This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Elektro-homeopatii´a´ grafa Mattei

Cesare Mattei

Digitized by Google



THE GIFT OF
The publishers.

Digitized by Google

H 615,8
M43e
Q8

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Mattei, Cesare, conte

С. В. Смирновъ.

ЭЛЕКТРО-ГОМЕОПАТІЯ

ГРАФА МАТТЕИ.

ДЕСЯТОЕ ИЗДАНІЕ.

вновь пересмотрѣнное, исправленное и значительно дополненное по запискамъ, оставшимся послѣ смерти автора и по лучшимъ иностраннымъ источникамъ.

ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ.

Съ подробнымъ алфавитнымъ указателемъ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типо-Литографія К. Л. Пентковскаго, Большая Подъяческая 22.
1908.

Digitized by Google

Digitized by Google

Зеленіс М. А. Т.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

СОДЕРЖАНІЕ КНИГИ:

Предисловіе къ новому 10-му изданію V
Предисловіе къ прежнему 9-му изданію VII
Литература XIII
Объ изобрѣтателѣ Электро-Гомеопатіи 1

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Введеніе 5
Отзывы русской печати 14
Мнѣніе врачей объ Электро-Гомеопатіи 15, 21, 35

Глава I. Этіологія 25

Глава II. Названіе лѣкарствъ и общія объ нихъ замѣчанія 26

Глава III. Характеристика серій и кругъ дѣйствія каждаго лѣкарства въ крупинкахъ:

А. Главныя лѣкарства . . . . . 36—80

Характеристика серіи Скрофолозо . . . . . 36—46

Кругъ дѣйствія Скрофолозо 1 (37), кругъ дѣйств. Скроф. 2 (41); кругъ дѣйств. Скроф. 3 (42); кругъ дѣйств. Скроф. 5 (43); кругъ дѣйств. Скроф. 6 (44); кругъ дѣйств. Скроф. Джіаппоне (44); кругъ дѣйств. Марина (45).
Дифференціальныя (отличительныя) свойства серіи Скрофолозо въ различныхъ дозахъ (46).

Характеристика серіи Анжіоитико . . . . . 47—55

Кругъ дѣйств. Анж. 1 (48); кругъ дѣйств. Анж. 2 (50); кругъ дѣйств. Анж. 3 (52) . . . . . .
Дифференціальныя (отличительныя) свойства серіи Анжіоитико въ различн. дозахъ (53).

258909

Digitized by Google

Характеристика серіи Канчероло . . . . . 55—64

Кругъ дѣйств. Канч. 1 (56); кругъ дѣйств. Канч. 2 (58); кругъ дѣйств. Канч. 3 (59); кругъ дѣйствія Канч. 4 (60); кругъ дѣйств. Канч. 5 (60); кругъ дѣйств. Канч. 6, 10, С. Т. В. (63); кругъ дѣйств. Лордъ, Домъ-финъ (64).

Дифференціальн. (отличительн.) свойства серіи Канчероло въ различн. дозахъ (64).

Характеристика и кругъ дѣйствія Линфатико . . . . 66—67

Дифференціальн. (отличительн.) свойства Линфатико въ различн. дозахъ (67).

Б. Спеціальныя лѣкарства . . . . . 68—80

Характеристика и кругъ дѣйствія ихъ:

Кругъ дѣйств. Фебрифуго 1 (68); кругъ дѣйств. Фебрифуго 2 (70).

Дифференціальное свойство Фебрифуго въ различн. дозахъ (71).

Характеристика серіи Вермифуго . . . . . 72—74

Кругъ дѣйствія Вермифуго 1 (72); кругъ дѣйствія Верм. 2 (73).

Дифференц. свойства Вермифуго въ различныхъ дозахъ (74).

Характеристика серіи Петторале . . . . . 75—76

Кругъ дѣйств. Петторале 1 (75); кругъ дѣйств. Петторале 2, 3 и 4 (76).

Дифференціальн. свойства Петторале въ различныхъ дозахъ . . . . . 76—77

Характеристика и кругъ дѣйствія Венерео . . . . . 77—78

Дифференціальн. свойства Венерео 79

Кругъ дѣйствія Анти-маль ди маре 79

Скрофолово лассативо 80

Глава IV. Способъ употребленія Электро-Гомеоп. крупинокъ и дозировка ихъ. . . . . 80—97

I. Внутреннее употребленіе крупинокъ . . . . . 80—88

а) Водные растворы или разведенія (крѣпкій растворъ; первое разведеніе или первый стаканъ; усиленное первое разведеніе; среднее разведеніе; второе разведеніе или второй стаканъ; третье, четвертое и высшія разведенія (80—86). Дозы для дѣтей (86).

б) Примѣненіе крупинокъ въ сухомъ видѣ или въ растираніяхъ (86—88).

Digitized by Google

II. Наружное употребленіе крупинокъ . . . . . 88—97

1) Мази: а) красная, б) бѣлая, в) синяя или Анжіонтико-мазь, г) зеленая, д) желтая, е) Вермифуго-мазь, ж) Лимфатико-мазь, з) Петторале-мазь, и) Венереомазь, і) Домъ-финъ-мазь (88—91); 2) втиранія (91); 3) обмыванія; 4) полосканія, 5) спринцованія, 6) ванны (92); 7) холодныя примочки, 8) согрѣвающій компрессъ (93); 9) тампоны, 10) пульверизація (94); 11) пластыри, 12) глазная ванна (95), глазныя примочки (96), 13) Суппозиторіи, свѣчи, маточные шарики (96). 14) Бужи (97). 15) Пудра для присыпки (97).

Глава V. Электро-Гомеопатическія жидкости . . . . 97—105

Характеристика и кругъ дѣйствія ихъ: 1) красная—Эл. Кр. (99); 2) желт.—Эл. Жел. (100); 3) бѣл.—Эл. Бѣл. (101); 4) синяя или Анжіонтико — Эл. Анж. (102); 5) зеленая—Эл. Зел. (104).

Глава VI. Наружное примѣненіе Электро-Гомеопатич. жидкостей . . . . . 105—111

Законъ поляризаціи (107); нервныя точки для приложенія электрогомеопатической жидкости (109).

Глава VII. Тѣлосложенія и темпераменты . . . . . 111—129

Тѣлосложеніе и его виды: 1) лимфатическое (113); 2) сангвиническое или анжіонтическое (116); 3) смѣшанное (118).
Темпераменты, ихъ теорія и виды: лимфатическій (123), сангвиническій (124), желчный (125), нервный (127), смѣшанный (129).

Глава VIII. О діагностикѣ . . . . . 130—142

Мѣстныя и общія разстройства организма. Внѣшніе признаки. Субъективные и объективные признаки. Способы изслѣдованія болѣзней (133—140): 1) перкуссія, 2) аускультація, 3) термометрія, 4) изслѣдованіе пульса, 5) ощупываніе, 6) изслѣдованіе пальцемъ, 7) изслѣдованіе зондомъ, 8) изслѣдованіе посредствомъ разныхъ снарядовъ, 9) взвѣшиваніе тѣла, 10) измѣреніе тѣла, 11) микроскопич. изслѣдованіе, 12) химическое изслѣдованіе. Возрастъ и соотвѣтствующія болѣзни (140).

Глава IX. Выборъ лѣкарства по тѣлосложенію и темпераменту . . . . . 142—145

Digitized by Google

Глава X. Выборъ дозы, продолжительность опыта и самаго лѣченія . . . . . 146—153

Глава XI. Діэта и нѣкоторыя гигіеническія указанія. 153—157

Глава XII. Нѣкоторые практическіе совѣты начинающимъ примѣнять Электро-Гомеопатію . . . . . 157—164

Вниманію иногородних 165

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Каталогъ болѣзней 167

Списокъ сокращеній, принятыхъ въ этой части, и объясненіе ихъ . . . . . 168—169

Различныя болѣзни и ихъ лѣченіе въ алфавитномъ порядкѣ 170

Списокъ лѣкарствъ 517

Центральный складъ Электро-Гом. лѣкарствъ 517

Цѣны лѣкарствамъ 518

Алфавитный указатель болѣзней, лѣкарствъ, органовъ тѣла, статей и терминовъ . . . . . .

Замѣченные опечатки и пропуски.

Стр.	*Строка.*	*Напечатано:*	*Слѣдуетъ читать:*
2	25	La Bochetta	La Rochètta
8	7	Ганнарда	Гоннарда
8	9	Баянусъ	Боянусъ
29	27	Anti-mal de mer	Anti-mal di mare
32	28	доказана	доказано
71	1	Febrifugo 1 (Фебриф. 1)	Febrifugo (Фебрифуго).
116	23	Сангвиническое и	Сангвиническое или
151	22	втягиваніе	втягиваніе въ носъ
207	35	см. параличъ	см. стр. 171 и параличъ
259	3	см. Лицо	см. выше стр. 356

Digitized by Google

Предисловіе къ новому 10-му изданію.

Авторъ этой книги, *С. В. Смирновъ*, скончался 28 февраля 1901 года въ преклонномъ возрастѣ. При его жизни вышло девять изданій этой его книги, что указываетъ на значительный успѣхъ ея въ русской публикѣ.

Всѣ эти изданія разошлись, и когда девятое изъ нихъ было уже на исходѣ, явилось безотлагательно нужнымъ напечатать новое, десятое изданіе, такъ какъ требованія на эту книгу не переставали поступать со всѣхъ концовъ Россіи. При этомъ явился вопросъ, печатать ли ее вновь въ неизмѣненномъ видѣ или сдѣлать въ ней кой-какія исправленія и дополненія въ соотвѣтствіи съ прогрессомъ, достигнутымъ въ новѣйшее время въ области Электро-Гомеопатіи, тѣмъ болѣе, что въ распоряженіи издателя имѣлись посмертныя записки автора, заготовленныя имъ для 10-го изданія.

Послѣ тщательнаго пересмотра предыдущаго изданія и сравненія его съ лучшими новѣйшими заграничными источниками оказалось однако совершенно необходимымъ, пользуясь, между прочимъ, вышеупомянутыми записками, сдѣлать въ новомъ изданіи *весьма существенныя* исправленія, измѣненія и дополненія. Весь этотъ трудъ взялъ на себя докторъ Л. Д. Френкель и постарался выполнить его наилучшимъ образомъ. Особенно подверглась такой обработкѣ *первая часть* книги, а именно: гл. IV (*Способъ употребленія—внутренняго и наружнаго—электрогомеопатическихъ крупинокъ и дозировка ихъ*), гл. VI (*Примѣненіе электрогомеопатическихъ жидко-*

Digitized by Google

стей), гл. VII (*Тѣлосложенія и темпераменты*) и проч. Количество главъ въ первой части увеличено: вмѣсто прежнихъ 8 (VIII) теперь—12 (XII).

Во *второй части* (*Каталогъ болѣзней*) описаніе и особенно лѣченіе болѣзней во многихъ случаяхъ дополнены, а въ нѣкоторыхъ и совершенно вновь переработаны; прибавлены также нѣкоторыя болѣзни, отсутствовавшія въ предыдущихъ изданіяхъ. Не обойденъ и рисунокъ въ концѣ книги, изображающій точки примѣненія Электро-Гомеопатическихъ жидкостей: онъ представленъ въ болѣе наглядной формѣ, съ очерченными областями внутреннихъ органовъ и обозначеніями мѣстъ примѣненія положительныхъ и отрицательныхъ Электро-Гомеопатическихъ жидкостей согласно закону поляризаціи (ср. стр. 107).

Но и въ настоящемъ усовершенствованномъ изданіи, какъ во всякомъ трудѣ человѣческомъ, могутъ оказаться еще недостатки въ отношеніи хотя бы полноты и ясности изложенія. И если бы читатель, при пользованіи этой книгой, находилъ бы для себя какія-либо недоразумѣнія, то за разъясненіями ихъ, а также для полученія письменныхъ указаній онъ можетъ обращаться въ Центральную Гомеопатическую Аптеку, С.-Петербургъ, Гороховая, 17 (см. статью: „*Вниманію иногороднихъ*“, на страницѣ 165).

Іюнь 1908 г.
С.-Петербургъ.

Digitized by Google

Предисловіе къ прежнему 9-му изданію.

Возникновеніе Электро-Гомеопатіи графа Маттеи относится къ 1865 году, и благодаря всѣмъ препятствіямъ, которыя она встрѣчала на пути своего развитія на благо общества, она проникла во всѣ государства всего Свѣта и сдѣлалась популярною вездѣ понемногу. Въ тѣхъ мѣстностяхъ, куда она проникла, ее примѣняютъ съ успѣхомъ несомнѣннымъ, часто удивительнымъ.

Изъ массы данныхъ въ пользу методы графа Маттеи достаточно указать: 1) его метода уничтожаетъ органическую причину болѣзни; 2) люди, пользующіеся ею, имѣютъ болѣе крѣпкое здоровье, заболѣваютъ рѣже, полны энергіи и одушевленія, при превратностяхъ судьбы и въ престарѣломъ возрастѣ силы и бодрость духа имъ не измѣняютъ; 3) въ самыхъ опасныхъ болѣзняхъ смертность при этомъ лѣченіи меньше; 4) метода лѣченія наиболѣе дѣйствительная, какъ дѣйствующая на органическую причину болѣзни, вполнѣ безопасна, сравнительно дешева и по своей простотѣ доступна массѣ населенія. Простота Электро-Гомеопатіи заключается въ томъ, что вся фармакологія ея состоитъ только изъ 37 лѣкарствъ: изъ нихъ 32 въ крупинкахъ и 5 въ жидкостяхъ; всѣ эти лѣкарства не подвергаются порчѣ и способъ примѣненія ихъ къ болѣзнямъ очень простъ; затѣмъ дешевизна и простота ея явствуетъ еще изъ того, что всякій грамотный, но здравомыслящій человѣкъ, къ весьма многихъ случаяхъ, можетъ оказать помощь больнымъ не обращаясь къ врачу, при чемъ очень многія болѣзни лѣчатся только одною крупинкою въ день, стоимостью въ $^1/_4$ копѣйки, и больные, во всѣхъ почти случаяхъ заболѣванія,

Digitized by Google

выздоравливаютъ скорѣе, чѣмъ при всякомъ другомъ способѣ лѣченія, и 5) этою методою, въ большинствѣ случаевъ, излѣчиваются болѣзни упорныя и признанныя неизлѣчимыми, какъ напр.: хроническіе ревматизмы и подагры, многія хроническія болѣзни пищеварительныхъ, дыхательныхъ и слуховыхъ органовъ, невралгіи, разные неврозы, многія женскія и мужскія болѣзни, малокровіе; недавніе фиброиды, незастарѣлые раковые опухоли и полипы; разныя лихорадки, болѣзни кожи, сердца и артерій, анемія мозга, двоезрѣніе, трахома, нѣкоторые параличи, разныя водянки, сифилисъ, холера; камни почечные, мочевые и желчные поддаются и растворяются. Проказа — этотъ бичъ человѣчества, уступаетъ волшебному дѣйствію лѣкарствъ графа Маттеи. Ссылаемся, въ этомъ случаѣ, на заявленіе іезуитовъ изъ Мангалора [1]). Однимъ словомъ, исцѣляются болѣзни, противъ которыхъ ни аллопатія, ни гомеопатія не имѣютъ вѣрныхъ средствъ.

Въ подтвержденіе сказаннаго, независимо отъ тѣхъ фактовъ, которые содержатся въ этой книгѣ, мы дѣлаемъ выписку изъ статьи В. Т. Стэда, напечатанной въ приложеніи къ газетѣ „Новое Время“ 23-го Февраля (7-го Марта) 1891 г. № 5384. Въ этой статьѣ читаемъ: „графъ Маттеи—итальянскій вельможа, живущій въ своемъ замкѣ Ла-Рокетъ (*La Rochetta*), близъ г. Болоньи. Лэди Пэджетъ (*Lady Wally Paget*) посѣтила его послѣ того, какъ мужъ ея, теперешній англійскій посолъ въ Вѣнѣ, вылѣчился его лѣкарствами. Благодаря статьѣ ея, помѣщенной ею въ „*National Review*“ за май мѣсяцъ 1890 года, общественное мнѣніе въ Англіи впервые обратило вниманіе на средства графа Маттеи. Лэди Пэджетъ не стала бы писать, еслибъ не имѣла на это самыхъ серьезныхъ причинъ. Она утверждаетъ положительнымъ образомъ, что у ея мужа ракъ былъ излѣченъ лѣкарствами Маттеи. Она лично познакомилась съ графомъ и испытала на самой себѣ и на своихъ друзьяхъ цѣлебное свойство его медикаментовъ. Впечатлѣніе, что дѣйствительно есть что-то серьезное въ таинственномъ открытіи

[1]) Тамъ существуетъ пріютъ для прокаженныхъ (*Asile Mattei* à Mangalore, Inde).

Digitized by Google

графа Маттеи, еще усилилось послѣ появленія второй статьи лэди Пэджетъ. Въ ней она сообщала, что во время прошлогодней эпидеміи инфлуенцы, лѣкарства Маттеи оказывали почти *волшебное дѣйствіе*: „паціенты, находившіеся въ состояніи полной прострацiи, поправлялись въ пять минутъ до такой степени, что почти не вѣрили, что были больны". И это засвидѣтельствовано не кѣмъ-нибудь, а дамой уважаемой, мужъ которой достигъ высшаго поста въ дипломатической службѣ, кромѣ того, особой, не имѣвшей никакихъ личныхъ или корыстныхъ мотивовъ, чтобы рекомендовать это средство всему міру. Разумѣется, медицинскій факультетъ, по своему обыкновенію, высказался противъ лѣченія графа Маттеи. Но вѣдь безъ этого ни одно новое открытіе не можетъ считаться достойнымъ вниманія публики. Такой приговоръ, въ сущности, уже служитъ доказательствомъ, что данное открытіе имѣетъ серьезное значеніе.

Графъ Маттеи не имѣетъ притязаній дѣлать чудеса въ смыслѣ сверхъестественнаго. Разумѣется, нельзя принимать на вѣру каждую сказку, наивно измышленную и преувеличенную, но нельзя и отвергать a priori все, что, повидимому, выходитъ изъ предѣловъ нашихъ ограниченныхъ понятій о возможномъ. Но вотъ лэди Пэджетъ, свидѣтельница безпристрастная и заслуживающая довѣрія, утверждаетъ, что графъ Маттеи открылъ средства, которыя она и другіе свидѣтели, также достойные довѣрія, признали чрезвычайно дѣйствительными для излѣченія болѣзней, до этихъ поръ признанныхъ неизлѣчимыми съ помощью докторовъ".

Статьи лэди Пэджетъ въ „National Review" не остались безъ послѣдствій для просвѣщеннаго ея отечества: въ Лондонѣ вскорѣ были учреждены двѣ Электро-Гомеопатическія лѣчебницы, изъ нихъ одна принадлежитъ доктору Кеннеди (Kennedy); тамъ же началъ издаваться ежемѣсячный Электро-Гомеопатическій журналъ „Modern Medicine", по цѣнѣ баснословно дешевой—два франка въ годъ съ пересылкою во всѣ страны Свѣта, который расходится въ огромномъ количествѣ экземпляровъ какъ въ самой Англіи, такъ и въ ея многочисленныхъ

Digitized by Google

колоніяхъ; число послѣдователей графа Маттеи въ Англіи начало быстро увеличиваться, что видно изъ того, что въ Англіи существуетъ 28 депо его лѣкарствъ, въ одномъ Лондонѣ ихъ десять; докторъ Кеннеди читаетъ въ Лондонѣ публичныя лекціи объ Электро-Гомеопатіи, посѣщаемыя высшею аристократіей, которая публично выражаетъ ему свою признательность, и, заключаемъ изъ „Modern Medicine", что „благодаря лѣкарствамъ графа Маттеи, въ послѣднія семь лѣтъ въ Англіи и ея колоніяхъ процентъ выздоравливающихъ отъ неизлѣчимыхъ болѣзней замѣтно увеличился, а съ тѣмъ вмѣстѣ и срокъ лѣченія обыкновенныхъ болѣзней значительно сократился".

Сколько есть еще страдальцевъ, которые не вѣдаютъ, что Электро-Гомеопатія представляетъ одинъ изъ прогрессовъ среди экспериментальныхъ методовъ лѣченія, и сколько того не знаютъ, что теперь можно освободиться отъ различныхъ мучительныхъ болѣзней и не прибѣгать къ операціямъ! Съ цѣлью доставить каждому больному возможность лѣченія его болѣзни простою и дѣйствительною методою мы составили руководство это, которое можетъ быть настольною книгою каждаго больного, желающаго лѣчиться съ серьезною надеждою на выздоровленіе, и полагаемъ, что оно будетъ ими принято благосклонно.

Но съ другой стороны есть очень много сомнѣвающихся и невѣрующихъ, которые презрительно относятся къ этой методѣ лишь только потому, что фактъ излѣченія болѣзни или, вѣрнѣе, фактъ дѣйствія лѣкарства на организмъ больного въ минимальной дозѣ кажется имъ непостижимымъ и невѣроятнымъ, и по этой причинѣ для лѣченія своихъ болѣзней неизлѣчимыхъ или упорныхъ, они охотно подвергаются дорого стоющему аллопатическому способу врачеванія какъ наиболѣе соотвѣтствующему ихъ понятіямъ, они не уклоняются также и отъ, такъ называемыхъ докторомъ Вилемъ, средневѣковыхъ пытокъ надъ собою и мучительныхъ операцій, очень часто безполезныхъ и усиливающихъ или развивающихъ ихъ страданія.

Digitized by Google

Это руководство все нами исправлено и мѣстами дополнено. Эта книга, въ относительно короткое время, выдержала восемь изданій; по ясности своего изложенія, по количеству и полнотѣ содержащихся въ ней новыхъ свѣдѣній и указаній, которыхъ вовсе нѣтъ у другихъ авторовъ, она пользуется извѣстностію и предпочтеніемъ передъ всѣми иностранными и рускими изданіями по этому предмету и удостоилась одобрительныхъ отзывовъ иностранной печати, которые о ней печатались въ Clinique Electro-Homéopathique, Moniteur de l'Electro-Homéopathie, Modern Medicine и Blätter für Electro-Homöopathie.

Точно также и русскіе послѣдователи методы графа Маттеи, и между ними есть врачи, указывая въ русской печати [1]) на преимущества этой системы лѣченія, въ то же время не обошли молчаніемъ и о достоинствахъ этой книги.

С. Смирновъ.

20 Августа 1898 г.
С.-Петербургъ.

[1]) См. ниже отзывы печати, стр. 14.

Digitized by Google

Digitized by Google

Литература.

Un poco di storia sui rimedi Mattei degli effetti che se ne ottengeno e del modo di usarno. Bologna. 1874.

Emancipazione dell'uomo dal medico pei rimedi Mattei. Bologna. 1875.

La scienza nuova dal Conte Cesare Mattei a la scienza veechia del Dottore. C. Bologna. 1882.

Fin des palliatifs et principe de la liberté de la médecine, aux amateurs de la liberté. Nice. 1882.

Elettromiopatia. Scienza nuova che cura il sangue e sana l'organismo. Libro dettato dal Conte Cesare Mattei a bene dei popoli, che la massima parte dei medici reffiuta di curare coll' Elettromiopatia. Casale Monferato. 1880.

Electro-Homéopathie. Principes d'une science nouvelle, decouverte par le Comte César Mattei de Bologne. 1-e éd. française. Nice. 1879. Второе изданіе этой книги вышло подъ тѣмъ же названіемъ въ Болоньи въ 1880 г.

Electro-Homéopathie. Vade-Mecum. Bologne. 1882.

Nouveau Vade-Mecum. Bologne. 1883. Traduit de l'Italien en Français, en Allemand, en Anglais et en Espagnol.

Guide pratique pour l'emploi des spécifiques Mattei, par le docteur Regard. 2-e édit. Genève. 1873.

Nouveau guide pratique de l'Electro-Homéopathie par le Comte César Mattei. Nice. 1881. Эта книга переведена на испанскій и арабскій языки.

Spécifiques Electro-Homéopathiques du Comte Mattei, par S. Berard. 7-e édit. Valence. 1884. Изъ всѣхъ существующихъ до сего времени на иностранныхъ языкахъ это лучшее

Digitized by Google

руководство, и значительно превосходитъ 5-е изданіе подъ тѣмъ же заглавіемъ, вышедшее въ Женевѣ въ 1878 г.

Médecine Electro-Homéopathique ou nouvelle thérapeutique expérimentale par le Comte César Mattei. Nice. 1883.

Mattei. Nowa Elektro-Homeopatyczna Metoda leczenia, Wilna. 1879.

Mattei Elektro-Homeopatyczna Metoda leczenia jej srodki i zastosowania. 1891.

Hrabiego Cesarego Mattei Elektro-Homeopatja zasady nowej umiejętnosci, jej srodkow, chorob objętych spisem alfabetycznym. Przeclad z oryginalu francuzkiego Stanislavy z Kaczkwoskich Byszewskiej. Krakow. 1881.

Electro-Homöopathie. Grundsätze einer neuen Wissenschaft dargelegt vom Grafen Cesare Mattei in Bologna. 3-te Auflage Regensburg. 1883.

Der Aerztliche Rathgeber der Electro-Homöopathischen Heilmethode, des Entdeckers Grafen Cesare Mattei. München. 1883.

Lehrbuch der Electro-Homöopathie nach den Erfahrungen benährier Aerzte und Praktiker zusammengestellt. 2-te Auflage. Stuttgart. 1882.

Cesar Mattei, Electro-Homoeopathy. The principles of new science. Bologne. 1880.

Mattei Count's Electro-Homoeopathic specifics. Third edition. Geneva.

Lehrbuch der Electro-Homöopathie von Dr. med. A. Hewser. Leipzig. 1896.

Журналы.

1. Прежде издававшіеся:

Revue Electro-Homéopathique. Journal médical. Genève 1878—1881.

Revue Française d'Electro-Homéopathie. Directeur M. le Dr. La Bonnardière. Grenoble. 1883—1885.

Digitized by Google

Bulletin Electro-Homéopathique. Journal médical. Publié par Mr A. Clerc. Motiers-Travers (Suisse). 1883—1885.

Clinique Electro-Homéopathique. Publiée par M. le Commandeur Ghirelli. Nice. 1884—1887.

2. Журналы теперь издающіеся:

Moniteur de l'Electro-Homéopathie. Revue mensuelle de la science médicale, découverte par le Comte César Mattei. Rédaction et Administration: Rue Mazzini 46, Bologne. Abonnement pour un an 5 fr.; pour six mois 2 fr. 50 c.

Modern Medicine. (Revue mensuelle). The Official English Magazine of Count Mattei's System of Electro-Homoeopathy. Rédaction et Administration; Central Depot for Count Mattei's Remedies, 18, Pall Mall East, London, S. W. — Prix de l'abonnement annuel fr. 2.

Monatschrift für Electro-Homöopathie, organe de la nouvelle science médicale du Comte César Mattei, seule édition allemande autorisée par le Moniteur de l'Electro-Homoeopathie. Imprimerie de W. F. Friedrich, Leipzig, Libraire de la Cour royale. — Prix de l'abonnement pour un an 2 marcs 50.—Six mois, 1 marc 25.

A Electro-Homoeopathia. (Revue Mensuelle). Organe de l'Institut Electro-Homoeopathique de Lisbonne (Portugal), dirigé par M. le Docteur J. P. Macedo de Bragança. Redaction et Administration — Rua du Palma, 115, 1º. Lisbonne. Prix de l'abonnement: Un an, 500 reis—6 mois 300 reis.

Journal for Electro-Homoeopathie, revue mensuelle d'Electro-Homoeopathie, publié en anglais sous la direction du Dr. Chas A. Pusheck à Chicago (Etats Unis d'Amérique) 330 La Salbe Avenue. Prix de l'abonnement annuel fr. 2. 50.

Digitized by Google

Кромѣ того, при составленіи этого руководства служили источниками:

Бокъ, Д-ръ. Книга о здоровомъ и больномъ человѣкѣ.

Бурцевъ, Д-ръ. Анатомія человѣка.

Нимейеръ, Д-ръ. Руководство къ частной патологіи и терапіи.

Шредеръ. Болѣзни женскихъ половыхъ органовъ.

Штейнеръ. Compendium дѣтскихъ болѣзней.

Jules Davasse. De la Syphilis, de ses formes, etc. Ballière et Fils, Paris.

Андреевскій, Д-ръ. Школа здоровья.

Шеръ, Д-ръ. Руководство къ распознаванію женскихъ болѣзней.

Кашеварова-Руднева, Д-ръ. Гигіена женскаго организма во всѣхъ фазисахъ жизни.

Котовщиковъ, Д-ръ. Таблицы важнѣйшихъ признаковъ внутреннихъ болѣзней. 1886.

Лори. Гомеопатическая домашняя медицина, и нѣкторые другіе; особыхъ ссылокъ на нихъ сдѣлано не будетъ.

Digitized by Google

Объ изобрѣтателѣ Электро-Гомеопатіи.

Графъ Цезарь Маттеи родился 11 января 1809 года въ г. Болоньи, въ Сѣверной Италіи. Онъ происходилъ изъ одной древнѣйшей и наиболѣе богатой фамиліи этого города и принадлежалъ къ той золотой молодежи, у которой не было другой цѣли къ жизни, какъ жизнь беззаботная.

Его воспитателемъ былъ, извѣстный въ то время, ученый философъ *Paolo Costa* *), который даромъ своего убѣжденія умѣлъ расположить къ себѣ молодого Маттеи и убѣдилъ его посвятить себя изученію литературы, философіи и наукъ естественныхъ. Цезарь Маттеи съ непоколебимою волею послѣдовалъ совѣту своего наставника и предался наукѣ, подъ его наблюденіемъ, со рвеніемъ и рѣдкою настойчивостью. Этотъ родъ жизни прерывался только путешествіями съ образовательною цѣлью по Италіи и заграницей.

Въ 1846 году, при восшествіи Пія IX на папскій престолъ, начинается политическая карьера Маттеи, и хотя эта карьера была не продолжительна, но Маттеи занималъ разныя высшія должности, гдѣ оказалъ свои отличія. За пожертвованіе папскому престолу одной изъ своихъ недвижимостей Пій IX пожаловалъ ему въ 1847 году титулъ личнаго графскаго достоинства. Но завѣтная мысль его была изучить медицину, и потому на 40 году своей жизни онъ оставилъ свое политическое поприще и посвятилъ себя изученію терапіи и всѣхъ относящихся къ ней вспомогательныхъ естественныхъ наукъ. Слѣдуя правиламъ галлилейской школы, ему послѣ долгихъ и терпѣливыхъ изысканій удалось извлечь изъ нѣкоторыхъ растеній экстракты, которые одни, или соединенные вмѣстѣ, образовали врачебныя средства новой методы лѣченія, которую онъ назвалъ Электро-Гомеопатіей. Эти врачебныя средства не содержатъ въ себѣ ничего вреднаго и ядовитаго, это не пальятивы, они дѣйствуютъ вѣрно и быстро на самую причину болѣзни.

---

*) Paolo Costa. Lettere al Conte Cesare Mattei edite per la prima volta da Mario Venturoli-Mattei. Bologna. 1890.

Digitized by Google

Онъ вскорѣ практически испыталъ свою методу лѣченія. Удивительные результаты ея были прежде всего имъ достигнуты въ Болоньи, въ своемъ дворцѣ. Въ этомъ дворцѣ Графъ Маттеи давалъ безплатные совѣты больнымъ, которые являлись къ нему изъ Италіи и заграницы. На этихъ консультаціяхъ нерѣдко присутствовали извѣстные ученые и врачи.

Въ 1868 году Графъ Маттеи примѣнилъ свой способъ лѣченія въ Римѣ, въ госпиталѣ Св. Терезы, подъ наблюденіемъ Профессора Паскучи. Тамъ результаты были на столько блестящи, что они удивили всѣхъ присутствующихъ. Это былъ настоящій тріумфъ, и имя Графа Маттеи сдѣлалось извѣстнымъ не только въ Италіи, но и во всей Европѣ.

Вездѣ, гдѣ только метода его лѣченія могла избавиться отъ невѣжества, избѣгнуть враговъ всякаго рода открытій, ускользнуть отъ людей недоброжелательныхъ или съ наклонностями къ разгульной жизни и не встрѣтиться съ нравственными уродами были засвидѣтельствованы блестящіе результаты, ея неоспоримыя благодѣянія. Это истина. При такихъ данныхъ нѣтъ ничего удивительнаго, что его метода лѣченія все болѣе и болѣе пріобрѣтаетъ довѣріе, потому что почти всегда оправдывала надежды больныхъ и имѣетъ свою литературу.

Кто лично зналъ Графа Маттеи тотъ можетъ сказать, что онъ былъ человѣкъ добродѣтельный и вмѣстѣ съ тѣмъ очень эксцентричный и съ причудливыми привычками. Къ числу его причудливостей надо отнести постройку имъ замка «*La Bochetta*» въ округѣ «*Vergato*». Архитектура его много напоминаетъ средне-вѣковую архитектуру феодальныхъ замковъ: тѣ же башни и стѣны съ амбразурами и бойницами, тѣ же высокія крыши и причудливые куполы, издали напоминающіе наши пятиглавыя монастырскія церкви. Этотъ замокъ изъ сѣраго гранита, пристроенъ къ скалѣ, такъ что гдѣ есть выступы, углубленія въ горѣ, такъ и комнаты расположены соотвѣтственно мѣстности. Какъ на особенность этой постройки надо указать, что въ этомъ замкѣ одни проходныя залы, окна узкія и высокія съ разноцвѣтными стеклами, стѣны расписаны причудливыми фресками въ восточномъ вкусѣ, полное отсутствіе мебели во всѣхъ залахъ, но у самыхъ стѣнъ пристроены каменные диваны, довольно длинные, въ видѣ лежанокъ, и во всемъ замкѣ нѣтъ ни одной жилой комнаты, кромѣ кабинета-спальни Графа Маттеи. Другая особенность этого замка состоитъ въ томъ, что внутри его находится зіяющая пропасть во всю ширину темнаго коррицора, ведущаго въ упомянутый кабинетъ-спальню. Эта пропасть днемъ закрыта желѣзною рѣшеткою и по ней

Digitized by Google

свободно можно ходить, а на ночь, и когда вздумается, эту рѣшетку Графъ Маттеи приподнималъ помощью блока, и она составляла дверь въ его кабинетъ-спальню, а пропасть оставалась открытою на все время пока Графъ Маттеи не опуститъ рѣшетчатую дверь. Это было устроено графомъ Маттеи для того, что если бы кто вздумалъ посягнуть на его жизнь, то эта пропасть преграждала къ нему входъ, и незнающій о ея существованіи легко можетъ въ нее провалиться, потому что корридоръ темный, безъ перилъ, и пропасть, послѣ подъема рѣшетки, ничѣмъ не загораживалась.

Въ этотъ замокъ пріѣзжали больные и много знатныхъ особъ всѣхъ націй, которыя желали воспользоваться личнымъ совѣтомъ Графа Маттеи. Здѣсь же жилъ въ 1879 году нѣсколько мѣсяцевъ, по приглашенію самого Графа Маттеи, и авторъ этой книги, который учился Электро-Гомеопатіи подъ личнымъ его руководствомъ. Графъ Маттеи всѣхъ своихъ посѣтителей принималъ одинаково радушно и гостепріимно, такъ какъ ни національность, ни вѣроисповѣданіе, ни соціальное положеніе человѣка для него не имѣли значенія. Онъ всѣхъ пріѣзжавшихъ къ нему приглашалъ у него отобѣдать, и всѣ гости, не взирая на разность своего соціальнаго положенія, обѣдали за общимъ съ нимъ столомъ.

Въ этомъ замкѣ онъ прожилъ уединенно, настоящимъ философомъ и безъ всякихъ потребностей, послѣдніе 17 лѣтъ своей жизни и здѣсь скончался $\frac{\text{22 Марта}}{\text{3 Апрѣля}}$ 1896 года на 87 году своей жизни.

Покойный Графъ Маттеи былъ холостъ и не имѣлъ нисходящаго потомства и законныхъ наслѣдниковъ, которымъ онъ могъ-бы, послѣ своей смерти, завѣщать секретъ изобрѣтенныхъ имъ Электро-Гомеопатическихъ лѣкарствъ, а также свое имя и свой замокъ, рѣшилъ въ 1888 году усыновить Г-на Маріо Вентуроли *(Mario Venturoli)* жителя г. Болоньи, имѣвшаго тогда отъ роду 30 лѣтъ, и который въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ былъ сотрудникомъ Графа Маттеи и директоромъ центральнаго его склада лѣкарствъ въ г. Болоньи. Усыновленіе это утверждено Судомъ *(R. Cour d'Appel de Bologne)* 31-го Декабря 1888 г., и усыновленный сынъ Графа Маттеи носитъ имя Маріо Вентуроли-Маттеи *(Mario Venturoli-Mattei)*. Незамедлительно отъ сего объ этомъ усыновленіи было напечатано въ «*Moniteur de l'Electro-Homéopathie*» и всѣ корреспонденты Графа Маттеи были имъ извѣщены отдѣльными циркулярами.

Такимъ образомъ г. Маріо Вентуроли-Маттеи является собственникомъ секрета лѣкарствъ покойнаго своего усыновителя

Digitized by Google

и по волѣ его будетъ продолжать традицію филантропическую, слѣдуя всѣмъ его предначертаніямъ и указаніямъ.

Г. Маріо Вентурали-Маттеи лицо вполнѣ компетентное для исполненія воли Графа Маттеи, потому что онъ въ продолженіи многихъ лѣтъ былъ усерднымъ его помощникомъ и вполнѣ изучилъ способъ приготовленія его лѣкарствъ, такъ что служитъ полною гарантіею, что онъ будетъ точный истолкователь и исполнитель теоріи и практики знаменитаго изобрѣтателя Электро-Гомеопатіи.

Былъ моментъ во время жизни Графа Маттеи, когда казалось, что онъ имѣлъ намѣреніе обнародовать составъ своихъ лѣкарствъ, что-бы обезоружить послѣдователей аллопатіи, которые для того, что-бы сразить Электро-Гомеопатію указывали на отсталость и неприличіе таить секреты въ вѣкѣ въ высшей степени положительномъ, который желаетъ все видѣть, все изслѣдовать и все знать, что скрыто и таинственно. Но Графъ Маттеи былъ того мнѣнія, что если составъ его средствъ будетъ обнародованъ, то для больныхъ уже не будетъ существовать гарантіи въ способѣ ихъ приготовленія. А потому обязалъ своего усыновленнаго сына хранить въ тайнѣ составъ его Электро-Гомеопатическихъ лѣкарствъ.

Digitized by Google

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Введеніе.

Ни въ одной отрасли человѣческаго знанія, говоритъ профессоръ Бенедиктъ [1]), факты не отрицаются и не игнорируются такъ долго, какъ въ медицинѣ. Каждая страница исторіи медицины говоритъ намъ, что самыя безсмысленныя положенія принимаются, если они соотвѣтствуютъ господствующимъ воззрѣніямъ. Напротивъ того, самыя очевидныя истины были игнорированы и устраняемы посредствомъ оклеветанія автора, какъ скоро они стояли въ разрѣзъ съ господствующими мнѣніями.

Изъ этого видно, что медицина вовсе еще неточная наука, что ей недостаетъ строгаго методически-критическаго мышленія, а главное, что врачи больше довѣряютъ своимъ мнѣніямъ, которыя исторія не признаетъ, чѣмъ природѣ, которая проявляетъ себя въ фактахъ и явленіяхъ.

Недовѣріе къ электро-гомеопатіи понятно. Ученый міръ издавна возставалъ противъ истинъ вышедшихъ не изъ цеха— это историческій фактъ. Но большинство изобрѣтеній нашего времени, и, между прочимъ, наиболѣе выдающіяся изъ нихъ сдѣланы не записными учеными, а самоучками изъ публики, почерпнувшими необходимыя свѣдѣнія не въ университетахъ и не изъ ученыхъ трактатовъ, а въ мастерскихъ и изъ популярныхъ сочиненій. Такъ, гидропатію создалъ крестьянинъ Присницъ, изобрѣтатель парохода Фультонъ былъ часовой ма-

---

[1]) Каталепсія и Месмеризмъ. Проф. Бенедикта, въ Вѣнѣ. Переводъ съ нѣмецкаго подъ редакціею д-ра Дмитріева. Спб. 1880 года.

Digitized by Google

стеръ и живописецъ, творецъ паровоза и желѣзныхъ дорогъ Стефенсонъ—простой машинистъ, изобрѣтатель электрическаго телеграфа Морсъ — живописецъ и учитель рисованія, знаменитый теперь Эдисонъ—сначала продавецъ газетъ, а потомъ телеграфистъ.

Чтобы пользоваться наукою, въ особенности, чтобы примѣнять къ жизни и разработывать поставленные ею практическіе вопросы, говоритъ докторъ Симоновъ [1]), нѣтъ надобности быть цѣховымъ ученымъ; достаточно желанія, энергіи и интереса къ вопросу, главнымъ образомъ именно *интереса,* хотя бы и чисто матеріальнаго свойства. Значеніе ученыхъ для общества, конечно, очень велико, но наибольшее вліяніе на него оказываютъ не ученые, а искусные популизаторы знаній. Работать съ пользою для себя и общества можетъ всякій, у кого есть умъ и руки. Но для этого нужна нравственная смѣлость, подобная той, которая позволила часовому мастеру изобрѣсти пароходъ, а малообразованному продавцу газетъ сдѣлаться спеціалистомъ по телеграфной части и, будучи телеграфистомъ, устроить прославившій его фонографъ.

Непониманіе дѣйствія электро-гомеопатическихъ лѣкарствъ, на организмъ человѣческій, вызвало противъ себя недовѣріе, презрѣніе и даже злобу, между тѣмъ истинное дѣйствіе большей части лѣкарствъ, по словамъ профессора Бенедикта, по крайней мѣрѣ въ большій періодъ медицинской исторіи, также было неизвѣстно, или врачи только воображали, что они его понимаютъ. Да и теперь, говоритъ, еще никто не догадывается, почему большинство ядовъ дѣйствуютъ такъ, а неиначе. Кому же извѣстенъ, напримѣръ, процессъ, вызываемый въ организмѣ морфіемъ или атропиномъ. Не безъ основанія «Русская Рѣчь» [2]) замѣтила, что еще до сихъ поръ ученые врачи не могутъ прійти къ положительному заключенію даже о дѣйствіи горчичниковъ на больной организмъ.

Основное правило Электро-Гомеопатіи, какъ результатъ

---

[1]) Гигіена зрѣнія. Д-ра Симонова. Спб. 1890 г.

[2]) Кн. III, 1881 г. Аллопатія и ея врачебный арсеналъ.

Digitized by Google

многолѣтнихъ опытовъ надъ людьми, заключается въ томъ, что болѣзнь нужно лѣчить не по симптомамъ, а причину ея. Уничтоживъ причину, вызвавшую болѣзнь, организмъ приходитъ въ нормальное состояніе, лишь бы органъ, необходимый для жизни, не былъ разрушенъ. Многолѣтніе опыты и тѣ диспуты, на которые графомъ Маттеи приглашены были знаменитости медицинскаго міра изъ столицъ Европы, не привели ни къ какому результату, кромѣ того, что вреда положительно никакого электро-гомеопатическія средства принести не могутъ, даже при невѣрномъ опредѣленіи болѣзни и несоотвѣтствущемъ выборѣ лѣкарствъ.

Не то мы видимъ при лѣченіи аллопатіей. Докторъ Виль (Wiel), процессоръ гигіены въ Цюрихѣ, въ своемъ сочиненіи [1]) причисляетъ наибольшую часть аптечныхъ лѣкарствъ къ числу ядовитыхъ и вредныхъ, въ родѣ: Morphium, Aq. Laurocerasi, Nux vomica, Belladona, рвотный камень, александрійскій листъ, глауберовая соль, кротоновое масло, каломель, ялаппа, минеральныя кислоты и воды, большинство металлическихъ солей, квасцы, дубильная кислота, алкоголь и тому подобныя вещи, и говоритъ, что употребленіе лѣкарственныхъ веществъ не разъ служило причиною страданія желудка. Извѣстно, что большинство этихъ веществъ, которыми лѣчатся болѣзни, вводятся per os и всасываются черезъ желудокъ; они вредятъ не только путемъ того раздраженія, которое они наносятъ слизистой оболочкѣ желудка, но и свойственной имъ способностью притуплять переваривающую силу желуднаго сока, и опытъ показалъ, что простыя средства несравненно полезнѣе ядовитыхъ, аптечныхъ лѣкарствъ. Всѣ отвлекающіе раздражители, какъ-то: банки, мушки, горчичники, заволоки и т. д. онъ называетъ безплодною жестокостью, средневѣковыми пытками, ими только отвлекается вниманіе больного отъ настоящаго мѣста боли. Нѣтъ счета,—замѣчаетъ онъ,—тѣмъ безсоннымъ, мучительнымъ

[1]) Какъ и чѣмъ кормить больныхъ, страдающихъ желудкомъ. Перев. съ 5-го изд., съ предисловіемъ профессора В. Манасеина. Спб., 1881 г. См. также: «Аллопатія и ея врачебный арсеналъ», статья А. Н. въ «Русской Рѣчи», кн. III, 1881 г.

Digitized by Google

ночамъ и страданіямъ, нанесеннымъ не болѣзнію, а варварскимъ методомъ врачеванія, создавшимъ такія мучительныя врачебныя средства. Мы должны сознаться въ этомъ, ибо нельзя смотрѣть и не видѣть, трогать и не осязать, читать и не понимать.

Это указаніе д-ра Виля на ядовитость и вредъ аллопатическихъ лѣкарствъ и утвержденіе д-ра Ганнарда о ничтожествѣ аллопатіи [1]) находятъ себѣ отголосокъ и въ русской печати. Такъ д-ръ Баянусъ говоритъ [2]): «публика ищетъ исцѣленія тамъ, гдѣ можетъ его найти, и если ученые врачи помочь ей не въ состояніи, то она стучитъ въ другія двери, которыя ей услужливо открываются. Публикѣ никакой пользы не приноситъ ни самая блестящая діагностика, ни самое изящное окрашиваніе бактерій, такъ какъ цѣль врачебной науки заключается не въ одномъ только опредѣленіи болѣзни, но въ излѣченіи ея». Затѣмъ, газета «Сынъ Отечества», въ рубрикѣ «*Изъ русской печати*» [3]) помѣстила: «когда видимъ, говоритъ, фельетонистъ «Новаго Времени», эти утонченныя ухищренія и искусственныя задачи напряженной, неестественной выдумки вивисекторовъ, и сопоставляя ихъ съ тѣмъ простымъ, общимъ фактомъ, что *большинство людей умираетъ отъ простой простуды и врачи не умѣютъ ея вылѣчить*, а великому множеству людей ихъ помощь и вовсе не доступна, то торжество ученыхъ собраній, по поводу опыта съ блуждающими нервами, принимаетъ значеніе сарказма, и тѣмъ болѣе печальнаго и ядовитаго, что въ основѣ опыта лежитъ искреннее убѣжденіе вивисектора будто онъ совершилъ «*чудо*». Кому и зачѣмъ это «*чудо*»? Самыхъ вѣрныхъ болѣзней не умѣютъ лѣчить и понимать, и въ то же время увлеченіе вивисекторствомъ принимаетъ угрожающіе размѣры, и не можетъ не возмущать печальнымъ скудоуміемъ и безсердечіемъ quasi-ученыхъ живорѣзовъ. Это стремленіе обезсмертить имя въ наукѣ открытіемъ безъ ума и таланта, прямо позорно для науки». Съ этимъ

[1]) См. въ отзывахъ печати статью П. Куракина, стр. 17.
[2]) Врачъ-Гомеопатъ, 1896 г. № 8.
[3]) С. О. 1895 г. №№ 117, 141 и 204.

Digitized by Google

нельзя не согласиться. Но вотъ и другое обвиненіе врачей читаемъ въ той же газетѣ: «поразительно большое число внезапныхъ «*скоропостижныхъ*» смертей естественно обращаетъ вниманіе общества. Что случилось? Отчего такъ часто мрутъ сравнительно молодые, полные силъ люди—спрашиваютъ всѣ, для которыхъ оффиціальное опредѣленіе: «*параличъ сердца*» или «*разрывъ сердца*» ничего не объясняютъ. Да отъ чего же такъ часто стали происходить эти параличи и разрывы, о которыхъ въ доброе старое время слышали только изрѣдка?

Отчего продолжительность человѣческой жизни такъ замѣтно сократилась, и въ 50 лѣтъ человѣкъ считается и считаетъ себя старикомъ, а доживающій до 70 лѣтъ возбуждаетъ удивленіе?

Шибко живутъ, говорятъ одни врачи; слишкомъ много работаютъ, замѣчаютъ другіе; *отравляются*, скажемъ мы, *отравляются съ перваго года отъ рожденія*. И это не фраза.

Каждую ничтожную болѣзнь наши врачи-аллопаты излѣчиваютъ большимъ или меньшимъ количествомъ наркотическихъ средствъ, маскируя бездѣйствіе медицины дѣйствовать на корень болѣзни. И нѣкто *Cardanus*, сурово осуждаетъ охватившую всѣхъ врачей-аллопатовъ, страсть къ новымъ медицинскимъ панацеямъ. Указывая на лѣченіе въ настоящее время разныхъ болѣзней кровяною сывороткою, о чемъ подробно не будемъ здѣсь распространяться, онъ говоритъ, дѣло дошло до такого отвратительнаго эмпиризма, что являются охотники лѣчить болѣзни сердца настойкою изъ сердца, болѣзни печени—настойкою изъ печени и пр. И это теперь, въ началѣ XX вѣка. Пора бы подумать врачамъ, что эмпиризмъ, имѣвшій смыслъ въ средніе вѣка, когда иначе нельзя было добывать новые факты, теперь является чѣмъ то дикимъ, смѣшнымъ и печальнымъ, роняющимъ значеніе медицины до степени знахарства самой низкой пробы.

Антипиринъ, антифибринъ, фенацетинъ, хлороформъ, опій, іодъ, морфій, кофеинъ, кодеинъ и т. д.—всѣ эти средства щедро вводятся въ организмъ больного съ расчетомъ доставить паціенту сонъ, забытье или апатію, а тамъ, молъ, природа возьметъ свое! И всѣ они дѣйствуютъ великолѣпно, всѣ даютъ

Digitized by Google

«блестящіе» результаты. Изобрѣтатель заявляетъ, что такое то средство понижаетъ черезъ часъ послѣ пріема температуру на 2 или на 3 градуса, и врачи кричатъ *«ура»*, и начинаютъ этимъ средствомъ накачивать больныхъ, имѣющихъ повышенную температуру, забывая или вѣрнѣе *не понимая*, что пониженіе температуры въ томъ или другомъ случаѣ нисколько не свидѣтельствуетъ объ уменьшеніи напряженности болѣзни, что *пониженіе температуры отъ какого-нибудь антифибрина, есть лишь результатъ кратковременнаго отравленія организма.* Мало ли есть ядовъ, которыми можно понизить температуры? Отравите человѣка спиртомъ, синильною кислотою—и у него температура понизится. Развѣ изъ этого слѣдуетъ, что оба названные яда—прекрасное средство противъ лихорадочныхъ болѣзней? Гдѣ же здѣсь наука, которою такъ гордятся современные врачи?

Ну, о наукѣ большинство нашихъ врачей думаетъ не особенно много, гонорару же новыя панацеи не только не мѣшаютъ, а даже способствуютъ! И потому *не задумываясь надъ послѣдствіями, лѣчатъ все и всѣхъ, отъ ребенка до старика, наркотиками.*

Какъ дѣйствуютъ эти возбуждающія, угнетающія средства—хорошо извѣстно... Сегодня человѣкъ поправится, а черезъ нѣсколько лѣтъ у него начинаются припадки сердцебіенія, и опять появляются на сцену яды въ родѣ дигиталина.

Двѣ-три неопасныхъ, въ сущности болѣзни и, благодаря введеннымъ въ организмъ медикаментамъ, здоровье человѣка серьезно потрясено. Правильность сердечныхъ отправленій нарушена, а если болѣетъ сердце, то человѣкъ пропадаетъ.

Д-ръ Пауль Бергеръ говоритъ, что слишкомъ долгое употребленіе столь часто назначаемаго бромистаго калія *(Kali bromati)* можетъ обусловить ослабленіе умственныхъ способностей.

Если осуждаютъ врачей за лѣченіе болѣзней наркотическими средствами, то съ другой стороны, по нашему мнѣнію, не заслуживаютъ оправданія и сами паціенты избирающіе подобный способъ лѣченія, который сокращаетъ ихъ жизнь и ослабляетъ умственныя ихъ способности.

Digitized by Google

Дѣлая эти факты общеизвѣстными, распространяя ихъ, по мѣрѣ силъ и возможности, среди публики, мы содѣйствуемъ здравію, благоденствію и долголѣтію нашихъ ближнихъ.

Мы съ увѣренностью можемъ сказать, что нашимъ прадѣдамъ во снѣ не снились желѣзныя дороги, броненосцы и аэростаты, а дѣды наши ни за что не повѣрили бы, въ молодости, если бы кто-нибудь имъ предсказалъ появленіе электрическаго телеграфа, телефона и фонографа. Тѣмъ менѣе повѣрили бы наши предки въ возможность излѣченія упорныхъ болѣзней Электро-Гомеопатіей и въ изобрѣтеніе иксовыхъ лучей. Всѣ эти чудеса науки и техники второй половины нашего столѣтія выпали на нашу долю, и всѣмъ этимъ мы пользуемся.

Сущность Электро-Гомеопатіи состоитъ въ томъ, чтобы устранить и совершенно уничтожить болѣзнь во всемъ ея объемѣ кратчайшимъ, вѣрнѣйшимъ и безвреднѣйшимъ способомъ, на основаніи ясныхъ и очевидныхъ фактовъ. Это достигается помощію лѣкарствъ графа Маттеи, которыя примѣняются противъ всѣхъ болѣзней, а также противъ болѣзней, признаваемыхъ неизлѣчимыми. Они дѣйствуютъ мгновенно, такъ сказать электрически на организмъ и способствуютъ ему освободиться отъ разстраивающихъ его вредныхъ элементовъ. Это-то мгновенное дѣйствіе лѣкарствъ, напоминающее электрическій токъ, и притомъ въ гомеопатическихъ дозахъ, послужило изобрѣтателю поводомъ назвать новую методу лѣченія Электро-Гомеопатіей.

Излѣченіе и облегченіе болѣзней лѣкарствами графа Маттеи достигается употребленіемъ ихъ въ малыхъ дозахъ.

Вопросъ о дозахъ—это вопросъ *количества необходимаго и достаточнаго*, чтобы произвести опредѣленное дѣйствіе: только опытъ разрѣшаетъ его, т. е. наблюденія за послѣдствіями дѣйствія слабыхъ и сильныхъ дозъ. Аллопатія оффиціально признанная, полагаетъ, что цѣлительное дѣйствіе можетъ быть достигнуто только массивными дозами. Она допускаетъ только дѣйствіе вѣса и до нея вовсе не касается дѣйствіе производимое крупинками. Физика и химія заключаютъ достаточно фактовъ, чтобы научить отличать это двойное дѣйствіе и намъ

Digitized by Google

доказать, что матерія, вслѣдствіе своего подраздѣленія, если отдѣлилась отъ силы сцѣпленія, обратно получаетъ свои первоначальныя свойства, которыя въ массѣ находились, такъ сказать, въ скрытомъ состояніи; вся химія построена на дѣйствіи частичекъ и крупинокъ.

Возможно ли при томъ не знать силу этихъ дозъ безконечно-малыхъ и дѣйствіе количествъ невѣсомыхъ частицъ на живой организмъ, когда видятъ, что міазмы развиваютъ болѣзни самыя смертельныя, убивающія населеніе цѣлаго города, цѣлой области? Что такое міазма? Міазмою называется болѣзненный ядъ, образовавшійся внѣ живаго организма, заражающій атмосферный воздухъ и такимъ образомъ вредно дѣйствующій на здоровье многихъ людей, въ особенности если такой испорченный воздухъ вызываетъ у этихъ многихъ одну и ту же форму болѣзни, какъ напримѣръ перемежающуюся лихорадку, тифъ, холеру, чуму.

Въ самомъ дѣлѣ, какой вѣсъ имѣетъ матерія, зараженная ядомъ, заключающаяся въ жалѣ насѣкомаго, отъ ужалѣнія котораго человѣкъ умираетъ? Неужели вы полагаете, что нужно противуядіе въ количествѣ несравненно большемъ, чтобы возбудить одинаковую реакцію въ организмѣ для уничтоженія гибельныхъ послѣдствій? Сколько фактовъ проходятъ мимо насъ незамѣченными, которые должны бы насъ научить, еслибы мы имѣли привычку думать и разсуждать для ихъ пониманія.

Аллопаты допускаютъ вліяніе неуловимыхъ атомовъ, они признаютъ передачу наслѣдственныхъ болѣзней и другіе факты, которые они принуждены приписывать матеріи неопредѣленно разжиженной. Эти матеріалисты, мы полагаемъ, не будутъ искать причины болѣзней во вліяніи мельчайшихъ частицъ, заключающихся въ человѣческомъ тѣлѣ. Слѣдовательно наука не связна, не логична, когда она отвергаетъ *à priori* факты очень положительные по одной только причинѣ, что ихъ нужно приписывать чрезвычайно малымъ дозамъ гомеопатической методы.

Эта метода представляется болѣе простою, болѣе вѣрною, болѣе раціональною, чѣмъ этотъ хаосъ сложныхъ, произволь-

Digitized by Google

ныхъ и противорѣчивыхъ системъ, между которыми носится аллопатія въ продолженіи двухъ тысячъ лѣтъ.

Факты, производимые Электро-Гомеопатіею, само собою удивительны, и тутъ, пока въ нихъ не убѣдились своими глазами, съ одной стороны, является колебаніе и недовѣріе и съ другой стороны—презрѣніе. При господствующей, въ свѣтѣ, въ настоящее время, мистификаціи и шарлатанствѣ. недовѣріе существуетъ въ большой степени; но презрительный отказъ непозволителенъ людямъ образованнымъ, которые видятъ всякій день новые факты, казавшіеся въ прежнія времена невозможными.

Вспомнимъ слова великаго Араго: *«до чего мы дойдемъ, если станемъ отвергать все то, чего мы не въ состояніи объяснить»*. Но Викторъ Гюго выразился еще опредѣлительнѣе: *«ученый, который смѣется надъ возможнымъ, весьма близокъ къ идіоту»*.

Тѣхъ же людей, которые могутъ получить все, что желаютъ, но несмотря на это, отвергаютъ не испытывая, лучше всего характеризуетъ покойный профессоръ Бутлеровъ: *«тотъ, кто отвергаетъ не испытывая, не только не заслуживаетъ имени ученаго, но даже и названія честнаго человѣка»*.

Болѣе уже не удивляются замѣчательнымъ открытіямъ въ физикѣ, а между тѣмъ доктора назвали галлюцинаціями излѣченія, достигнутыя Электро-Гомеопатіей. Это доказываетъ, что медицина мало подвинулась впередъ, потому что доктора не вѣрятъ даже въ возможность дѣйствительныхъ открытій въ медицинѣ. Для аллопата, всякій Электро-Гомеопатъ по меньшей мѣрѣ мечтатель и энтузіастъ, если только не наглый шарлатанъ. Съ другой стороны, для послѣдователей Маттеи и Ганеманна аллопатія представляетъ огромное заблужденіе, тяготѣющее надъ человѣчествомъ въ продолженіе двухъ тысячъ лѣтъ.

Съ тѣхъ поръ какъ существуетъ цивилизація, человѣчество стремится къ правильному рѣшенію спорныхъ вопросовъ. Оно употребляетъ всѣ умственныя усилія отыскать способъ вѣрно представить обстоятельства дѣла, выяснить истинные его мо-

Digitized by Google

тивы и воздержаться въ своемъ сужденіи отъ субъективныхъ симпатій и антипатій. Прежде всего человѣчество установило два положенія: *не должно судить не изслѣдовавши и осуждать, не имѣя положительныхъ доказательствъ.*

Отвергать же въ настоящее время цѣлебное свойство лѣкарствъ графа Маттеи противъ болѣзней это все равно, что сомнѣваться въ открытіе Америки, изобрѣтеніе пороха считать ложью, а фонографъ Эдиссона—сказкой. Американскіе и Англійскіе врачи Электро-Гомеопаты представляютъ Электро-Гомеопатію какъ одинъ изъ прогрессовъ среди экспериментальныхъ методовъ лѣченія и какъ такую они ее рекомендуютъ больнымъ, которые не вылѣчились гомеопатіей или аллопатіей, а также и тѣмъ, которые еще не приступали ни къ какому лѣченію.

Въ заключеніе помѣщаемъ здѣсь отзывы русской періодической печати объ Электро-Гомеопатіи графа Маттеи и объ этой книгѣ.

Отзывы русской печати.

Противъ ожиданія въ число медицинскихъ знаменитостей я долженъ включить сегодня пресловутаго итальянца *графа Маттеи,* «умопомѣшаннаго шарлатана», какъ охарактеризовали его всѣ медицинскія коллегіи. Нисколько не желая доказывать здравомысліе и добросовѣстность «графа» Маттеи, котораго я вовсе и не знаю, тѣмъ не менѣе считаю не безъинтереснымъ занести въ лѣтопись слѣдующій фактъ, характеризующій дѣйствіе его медикаментовъ. Есть у меня знакомый морской офицеръ г. П., проживающій въ Колпинѣ, который былъ такъ отчаянно боленъ водянкою и прочими недугами, что уже совсѣмъ собирался ad patres и доктора объявили его безнадежнымъ. Близкіе считали житія его на землѣ впредь не болѣе нѣсколькихъ дней, какъ больному пришла мысль попользоваться средствами Маттеи. Можете себѣ представить какой результатъ: больной не только всталъ съ постели, но началъ ходить на службу и чувствуетъ себя уже совсѣмъ здоровымъ. Дѣйствительно-ли графъ Маттеи «помѣшанный шарлатанъ»??.. Любопытно! (Петерб. Газ. 1880 г. № 70). *Оса.*

Digitized by Google

Письмо Камынина въ Редакцію Петерб. Листка 1883 г. № 141.

Мм. Гг! По поводу отвѣта г. Смирнова, появившагося 29-го Мая въ газетѣ «Новости», газета «Врачъ», 2-го сего Іюня, болѣе чѣмъ неосновательно и несправедливо упрекаетъ за это редакцію «Новостей», и въ ея упрекѣ такъ и проглядываетъ профессіональное раздраженіе аллопата противъ электро-гомеопатіи.

Но вотъ фактъ, и при томъ не единичный, который я прошу не отказать помѣстить въ вашей газетѣ для пользы общества.

Четыре мѣсяца я страдалъ сильнымъ воспаленіемъ глазъ, при невыносимой боли въ глазахъ. Лѣчился я отъ этой болѣзни аллопатіей у разныхъ спеціалистовъ глазныхъ болѣзней въ другихъ городахъ, но безъ пользы: зрѣніе мое только помрачалось, я чуть не ослѣпъ. По совѣту многихъ лицъ, вылечившихся отъ разныхъ упорныхъ болѣзней электро-гомеопатіей, я, находясь въ настоящее время въ Петербургѣ, обратился къ г. Смирнову. Онъ мнѣ указалъ на два электро-гомеопатическія лѣкарства, отъ которыхъ боль въ моихъ глазахъ мгновенно прекратилась, черезъ четыре дня я совершенно выздоровѣлъ и зрѣніе мое возстановилось. За эти лѣкарства я въ центральной гомеопатической аптекѣ заплатилъ всего одинъ рубль, тогда какъ лѣченіе аллопатіей мнѣ стоило болѣе 300 р. при невыразимыхъ физическихъ страданіяхъ.

Теперь всякому будетъ понятно, только не «Врачу», что полезнѣе для больнаго: электро-гомеопатія или аллопатія?

Примите и проч. *Камынинъ.*

Письмо Д-ра Медицины въ Редакцію Гражданина. 1887 г. № 1. «По поводу статьи, напечатанной въ № 102 «Гражданина» о безвредномъ способѣ лѣченія барона Вревскаго и объ убійственномъ врачеваніи, производимомъ нами, аллопатами, я позволю себѣ замѣтить что баронъ Вревскій способъ лѣченія водою заимствовалъ въ провинціи отъ послѣдователей лѣченія извѣстнаго графа Маттеи».

Я довольно продолжительное время служилъ въ провинціи; въ ту же губернію часто наѣзжалъ и баронъ Вревскій. Во всѣхъ почти уѣздахъ этой губерніи, а также и въ смежной, мѣстные землевладѣльцы, сельскіе священники и другія лица лѣчатъ больныхъ исключительно электро-гомеопатіей графа Маттеи по руководству, составленному г. Смирновымъ. Къ нимъ стекаются за помощью люди всѣхъ званій и возрастовъ, не только мѣстные обыватели, но и жители другихъ губерній, мѣстечекъ и селеній. Они для больныхъ растворяютъ кру-

Digitized by Google

пинки графа Маттеи въ бутылкахъ и бутыляхъ чистой воды, и эту воду, смотря по болѣзни, они назначаютъ пить больнымъ столовыми ложками или по стакану въ день».

«Интересуясь этимъ способомъ лѣченія, я распрашивалъ больныхъ; они отзывались объ этой водѣ, какъ о цѣлебной, и нѣкоторые изъ нихъ говорили, что эта вода производила у нихъ поносы. Не скрою и того, что эту воду и самъ я пилъ, по совѣту одного изъ маттеистовъ, съ пользою для себя. Этотъ же способъ лѣченія практиковалъ тамъ и баронъ Вревскій. Занимающіеся лѣченіемъ не скрываютъ ни отъ кого, что они лѣчатъ лѣкарствами графа Маттеи, и что относительно нѣкоторыхъ упорныхъ болѣзней они обращаются въ С.-Петербургъ за совѣтомъ къ г. Смирнову. Послѣдній, какъ извѣстно, примѣняетъ электро-гомеопатію графа Маттеи въ Петербургѣ уже нѣсколько лѣтъ».

«По химическому анализу воды барона Вревскаго, она оказалась чистою *невскою водою*. Но извѣстно также, что всѣ европейскіе химики ничего не открыли и въ лѣкарствахъ графа Маттеи, и вода, содержащая растворъ его крупинокъ (въ количествѣ одной крупинки на бутылку воды, а тѣмъ болѣе слабыя дозы изъ втораго или третьяго стакана), не измѣняетъ ни вкуса, ни своего состава, а между тѣмъ цѣлебна. Это я самъ испыталъ на самомъ себѣ и наблюдалъ надъ многими больными. А потому если теперь сличить съ книгою Смирнова статью, напечатанную въ «Гражданинѣ», въ которой сказано, что вода барона Вревскаго заключаетъ въ себѣ *что-то*, неподдающееся химическому анализу, и что у нѣкоторыхъ лицъ, пьющихъ эту воду, она производитъ поносъ, то, мнѣ кажется, что это *что-то* есть ничто иное какъ растворенныя крупинки графа Маттеи, которыя иногда то же производятъ поносъ. См. 6-е изданіе книги Смирнова «Электро-гомеопатія графа Маттеи». Спб. 1885 г., стр. 18».

«Предположеніе автора статьи учредить общество противъ врачей не поможетъ дѣлу. Я полагаю, что было бы цѣлесообразнѣе проводить въ литературѣ здравыя понятія о гомеопатіи и электро-гомеопатіи, и тѣмъ стараться искоренить въ русскомъ обществѣ презрительное отношеніе, съ которымъ оно относится къ этимъ двумъ способамъ лѣченія, и чтобы въ печати оглашались факты излѣченія болѣзней минимальными дозами лѣкарствъ. Тогда только, по моему мнѣнію, и могутъ если не прекратиться, то значительно уменьшиться случаи отравленія больныхъ массивными дозами аллопатическихъ лѣкарствъ».

«Simlia. Докторъ медицины».

Digitized by Google

Излѣчимъ-ли ракъ? Статья В. Т. Стэда въ приложеніи къ газетѣ «Новое Время» 1891 г. № 5884. Краткое извлеченіе изъ этой статьи вошло въ предисловіе этого руководства. Стэдъ возстаетъ, говоритъ редакторъ «Новаго Времени», противъ одного предразсудка, свойственнаго современнымъ медикамъ и мѣшающаго ихъ больнымъ выздоравливать—противъ созданія рядомъ со страждующимъ человѣчествомъ еще особеннаго фетиша медицины, то есть идола, кумира, въ жертву котораго приносятся милліоны и десятки милліоновъ людей.

Мнѣніе Спб. Общества Врачей-Гомеопатовъ о методѣ Графа Маттеи. См. ниже въ Гл. II.

Совѣтъ унывающимъ больнымъ. Серьезно больнымъ, не получившимъ облегченія отъ нашей господствующей медицины (аллопатіи), какою бы болѣзнію они ни страдали, совѣтую лѣчиться электро-гомеопатическими лѣкарствами графа Маттеи, которыя во всѣхъ серьезныхъ болѣзняхъ хорошо помогаютъ. При лѣченіи этомъ, слѣдуетъ имѣть подъ рукою популярный лѣчебникъ г. Смирнова, который такъ хорошо изложенъ, что и безъ помощи доктора можно опредѣлить свою болѣзнь и назначить лѣкарство. Лѣчебникъ Смирнова и лѣкарства гр. Маттеи можно получать изъ центральной гомеопатической аптеки (Гороховая ул.. д. 17, въ С.-Петербургѣ). Съ этимъ вмѣстѣ считаю долгомъ предупредить, что не слѣдуетъ смѣшивать электро-гомеопатію съ аллопатіей и не лѣчиться попеременно, то тѣми, то другими средствами, какъ это дѣлаютъ многіе, не сознавая того, что основы лѣченія тѣхъ и другихъ системъ діаметрально противоположны. («Свѣтъ». 1892 г. № 175).

А. П.

Библіографія. Электро-Гомеопатія Графа Маттеи, 8-е испр. изд. Составилъ С. В. Смирновъ. Спб. 1893 г. Книга эта изложена популярно и удобопонятно для каждаго; метода графа Маттеи объяснена въ ней ясно и просто и по своему изложенію она указываетъ на компетентность автора. Книга снабжена весьма подробнымъ алфавитнымъ указателемъ и рисунками, что очень облегчаетъ ею пользоваться; издана весьма старательно, и восьмое изданіе ея доказываетъ практическое ея значеніе. («Свѣтъ». 1893 г. № 127).

Письмо П. Куракина *въ Редакцію.* Признавая пользу гомеопатическаго лѣченія, о которомъ говорится въ № 263 «Руси»,

Digitized by Google

я. въ дополненіе къ письму г. Петровскаго считаю нужнымъ сказать, что гомеопатія въ послѣднее время сдѣлала громадный прогрессъ въ Западной Европѣ. И не съ цѣлью умаленія ея достоинствъ я прошу напечатать эту замѣтку въ «Руси», что, по неоднократнымъ опытамъ какъ врачей, такъ равно и лицъ изъ публики, то-есть убѣжденныхъ ея послѣдователей, гомеопатія оказывается дѣйствительной въ острыхъ болѣзняхъ. Но какъ только дѣло коснется до лѣченія гомеопатіей хроническихъ болѣзней, то тутъ начинаются испытанія разныхъ лѣкарствъ, которыя назначаются по симптомамъ болѣзни и закону подобія; иногда отъ этого получится кратковременное облегченіе, но вновь обострится хроническая болѣзнь, затѣмъ постепенно переходятъ къ другимъ гомеопатическимъ лѣкарствамъ и выжидаютъ ихъ дѣйствія, и такъ эта проба продолжается нѣсколько лѣтъ сряду, но безъ всякой пользы для больного. И тогда иные больные, не видя улучшенія своей болѣзни отъ гомеопатіи, при всемъ своемъ терпѣніи и настойчивости, переходятъ къ лѣченію электро-гомеопатіей графа Маттеи, а другіе возвращаются къ аллопатіи.

Но результаты отъ этого перехода получаются для больныхъ діаметрально-противоположные: начавшіе лѣчиться электро-гомеопатіей графа Маттеи замѣчаютъ видимое улучшеніе ихъ хронической болѣзни въ теченіе первыхъ десяти дней лѣченія, и, затѣмъ, улучшеніе постепенно прогрессируетъ и доходятъ до выздоровленія, но, конечно, въ разные періоды времени, смотря по степени и свойству самой болѣзни, возрасту больного и, конечно, при условіи, чтобы необходимый органъ для жизни не былъ разрушенъ. И этимъ цѣлебнымъ дѣйствіемъ лѣкарствъ графа Маттеи объясняется, почему практичные англичане и американцы, которые умѣютъ цѣнить и дѣло, и время и деньги, учредили у себя электро-гомеопатическія лѣчебницы, которыя находятся тамъ подъ вѣдѣніемъ врачей и тамъ же издаются врачами популярные электро-гомеопатическіе журналы и руководства.

Что же касается до обратившихся къ аллопатіи, то кому неизвѣстенъ этотъ типъ несчастныхъ жертвъ quasi-научной медицины? Чтобы это не казалось голословнымъ я сошлюсь на публичную лекцію доктора Гоннарда (Gonnard), читанную въ Парижѣ, въ 1893 г. Изъ этой лекціи [1]) я дѣлаю очень краткую выписку, изъ которой каждый пойметъ значеніе аллопатической методы лѣченія.

---

[1]) Эта лекція напечатана въ журналѣ «Врачъ Гомеопатъ» 1893 г. № 12.

Digitized by Google

Въ этой лекціи докторъ Гоннардъ разсказываетъ между прочимъ про два засѣданія Парижской медицинской академіи, крайне комичныя, происходившія одно въ 1850 году по вопросу о лѣченіи остраго суставнаго ревматизма, а другое въ 1891 году, т. е. 41 годъ спустя, по вопросу о лѣченіи воспаленія легкихъ. Въ этихъ двухъ засѣданіяхъ присутствовало большое число корифеевъ. Онъ приводитъ взгляды каждаго изъ нихъ. Но никто изъ корифеевъ въ способѣ лѣченія одинъ съ другимъ не согласились ни для одной изъ этихъ болѣзней, и они не могли признать, даже по большинству мнѣній, которое изъ лѣкарствъ для болѣзни дѣйствительно специфическое: то ли, которое было въ употребленіи 40 лѣтъ тому назадъ, или то, которое теперь въ модѣ? Въ воспаленіи легкихъ, напр. чего слѣдуетъ придерживаться: рвотнаго ли камня, кровопусканія или шпанской мушки? Такъ этотъ вопросъ остался открытымъ и по настоящее время!

Затѣмъ докторъ Гоннардъ, въ той же лекціи, приводитъ свидѣтельства множества знаменитыхъ врачей-аллопатовъ прошлыхъ вѣковъ и текущаго столѣтія, начиная отъ извѣстнаго Бергааве и кончая знаменитымъ физіологомъ Клодъ Бернаромъ, которому въ городѣ Ліонѣ въ текущемъ году будетъ воздвигнутъ памятникъ отъ французской академіи наукъ. Эти ученые единогласно признаютъ и заявляютъ, что *«научная медицина не существуетъ»*, и что *«смертность бываетъ значительнѣе именно тамъ, гдѣ медицина наиболѣе дѣятельна»*. И потому докторъ Гоннардъ, основываясь на всемъ этомъ, утверждаетъ, что аллопатія, какъ доктрина и практика, не имѣетъ оправданія въ прошедшемъ, ни значенія въ настоящемъ, ни надеждъ въ будущемъ. («Русь». 1894 г. № 276). *П. Куракинъ.*

Письмо Леопольда Верещинскаго *въ Редакцію* «Русь». 1894 г. № 287. Изъ помѣщенныхъ замѣтокъ въ №№ 276 и 281 «Руси» о лѣченіи электро-гомеопатическими средствами гр. Маттеи, я убѣждаюсь, что и мои свѣдѣнія не будутъ излишними для лицъ, интересующихся этимъ лѣченіемъ, а именно: болѣе тридцати лѣтъ я страдалъ геморроемъ, который являлся у меня въ такихъ разнообразныхъ видахъ, что даже смущалъ самихъ представителей аллопатіи. Наконецъ, когда болѣзнь дошла до расширенія венъ и отека ногъ, на которыхъ образовались не поддающіяся лѣченію раны, а затѣмъ и каттаръ желудка, то я, въ отчаяніи за жизнь, обратился къ электро-гомеопатіи и пользовался совѣтами С. В. Смирнова, извѣстнаго автора лѣчебника по этой отрасли врачеванія. Три года настойчиваго

Digitized by Google

выполненія его указаній возстановили мое здоровье, геморрой прошелъ безслѣдно—вмѣстѣ съ каттаромъ желудка, а отекъ является только по временамъ на лѣвой ногѣ, но раны совершенно зажили. *Леопольдъ Верещинскій.*

Письмо П. Куракина *въ Редакцію* «Русь». 1894 г. № 288. По поводу письма, напечатаннаго въ № 281 «Руси», я спѣшу заявить гласно, что я одинъ изъ вылѣчившихся средствами графа Маттеи отъ хроническаго ревматизма въ сочлененіяхъ, существовавшаго у меня 15 лѣтъ сряду и осложненнаго еще сердцебіеніемъ и катарромъ желудка. Я сначала лѣчился аллопатіей, потомъ электричествомъ, гидропатіей и гомеопатіей, но безъ пользы. Лѣтъ шесть тому назадъ, какъ я, по совѣту и настоянію моихъ родныхъ, убѣжденныхъ послѣдователей графа Маттеи, прибѣгнулъ къ его лѣкарствамъ. Прежде всего я обратился письменно за совѣтомъ къ самому графу Маттеи, проживающему въ Италіи. Онъ не замедлилъ предложить мнѣ свой способъ лѣченія моей болѣзни, но при этомъ присовокупилъ, что если при лѣченіи встрѣтятся какія либо недоразумѣнія, то за разъясненіемъ ихъ посовѣтовалъ мнѣ обратиться къ проживающему въ С.-Петербургѣ его ученику, г. Смирнову, который подъ личнымъ его руководствомъ изучилъ электро-гомеопатію.

Мои ревматическія боли были настолько невыносимы, что я не счелъ возможнымъ лѣчиться самъ, и потому поѣхалъ въ Петербургъ къ г. Смирнову и, благодаря его указаніямъ, мнѣ черезъ три недѣли стало лучше, я уѣхалъ въ свое имѣніе и тамъ продолжалъ лѣченіе, по временамъ списываясь съ г. Смирновымъ, и черезъ шесть мѣсяцевъ выздоровѣлъ.

Кромѣ того мнѣ извѣстны случаи излѣченія моихъ знакомыхъ, живущихъ въ Россіи, средствами графа Маттеи, какъ то: затвердѣній въ грудныхъ железахъ, мочевыхъ камней, упорныхъ женскихъ болѣзней. Всѣ эти хроническія болѣзни вовсе не поддавались лѣченію аллопатовъ, которые, противъ нѣкоторыхъ изъ нихъ, предлагали операціи. Но, очевидно, что въ настоящее время больные могутъ обойтись и безъ операцій.

Я пропускаю здѣсь способъ употребленія лѣкарствъ графа Маттеи противъ болѣзней, потому что это не можетъ быть предметомъ газетной корреспонденціи, но желающимъ ближе ознакомиться съ его методою предлагаю прочитать руководство С. В. Смирнова, о которомъ упоминается въ № 271 «Руси» и которое признано графомъ Маттеи за одно изъ лучшихъ.

П. Куракинъ.

Digitized by Google

Мнѣніе врачей объ Электро-Гомеопатіи Графа Маттеи. «Гражданинъ». 1895 г. № 60. Я нѣсколько лѣтъ сряду служилъ земскимъ врачемъ въ одномъ изъ земствъ на Югѣ Россіи, но вслѣдствіе моей болѣзни принужденъ былъ оставить службу. Я заболѣлъ сахарною болѣзнью; лѣчился самъ, пользовался совѣтами моихъ коллегъ-аллопатовъ, но безуспѣшно, наконецъ, въ концѣ 1891 года, я лежалъ въ одной изъ клиникъ, гдѣ былъ признанъ неизлѣчимымъ и вышелъ оттуда.

Отправляясь въ свое имѣніе, я на станціи отправленія познакомился съ мѣстнымъ землевладѣльцемъ г. Ж., человѣкомъ весьма интеллигентнымъ. Дорогою я ему объяснилъ, чѣмъ я боленъ, гдѣ и какъ я лѣчился и діагнозъ врачей, которые меня пользовали. Онъ мнѣ въ свою очередь разсказалъ, какъ онъ самъ былъ боленъ и какъ врачи аллопаты признали его также неизлѣчимымъ, и присовокупилъ, что если теперь онъ здоровъ и имѣетъ цвѣтущій видъ, то обязанъ исключительно электро-гомеопатіи графа Маттеи, и потому посовѣтовалъ мнѣ испробовать эту методу противъ моей болѣзни и указалъ мнѣ на руководство С. В. Смирнова, по которому можно лѣчиться самому; онъ также снабдилъ меня всѣми лѣкарствами графа Маттеи, которыя по этому руководству были необходимы для моей болѣзни.

Я охотно принялъ предложеніе г. Ж., потому что отъ очень многихъ моихъ родныхъ и знакомыхъ я слышалъ о методѣ графа Маттеи, какъ о весьма цѣлебной; кромѣ того въ періодической печати появлялись статьи о пользѣ этой методы, и между прочимъ, по этому предмету, была напечатана въ «Гражданинѣ» статья одного доктора медицины.

Начавъ свое лѣченіе по указаніямъ г. Ж., я чувствовалъ себя лучше, пріобрѣлъ книгу г. Смирнова, но счелъ за лучшее обратиться къ нему за письменнымъ его совѣтомъ въ С.-Петербургъ. Этотъ совѣтъ я скоро отъ него получилъ съ подробными разъясненіями способа употребленія лѣкарствъ графа Маттеи противъ моей болѣзни. И, слѣдуя неуклонно его совѣту, я черезъ два съ половиною мѣсяца лѣченія совершенно выздоровѣлъ.

Убѣдившись на себѣ въ несомнѣнной цѣлебности лѣкарствъ графа Маттеи, я началъ самъ лѣчить больныхъ, въ той губерніи гдѣ жилъ, этими лѣкарствами по руководству г. Смирнова. При этомъ всѣ острыя болѣзни, не исключая даже воспаленія легкихъ, вылѣчивались очень быстро. Но при лѣченіи хроническихъ и опасныхъ болѣзней или признаваемыхъ неизлѣчимыя, я въ виду явной несостоятельности аллопатіи

Digitized by Google

и моей неопытности въ электро-гомеопатіи, предлагалъ больнымъ обратиться лично за письменнымъ совѣтомъ къ г. Смирнову въ С.-Петербургъ. Такимъ образомъ, по моему совѣту, къ нему обратились слѣдующіе больные, которые получили его указанія и разъясненія къ лѣченію ихъ болѣзней:

1) М., молодой человѣкъ 21 г., заразившійся легочной чахоткою отъ своей жены;

2) Ѳ., мужчина 56 л., страдавшій много лѣтъ желчными коликами;

3) К., дама 30 л., у которой было затвердѣніе въ правой груди, признанное за раковое, и предложена была операція.

4) Б., дама 40 л., страдала нѣсколько лѣтъ истеріей и хроническимъ оваритомъ;

5) А., мужчина 38 л., страдалъ мочевыми камнями, было предложено дробленіе камня;

6) Т., дама 57 л., болѣла два года грудною жабою;

7) Н., мужчина 40 л., болѣлъ три года неврастеніей;

8) А., дѣвица 23 л., страдала три мѣсяца упорной трахомой, угрожавшей потерею зрѣнія.

Всѣ эти больные лѣчились электро-гомеопатіей подъ моимъ наблюденіемъ, исполняя въ точности совѣты и указанія г. Смирнова. Кромѣ того, въ числѣ моихъ паціентовъ былъ и одинъ діабетикъ, котораго я лѣчилъ тѣми самыми лѣкарствами графа Маттеи, которыя, по назначенію г. Смирнова, я самъ принималъ. И при этомъ я по совѣсти долженъ сказать, что всѣ эти больные вылѣчились отъ означенныхъ болѣзней лѣкарствами гр. Маттеи въ періодъ времени отъ 2 до 6 мѣсяцевъ.

Заинтересовавшись методою гр. Маттеи, я пріобрѣлъ всѣ существующія по этому предмету руководства на иностранныхъ языкахъ, но долженъ сказать, что русское руководство Смирнова значительно ихъ превосходитъ.

Весною 1893 года мнѣ представился случай сопровождать заграницу, въ качествѣ врача, одно богатое семейство. Всѣ члены этой семьи убѣжденные послѣдователи методы графа Маттеи. И, находясь заграницей, я познакомился съ врачами электро-гомеопатами, а именно: *Landry* въ Парижѣ, *Schmeltz*'омъ въ Ниццѣ, *Ringelmon*'омъ въ Женевѣ, *Theobald*'омъ и *Kennedy* отцомъ и сыномъ въ Лондонѣ.

По единогласному мнѣнію этихъ врачей, основанному на многолѣтнемъ ихъ опытѣ, метода графа Маттеи представляется несомнѣнно дѣйствительною при лѣченіи всѣхъ острыхъ и хроническихъ болѣзней, такъ какъ дѣйствуетъ на органическую причину болѣзни, и помощью этой методы вылѣчиваются очень

Digitized by Google

многія болѣзни, упорныя и признаваемыя за неизлѣчимыя; при этомъ же срокъ излѣченія болѣзни, въ большинствѣ случаевъ, наступаетъ гораздо быстрѣе, чѣмъ при другихъ способахъ лѣченія. И это мнѣніе моихъ коллегъ я вполнѣ раздѣляю.

Докторъ *Kennedy* показывалъ мнѣ въ Лондонѣ свою электро-гомеопатическую лѣчебницу, которая устроена со всѣми требованіями спеціальной лѣчебницы; другая подобная лѣчебница въ Лондонѣ принадлежитъ г-жѣ *Schmit*.

Въ заключеніе моей замѣтки присовокуплю, что въ Лондонѣ издается электро-гомеопатическій журналъ «*Modern Medicine*», который въ числѣ своихъ сотрудниковъ имѣетъ въ англійскихъ колоніяхъ до 30 врачей. По общему отзыву докторовъ *Kennedy*, *Theobald*'а и *Gliddon*'а, издателя этого журнала, эти врачи-сотрудники примѣняютъ тамъ методу графа Маттеи съ громаднымъ успѣхомъ. Докторъ-медицины *Electro*.

Изъ золотой книги графа Маттеи, Русь. 1895 г. № 178. Золотая книга графа Маттеи, извѣстнаго гомеопата, содержитъ драгоцѣнную коллекцію автографовъ. Въ ней собрана масса писемъ отъ различныхъ европейскихъ дворовъ. Вотъ, напримѣръ, письмо лектрисы императрицы австрійской, отъ 11-го января 1881 года: «Медикаменты, полученные нами чрезъ посредство герцога Людвига, брата ея Величества, оказавшіе большую пользу Императрицѣ и Императору, убѣдили меня слѣдовать вашему лѣченію» и т. д.

Герцогъ Мекленбургъ-Шверинскій телеграфируетъ графу, прося немедленно прислать лѣкарства для спасенія жизни его ребенку. Лѣкарства были высланы и, вѣроятно, оказали чрезвычайно благопріятное дѣйствіе, потому что въ другой телеграммѣ говорится: «Благодаря Богу и вашимъ лѣкарствамъ, ребенокъ поправился».

Есть нѣсколько писемъ отъ пословъ и ихъ женъ; отъ румынскихъ генераловъ, принцевъ и государственныхъ людей. Орлеанскіе принцы также просили свиданія съ графомъ и просили присылки его лѣкарствъ.

Въ числѣ высокопоставленныхъ лицъ, предпринимавшихъ паломничество къ Маттеи, находится извѣстный графъ Игнатьевъ. Въ сопровожденіи своей супруги и княгини Голицыной, онъ однажды пріѣхалъ въ замокъ Ла-Рокеттъ очень не въ духѣ, потому что имъ пришлось путешествовать со станціи въ жалкой одноконной таратайкѣ.

— Какъ это вы могли выслать намъ подобную повозку?— спросилъ графа разсерженный генералъ.

Digitized by Google

— Что же, если вамъ было угодно пріѣхать во всемъ парадѣ, то лучше бы вы достали себѣ ландо и пару лошадей изъ Болоньи,—отвѣчалъ Маттеи.

Графъ Игнатьевъ страдалъ отъ сильнаго воспаленія вѣкъ, и судя по позднѣйшему письму его супруги, получилъ значительное облегченіе, благодаря лѣкарствамъ Маттеи, не смотря на одноконную таратайку. Письмо, помѣченное іюлемъ 1879 г., очевидно, было написано передъ тѣмъ, какъ графъ Игнатьевъ былъ назначенъ губернаторомъ Нижняго-Новгорода. Вотъ его содержаніе:

«Мужъ мой, принужденный выѣхать изъ С.-Петербурга, чтобы занять административный постъ въ провинціи, поручилъ мнѣ благодарить васъ и сообщить вамъ, что онъ продолжаетъ употреблять ваше средство съ величайшимъ успѣхомъ. Оно совершило излѣченіе почти чудесное; подробности онъ передастъ самъ».

Русскій дипломатъ г. Гамбургеръ обратился къ Маттеи, прося у него лѣкарствъ, которыми онъ надѣялся поправить здоровье своей супруги, точно такъ же, какъ возстановить свое собственное. Княгиня Воронцова также оказалась горячей поклонницей Маттеи, о чемъ упоминается въ одномъ изъ писемъ, и ею подарена ему табакерка художественной работы; золотые часы графа—также подарокъ одной изъ русскихъ придворныхъ дамъ.

Петербургскій купецъ Григорьевъ писалъ, что обязанъ жизнью графу и что онъ считаетъ его однимъ изъ величайшихъ людей своего времени.

Англійскихъ писемъ не такъ много. Герцогиня Аргайль писала въ 1884 году, что послѣ многолѣтнихъ страданій отъ астмы, до того сильной, что жизнь становилась ей въ тягость, ей настолько помогли средства графа, что она надѣется на полное выздоровленіе.

Кромѣ того въ нашемъ портфелѣ находится масса писемъ, въ которыхъ бывшіе больные выражаютъ намъ своею благодарность за излѣченіе ихъ Электро-Гомеопатіей отъ упорныхъ и иногда безнадежныхъ болѣзней.

Указанія на эти случаи содержатся въ примѣрахъ излѣченій, которые приведены въ этой книгѣ послѣ изложенія болѣзней.

Digitized by Google

ГЛАВА I.

Этіологія.

Этіологія есть ученіе о причинахъ болѣзней. Мы говоримъ о причинахъ во множественномъ числѣ, потому что первая причина, производящая болѣзненное явленіе *(prima causa morbi)*, ея сущность, ускользаетъ отъ всякаго наблюденія и остается совершенно недоступной для насъ. Сущность скрывается, явленіе же одно обнаруживается. Всякое разысканіе первоначальной причины совершенно тщетно, остается только знать, что возможно, о ближайшей причинѣ болѣзненнаго явленія.

Новая терапія всецѣло основана на аксіомѣ физіологіи и общей патологіи: *кровь есть источникъ жизни.* Отсюда слѣдуетъ, что 1) отъ надлежащаго количества и качества крови, которая образуетъ, питаетъ и поддерживаетъ всѣ ткани и органы и изъ которой всѣ части тѣла получаютъ тѣ вещества, какія необходимы для ея обновленія, зависитъ здоровье человѣка и его потомства; 2) отъ испорченности крови болѣе или менѣе значительной, отъ разстройства въ отправленіяхъ или первоначальной неправильности ея теченія происходятъ всѣ болѣзни внутреннія, зависящія отъ организма, наслѣдственныя или прирожденныя. Но большая часть острыхъ болѣзней, неожиданно появляющіяся при полномъ здоровьи, происходятъ отъ внѣшнихъ болѣзнетворныхъ причинъ, не зависящихъ отъ организма. Внѣшнія причины могутъ быть *атмосферическія*, когда воздухъ содержитъ въ себѣ излишній холодъ, тепло, влажность или сухость; *міазматическія*,—когда в здухъ содержитъ нѣкоторыя вредныя частицы, называемыя м змами; *діэтетическія*,—когда употребляется пища неудобо- в римая, въ чрезмѣрно большомъ или крайне недостаточномъ к личествѣ; если вода, употребляемая для питья и въ кушанья, с держитъ примѣсь веществъ вредныхъ, какъ-то: минеральныхъ

Digitized by Google

солей, газовъ или гнилыхъ частицъ; *механическія*,—когда на органъ дѣйствуютъ или продолжительно, или быстро: ударъ, давленіе, треніе; *химическія*,—когда на органъ дѣйствуютъ минеральные, растительные и животные яды; *нравственныя причины*,—когда на нервы человѣка дѣйствуютъ неумѣстныя, несвоевременныя или очень продолжительно и усиленно: чувства горя, радости и тоски, и *физическія*,—къ которымъ принадлежатъ: свѣтъ, теплота, электричество и т. п.

Это первая серія причинъ.

Вся современная медицина признаетъ еще другія причины, называемыя *случайными* или *предрасполагающими*. Онѣ опредѣляются такимъ образомъ: при отысканіи причинъ болѣзни обращаютъ вниманіе на физическое тѣлосложеніе больного, на его складъ ума, на его характеръ, на его занятія, на его образъ жизни, на его привычки, на его соціальныя отношенія, на его возрастъ, на его полъ; однимъ словомъ надо обратить вниманіе на индивидуальность больного, и слѣдовательно на индивидуальность болѣзни. Господствующая идея въ этой второй серіи причинъ—это идея индивидуальности. Эти причины имѣютъ начало внутреннее. Источники внутренніе и индивидуальные противоположны источникамъ внѣшнимъ и всеобщимъ, которые образуютъ первую серію. Отсюда характеръ причинъ просто случайныхъ или еще предрасполагающихъ. Страданіе одного какого-либо органа отражается болѣзненно и на весь организмъ человѣка.

ГЛАВА II.

Названіе лѣкарствъ и общія объ нихъ замѣчанія.

Электро-гомеопатическія лѣкарства уничтожаютъ *органическія причины* болѣзни.

Это утвержденіе стоитъ внѣ всякаго сомнѣнія отъ фактовъ, которые всякій можетъ воспроизвести и удостовѣрить.

Digitized by Google

Теорія весьма проста и состоитъ въ томъ, что человѣческое тѣло есть ничто иное, какъ продуктъ или живая организація двухъ жидкостей: *лимфы* (или пасоки) и *крови*. Ничего другого не содержится въ птичьемъ яйцѣ и человѣческомъ зародышѣ.

Кости, тѣло, внутренности, нервы, желчь, вены и всѣ органы безъ исключенія образуются изъ этихъ двухъ жидкостей, и въ концѣ концовъ человѣкъ есть ничто иное, какъ *лимфа* и *кровь*.

Кровь и лимфа имѣютъ одно общее начало, потому что образуются при посредствѣ пищеваренія [1]).

Эти лѣкарства ничто иное, какъ экстракты изъ растеній, *совершенно неядовитыхъ*, и напоминаютъ силу *электричества*, въ томъ смыслѣ, что они дѣйствуютъ мгновенно, электрически, хотя не всегда ощутительно.

Это *мгновенное дѣйствіе* обнаруживается въ Скрофолозо, напр., когда его даютъ отъ 8 до 10 крупинокъ субъекту, находящемуся въ обморокѣ, опьянѣвшему, или которому угрожаетъ мозговой ударъ.

Отсутствіе всякой ядовитости многократно подтверждалось немалочисленными химическими анализами, производимыми надъ этими лѣкарствами, какъ со стороны желавшихъ подорвать довѣріе къ нимъ, такъ и со стороны тѣхъ и притомъ еще въ большемъ количествѣ, которые надѣялись открыть секретъ. Изобрѣтатель предпочелъ сохранить свой секретъ, каковой не открытъ и до настоящаго времени.

Онъ первый началъ изслѣдовать причины болѣзней, и для достиженія своей цѣли примѣнялся къ Гомеопатіи, не обращая вниманія на наружныя формы болѣзни.

Къ этому онъ прибавляетъ, что дѣйствіями его лѣкарствъ не только уничтожается болѣзнь, но и устраняется породившая ее внутренняя причина, такъ что, разъ выздоровѣвши, больному нечего бояться ни возврата болѣзни, ни вогнанія ее во внутрь, ни превращенія и ни вторичнаго послѣдовательнаго появленія. Всѣ болѣзни даже трудно излѣчимыя, болѣе или менѣе быстро прекращаются по мѣрѣ очищенія и возрожденія организма, за-

---

[1]) См. Сосудистая система.

Digitized by Google

тѣмъ окончательно и безвозвратно исчезаютъ. Выздоровленіе безусловно [1]).

Впрочемъ, это очищеніе становится замѣтнымъ въ тѣхъ большею частію случаяхъ, когда тѣло освобождается отъ постороннихъ и вызывающихъ болѣзнь причинъ, посредствомъ излишняго потѣнія, вередовъ, отхаркиванія или посредствомъ осадка въ мочѣ и поносовъ, непроизводящихъ боли.

Наружныя лѣкарства дѣйствуютъ равносильно съ внутренними, и наложенныя въ видѣ компрессовъ, даже усиливаютъ и ускоряютъ дѣйствіе внутренняго лѣкарства, въ особенности при ранахъ и опухоляхъ.

Употребленныя же наружно, эти лѣкарства входятъ въ категорію аллопатическихъ палліативовъ. И вотъ поэтому-то, чтобы усилить ихъ дѣйствіе, увеличиваютъ дозу, тогда какъ при внутреннемъ лѣченіи поступаютъ наоборотъ.

Прежде, чѣмъ говорить подробно о каждомъ лѣкарствѣ и ихъ свойствахъ, мы приводимъ ихъ названія: лѣкарство очищающее лимфу и уничтожающее лишайное, золотушное или псорическое худосочіе, которымъ болѣе или менѣе пропитанъ организмъ человѣка, называется *Antiscrofoloso* (*Scrofoloso—Скрофолозо*) [2]); лѣкарство очищающее кровь и дѣйствующее на всю кровеносную систему и сердце, называется *Antiangioitico* (*Angioitico—Анжіоітико*). Этими двумя лѣкарствами, большею частію, вылѣчиваются всѣ болѣзни, которыя имѣютъ своею причиною органическое разстройство. Болѣзни сперва облегчаются, потомъ постепенно проходятъ, точно такъ, какъ они и образовались.

Тѣ болѣзни, которыя не были во-время лѣчимы предъидущими двумя средствами, кончаютъ тѣмъ, что имъ не поддаются; тогда примѣняютъ третье лѣкарство, достаточно сильное, могу-

---

[1]) Изъ числа многихъ больныхъ о которыхъ упоминаетъ гр. Маттеи, есть выздоровѣвшіе назадъ тому 3, 4, 6 и даже 10 лѣтъ и никто изъ нихъ съ тѣхъ поръ не жаловался на возобновленіе хотя малѣйшаго болѣзненнаго симптома.

[2]) Приставка „*Anti—Анти*“, что́ означаетъ „противъ“ обыкновенно, ради сокращенія, опускается.

Digitized by Google

щее побѣдить упорныя болѣзни. Они называется *Anticanceroso* (*Canceroso—Канчерозо*). Когда болѣзнь не поддается дѣйствію *Скрофолозо* и *Анжіоітико*, оно уступаетъ *Канчерозо*.

Эти три лѣкарства называются *главными*; къ нимъ присоединяется еще четвертое *Antilinfatico* (*Linfatico—Линфатико*), главный кругъ дѣйствія котораго ограничивается сердцемъ, кровеносными сосудами и кожею.

Вслѣдствіе того, что неожиданно появляющіяся, при полномъ здоровьи, острыя болѣзни ограничиваются извѣстною тканью, органомъ или частью его, или распространяется на весь организмъ (см. гл. VII), то первыя три лѣкарства назначаются и противъ острыхъ болѣзней, и первыя два остаются главными и фундаментальными средствами для совершеннаго возстановленія здоровья, даже и тогда, когда болѣзнь входитъ въ кругъ дѣйствія одного изъ слѣдующихъ *девяти спеціальныхъ* лѣкарствъ, а именно:

Febrifugo—Фебрифуго противолихорадочное, которое излѣчиваетъ всѣ лихорадки, всѣ болѣзни печени и селезенки, невралгіи и болѣзни возвратнаго типа.

Vermifugo—Вермифуго противоглистное, которое убиваетъ всѣхъ кишечныхъ паразитовъ, глистовъ.

Pettorale—Петторале, которое успѣшно побѣждаетъ всѣ болѣзни дыхательныхъ органовъ.

Antivenereo (*Venereo, Венерео*)—противовенерическое, которое вылѣчиваетъ сифилисъ во многихъ его видахъ, и даже, быть можетъ предупреждаетъ его.

Anti mal de mer—Анти маль де меръ — главнымъ образомъ противъ морской болѣзни.

Dom-Fin—Домъ-Финъ—главнымъ образомъ противъ дифтерита.

Lord—Лордъ—главнымъ образомъ противъ пупочной грыжи.

Marina—Марина—главнымъ образомъ противъ глазныхъ болѣзней.

Scrofoloso lassativo—Скрофолозо лассативо—слабительное.

Послѣднія пять—это новыя лѣкарства, недавно изобрѣтенныя, кругъ ихъ дѣйствія ограничивается преимущественно тѣми болѣзнями, противъ которыхъ они назначаются.

Digitized by Google

Эти 13 лѣкарствъ добыты изъ растеній, имѣющихъ свойство, какъ мы уже сказали, напоминающее силу Электричества, и приготовлены въ сухомъ видѣ, въ крупинкахъ. Многія изъ нихъ имѣютъ одно или нѣсколько одноименныхъ другого состава, образуя такимъ образомъ серіи, въ которыхъ лѣкарства отмѣчены нумерами въ послѣдовательномъ порядкѣ; эти медикаменты назначаются для внутренняго употребленія, и только нѣкоторыя изъ нихъ даются одновременно внутрь и наружно, при чемъ имѣется въ виду:

1) Замѣнять первые нумера или другія одноименныя изъ той же серіи, когда доказано, что дѣйствіе ихъ прекратилось послѣ употребленія въ различныхъ дозахъ и въ сухихъ крупинкахъ, и

2) поддерживать дѣйствіе однородныхъ имъ лѣкарствъ, когда это дѣйствіе представляется недостаточнымъ или прекратившимся, или же когда необходимо перемѣнить средство, къ которому болѣзнь и больной привыкли. Ихъ дѣйствіе различно, но незначительно, хотя они принадлежатъ къ той же серіи лѣкарствъ: одни изъ нихъ лучше соотвѣтствуютъ нѣкоторымъ болѣзнямъ и организмамъ, а другія дѣйствуютъ гораздо глубже, и имѣютъ свойство болѣе ограниченное, чѣмъ другія.

Начинать лѣченіе слѣдуетъ всегда съ перваго лѣкарства каждой серіи, исключая конечно болѣзни, для которыхъ существуютъ специфическія средства, и переходить къ одноименнымъ слѣдуетъ послѣдовательно и внимательно.

Въ настоящее время всѣхъ названій крупинокъ имѣется 32.

Эти медикаменты дополняются еще пятью *Электро-гомеопатическими жидкостями* для употребленія *исключительно наружнаго*, которыхъ дѣйствіе заключается въ уменьшеніи и часто въ совершенномъ уничтоженіи всякаго рода боли и въ способствованіи дѣйствію внутреннихъ лѣкарствъ, въ особенности при выздоравливаніи, а также онѣ могутъ быть примѣняемы самостоятельно въ болѣзняхъ менѣе серьезныхъ, въ которыхъ не выражается значительная испорченность лимфы и крови.

Эти жидкости называются:

Digitized by Google

Elettricita	Verde	или	El. V.	Электрич.	Зеленое (Эл. З.).
„	Gialla	„	El. G.	„	Желтое (Эл. Ж.).
„	Rossa	„	El. R.	„	Красное (Эл. К.).
„	Angioitico	„	El. A.	„	Анжіоітико (Эл. А.).
„	Bianca	„	El. B.	„	Бѣлое (Эл. Б.).

Названіе этихъ жидкостей электричествами неправильно, потому что въ природѣ не существуетъ электричества въ жидкомъ видѣ. Иностранная пресса и послѣдователи Электро-Гомеопатіи, признавая все ея превосходство передъ существующими способами лѣченія, неоднократно указывали на подобную несообразность. Несмотря на это, всѣ иностранные авторы книгъ, а также и редакторы журналовъ Электро-Гомеопатическихъ, и въ числѣ ихъ есть много врачей, продолжаютъ называть эти жидкости электричествами. Мы называть ихъ такъ не будемъ, а назовемъ — *Электро-Гомеопатическія жидкости: Бѣлая, Красная, Желтая, Зеленая и Анжіоітико.* (Эл. Анж. нѣкоторыми называется также *голубымъ* или *синимъ*). Только для краткости мы будемъ обозначать ихъ *Эл. З.*, *Эл. Ж.*, *Эл. К.* и т. д.

Жидкости *Красная* и *Анжіоітико* положительнаго свойства, *Зеленая* и *Желтая* отрицательнаго свойства, *Бѣлая* средняго свойства.

Эти жидкости собственно всѣ бѣлыя и по наружному виду распознаются одна отъ другой или по цвѣту стклянокъ или по цвѣту этикетъ, сообразно ихъ названіямъ по цвѣтамъ.

Этотъ врачебный матеріалъ простъ, какъ сама истина.

Обыкновенная доза для больного человѣка—одна крупинка въ день. Если же дать собакѣ, хотя бы сто, и даже цѣлый пузырекъ крупинокъ, то лѣкарство не произведетъ ни малѣйшаго дѣйствія.

Человѣкъ можетъ также проглотить, безъ всякихъ вредныхъ для себя послѣдствій, какое бы ни было количество крупинокъ, лишь бы только не во время лѣченія, т. е. когда принимается какое-нибудь лѣкарство, соотвѣтствующее имѣющейся болѣзни. Въ этомъ случаѣ онъ почувствуетъ непріятное ощущеніе, но никогда не вредное.

Digitized by Google

Изъ всего этого выходитъ, что, чѣмъ сложнѣе и труднѣе болѣзнь, тѣмъ меньше должны быть лѣкарственныя дозы.

Напримѣръ, перемежающаяся лихорадка проходитъ отъ одной крупинки, растворенной въ стаканѣ воды.

Злокачественная лихорадка излѣчивается одною крупинкою на шесть стакановъ воды.

Слѣдуетъ исключить случаи, когда бываютъ конвульсіи,—тогда лѣкарство разбавляется больше и принимается несравненно чаще.

И кромѣ того въ перемежающихся лихорадкахъ слѣдуетъ давать по одной крупинкѣ на стаканъ воды отъ восьми до десяти разъ въ день; въ лихорадкахъ же злокачественныхъ лучше давать по одной крупинкѣ на шесть стакановъ воды, самыми маленькими и часто повторяемыми дозами, если можно,—каждыя пять минутъ по чайной ложкѣ.

Можно давать и нѣсколько лѣкарствъ одновременно, несмѣшивая, одно утромъ, другое послѣ полудня.

При легочной чахоткѣ дается *Канч.* и *Петтор.*, одно утромъ, другое послѣ полудня. Если же бываетъ притомъ кровохарканіе, то дается третье средство *Анж.* и тогда на каждое лѣкарство опредѣляется одна треть стакана въ день.

Для ускоренія внутренняго лѣченія можно пользоваться электро-гомеопатическими жидкостями, выбирая соотвѣтственно причинѣ каждой болѣзни. Если причина происходитъ отъ кровообращенія, то прикладывать *Электр. анж.*

Красн. и *желт.* жидкости предпочитаются означенному средству при золотухѣ.

Опытомъ доказана, что сложная болѣзнь поддается только совокупному дѣйствію нѣсколькихъ лѣкарствъ, употребленныхъ одновременно, но въ послѣдовательномъ порядкѣ, одно за другимъ, внутрь и наружно.

Гомеопаты характеризуютъ лѣкарства и означаютъ соотвѣтствующее каждой болѣзни лѣченіе, напримѣръ, для водяной болѣзни такое-то лѣкарство, для конвульсій такое-то. Этотъ способъ почти непримѣнимъ въ настоящемъ случаѣ, потому что конвульсіи могутъ происходить отъ разныхъ причинъ. Напри-

Digitized by Google

мѣръ, если конвульсіи происходятъ отъ глистовъ, то какъ можно излѣчить ихъ лѣкарствомъ, дѣйствующимъ на кровь или кровеносную систему и наоборотъ? Водяная болѣзнь не проходитъ отъ одного лѣкарства; лѣкарство, которое излѣчиваетъ брюшную водянку, не соотвѣтствуетъ водянкѣ околосердечной сумки или водянкѣ яичника. Но въ каждомъ изъ этихъ случаевъ должно выбирать лѣкарство, вѣрно дѣйствующее на самый корень болѣзни—на органическую причину.

Слѣдуетъ замѣтить также, что наружныя лѣкарства ускоряютъ дѣйствіе внутреннихъ, но сами не могутъ уничтожить причины болѣзни.

Напримѣръ, вздутіе живота гораздо скорѣе проходитъ, если, кромѣ внутренняго лѣкарства, наложить еще компрессы, смоченные въ растворѣ того же лѣкарства, т. е. принимаемаго во внутрь, на подвздошья.

Также при аневризмѣ, лѣченіе ускоряется отъ компрессовъ, смоченныхъ въ растворѣ внутренняго лѣкарства, но въ большей дозѣ и наложенныхъ на тѣ мѣста, которыя кажутся болѣе болѣзненными.

Сильные золотушные и сифилитическіе недуги, неподдающіеся своимъ спеціальнымъ средствамъ, лѣчатся *Канч*.

Эти лѣкарства оказываются недѣйствительными только въ слѣдующихъ трехъ случаяхъ:

Когда неправильно опредѣлена болѣзнь, слѣдовательно, когда невѣрно выбрано лѣкарство;

Когда назначена неточная доза;

Или, наконецъ, когда болѣзнь до такой степени развилась, что не хватаетъ человѣческой возможности побѣдить ее».

Напримѣръ, когда органъ, необходимый для жизни разрушенъ болѣзнью или операціею, или когда больной ослабленъ продолжительною болѣзнью или престарѣлымъ возрастомъ. При такихъ обстоятельствахъ можно только облегчить страданія, но не вылѣчить больного.

Лѣкарство никогда не остается безъ дѣйствія, лишь бы оно было выбрано соотвѣтственно болѣзни и сообразно указаннымъ правиламъ.

Digitized by Google

Общее правило состоитъ въ томъ, что когда болѣзнь поддается дѣйствію лѣкарства, слѣдуетъ увеличить дозы, по той причинѣ, что лѣкарства—подобны, и, наоборотъ, когда болѣзнь усиливается, слѣдуетъ разжидить растворъ, т. е. ослабить дозы. Бываютъ больные, но это исключеніе, для которыхъ дозы, болѣе слабыя или болѣе сильныя, употребленныя внутрь и наружно, производятъ лучшее дѣйствіе. Ослаблять и усиливать дозы должно сообразно степени болѣзни. О дозировкѣ подробнѣе сказано ниже при описаніи круга дѣйствія каждой серіи лѣкарствъ, а также ниже въ отдѣльной главѣ и при описаніи болѣзней.

Слѣдуя указаннымъ правиламъ, каждый смѣло можетъ примѣнять этотъ способъ лѣченія, конечно при нѣкоторомъ соображеніи и вниманіи.

Но въ болѣзняхъ хроническихъ, упорныхъ или представляющихъ глубокое пораженіе организма, больнымъ не слѣдуетъ полагаться на самихъ себя, такъ какъ безконечное разнообразіе организмовъ всегда порождаетъ непредвидѣнные случаи, которыхъ они сами преодолѣть не умѣютъ, а потому имъ совѣтуется лучше обратиться за совѣтомъ къ спеціалистамъ этой методы лѣченія; только личный опытъ послѣднихъ и ихъ практическое знаніе примѣнять эти лѣкарства могутъ повліять на весь ходъ болѣзни, а также на улучшеніе здоровья и вообще на выздоровленіе.

Примѣчаніе 1. Лѣкарства въ той части этой книги, гдѣ приводится описаніе лѣченія болѣзней, для краткости обозначаются: во 1) безъ приставки *„анти“*, во 2) лишь заглавной буквой лѣкарства. Такъ, не Antiscrofoloso, а Scrofoloso или **S**; не Anticanceroso, а Canceroso или **C**; не Antivenereo, а Venereo или **V** и т. д.

Арабская цифра, стоящая рядомъ съ заглавной буквой, обозначаетъ нумеръ лѣкарства, напримѣръ: S.1 = Скрофолозо первое; S.2 = Скрофолозо второе; A.3 = Анжіоитико третье и т. д.

Digitized by Google

Цифра 2 то-же самое, что *nuovo (нуово)*; цифра 3 тоже самое, что *doppio (donnio)*.

Примѣчаніе 2. Удивительныя излѣченія болѣзней упорныхъ, сложныхъ и признанныхъ неизлѣчимыми, достигнутыя лѣкарствами графа Маттеи, имѣли своими послѣдствіями съ одной стороны обширное распространеніе метода его лѣченія во всемъ образованномъ мірѣ для блага страждущаго человѣчества, а съ другой стороны, съ чисто спекулятивною цѣлію явились подражатели способа его лѣченія, выдѣлывающіе издѣлія *своихъ фирмъ* въ крупинкахъ и жидкостяхъ, которымъ присвоили всѣ названія лѣкарствъ графа Маттеи. Эти подражатели слѣдующіе: *Sauter* въ г. Женевѣ, *Martignoli* въ г. Болоньѣ; *Ponzio*, *Ghirelli* и *I. Vigon* въ г. Ниццѣ, и, наконецъ, *G. A. Clerc* въ *Motiers-Travers*, въ Швейцаріи. Оградить себя отъ фальсификаціи можно лишь полученіемъ этихъ лѣкарствъ изъ заслуживающихъ довѣрія складовъ электро-гомеопатич. средствъ графа Маттеи [1]).

По поводу системы гр. Маттеи и поддѣлки его лѣкарствъ въ засѣданіи Спб. Общества Врачей-Гомеопатовъ 15-го ноября 1891 года, между прочимъ, было высказано слѣдующее: случаи излѣченій болѣзней посредствомъ лѣкарствъ гр. Маттеи встрѣчаются неоднократно, что дѣйствительно не подлежитъ никакому сомнѣнію, и что методъ лѣченія гр. Маттеи заслуживаетъ практическаго испытанія и особливо физіологическаго изученія, если бы только знать, что именно изучать. Но это-то и составляетъ тайну графа Маттеи. Въ виду же большого интереса, возбужденнаго въ публикѣ къ его средствамъ и не малаго на нихъ спроса, явились коммерсанты и спекулянты, заявляющіе, что имъ извѣстенъ секретъ графа Маттеи, и наводняющіе рынокъ *своими препаратами*, которые они называютъ «электро-гомеопатическими»; таковы *Vigon*, *Martignoli* и другіе, но главнымъ образомъ женевскій аптекарь Сотеръ (*Sauter*). Графъ Маттеи однако категорически заявляетъ, что ни Сотеръ, ни

[1]) См. перечень лѣкарствъ и цѣны ихъ въ концѣ книги.

Digitized by Google

другіе фабриканты, *поддѣлывающіе его средства*, отнюдь не посвящены въ его тайну. И дѣйствительно, есть много данныхъ утверждать, что средства Маттеи совершенно не тождественны со средствами Сотера, и во всякомъ случаѣ терапевтическое дѣйствіе первыхъ отличается отъ послѣднихъ.

ГЛАВА III.

Характеристика серій и кругъ дѣйствія каждаго лѣкарства въ крупинкахъ.

А. ГЛАВНЫЯ ЛѢКАРСТВА.

Характеристика серіи Scrofoloso (*Скрофолозо*) = **S.**

Серія этихъ лѣкарствъ состоитъ изъ шести одноименныхъ средствъ, изъ которыхъ каждое имѣетъ другой составъ и лучше соотвѣтствуетъ нѣкоторымъ болѣзнямъ и организмамъ, а именно: *Скроф.* 1, *Скроф.* 2 или *нуово*, *Скроф.* 3 или *доппіо*. *Скроф.* 5, *Скроф.* 6 и *Скроф. джіаппоне*; они исправляютъ и очищаютъ лимфу и потому соотвѣтствуютъ во всѣхъ болѣзняхъ лимфатикамъ, и точно также и другимъ темпераментамъ, имѣющимъ расположеніе къ затвердѣнію железъ или къ острымъ воспаленіямъ, не исключая людей смѣшаннаго темперамента съ нѣжною кожею.

Изъ всѣхъ *Скрофолозо* самыя замѣчательныя *Скроф.* 1 и *Скроф.* 5 по своимъ превосходнымъ качествамъ и безконечно обширному кругу дѣйствія. *Скроф.* 1 вылѣчиваетъ $^{9}/_{10}$ болѣзней, происходящихъ отъ *золотухи*, которая, по мнѣнію графа Маттеи, есть ничто иное, какъ проказа или сифилисъ, наслѣдственные. Оно единственное изъ всѣхъ лѣкарствъ, которое можно принимать какъ *предохранительное* во время эпидемій — это во-первыхъ, и, во-вторыхъ, чтобы очистить свой организмъ, укрѣпить себя противъ наклонности къ простудѣ, получить аппетитъ, легкое пищевареніе, силы и хорошій сонъ. Это лѣ-

Digitized by Google

карство уничтожаетъ лишайное, золотушное или псорическое худосочіе, которымъ болѣе или менѣе пропитывается организмъ каждаго человѣка, и которое, по свойству своему, развиваясь, постепенно въ организмѣ производитъ неправильность кровообращенія, порождаетъ преждевременную старость и обременительную дряхлость. Другія же лѣкарства побѣждаютъ болѣзни, только входящія въ кругъ ихъ дѣйствія, но не предупреждаютъ ихъ. *Скроф.* 1 необходимое лѣкарство для дѣтей и стариковъ: первымъ онъ предупреждаетъ болѣзни свойственныя ихъ возрасту, а вторымъ продолжаетъ жизнь. Принимаемое регулярно во время беременности, оно производитъ благопріятное вліяніе на мать и на ребенка. *Скроф.* 1 и *Скроф.* 5—это цѣлительныя средства противъ ранъ, происходящихъ отъ внутренней причины, напримѣръ золотухи, сифилиса, рака и пр., но противъ случайныхъ ранъ дѣйствуетъ лучше *Анж.*

Цѣлыя семейства, даже населенія, могутъ предупредить себя отъ множества болѣзней и очистить свой организмъ обычнымъ употребленіемъ одного изъ *Скрофолозо*, но въ особенности *Скроф.* 1, смѣшивая ихъ съ пищею, съ виномъ или водою (по 5—10 круп. 2—3 раза въ день въ сухомъ видѣ). Въ Лондонѣ приготовляютъ хлѣбъ (*pain de Santé*) смѣшивая 5 круп. *Скроф.* 1 съ фунтомъ муки.

Всѣ *Скрофолозо* обладаютъ специфическими свойствами противъ разныхъ болѣзней, ниже мы здѣсь приводимъ кругъ дѣйствія каждаго изъ Скрофолозовъ въ отдѣльности.

Эта серія лѣкарствъ примѣняется наружно всѣми способами, о которыхъ сказано въ Гл. IV.

Кругъ дѣйствія Scrofoloso 1 (*Скрофолозо 1*) = S.1.

Голова. Головная боль всякаго рода, невральгія головы; мигрень; воспаленіе головнаго мозга; головная водянка; сотрясеніе мозга; анемія мозга; апоплексія мозга (въ началѣ ея); спячка; слабость памяти; душевныя болѣзни (для женщинъ лучше *Канч.*).

Лицо. Личная боль; флюсъ; судорожное сжатіе челюстей.

Digitized by Google

Глаза и вѣки. Воспаленіе и параличъ вѣкъ; воспаленіе соединительной оболочки; катарракта (попер. съ *Анж.*); темная вода; стафилома; слезная фистула (иногда попер. съ *Канч.*); отекъ глазного яблока; ослабленіе зрѣнія; косоглазіе; куриная слѣпота; ячмень; перелойное воспаленіе глазъ.

Носъ. Насморкъ острый и хроническій; воспаленіе носа и болѣзни его полости; полипы.

Уши. Воспаленіе, шумъ и острыя боли въ ушахъ; течь изъ ушей; притупленіе слуха, глухота, независящая отъ прилива крови; кровотеченіе изъ ушей (попер. съ *Канч.* 1 или 5).

Ротъ, зубы, десны, языкъ. Воспаленіе внутренности рта; молочница; афты; плесневица; цынга; зубная боль; трудное прорѣзываніе зубовъ (внутрь ребенку и кормилицѣ); болѣзни десенъ; воспаленіе и изъязвленіе языка.

Гортань. Дифтеритъ; катарральная жаба; грануляція гортани; хроническое воспаленіе миндалевидныхъ железъ, происходящее отъ золотухи; крупъ; ложный крупъ; коклюшъ; катарръ гортани; гриппъ; катарральныя язвы гортани; охриплость, осиплость, потеря голоса; кашель глубокій, звонкій, крупозный или являющійся вслѣдствіе нѣкоторыхъ лихорадокъ; полипы.

Дыхательные органы. Воспаленіе легкихъ; воспаленіе плевры; колотье въ боку при началѣ бугорчатки, когда мокрота бѣлая; грудная водянка, бронхитъ; одышка у людей золотушныхъ вслѣдствіе усиленныхъ движеній или отъ очень обильной пищи; вонючее дыханіе (для женщинъ лучше *Канч.*).

Пищеварительные органы. Во всѣхъ болѣзняхъ желудка и кишекъ, если при этомъ не страдаетъ печень, что распознается по желтушечному окрашиванію кожи, безцвѣтному калу, тошнотѣ, рвотѣ желчью, горькому вкусу и проч.; подвздошная колика; кисты желудка; боль, разстройство, спазмы, диспепсія и слабость желудка; воспаленіе: желудка, пищепроводника; желудочная боль у беременныхъ женщинъ; морская болѣзнь; невральгія желудка; холерина; холера азіатская или спорадическая; дѣтская холера; чрезвычайный голодъ (вмѣстѣ съ *Анж.*) аппетитъ отсутствующій или извращенный; потеря вкуса; трудное пищевареніе; изжога; икота; тошнота; рвота; запоръ; по-

Digitized by Google

носъ (въ упорномъ случаѣ вмѣстѣ съ *Фебр.* 1, а при зеленоватыхъ испражненіяхъ съ *Канч.* 1); геморрой; рвота каломъ; выпаденіе прямой кишки; полипы въ кишкахъ; съуженіе и ущемленіе кишекъ.

Животъ. Воспаленіе брюшины: брюшная водянка при общей водянкѣ, происходящая отъ органической болѣзни живота; вздутіе живота.

Половые органы. Затвердѣніе железъ въ этихъ органахъ; боль матки; хронич. ея воспаленіе (попер. съ *Канч.*); полипы матки; болѣзни влагалища; воспаленіе большихъ губъ; маточная невральгія; блѣдная немочь; аменоррея. Мужское безсиліе; водянка яичка; слизетеченіе; хроническое воспаленіе предстательной железы; воспаленіе крайней плоти; поллюціи; сперматорея; медленное истеченіе сѣмени во время совокупленія; слабость половыхъ органовъ вслѣдствіе онанизма.

Мочевые органы. Затвердѣніе железъ въ этихъ органахъ, воспаленіе мочевого канала; съуженіе его; воспаленіе (катарръ) мочевого пузыря; параличъ мочевого пузыря; мочевые камни; боль, воспаленіе и бугорчатка почекъ; блуждающія (передвижныя) почки; почечные камни; Брайтова болѣзнь; сахарное мочеизнуреніе.

Женскія груди. Затвердѣніе грудей; грудница; нарывы; млекотеченіе; воспаленіе и трещины сосковъ; порча женскаго молока; отвращеніе ребенка отъ груди; ослабленіе женщины вслѣдствіе кормленія грудью.

Сочлененія и члены. Бедреная боль; самородный вывихъ бедра у дѣтей; ревматизмъ мышцъ и сочлененій; подагра; бѣлая опухоль колѣна; мягкая и бѣлая опухоли (попер. съ *Фебр.* или съ *Анж.*, или *Канч.*).

Кожа. Чирья; карбункулъ; сибирская язва; лишаи; слоновая болѣзнь; проказа (попер. съ *Канч.*); раны отъ внутр. болѣзни; хроническія сыпи всякаго рода; парша; чесотка; рожа (при которой иногда употребляютъ *Анж.*, а потомъ *Фебр.*); нарывы холодные и горячіе; обопрѣлость; фистулы; ногтоѣда; обжоги; отмороженіе, наружныя кисты.

Кости. Воспаленіе надкостной плевы и вещества кости; ра-

Digitized by Google

хитизмъ; костоѣда; воспаленіе; размягченіе, переломы и вывихи костей.

Лихорадки. Сыпныя лихорадки всякаго рода, корь, оспа, скарлатина, потовая горячка красная и бѣлая, крапивная; стекловидная и просообразная сыпь. Въ сыпной лихорадкѣ сперва даютъ *Фебр.* 1, а потомъ для окончанія лѣченія—*Скроф.* 1. Послѣднее вызываетъ сыпь на тѣлѣ и этимъ спасаетъ жизнь отъ скрывшейся сыпи вслѣдствіе простуды, и вылѣчиваетъ послѣдствія сыпныхъ лихорадокъ: кашель, жабу, ушную течь и проч., и упадокъ силъ вслѣдствіе всякихъ лихорадокъ.

Спазмодическія страданія. Истерика (въ слабыхъ дозахъ, иногда попер. съ *Канч.* 1); пляска Св. Витта; судороги; конвульсіи; эпилепсія; эклампсія; каталепсія у мужчины; конвульсивный смѣхъ; заиканіе.

Разныя болѣзни. Анемія артерій; воспаленіе; асфиксія; атрофія мышцъ; безсонница; болѣзни железъ; всѣ болѣзни людей съ предрасположеніемъ къ лишаямъ; болѣзни острыя вообще; болѣзни спинного мозга; бѣшенство или водобоязнь; воспаленіе разныхъ органовъ; грусть; грыжа; золотуха; кисты наружныя; критическій возрастъ; летаргія; ломъ въ поясницѣ; лунатизмъ у мужчины; мозоли; наклонности къ онанизму, простудѣ и пьянству; невральгія; нѣмота случайная; обморокъ; онѣмѣніе; опьяненіе; ослабленіе разныхъ органовъ у лимфатиковъ; отравленіе разными ядами; параличъ; полупараличъ; пассивныя кровотеченія; пораженіе молніею; перелой; порѣзы; потливость; притупленіе ума; раны; ртутная болѣзнь; рыданіе; селезенки воспаленіе; сердцебіеніе вслѣдствіе скрывшейся сыпи, заживленія лишая или раны, или послѣ ревматизма, кровотеченія и при анеміи (попер. съ *Анж.*); сифилисъ,—въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ существуетъ въ крови, не производя никакихъ обнаруживаній въ собственномъ смыслѣ, *Скроф.* 1 дѣйствительнѣе, чѣмъ *Венер.*; слюнотеченіе при беременности; содроганіе; солнечный ударъ; столбнякъ (вмѣстѣ съ *Верм.* и *Эл. желт.*); трихинная болѣзнь; тучность (попер. съ *Канч.*); ужаленіе змѣею и насѣкомыми; укушеніе бѣшеными животными; фиброиды; язвы варикозныя (поперемѣнно съ *Анж.* 2).

Digitized by Google

Кругъ дѣйствія Scrofoloso 2 или nuovo.

Скрофолозо 2 или *нуово* = **S.2.**

Кругъ его дѣйствія менѣе обширный, чѣмъ *Скроф.* 1, но за то оно дѣйствуетъ глубже и гораздо проницательнѣе, и при этомъ не отягощаетъ кровеносной системы [1]), соотвѣтствуетъ лучше субъектамъ смѣшаннаго темперамента, но не имѣющимъ раковыхъ язвъ, а также и золотушнымъ. Специфическое лѣкарство противъ болѣзней слизистой оболочки кишекъ, мочевыхъ и почечныхъ камней.

Голова. Головныя боли нервныя и истерическія; мигрень (попер. съ *Фебр.*); ипохондрія у мужчины; выпаденіе волосъ вслѣдствіе сильныхъ острыхъ болѣзней.

Глаза и вѣки. Воспаленіе вѣкъ; темная вода; слезная фистула; нарывы на роговой оболочкѣ.

Уши. Течь изъ ушей; шумъ въ ушахъ.

Зубы. Зубная боль съ флюсомъ или съ опухолью подчелюстныхъ железъ.

Гортань. Катарральный кашель; крупъ; коклюшъ; охриплость; полипы.

Пищеварительные органы. Нервная и хроническая диспепсія; воспаленіе слизистой оболочки кишекъ; чрезвычайный голодъ.

Половые и мочевые органы. Нервное раздраженіе этихъ органовъ; болѣзни влагалища, нимфоманія женщинъ послѣ родовъ; хроническая гоноррея (вмѣстѣ съ *Венер.*); катарръ мочеваго пузыря; почечные и мочевые камни; полипы.

Женскія груди. Ссадины на соскахъ; задержаніе молока.

Железы. Зобъ, затвердѣніе шейныхъ железъ.

Сочлененія и члены. Бедреная боль; бедреный вывихъ; ревматизмъ; подагра; судороги въ икрахъ, параличъ рукъ.

Кожа. Хроническія болѣзни кожи; хроническая крапивная сыпь; проказа; бородавки; обжоги; заживляетъ простыя раны.

---

[1]) *Скроф.* 1, принятое сангвиникомъ, слегка его разгорячаетъ, волнуетъ, что выражается запорами и легкими головокруженіями. Въ этомъ случаѣ его замѣняетъ *Скроф.* 2.

Digitized by Google

Кости. Рахитизмъ; размягченіе костей; воспаленіе вещества кости; воспаленіе надкостной плевы.

Лихорадка. Гастрическая и ревматическая (та и другая вмѣстѣ съ *Фебр.* 1 и 2).

Разныя болѣзни. Болѣзни спинного мозга; грыжа у дѣтей вслѣдствіе крика; истерика; пляска Св. Витта; эпилепсія.

Кругъ дѣйствія Scrofoloso 3 или doppio.

Скрофолозо 3 или *doppio* = **S.3.**

Дѣйствіе его подходитъ къ тому, которое получается отъ смѣшенія *Скроф.* 1 и 2.

Оно дѣйствуетъ на нервную систему очень быстро и скорѣе побѣждаетъ нервныя болѣзни, чѣмъ его одноименныя, въ особенности, если его принимать соображаясь съ обстоятельствами, попеременно съ *Фебр. 2.*

Голова. Головная боль вслѣдствіе злоупотребленія спиртными напитками или отъ усиленныхъ умственныхъ занятій.

Языкъ и гортань. Затвердѣніе языка; воспаленіе миндалевидныхъ железъ съ нагноеніемъ и безъ онаго.

Половые и мочевые органы. Затвердѣніе яичекъ; болѣзни половыхъ и мочевыхъ органовъ вслѣдствіе прервавшейся гонорреи; воспаленіе сѣмянныхъ канатиковъ.

Сердце. Нервное сердцебіеніе; съуживаніе сердца (въ обѣихъ случаяхъ попер. съ *Анж.* 3).

Кожа. Лишай на лицѣ; лишаи на мошонкѣ и на лобкѣ.

Кромѣ того *Скроф.* 3 можетъ быть назначаемо противъ невральгіи, болѣзней спинного мозга, атрофіи у золотушныхъ дѣтей, грыжи, желудочной боли, подагрическихъ отложеній, физической слабости вслѣдствіе потери сѣмени, слабости мускуловъ у дѣтей, вслѣдствіе чего имъ трудно начинать ходить, припадковъ конвульсій, эпилепсіи и столбняка (съ приложеніемъ *Эл. Желтаго*).

Digitized by Google

Кругъ дѣйствія Scrofoloso 5.

Скрофолозо 5 = **S.5.**

Кругъ его дѣйствія очень обширный и по своимъ цѣлебнымъ свойствамъ подходитъ къ тѣмъ, которыми обладаетъ *Канч.* 1. Послѣднее можетъ быть замѣнено *Скроф.* 5-мъ, но только не въ болѣзняхъ матки и рака. *Скроф.* 5 точно также какъ и *Скроф.* 1, противовенерическое лѣкарство и болѣе дѣйствительное, чѣмъ *Венерео* въ тѣхъ случаяхъ, когда сифилисъ существуетъ въ крови, не производя никакихъ характерныхъ наружныхъ явленій.

Такъ какъ *Скроф.* 1 не соотвѣтствуетъ въ нѣкоторыхъ болѣзняхъ пищеварительныхъ органовъ, зависящихъ отъ болѣзни печени, то оно въ этихъ болѣзняхъ и точно также въ хроническихъ болѣзняхъ печени съ успѣхомъ замѣняется *Скроф.* 5 вмѣстѣ съ *Фебриф.* 1 и 2.

Глаза и вѣки. Золотушное воспаленіе глазъ; слезная фистула; опухоль вѣкъ.

Носъ, ротъ, языкъ. Хроническій насморкъ; вонючее нагноеніе носа; полипъ въ носу; цынга; воспаленіе языка.

Уши. Течь изъ ушей; глухота.

Гортань. Хроническое воспаленіе гортани съ нагноеніемъ (поперем. съ *Канч.* 1); жаба; дифтеритъ съ значительнымъ упадкомъ силъ.

Пищеварительные органы. Острый и хроническій катарръ желудка; кисты желудка; разстройство желудка вслѣдствіе пьянства; колика кишекъ; бугорчатка кишекъ и брыжжеечныхъ железъ; рвота, поносъ; аппетитъ отсутствующій или извращенный; всѣ хроническія болѣзни этихъ органовъ, происходящія отъ сыпи, скрывшейся внутрь, или осложняющіяся болѣзнею печени; хроническіе запоры (въ слабыхъ дозахъ въ продолженіе долгаго времени); закрытый геморрой.

Печень. Хроническія болѣзни печени вмѣстѣ съ *Фебр.* 1 и 2.

Половые и мочевые органы. Очень болѣзненные регулы у женщинъ, явно безплодныхъ; почечные и мочевые камни; неержаніе мочи; съуженіе мочевого канала.

Digitized by Google

Железы. Затвердѣніе железъ вообще; зобъ съ образованіемъ нарыва и фистулы, а также и безъ оныхъ.

Сочлененія и члены. Хроническій ревматизмъ мышцъ и сочлененій, усиливающійся въ дурную погоду; подагра; бедреная невральгія съ колющею и сдавливающею болью и дерганіемъ въ наружной сторонѣ бедра (съ приложеніемъ *Эл. Кр.*); бѣлая опухоль колѣна.

Кожа. Всѣ хроническія болѣзни кожи вылѣчиваются *Скроф.* 5, при употребленіи внутрь и наружно въ ваннахъ, примочкахъ, мази, обмываніяхъ, и пр., какъ-то: экзема, слоновая болѣзнь, разъѣдающій лишай на крыльяхъ носа; лишайныя сыпи, которыя упорствуютъ прочимъ лѣкарствамъ. Дикое мясо, раны отъ внутренней болѣзни; фистулы; карбункулъ; чирья; отмороженіе; обжоги; ужаленіе насѣкомыми; холодные и горячіе нарывы; опухоли, раны, въ которыхъ унимаетъ боль и быстро ихъ заживаетъ.

Кости. Вывихи; воспаленіе надкостной плевы и вещества кости; костоѣда, рахитизмъ, размягченіе костей; костные наросты и прочія болѣзни костей (иногда попер. съ *Канч.* 4).

Разныя болѣзни. Боли вообще; болѣзни спинного мозга; лунатизмъ у мужчины; ослабленіе женщины вслѣдствіе кормленія грудью; сифилисъ въ скрытомъ состояніи.

Кругъ дѣйствія Scrofoloso 6 (*Скрофолозо 6*) = S.6.

Спеціально употребляется противъ всѣхъ болѣзней почекъ и мочевого пузыря, въ особенности противъ задержанія мочи; кромѣ того при сахарномъ мочеизнуреніи, ревматической боли въ сочлененіяхъ рукъ и ногъ, боли вслѣдствіе ушиба и паденія, разстройства пищеваренія отъ охлажденія желудка холодными напитками или кислотами, сухотки спинного мозга у взрослыхъ людей, слабости мускуловъ съ трясеніемъ членовъ, меланхоліи, рожистаго воспаленія.

Кругъ дѣйствія Scrofoloso Giappone.

Скрофолозо Джіаппоне = S.G.

Назначается противъ всѣхъ разстройствъ пищеварительныхъ органовъ, въ томъ числѣ и диспепсіи. Спеціально дается про-

Digitized by Google

тивъ азіатской и спорадической холеры, холерины, колики, поноса, рвоты, дизентеріи, судорогъ, лихорадки, инфлуэнціи, слизистаго геморроя и какъ средство предохранительное противъ эпидеміи холеры и инфлуэнціи. Съ успѣхомъ побѣждаетъ ослабленіе всего организма, происходящее вслѣдствіе тяжкой и изнурительной болѣзни, или какъ слѣдствіе переутомленія умственными занятіями, сопровождаясь холоднымъ потомъ и обморокомъ, или какъ обыкнововенное явленіе престарѣлаго возраста съ слабостью въ колѣняхъ, ногахъ и поясницѣ.

Кругъ дѣйствія Marina (*Марина*) = M.

Марина принадлежитъ къ Скрофолозамъ. Примѣняется внутренно и наружно и очень дѣйствительно противъ большинства заболѣваній глазъ, особенно противъ катаракты, а также противъ заболѣваній разныхъ слизистыхъ оболочекъ.

Всѣ средства опредѣленной серіи, также и различные нумера Скрофолозовъ могутъ при нѣкоторыхъ эпидемическихъ вліяніяхъ замѣнять другъ друга. Такъ наблюдалось, что въ одной эпидеміи гриппа специфическимъ средствомъ оказалось *Скроф. джіап.*, въ другой—*Скроф.* 1. Имѣетъ основаніе поэтому указаніе графа Маттеи начинать вообще съ № 1 показанныхъ средствъ; въ случаѣ же отсутствія или недостаточности успѣха, перейти къ № 2 или № 3 и т. д., несмотря на насмѣшки, вызываемыя такимъ способомъ примѣненія у недостаточно освѣдомленныхъ противниковъ нашихъ. Опытъ учитъ, что дѣйствительно характеръ эпидеміи (genius epidemicus) въ разное время разный бываетъ, и болѣе соотвѣтствующими являются другіе нумера опредѣленной серіи лѣкарствъ, чѣмъ тѣ, которые въ прежнихъ эпидеміяхъ оказались наиболѣе дѣйствительными.

Digitized by Google

Дифференціальныя (отличительныя) свойства серій Scrofoloso (*Скрофолозо*) въ различныхъ дозахъ [1]).

Первый стаканъ [2]) соотвѣтствуетъ взрослымъ въ болѣзняхъ недавнихъ, маловажныхъ и острыхъ безъ лихорадки: поносъ, разстройство желудка, припадки подагры, головная и зубная боль и пр., также въ сыпныхъ лихорадкахъ у взрослыхъ и дѣтей, чтобы вызвать скрывшуюся сыпь или произвести сыпь. Для послѣдней цѣли можно безъ опасности принимать растворъ изъ 3 крупинокъ въ стаканѣ воды или же давать S. 1 въ массивныхъ дозахъ.

Второй стаканъ употребляютъ при лѣченіи острыхъ воспаленій, сопровождающихся лихорадкой и болью или безъ боли, также противъ всѣхъ накожныхъ и хроническихъ болѣзней; ревматизма, подагры, невральгіи, рожи и другихъ накожныхъ болѣзней, исключая являющихся съ лихорадкою, которая вылѣчивается скорѣе и легче слабыми дозами, очищающими кровь и не производящими усиленнаго высыпанія.

Третій стаканъ даютъ въ предъидущихъ же болѣзняхъ, когда они усиливаются отъ пріема втораго стакана, также при лѣченіи грудныхъ и малолѣтнихъ дѣтей, и спеціально употребляется противъ хроническихъ запоровъ, нервныхъ и спазмодическихъ страданій, какъ падучая болѣзнь, истерика, пляска Св. Витта, но и второй стаканъ въ нервныхъ и спазмодическихъ болѣзняхъ можетъ быть употребленъ иногда съ одинаковымъ успѣхомъ. Исключеніе составляютъ случайныя конвульсіи у дѣтей и женщинъ; въ этихъ случаяхъ первый стаканъ дѣйствуетъ лучше.

Массивныя дозы: по 10 сухихъ крупинокъ въ одинъ пріемъ противъ поноса, рвоты, обморока, асфиксіи, опьяненія, спаз-

---

[1]) Указанія, которыя слѣдуютъ, относятся особенно до *Скроф.* 1.

[2]) См. гл. IV о дозахъ.

Digitized by Google

мовъ, апоплексіи, разстройства желудка, морской болѣзни. По 20 сухихъ круп. *каждый часъ*, до появленія внезапно скрывшейся сыпи во всѣхъ сыпныхъ лихорадкахъ. Отъ 15 до 40 сухихъ круп. въ одинъ пріемъ, смотря по степени болѣзни, противъ отравленія, трихинной болѣзни, азіатской и спорадической холеры. Какъ *предохранительное* средство во время всякой эпидеміи принимаютъ ежедневно: на тощакъ, каждый разъ съ пищею и на ночь отъ 4 до 6 сухихъ круп. въ одинъ пріемъ, и съ каждымъ питьемъ, выпитымъ въ продолженіе дня, по 1 круп. Какъ *предохранительное* средство, чтобы очистить свой организмъ, укрѣпить себя противъ наклонности къ простудѣ, получить аппетитъ, легкое пищевареніе, силы и хорошій сонъ принимаютъ два или три раза ежедневно отъ 1 до 4 сухихъ круп. въ одинъ пріемъ. Отъ 6 до 20 круп. въ день даютъ для усиленія внутреннихъ растворовъ при лѣченіи нѣкоторыхъ болѣзней, напр., костей, желудка, кишекъ, ревматизма, мужскаго безсилія и пр.

Надо замѣтить, что *Скроф.* 1 въ сухихъ крупинкахъ, а также принимаемое въ первомъ стаканѣ иногда вызываетъ сыпь на тѣлѣ, лишаи или производитъ ревматическія боли у тѣхъ, которые предрасположены къ этимъ болѣзнямъ.

Характеристика серіи Angioitico (*Анжіоитико*) = А.

Серія этихъ лѣкарствъ состоитъ изъ трехъ одноименныхъ средствъ, изъ которыхъ каждое имѣетъ другой составъ и лучше соотвѣтствуетъ нѣкоторымъ болѣзнямъ и организмамъ, а именно: *Анж.* 1, *Анж.* 2 или *нуово* и *Анж.* 3. Эти лѣкарства сообщаютъ правильность кровообращенію и очищаютъ кровь, дѣйствуютъ на всю кровеносную систему, въ особенности на сердце и на всѣ его болѣзни, и назначаются для лѣченія почти всѣхъ болѣзней у сангвиниковъ; но вообще можно сказать, что сангвиники рѣдко обходятся безъ Скрофолозо. Если имѣется, при общемъ показаніи для *Анжіоитико*, одновременно и заболѣванія отдѣльныхъ органовъ, напримѣръ—печени, селезенки, дыхательныхъ органовъ, то рядомъ примѣняются еще *Фебрифуго*, *Петторале* и проч.

Digitized by Google

Въ общемъ же примѣненіе *Анжіоитико* необходимо въ началѣ и въ теченіи всякихъ воспалительныхъ и острыхъ лихорадочныхъ болѣзней. Если это упустить, то легкая и неопасная на видъ болѣзнь, какъ наприм. воспаленіе подреберной плевы, можетъ принять очень опасный характеръ и повести даже къ смерти.

При *правильныхъ* регулахъ дѣвицы и женщины не должны принимать *Анжіоитико* внутрь, но наружное его употребленіе, кромѣ ваннъ и спринцованій влагалища во время регулъ можно продолжать; внутреннее же употребленіе прочихъ лѣкарствъ въ этотъ періодъ становится даже проницательнѣе.

При совокупной испорченности лимфы и крови, часто представляется необходимымъ употреблять *Анжіоитико* попер. то съ *Скроф.*, то съ *Канч.* и первое изъ нихъ иногда даже имѣетъ второстепенное значеніе. Если пренебрегутъ этимъ указаніемъ о совмѣстномъ употребленіи *Анжіоитико* съ *Скроф.* или *Канч.*, а при надобности съ однимъ изъ спеціальныхъ средствъ, какъ уже сказано выше, то тѣ или другія лѣкарства, употребленныя отдѣльно, могутъ быть полезны, но тогда не достигается выздоровленія.

Эта серія лѣкарствъ примѣняется наружно всѣми способами, о которыхъ сказано въ главѣ IV.

Теперь мы переходимъ къ подробному изложенію круга дѣйствія каждаго нумера *Анжіоитико*.

Кругъ дѣйствія Angioitico 1 (*Анжіоитико*)=A.1.

Принятое сангвиникомъ укрѣпляетъ силы, здоровье, способствуетъ хорошему сну и правильному пищеваренію. Оно спеціально назначается противъ всѣхъ болѣзней у людей полнокровныхъ, живого характера, желчныхъ и нервныхъ, противъ активныхъ приливовъ [1]), апоплексіи, рака, всѣхъ бо-

[1]) Эти приливы называются также *волненіемъ крови* и происходятъ вслѣдствіе ослабленія стѣнокъ сосудовъ, такъ что уже обыкновенное давленіе крови можетъ вызвать болѣе сильное переполненіе сосудовъ, изъ коихъ болѣе тонкіе расширяются. Эти приливы могутъ быть скоротечные и хроническіе.

Digitized by Google

лѣзней сердца и сосудистой системы, приливовъ крови, застоя крови и кровотеченій всякаго рода и изъ всѣхъ органовъ.

Голова. Головная боль и спячка отъ прилива крови; мозговые приливы съ головокруженіемъ; апоплексія; воспаленіе мозга и мозговыхъ оболочекъ; бугорчатка мозга; размягченіе мозга; невральгія головы и припадки судорогъ, преимущественно у молодыхъ людей сангвиническаго темперамента и ведущихъ сидячій образъ жизни; душевныя болѣзни.

Лицо. Лицевая боль; веснушки, судорожное сжатіе челюстей.

Глаза и вѣки. Воспаленіе вѣкъ; воспаленіе соединительной и сѣтчатой оболочекъ глазъ; гнойное воспаленіе глазъ; катарракта, ослабленіе зрѣнія; бѣльмо; куриная слѣпота; темная вода; ячмень.

Гортань и дыхательные органы. Жаба острая и жаба воспалительная; воспаленіе миндалевидныхъ железъ; катарральныя язвы гортани; ложный крупъ; коклюшъ; гриппъ; бронхитъ; кблотье въ груди (плевритъ); конвульсивный кашель; нервная одышка; удушье чахоточныхъ; кровохарканіе; грудная водянка, происходящая отъ неправильнаго кровообращенія или болѣзни сердца; стѣсненіе дыханія и кровавая мокрота при воспаленіи легкихъ.

Животъ и пищеварительные органы. Воспаленіе брюшины послѣ родовъ (вмѣстѣ съ *Канч.*); брюшная водянка, происходящая отъ неправильности кровообращенія; морская болѣзнь (съ виномъ значительно ослабляетъ симптомы болѣзни, но не столь дѣйствительно, какъ *Скроф.* 1); запоръ; рвота каломъ (вмѣстѣ съ *Скроф.* 1); кровавый поносъ; открытый геморрой; рвота кровью; частыя испражненія во время холеры.

Печень. Воспаленіе печени, желтуха, жирная печень, желчные камни, воспаленіе печени и желудка (всѣ эти болѣзни попер. съ *Фебр.* 1 и 2).

Половые и мочевые органы. Воспаленіе и затвердѣніе въ этихъ органахъ (попер. съ *Канч.*); разстройство регулъ, колики и судороги въ время регулъ; полипы матки, кисты и воспаленіе яичниковъ. Медленное истеченіе сѣмени во время совокупленія (попер. съ *Канч.*), задержаніе мочи и прочія болѣзни этихъ органовъ.

Digitized by Google

Сочлененія и члены. Ревматическое и подагрическое воспаленіе съ опухолью; бѣлая опухоль; мягкая опухоль ногъ; бѣлая болящая опухоль бедръ у женщинъ; бедреная боль.

Кожа. Просообразная сыпь; періодъ высыпанія оспы; рожистое воспаленіе; воспалительная и скоротечная краснота кожи; нарывы, карбункулъ и сибирская язва (вмѣстѣ съ *Канч.*); случайныя раны; дикое мясо; ракъ и скирръ (вмѣстѣ съ *Канч.*); антоновъ огонь.

Лихорадка. См. выше въ характеристикѣ этой серіи лѣкарствъ.

Спазмодическія страданія. Истерика; эпилепсія, если она обнаруживается у людей страстныхъ вслѣдствіе гнѣва; пляска Св. Витта, заиканіе, эклампсія, конвульсивная икота (съ *Фебр.* 1 и 2).

Разныя болѣзни. Анемія; асфиксія (если *Скроф.* не подѣйствовало); безсонница у сангвиника; наклонность къ пьянству и его послѣдствія; параличъ и односторонній параличъ вслѣдствіе апоплексіи; потеря голоса (попер. съ *Скроф.*); специфическое лѣкарство противъ болѣзней спинного мозга; фиброиды.

Анж. 1 употребляется наружно въ примочкахъ, мазяхъ и проч. противъ болѣзней, перечисленныхъ въ этой рубрикѣ. (См. гл. IV).

Кругъ дѣйствія Angioitico 2 или nuovo.

Анжіоитико 2 или нуово = **A. 2.**

Соотвѣтствуетъ лучше смѣшанному темпераменту и назначается преимущественно для лѣченія всѣхъ болѣзней сердца, кровеносной и сосудистой системы, пассивныхъ приливовъ [1]), рака, кровотеченій всякаго рода и изъ всякаго органа, и, обладая противовенерическимъ свойствомъ, употребляется при лѣченіи всѣхъ видовъ сифилиса.

[1]) Эти приливы обусловливаются извѣстными препятствіями свободному теченію крови. Они называются также *застоями крови,* и при этомъ происходитъ расширеніе болѣе тонкихъ сосудовъ; они могутъ быть скоротечные и хроническіе.

Digitized by Google

Голова. Апоплексія; приливы крови, головная водянка.

Носъ. Вонючее нагноеніе носа; полипъ въ носу.

Уши. Ушная течь; шумъ въ ушахъ; кровотеченіе изъ ушей; глухота; полипъ въ слуховомъ проходѣ.

Ротъ и десны. Скорбутъ (попер. съ *Скроф.* 1); воспаленіе полости рта; афты; болѣзни десенъ.

Гортань и дыхательные органы. Катарръ гортани; бронхитъ; воспаленіе легкихъ; кровохарканіе; колотье въ груди; воспаленіе легочныхъ венъ; полипы гортани.

Пищеварительные органы. Хроническое воспаленіе желудка; воспаленіе пищепроводника; воспаленіе кишекъ.

Половые органы. Воспаленіе матки; предвѣстники выкидыша; спазмодическія боли во время беременности (попер. съ *Канч.* 1 или *Канч.* 5); разстройство регулъ; критическій возрастъ; метроррагія преимущественно въ критическомъ возрастѣ; чирья на грудяхъ. Воспалительная опухоль яичекъ.

Мочевые органы. Боль и воспаленіе почекъ; брайтова болѣзнь; сахарное мочеизнуреніе; катарръ мочевого пузыря.

Сочлененія и члены. Ревматизмъ сочлененій, хроническая подагра; бедреная боль; опухоль и расширеніе венъ на конечностяхъ; воспаленіе артерій; бѣлая опухоль колѣна, мягкая опухоль на ногѣ.

Кожа. Горячій нарывъ; карбункулъ и сибирская язва (попер. съ *Канч.* 5); раны съ антоновымъ огнемъ; дикое мясо; веснушки.

Спазмодическія страданія. Истерика, происходящая отъ болѣзни матки или отъ разстройства кровообращенія въ этомъ органѣ; эпилепсія.

Разныя болѣзни. Англійская болѣзнь; атрофія мышцъ; воспаленіе спинного мозга; геморрой и дурныя послѣдствія вслѣдствіе остановки геморройныхъ истеченій; грыжи; желтуха (попер. съ *Фебр.* 1 и 2); застой крови; меланхолія при органической болѣзни сердца; размягченіе костей; общій потъ ночью; ослабленіе разныхъ органовъ у сангвиниковъ; невральгіи.

Для наружнаго употребленія имѣетъ преимущество передъ *Анж.* 1 и *Анж.* 3. Мазь изъ *Анж.* 2 и *Канч.* 5, вмѣстѣ

Digitized by Google

смѣшанныя въ равныхъ частяхъ по 10 круп. на унцію вазелина быстро унимаетъ боль въ кишечномъ каналѣ. (См. гл. IV).

Кругъ дѣйствія Angioitico 3.

Анжіоитико 3 = **А. 3.**

Голова. Активные приливы; апоплексія; острый періодъ мономаніи и вообще всѣ душевныя болѣзни; солнечный ударъ; апоплексія съ изліяніемъ крови; параличъ одностороннiй или двухсторонній.

Гортань и дыхательные органы. Воспаленіе миндалевидныхъ железъ; хроническій катарръ гортани; крупъ; коклюшъ; острый бронхитъ (попер. съ *Петтор.*); острое и хроническое воспаленіе легкихъ (поперем. съ *Петтор.* 2); одышка. При межреберной невральгіи (попер. съ *Скроф.*).

Пищеварительные органы. Воспаленіе желудка или кишекъ; запоръ у сангвиниковъ; язвы и ракъ желудка (попер. съ *Канч.*).

Половые и мочевые органы. Разстройство регулъ; полипъ на маткѣ; ракъ матки (попер. съ *Канч.*). Катарръ матки, сопровождаемый бѣлями. Воспаленіе яичниковъ (попер. съ *Канч.* 2); мочетеченіе по каплямъ и прочія болѣзни мочевого пузыря. Рвота и запоръ у беременныхъ.

Кожа. Лучше прочихъ Анжіоитико *А.* 2 соотвѣтствуетъ сыпямъ мокрымъ и сухимъ, экземѣ и слоновой болѣзни. Дѣйствіе его на кожу болѣе глубокое, чѣмъ *А.* 1.

Разныя болѣзни. Притупленіе слуха и глухота вслѣдствіе носоглоточнаго катарра; застой крови; безсонница; болѣзни сердца; корчи сердца (попер. съ *Канч.* 5); ракъ; кровотеченія; воспаленіе венъ внутреннихъ и происходящее отъ ранъ; брюшная водянка; истерика; эпилепсія; невральгія и возбужденіе нервной системы (въ слабыхъ дозахъ); послѣродовая лихорадка. Кромѣ того назначается въ тѣхъ случаяхъ, когда отъ *Анж.* 1 и *Анж.* 2 не достигается ожидаемое дѣйствіе.

Digitized by Google

Дифференціальныя (отличительныя) свойства серіи Angioitico (*Анжіоитико*) въ различныхъ дозахъ [1].

Первый стаканъ [2]) усиливаетъ кровообращеніе и біеніе сердца; выпитый въ два пріема дѣйствуетъ противъ запора; усиливаетъ слабыя регулы и вызываетъ остановившіяся, предупреждаетъ разстройства въ критическомъ возрастѣ у женщинъ; въ этой дозѣ назначается противъ малокровія, а также расширенія и воспаленія венъ. Первый стаканъ полезенъ всякій разъ, когда кровообращеніе должно быть усилено или измѣнено.

Средняя доза (1 круп. на четыре стакана воды) не усиливаетъ и не замедляетъ кровообращенія, но его возстанавливаетъ. Эту дозу слѣдуетъ предпочитать всякій разъ, когда кровообращеніе очень ускорено и когда регулы являются очень часто или въ очень обильномъ количествѣ.

Второй стаканъ производитъ дѣйствіе обратное первому стакану, т. е. онъ замедляетъ кровообращеніе, и его нужно предпочитать (вмѣстѣ съ третьимъ стаканомъ) противъ всякаго рода приливовъ, кровотеченій и воспаленій. Его даютъ для приведенія въ порядокъ регулъ, являющихся очень часто и въ очень обильномъ количествѣ, но только женщинамъ мало воспріимчивымъ къ *Анжіоитико*. Достаточно, чтобы испытать эту воспріимчивость, начать съ средней дозы. Если средняя доза не дѣйствуетъ или дѣйствуетъ очень мало, чтобы установить правильные регулы, можно смѣло перейти къ второму стакану.

Третій стаканъ вообще употребляется при лѣченіи грудныхъ и малолѣтнихъ дѣтей, а для взрослыхъ противъ болѣзней сердца, всякаго рода приливовъ, кровотеченій, воспаленій, расширенія венъ и нервныхъ болѣзней, происходящихъ отъ неправильнаго кровообращенія. Эти болѣзни требуютъ очень слабыхъ дозъ, и второй стаканъ въ этихъ болѣзняхъ соотвѣтствуетъ только очень незначительному числу больныхъ, но

[1]) Указанія, которыя слѣдуютъ, относятся болѣе до *Анж.* 1.
[2]) См. гл. IV о дозахъ.

Digitized by Google

даже и третій стаканъ представляется часто очень сильнымъ и производитъ ухудшеніе. Въ этомъ случаѣ ограничиваются 4-мя или 6-ю чайными ложками въ день. Если и эта доза оказывается очень сильною, что наблюдается въ особенности въ умѣренномъ или холодномъ климатѣ, тогда переходятъ къ 4 или 5 стакану. При органическихъ порокахъ сердца даже наружное примѣненіе *Анж.* (считая Эл. Анж.) должно производиться съ осторожностью, будетъ ли то мазь, компрессъ и т. д., и именно вдвое слабѣе, чѣмъ прочія электрогомеопатическія средства. Самымъ главнымъ лѣкарствомъ противъ болѣзней сердца является *А.* 2.—*А.* 3 употребляется въ тѣхъ же дозахъ, какъ и *Анж.* 1, но дѣйствіе его слабѣе. Изъ этого слѣдуетъ, что *Анж.* 3 изъ 1-го стакана можно примѣнить въ тѣхъ случаяхъ, когда *Анж.* 1 дается во второмъ стаканѣ.

Сухія крупинки. Нѣкоторые паціенты переносятъ сухія крупинки вообще лучше, чѣмъ растворы, особенно это бываетъ у поправляющихся отъ острыхъ болѣзней (реконвалесцентовъ). Если поэтому средство, несомнѣнно показанное, не даетъ хорошаго результата ни въ какомъ растворѣ (и въ никакомъ нумерѣ), то надо давать каждый часъ или полчаса по 1 крупинкѣ въ сухомъ видѣ. У лицъ сангвиническаго темперамента, не страдающихъ сердцемъ, разстроенное пищевареніе улучшается, если давать нѣкоторое время утромъ натощакъ отъ 1 до 3 крупинокъ *Анж.* 1. въ рюмкѣ воды, выпиваемой въ 2—3 пріема, или отъ 5 до 10 крупинокъ въ сухомъ видѣ. *Анжіоитико* дѣйствуетъ тутъ такъ-же, какъ *Скроф.* у лимфатическихъ субъектовъ. При сильномъ малокровіи и слабой сердечной дѣятельности часто прекрасныя услуги оказываютъ даже очень сильныя дозы, какъ напр., 15 крупинокъ въ полустаканѣ воды, по чайной ложечкѣ черезъ каждыя 10—15 минутъ. *Анж.* 1 по двѣ крупинки утромъ и вечеромъ вылѣчиваетъ истерическіе припадки, которые не поддавались *Канч.* 1, 2 и 5 и *Анж.* 1 въ растворахъ. Одна крупинка *Анж.* 2, принятая внутрь, останавливаетъ сильное кровотеченіе, напр. маточное, бывающее при ракѣ въ маткѣ. Одна крупинка *Анж.* 3, принятая на ночь, уничтожаетъ безсонницу и способствуетъ

Digitized by Google

хорошему сну. Не слѣдуетъ давать болѣе одной сухой крупинки больнымъ, подверженнымъ кровотеченіямъ, чтобы не вызвать кровотеченій. Но въ тѣхъ случаяхъ, когда кажется, что жизнь угасаетъ, сердце перестаетъ биться, тогда *массивныя дозы* сухихъ крупинокъ драгоцѣнны.

Характеристика серіи Canceroso (*Канчерозо*) = C.

Серія этихъ лѣкарствъ состоитъ изъ восьми одноименныхъ средствъ, изъ которыхъ каждое имѣетъ другой составъ и лучше соотвѣтствуетъ нѣкоторымъ болѣзнямъ и организмамъ, а именно: *Канч.* 1, *Канч.* 2 или *нуово*, *Канч.* 3 или *доппіо*, *Канч.* 4, *Канч.* 5, *Канч.* 6, *Канч.* 10, *Канч. Т. В.* и двухъ иноименныхъ—*Лордъ* и *Домъ-финъ*, сродныхъ съ Канчерозами.

Канчерозы являются наиболѣе могущественными средствами и, въ перемежку съ Анжіоитиками, соотвѣтствуютъ смѣшанному тѣлосложенію, особенно когда Скрофолозы съ Анжіоитиками остаются при этомъ тѣлосложеніи безуспѣшными, какъ, напримѣръ, въ самыхъ тяжелыхъ формахъ золотухи, при затвердѣніи железъ, при холодныхъ нарывахъ или развившихся раковыхъ страданіяхъ. Канчерозы могутъ излѣчивать самыя тяжелыя болѣзни и предупреждать ихъ появленіе. Въ тѣхъ же случаяхъ, когда тѣлесныя силы совершенно разстроены и организмъ лишился вполнѣ способности противодѣйствія (реакціи), напримѣръ, въ случаяхъ рака, ставшихъ, вслѣдствіе предшествовавшихъ операцій, неизлѣчимыми,—средства эти въ состояніи еще облегчать страданія и удлинить жизнь. Примѣненныя же въ самомъ началѣ болѣзни, они совершенно излѣчиваютъ всѣ раковыя заболѣванія, если только они примѣняются настойчиво и безпрерывно, пока не исчезли самые послѣдніе слѣды рака.

Канчерозы не составляютъ, однако, специфическаго средства только противъ рака, но употребляются противъ всякой испорченности лимфы и крови, изъ которыхъ ракъ занимаетъ лишь первое мѣсто.

Изъ этой серіи, по своему свойству, самыя важныя—*Канч.* 1 и *Канч.* 5.

Digitized by Google

Всѣ восемь Канчерозъ обладаютъ специфическимъ свойствомъ противъ почти всѣхъ женскихъ болѣзней и разныхъ другихъ болѣзней, которыя мы ниже приводимъ при описаніи круга дѣйствія каждаго изъ нихъ въ отдѣльности.

Если *Канчерозо* является при лѣченіи кореннымъ специфичнымъ средствомъ противъ болѣзни, то ни въ какомъ случаѣ не слѣдуетъ прерывать лѣченія до совершеннаго выздоровленія, и когда лѣченіе будетъ кончено, никогда не слѣдуетъ прекращать разомъ употребленіе Канчерозо подъ опасеніемъ возврата болѣзни. Послѣ такого лѣченія необходимо дополнительное лѣченіе со *Скроф.* или *Анж.* попер. съ *Скроф.*

Кругъ дѣйствія Canceroso 1 (*Канчерозо 1*) = C. 1.

Попеременно съ *Анж.*, *Канч.* 1 является первымъ и главнѣйшимъ цѣлебнымъ средствомъ противъ раковыхъ болѣзней, также противъ разныхъ женскихъ болѣзней, всякаго рода затвердѣній, напримѣръ, железъ, нарывовъ; при наступленіи нагноенія вызываетъ и поддерживаетъ нагноеніе; лѣкарство это не только противораковое, но и противовенерическое въ тѣхъ случаяхъ, когда нѣкоторыя проявленія сифилиса упорствуютъ *Вен.* и *Скроф.* и имѣютъ наклонность перейти въ нагноеніе или принять разъѣдающую форму.

Голова. Мозговые приливы съ головокруженіемъ (вмѣстѣ съ *Анж.*); размягченіе мозга; головная боль отъ разстройства въ маткѣ; апоплексія; бугорчатка, размягченіе и сотрясеніе мозга, воспаленіе сосудистой оболочки мозга. Душевныя болѣзни (въ особенности у женщинъ).

Лицо. Разъѣдающій лишай на лицѣ.

Глаза и вѣки. Воспаленіе вѣкъ; параличъ вѣкъ; золотушное и гнойное воспаленіе глазъ; катарракта; косоглазіе.

Уши. Воспаленіе уха съ опухолью; ушная течь; кровотеченіе изъ ушей (попер. съ *Скроф.*); полипъ въ слуховомъ проходѣ; заушница.

Ротъ, зубы, десны, нёбо, языкъ. Афты у новорожденнаго, если *Скроф.*, данное кормилицѣ, не помогло; воспаленіе вну-

Digitized by Google

тренности рта, языка, десенъ; цынга, болѣзни десенъ; полипъ на нёбѣ, твердая опухоль губъ; затвердѣніе языка.

Гортань. Жабы: горловая, ложноперепончатая, гангренозная и хроническая; нагноеніе миндалевидныхъ железъ; дифтеритъ; коклюшъ; грануляціи и катарральныя язвы гортани.

Дыхательные органы. Начало легочной чахотки; легочные туберкулы; антоновъ огонь легкихъ; катарръ бронхъ; хроническій кашель.

Женскія болѣзни и груди. Болѣзни беременныхъ женщинъ; предвѣстники выкидыша; боли въ нижней части живота передъ родами и послѣ родовъ; трудные роды; родильная горячка (попер. съ *Фебр.* 1 и 2). Грудница; млекотеченіе; трещины грудныхъ сосковъ; затвердѣніе грудей. Способствуетъ образованію молока въ грудяхъ.

Животъ и пищеварительные органы. Воспаленіе брюшины (попер. съ *Фебр.* 1 и 2); брюшная водянка; острое и хроническое воспаленіе желудка и кишекъ; воспаленіе и колика кишекъ; диспепсія; хроническій поносъ; упорные запоры; фистулы въ заднемъ проходѣ; подвздошная колика; бугорчатка кишекъ и брыжжеечныхъ железъ; геморрой; рвота каломъ; воспаленіе и выпаденіе прямой кишки; полипы въ кишкахъ; частыя испражненія во время холеры; боль подъ ложечкой.

Половые органы. Воспаленіе большихъ губъ; бѣли; аменоррея; дисменоррея; опухоль, кисты и затвердѣніе яичниковъ; воспаленіе матки, спазмы, грянуляціи и прочія ея болѣзни; острое и хроническое воспаленіе влагалища; фистулы влагалища. Водянка мошонки; воспаленіе яичекъ (внутрь и въ примочкахъ).

Мочевые органы. Боль, воспаленіе и бугорчатка почекъ; почечные камни; сахарное мочеизнуреніе; катарръ мочевого пузыря; полипъ въ мочевомъ пузырѣ; параличъ мочеваго пузыря. Недержаніе мочи.

Сочлененія и члены. Подагрическія опухоли, хроническая подагра; бедреная боль; вывихъ бедра; бѣлая опухоль колѣна; мягкая опухоль на ногѣ.

Кости. Рахитизмъ, размягченіе, опухоль и вывихъ костей; остоѣда.

Digitized by Google

Кожа. Лишаи (внутрь и въ примочкахъ); парша; чесотка; оспенная сыпь; разъѣдающій лишай; хроническія болѣзни кожи; нарывы; карбункулъ; сибирская язва; дикое мясо; фистулы; антоновъ огонь.

Печень и селезенка. Затвердѣніе печени; воспаленіе селезенки (обѣ попер. съ *Фебр.* 1 и 2).

Ракъ. Раковыя новообразованія во всѣхъ органахъ и тканяхъ (попер. съ *Анж.*).

Спазмодическія страданія. Спазмы, ослабленіе и другія разстройства у людей истеричныхъ; истерика; каталепсія и эпилепсія у женщинъ.

Разныя болѣзни. Водянка; воспаленіе, сухотка и прочія болѣзни спинного мозга; сухоточная лихорадка; дѣтская сухотка; тифъ; манія и лунатизмъ у женщинъ; золотуха; внутреннія кисты; полипы; сифилисъ во всѣхъ своихъ видахъ (попер. съ *Вен.*); тучность (попер. съ *Вен.*); ужаленіе насѣкомыми и змѣею; бубоны при чумѣ; фиброиды.

Мазь изъ *Канч.* 1, приложенная на подложечную область попер. съ *Эл. Кр.*, значительно облегчаетъ диспепсію и вообще разстройство желудка.

Кругъ дѣйствія Canceroso 2 или nuovo.

Канчерозо 2 или нуово = **C. 2.**

Соотвѣтствуетъ лучше смѣшанному темпераменту; дѣйствуетъ медленнѣе, но болѣе проницательно, чѣмъ *Канч.* 1. Спеціально побѣждаетъ водянку и съ успѣхомъ употребляется противъ слѣдующихъ болѣзней:

Водянка. Брюшная водянка съ общею водянкою, происходящая отъ органической болѣзни живота; острая головная водянка; водянка околосердечной сумки (попер. съ *Анж.* 2); отекъ.

Глаза. Воспаленіе глазъ.

Носъ. Насморкъ; воспаленіе клѣтчатки въ носу у золотушныхъ дѣтей.

Гортань. Катарральная жаба; скарлатина.

Женскія болѣзни и груди. Предвѣстники и послѣдствія выкидыша; грудница.

Digitized by Google

Животъ и пищеварительные органы. Воспаленіе брюшины; хроническое воспаленіе кишекъ; воспаленіе и образованіе бугорковъ въ брыжжечныхъ железахъ.

Половые органы. Выпаденіе матки и влагалища; бѣли; болѣзнь матки съ значительной ипохондріей.

Мочевые органы. Боль почекъ вслѣдствіе паденія; воспаленіе почекъ; катарръ мочевого пузыря; трипперъ.

Сочлененія и члены. Подагра; ревматизмъ; хроническая подагра.

Кожа. Застарѣлые нарывы; волчанка на головѣ; фистулы.

Печень. Хроническое воспаленіе печени (послѣ употребленія *Февр.* 1 и 2).

Ракъ. Раковыя новообразованія во всѣхъ органахъ и тканяхъ (попер. съ *Анж.*); скиррозное затвердѣніе губъ (попер. съ *Анж.*).

Спазмодическія страданія. Истерика; пляска св. Витта; эпилепсія.

Разныя болѣзни. Аневризмъ сердца и аорты; бубоны при чумѣ; воспаленіе железъ и лимфатическихъ сосудовъ; дѣтская сухотка.

Кругъ дѣйствія Canceroso 3 или doppio.

Канчерозо 3 или доппіо = **С. 3.**

Оно очень дѣйствительно въ особенно упорныхъ и тяжелыхъ болѣзняхъ, когда многія другія лѣкарства оставались безуспѣшными или когда наступили тяжелые возвраты, напримѣръ при тяжелыхъ страданіяхъ на золотушной почвѣ, при упорныхъ формахъ ревматизма и подагры, при злокачественныхъ ранахъ и язвахъ, грозящихъ перейти въ гангрену; при упорныхъ заболѣваніяхъ глазъ съ язвами или пятнами на роговицѣ; при затяжныхъ накожныхъ болѣзняхъ. Назначается также противъ такихъ болѣзней, какъ: брюшная водянка (послѣ *Канч.* 2); водянка сустава; бѣлая опухоль колѣна; воспалительная опухоль колѣна; параличъ сочлененій рукъ и ногъ вслѣдствіе ревматизма или вывиха; ракъ губъ;

Digitized by Google

ракъ грудей; раковая язва (попер. съ *Анж.*); бугорчатка кишекъ; парша; хроническій катарръ легкихъ; хроническое воспаленіе легкихъ съ нагноеніемъ; поносъ. При вонючихъ бѣляхъ нераковаго происхожденія *Канч. 3* конкуррируетъ съ *Канч.* 4 и 5.

Кругъ дѣйствія Canceroso 4 (*Канчерозо 4*) = C. 4.

Назначается для лѣченія рака и специфически противъ болѣзней костей, хрящей и связокъ. Показано поэтому противъ такихъ болѣзней, какъ: воспаленіе и опухоль надкостной плевы; острое и хроническое воспаленіе костей; воспаленіе костнаго мозга; воспаленіе суставовъ; костоѣда; омертвѣніе костей; хроническая подагра; вывихъ; ногтоѣда; ломота и невралгія въ костяхъ, если она не происходитъ отъ сифилиса; размягченіе, искривленіе и нагноеніе костей. Тоже оказалось полезнымъ противъ: бедреной невралгіи, самороднаго вывиха бедра, болѣзни спинныхъ позвонковъ, воспаленія спинного мозга, вонючаго нагноенія носа, золотухи, нарывовъ, слезной фистулы, затвердѣнія языка, нимфоманіи, болѣзней влагалища, мужского безсилія, кистъ въ желудкѣ (попер. съ *Анж.* 1), бубоновъ при чумѣ и колющихъ болей при ракѣ (которыя не проходятъ отъ *Канч.* 1). Внутреннее примѣненіе существенно поддерживается наружнымъ употребленіемъ *Канч.* 5 на пораженныхъ частяхъ. При нервной лицевой боли очень дѣйствительны компрессы изъ *Канч.* 4 рядомъ съ внутреннимъ примѣненіемъ *Фебриф.* 1.—*Канч.* 4 дѣйствуетъ особенно благотворно на такихъ больныхъ, которые долго страдали перемежающеюся лихорадкой.

Кругъ дѣйствія Canceroso 5 (*Канчерозо 5*) = C. 5.

Это лѣкарство есть главное во всѣхъ женскихъ болѣзняхъ послѣ *Канч.* 1 и является вообще самымъ дѣйствительнымъ изъ всѣхъ Канчерозовъ. Также и наружное его примѣненіе въ видѣ ваннъ, компрессовъ, полосканій, промываній, мазей и проч. такъ широко и всеобъемлюще, что едва ли возможно

Digitized by Google

привести въ отдѣльности каждое его специфическое дѣйствіе. Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ Канчерозо показано, слѣдуетъ всегда начинать съ другихъ номеровъ и лишь тогда, когда нѣтъ успѣшнаго результата, перейти къ *Канч.* 5, такъ какъ, если послѣднее принималось уже внутрь, то предыдущіе номера Канчерозо, принятые позднѣе, послѣ *Канч.* 5, лишь въ рѣдкихъ случаяхъ будутъ еще дѣйствительны.

Голова. Мигрень; водянка мозга, которой предшествовали туберкулы въ мозговыхъ оболочкахъ; бугорчатка, размягченіе и сотрясеніе мозга.

Глаза. Слабость зрѣнія, зависящая отъ начинающейся темной воды; бѣльма; катарракта; слезная фистула; стафилома.

Носъ. Вонючее нагноеніе носа; полипъ въ носу.

Уши. Течь; полипъ въ слуховомъ проходѣ; притупленіе слуха; глухота; кровотеченіе изъ ушей; притупленіе слуха и глухота вслѣдствіе носоглоточнаго катарра.

Ротъ, небо, губы, десны и языкъ. Афты; молочница; воспаленіе внутренности рта; цынга; полипъ на нёбѣ; твердая опухоль губъ; болѣзни десенъ; воспаленіе и затвердѣніе языка.

Гортань. Хроническое предрасположеніе къ жабѣ; дифтеритъ; хроническій катарръ гортани съ язвами и безъ нихъ; горловая чахотка.

Дыхательные органы. Бугорчатка легкихъ съ воспаленіемъ и отдѣленіемъ зеленой мокроты; спазмодическая одышка.

Женскія болѣзни, въ особенности у женщинъ съ нѣжною и чувствительною кожею; предрасположеніе къ выкидышу; слабыя родовыя потуги; отсутствіе или избытокъ боли при родахъ; внезапное прекращеніе или очень продолжительное родовое очищеніе; родильная горячка (попер. съ *Фебр.* 1 и 2).

Женскія груди. Грудница; млекотеченіе; трещины грудныхъ сосковъ; затвердѣніе грудей.

Железы. Воспаленіе, затвердѣніе и нагноеніе железъ вообще; воспаленіе лимфатическихъ железъ.

Животъ и пищеварительные органы. Брюшная водянка (попер. съ *Канч.* 2); диспепсія; кислая отрыжка; желудочная боль и прочія болѣзни желудка; поносъ; кисты желудка (попер.

Digitized by Google

съ *Анж.* 1); хроническое воспаленіе кишекъ; съуженіе и ущемленіе кишекъ; бугорчатка кишекъ и брыжжеечныхъ железъ; полипы въ кишкахъ.

Половые органы. Воспаленіе матки; спазмы матки; антоновъ огонь матки; нимфоманія; болѣзни яичниковъ; дисменоррея; бѣли; блѣдная немочь. Мужское безсиліе; ночныя поллюціи, сперматоррея.

Мочевые органы. Острая и хроническая гоноррея (попер. съ *Венер.*); боль, воспаленіе и бугорчатка почекъ; почечные камни; Брайтова болѣзнь; сахарное мочеизнуреніе; катарръ мочевого пузыря; полипъ и параличъ мочевого пузыря; недержаніе мочи; съуженіе мочевого канала.

Сочлененія и члены. Ревматизмъ; хроническая подагра; бедреная невралгія; самородный вывихъ бедра; бѣлая опухоль колѣна; ногтоѣда; отекъ.

Кости. Рахитизмъ; костоѣда; омертвѣніе, переломы и вывихи костей.

Кожа. Хроническія болѣзни кожи, сыпи, лишаи, парша; нарывы; язвы всякаго рода; дикое мясо; карбункулъ; сибирская язва; антоновъ огонь; фистулы.

Ракъ. Раковыя новообразованія во всѣхъ органахъ и тканяхъ (попер. съ *Анж.* 1).

Спазмодическія страданія. Истерика; конвульсіи; пляска св. Витта; эпилепсія.

Разныя болѣзни. Атрофія мышцъ, болѣзни капиллярныхъ сосудовъ; болѣзни нервной системы; бубоны при чумѣ; воспаленіе селезенки (попер. съ *Фебр.* 1 и 2); воспаленіе спинного мозга; выпаденіе волосъ; золотуха; лунатизмъ у женщинъ; манія и душевныя болѣзни; наклонность къ пьянству и его послѣдствія; нервное возбужденіе съ безсонницей; отекъ; параличъ; простуда; сифилисъ во всѣхъ его видахъ (попер. съ *Венер.*); тифъ; тучность и проч.

О частотѣ наружнаго употребленія *Канч.* 5 было уже сказано. Оно съ успѣхомъ замѣняетъ *Фебр.* 2, когда послѣднее, приложенное на подвздошья (подреберья), не производитъ никакого дѣйствія. Мазь изъ *Канч.* 5 и *Анж.* 2, вмѣстѣ смѣ-

Digitized by Google

шанныя въ равныхъ частяхъ по 10 круп. на унцію вазелина, быстро унимаетъ боль въ кишечномъ каналѣ.

Кругъ дѣйствія Canceroso 6 (*Канчерозо 6*) = C. 6.

Назначается противъ хроническихъ болѣзней, особенно— почекъ, мочевого пузыря, кишечнаго канала и кожи. Болѣзни, въ которыхъ это средство примѣняется, суть поэтому слѣдующія: задержаніе мочи, воспаленіе почекъ, почечная колика, и другія болѣзни мочевыхъ органовъ; холероподобные поносы, тифозные поносы, упорные запоры; желудочныя и желчныя страданія; упорныя накожныя болѣзни, язвы, ногтоѣда, гнойная течь изъ уха и различныя раковыя заболѣванія, въ которыхъ послѣ *Канч.* 5 процессъ заживленія останавливается. Очень дѣйствительно при маточныхъ кровотеченіяхъ у слабыхъ и чахоточныхъ женщинъ.

Кругъ дѣйствія Canceroso 10 (*Канчерозо 10*) = C. 10.

Это лѣкарство соединяетъ въ себѣ дѣйствіе всѣхъ Канчерозовъ и назначается противъ слѣдующихъ болѣзней: водянки яичка, желтухи, колики отъ вѣтровъ, упорнаго запора, колики при ущемленіи кишекъ; имъ же излѣчивается часто: мокротный кашель, насморкъ, ракъ желудка, ракъ матки, ракъ и скирръ, развившіеся на старой ранѣ вслѣдствіе многихъ нарывовъ, рвота беременныхъ женщинъ, рожа воспалительная и пузырчатая, сифилитическіе лишаи и язвы, спинная сухота, упорные шанкры и эмфизема (послѣ *Канч.* 2) и проч.

Употребленное въ полосканіи (20 круп. на полъ-стакана воды) быстро унимаетъ у беременныхъ женщинъ зубную боль, и она вновь не возвращается.

Кругъ дѣйствія Canceroso T. B.

Канчерозо Т. Б. = C. T. B.

Лѣкарство специфическое противъ задержанія мочи и противъ каменной болѣзни, особенно—желчныхъ камней (съ *Фебр.*) и противъ упорнаго запора (какъ *С.* 10). При очень медлен-

Digitized by Google

номъ заживленіи раковыхъ язвъ очень полезно, какъ промежуточное средство.

Къ Канчерозамъ относятся также *Лордъ* и *Домъ-финъ*.

Кругъ дѣйствія Lord (*Лордъ*).

Специфическое средство для лѣченія пупочной грыжи, на которую дѣйствуетъ лучше, чѣмъ лѣкарства, прежде употреблявшіяся. Назначается внутрь въ растворѣ, и наружно въ примочкахъ, мази и ваннахъ, также съ пользой при раковыхъ затвердѣніяхъ, между прочимъ и при ракѣ желудка. Какъ и всякое канчерозное средство, должно и это замѣнять другіе Канчерозы, если процессъ излѣченія останавливается.

Кругъ дѣйствія Dom-Fin (*Домъ-финъ*).

Специфическое средство для лѣченія дифтерита и крупа. Кромѣ того оно оказалось цѣлебнымъ въ тяжеломъ брюшномъ тифѣ и крупозномъ воспаленіи легкихъ, также во всѣхъ воспаленіяхъ горла не дифтеритическаго характера, также при всякаго рода язвахъ гортани, доброкачественныхъ или злокачественныхъ, и при всякомъ раздраженіи гортани.

Во множествѣ случаевъ было испытано и найдено, что одна крупинка на литръ воды, принимаемая по глотку въ частыхъ пріемахъ, при лѣченіи дифтерита, горла, ранъ, глазъ и проч., даетъ наилучшіе результаты; независимо отъ сего оно назначается въ полосканіи, примочкахъ и въ пульверизаціи въ дозѣ отъ 10 до 20 круп. на стаканъ воды.

Дифференціальныя свойства серіи Canceroso (*Канчерозо*) въ различныхъ дозахъ [1]).

Первый стаканъ [2]) способствуетъ уничтоженію болѣзненныхъ явленій, происходящихъ отъ задержанія выхода ихъ естествен-

---

[1]) Указанія, которыя слѣдуютъ, относятся болѣе до *Canc* 1.
[2]) См. Гл. IV.

Digitized by Google

нымъ путемъ—черезъ каналъ, проходъ или изъ раны. Такъ, напримѣръ, при нѣкоторыхъ болѣзняхъ матки, которыя сопровождаются метроррагіей, первый стаканъ *Канч.* 1, а также и сухія крупинки, вызываютъ кровотеченіе. Это бываетъ въ томъ случаѣ, когда отдѣляются какія нибудь волокна.

Первый стаканъ всегда даютъ, когда образуется нарывъ, чтобы ускорить его назрѣваніе и вскрытіе или чтобы способствовать отдѣленію гноя изъ раны и поддержать нагноеніе.

При лѣченіи рака первый стаканъ скорѣе насыщаетъ организмъ [1]), но въ этомъ случаѣ онъ лучше соотвѣтствуетъ мужчинѣ, чѣмъ женщинѣ, которая обыкновенно не переноситъ дозы ниже второго или даже третьяго стакана. Случалось, что при лѣченіи рака въ маткѣ второй стаканъ вызывалъ кровотеченіе.

Второй стаканъ употребляютъ при острыхъ воспаленіяхъ, водянкѣ, ракѣ, бугорчаткѣ и назначается женщинѣ при всякомъ лѣченіи; эта доза лучшая въ большинствѣ случаевъ.

Третій стаканъ назначаютъ противъ хронич. болѣзней, бѣлей, ипохондріи, истерики, эпилепсіи и всѣхъ нервныхъ болѣзней женщины, а также противъ упорныхъ запоровъ *Канч.* 1 дѣйствуетъ весьма успѣшно. Назначается груднымъ и малолѣтнимъ дѣтямъ.

Массивныя дозы сухихъ крупинокъ употребляются въ особенности при лѣченіи рака одновременно съ растворами; этими дозами иногда замѣняются растворы, когда эффектъ лѣкарства пріостановился, и желаютъ возстановить его дѣйствіе, прежде чѣмъ перейти къ другому одноименному.

По 10 сухихъ крупинокъ *Канч.* 1 и *Фебр.* 1, принятыхъ вмѣстѣ, прекращаютъ у взрослыхъ поносъ и диспепсію, сопровождаемые образованіемъ газовъ.

Сухія крупинки *Канч.* 1, по одной черезъ часъ или полчаса, вызываютъ въ 24 часа остановившееся нагноеніе; точно также

---

[1]) То же можно сказать и о массивныхъ дозахъ; эти два способа насыщенія организма могутъ быть примѣнены одновременно двумя различными Канчерозами.

Digitized by Google

сухія крупинки употребляются противъ полиповъ или опухолей, которыя вслѣдствіе предшествовавшаго лѣченія должны были отдѣлиться; отъ нѣсколькихъ сухихъ крупинокъ *Канч.* 1 прекращаются маточные спазмы. Отъ пріема четыре раза въ день по 5 сухихъ круп. *Канч.* 10 прекращается тошнота и рвота у беременныхъ женщинъ.

Характеристика и кругъ дѣйствія Linfatico.

Линфатико = **L.**

Это лѣкарство дѣйствуетъ одновременно на кровь и лимфу. Специфически оно дѣйствуетъ главнымъ образомъ на тѣ формы подагры и ревматизма, которыя сопровождаются выдѣленіемъ кирпично-краснаго осадка въ мочѣ, именно на такъ называемый мочекислый діатезъ, часто съ одновременнымъ пораженіемъ почекъ и мочевого пузыря. Болѣзненныя состоянія, соотвѣтствующія *Линфатико*, суть слѣдующія:

Голова. Головная боль тянущая, иногда въ половинѣ головы; головокруженіе съ тошнотою и чувствомъ слабости подъ ложечкой; ослабленіе памяти; припадки маніи и умопомѣшательства.

Глаза. Параличъ зрительнаго нерва и сѣтчатой оболочки.

Ротъ, зубы. Цынга; зубная боль; зубная фистула.

Гортань. Незначительная боль гортани; начинающаяся жаба; скоротечная охриплость.

Железа. Опухоль и затвердѣніе железъ вообще; гипертрофія миндалевидныхъ железъ съ притупленіемъ слуха; воспаленіе лимфатическихъ железъ; зобъ; истеченіе сока предстательной железы при испражненіяхъ.

Печень и пищеварительные органы. Болѣзни печени и желудка (вмѣстѣ съ *Фебр.* 1 и 2); геморрой открытый и закрытый; кисты желудка (попер. съ *Анж.* 1).

Половые органы. Колики передъ регулами и послѣ регулъ; запоздалыя регулы; бѣли; катарръ губъ. Воспаленіе яичекъ.

Лихорадки. Гастрическая, ревматическая и перемежающаяся (вмѣстѣ съ *Фебр.* 1 и 2).

Digitized by Google

Сочлененія и члены. Ревматизмъ; хроническая подагра; расширеніе венъ.

Кожа. Ощущеніе ползанія мурашекъ по тѣлу съ зудомъ и отдѣленіемъ чешуекъ, нарывы; карбункулъ; сибирская язва; кондиломы; сифилитическія язвы и раны съ нагноеніемъ; бородавки; лишаи, сыпь и прыщи на тѣлѣ; опухоли, даже раковыя; обладаетъ сушительнымъ свойствомъ на кожу и потому съ успѣхомъ лѣчитъ мокрый лишай.

Разныя болѣзни. Боль почекъ; лимфатизмъ у малолѣтнихъ дѣтей; ослабленіе мускуловъ; обильное потѣніе ногъ; всѣ болѣзни слизистыхъ оболочекъ; полипы; ослабленіе организма у людей нервныхъ и смѣшаннаго темперамента.

Въ очень многихъ болѣзняхъ *Линфатико* примѣняется наружно въ примочкахъ, мазяхъ, втираніяхъ и ваннахъ общихъ и мѣстныхъ, и эти ванны во всѣхъ болѣзняхъ, въ которыхъ они назначаются, представляютъ важное вспомогательное средство при внутреннихъ лѣкарствахъ.

Дифференціальное свойство Linfatico (*Линфатико*) въ различныхъ дозахъ.

Когда *Линфатико* назначается противъ болѣзни, входящей въ кругъ дѣйствія одного изъ Анжіоитико, то его употребляютъ въ той дозѣ, которая соотвѣтствуетъ свойству дозы Анжіоитико.

Если же болѣзнь входитъ въ кругъ дѣйствія *Скроф.* или *Канчер.*, или *Фебр.*, то *Линфатико* назначается въ тѣхъ дозахъ, которыя соотвѣтствуютъ свойствамъ дозъ одного изъ этихъ трехъ лѣкарствъ.

Массивныя дозы употребляютъ люди нервные и смѣшаннаго темперамента для укрѣпленія своего ослабленнаго организма, въ количествѣ отъ 4 до 10 сухихъ крупинокъ ежедневно передъ пищею (см. еще Гл. IV).

Digitized by Google

Б. СПЕЦІАЛЬНЫЯ ЛѢКАРСТВА.

Характеристика и кругъ дѣйствія ихъ.

Къ спеціальнымъ лѣкарствамъ принадлежатъ: *Febrifugo* (*Фебрифуго*) 1 и 2—для всѣхъ острыхъ и хроническихъ лихорадокъ; для болѣзней печени, селезенки и нервовъ, особенно для невральгій; *Vermifugo* (*Вермифуго*) 1 и 2 — (противоглистное) дѣйствуетъ не только какъ глистогонное, но и какъ уничтожающее бактеріи въ организмѣ; оно благотворно вліяетъ также на пищеварительные органы и на всю нервную систему; *Pettorale* (*Петторале*) 1, 2, 3 и 4, дѣйствуетъ спеціально на дыхательные органы; *Venereo* (*Венерео*) для венерическихъ болѣзней, примѣняется рядомъ еще съ другими лѣкарствами. Къ спеціальнымъ лѣкарствамъ относятся еще: *Марина*, сродственная со Скрофолозами и потому помѣщенная выше, вслѣдъ за послѣдними; *Лордъ* и *Домъ-финъ*, сродственные съ Канчерозами и помѣщенные выше вслѣдъ за послѣдними; *Anti-mal di mare* (*Анти-маль ди маре*)—противъ морской болѣзни.

Совершенно отдѣльно въ электрогомеопатіи стоитъ лѣкарство *Scrofoloso lassativo* (*Скрофолозо лассативо*)—слабительное средство.

Кругъ дѣйствія Febrifugo 1 (*Фебрифуго* 1) = F. 1.

Спеціальное средство противъ:

1) *всякаго рода лихорадокъ*: воспалительныхъ, перемежающихся, сыпныхъ, злокачественныхъ, желчныхъ, катарральныхъ послѣродовыхъ, слизистыхъ, нервныхъ (тифа); холеры и чумы;

2) *перемежающихся припадковъ* (возвращающихся въ опредѣленное время), какъ-то: мигрень, лицевая боль (Tic douloureux), головная боль перемежающаяся, нервные припадки, боли, невральгіи, ломъ въ поясницѣ вслѣдствіе простуды, кривошейность, безсонница, раздраженіе симпатическаго нерва (ганглій), нервной одышки, припадковъ изступленія и ясновидѣнія, нервной истерики, истерики, происходящей отъ болѣзни яичниковъ, болѣз-

Digitized by Google

ненныхъ разстройствъ въ различныхъ отправленіяхъ (функціяхъ) органической жизни, меланхоліи, ипохондріи и вообще разстройства всей нервной системы;

3) *всѣхъ болѣзней печени и селезенки* (иногда одновременно съ воспаленіемъ желудка), острыхъ и хроническихъ съ затвердѣніями, гипертрофіей, и желтухи;

4) *болѣзней кожи и слизистыхъ оболочекъ*, какъ-то: застарѣлыхъ хроническихъ сыпей, пузырьковъ, мокраго лишая, рожи и другихъ накожныхъ болѣзней, и также противъ хроническаго воспаленія и изъязвленія слизистыхъ оболочекъ. Нѣкоторыя накожныя болѣзни настолько упорны, что *Фебр*, непремѣнно должно быть употреблено вмѣстѣ съ *Скроф.* 1 и *Скроф.* 5 для избѣжанія неудачи; хотя Канчерозо и назначается противъ накожныхъ болѣзней, но оно не столь дѣйствительно какъ *Фебр.* 1;

5) *большей части болѣзней*: живота (вздутіе его, брюшная водянка), желудка, кишекъ, гортани, железъ, почекъ, хроническаго поноса (въ послѣднихъ двухъ случаяхъ попер. съ *Канч.*, *Скроф.* или *Анж.*) бѣлей, катарровъ, полиповъ, лунатизма, диспепсіи, геморроя, энтералгіи, гриппа и пр. и пр. Дѣйствіе *Фебр.* 1 на слизистыя оболочки гортани, желудка и кишекъ несомнѣнно. При острой жабѣ или въ періодѣ обострившейся хронической жабы *Фебр.* 1 дѣйствуетъ быстро и съ большимъ успѣхомъ: черезъ 4, а много черезъ 5 часовъ жаба проходила, и *Канч.* примѣнялось только тогда, когда на слизистой оболочкѣ появились ложныя перепонки, и

6) *нѣкоторыхъ болѣзней сердца*, когда оно бьется очень учащенно, когда органическія разстройства сопровождаютъ нервныя, которыя замедляютъ отправленія желудка, производятъ грусть, нервность, безсонницу и кошмаръ—въ этихъ случаяхъ *Фебр.* дается вмѣстѣ съ *Анж.*

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ *Фебр.* 1 оказалось полезнымъ при лѣченіи сахарнаго мочеизнуренія, происходящаго, вѣроятно, отъ избытка образованія сахара въ печени, который не могъ быть уничтоженъ легкими при кровообразованіи.

Фебрифуго 1, соединенное вмѣстѣ съ *Скроф.* 1, представ-

Digitized by Google

ляетъ дѣйствительное средство при лѣченіи холеры, холерины, поноса, кровавой дизентеріи и разныхъ разстройствъ пищеварительныхъ органовъ. Во многихъ болѣзняхъ оно хорошо дѣйствуетъ съ *Канч.* или съ однимъ изъ *Анж.* въ смѣси, или принятое порознь.

Вообще *Фебр.* 1 успокаиваетъ нервы, будучи примѣнено въ мази или компрессѣ на подвздошья и на болящіе нервы.

Кругъ дѣйствія *Фебр.* 1 представляетъ общія свойства съ другими лѣкарствами, а именно: съ *Скроф.* 1 противъ простуды, насморка; съ *Скроф.* 5 противъ болѣзней кожи и слизистыхъ оболочекъ (сыпи, лишаи, рожа, воспаленіе желудка, кишекъ, гортани, и пр.); съ *Скроф.* 6, которое есть мочегонное средство, какъ и *Фебр.* 1; съ *Анж.* противъ лихорадокъ, и способствуетъ послѣднему при болѣзняхъ сердца, и съ *Вермифуго* 1 противъ нервнаго возбужденія, ипохондріи, меланхоліи, безсонницы.

Кругъ дѣйствія Febrifugo 2 или nuovo.

Фебрифуго 2 или *нуово* = **F. 2.**

Это лѣкарство употребляется наружно на подвздошья (подреберья) въ мази или согрѣвающихъ компрессахъ (отъ 10 до 20 круп. на унцію вазелина или на стаканъ воды), которыя благотворно дѣйствуютъ во всѣхъ болѣзняхъ безъ исключенія, и съ тѣмъ вмѣстѣ усиливаютъ дѣйствіе *Фебр.* 1, принимаемаго внутрь. Теплыя общія ванны съ 100 крупинк. *Фебр.* 2 дѣйствуютъ противъ безсонницы и нервнаго возбужденія.

Наружное употребленіе *Фебр.* 1 или *Фебр.* 2 часто бываетъ дѣйствительнѣе, чѣмъ внутреннее ихъ употребленіе, и во многихъ случаяхъ было достаточно, чтобы вылѣчить хроническія болѣзни печени, напримѣръ, ея затвердѣніе.

Въ нѣкоторыхъ упорныхъ случаяхъ *Фебр.* 2 было употреблено внутрь съ большимъ успѣхомъ изъ второго стакана противъ сильныхъ лихорадокъ, а именно: противъ тифа, холеры, и многихъ нервныхъ болѣзней.

Digitized by Google

Дифференціальное свойство Febrifugo 1 (*Фебрифуго* 1) въ различныхъ дозахъ.

Первый стаканъ [1]) чаще необходимъ противъ *простой* перемежающейся лихорадки (до + 38° Ц.); при такой лихорадкѣ принимаютъ во время промежутковъ пароксизма 8 или 10 столовыхъ ложекъ въ день по одной черезъ полчаса; этотъ же растворъ принимаютъ противъ острой горловой жабы, поноса, запора.

Второй стаканъ лучше соотвѣтствуетъ во время пароксизма простой перемежающейся лихорадки (до + 39° Ц.), который принимаютъ по чайной ложкѣ черезъ пять минутъ въ продолженіи всего пароксизма; также въ *злокачественной* перемежающейся лихорадкѣ принимаютъ во время промежутковъ пароксизма по столовой ложкѣ черезъ полчаса, а въ продолженіе всего пароксизма по чайной ложкѣ черезъ пять минутъ. Этотъ же растворъ принимаютъ при воспаленіи и боли желудка, бѣляхъ, полипахъ (вмѣстѣ съ *Канч.*).

Третій стаканъ противъ простой и злокачественной перемежающейся лихорадокъ (свыше + 39° Ц.), также противъ лихорадки у дѣтей, хронической болѣзни печени и селезенки и противъ безсонницы.

Фебр. 1 въ дозѣ изъ 1-го и даже изъ 2-го стакана вызываетъ сильный потъ у лихорадочныхъ больныхъ, и это ихъ ослабляетъ; но въ слабыхъ дозахъ (3-й или 4-й стаканъ) и въ особенности въ сухихъ крупинкахъ — по одной крупинкѣ въ разные промежутки—быстро прекращаетъ потѣніе, и съ тѣмъ вмѣстѣ прерываетъ лихорадку.

Когда лихорадка не уступаетъ *Фебр.* 1, то его замѣняютъ *Фебр.* 2 (2-й, 3-й стаканъ) и примѣняютъ клистиры и ванны *Фебр.* 1 или *Фебр.* 2.

Фебр. 1 данное *въ началѣ* какой либо лихорадки или воспаленія или простуды въ малыхъ и часто повторяемыхъ пріемахъ (изъ 2-го, 3-го стакана) прерываетъ ихъ и часто пре-

---

[1]) См. Гл. IV.

Digitized by Google

дупреждаетъ болѣзни, предвѣстники которой не успѣли опредѣлиться.

Массивныя дозы сухихъ крупинокъ назначаются въ тѣхъ случаяхъ, когда нужно быстро подѣйствовать на болѣзнь. Такъ, напримѣръ, диспепсія съ скопленіемъ вѣтровъ или поносъ съ болью и разстройствомъ желудка быстро прерываются отъ 10 круп. *Фебр.* 1 въ смѣси съ 10 круп. *Скроф.* 1 или *Канч.* 1 въ одинъ пріемъ; противъ азіатской холеры даютъ внутрь 40 круп. *Фебр.* 1 въ одинъ пріемъ, при чумѣ 50 круп. на стаканъ воды. Это дозы для взрослыхъ, дѣтямъ же даютъ меньше.

Характеристика серіи Vermifugo (*Вермифуго*). = Verm.

Серія этихъ лѣкарствъ состоитъ изъ двухъ одноименныхъ средствъ, каждое другого состава, а именно: *Вермифуго* 1 и *Вермифуго* 2 или *нуово*. Эти лѣкарства противоглистныя, противонервныя и противопаразитныя.

Кругъ дѣйствія Vermifugo 1 (*Вермифуго 1*) = Verm 1

Спеціальное средство противъ всякаго рода глистовъ: аскаридъ, круглыхъ, ленточныхъ, тонкоголовыхъ, солитера и противъ всѣхъ недуговъ, происходящихъ отъ ихъ присутствія, какъ-то: поноса, тошноты, рвоты, глистной лихорадки, слюнотеченія, кошмара, безсонницы, головокруженія, конвульсій, паралича, лома въ поясницѣ и проч.

Такъ какъ присутствіе глистовъ составляетъ явленіе, часто встрѣчающееся во многихъ застарѣлыхъ болѣзняхъ, и можетъ маскировать симптомы разныхъ болѣзней, то принято за правило назначать *Верм.* во всѣхъ болѣзняхъ, упорствующихъ своимъ специфическимъ средствамъ, не исключая рака, тѣмъ болѣе что присутствіе глистовъ во многихъ случаяхъ парализуетъ дѣйствіе лѣкарствъ.

Верм. 1, независимо отъ своего глистогоннаго свойства, обладаетъ свойствомъ противонервнымъ и притомъ очень значительнымъ, подходящимъ къ тому, которымъ обладаютъ *Фебр.* и *Канч.* Его можно давать попер. съ *Канч.* противъ всѣхъ

Digitized by Google

нервныхъ болѣзней у женщинъ, безсонницы, ипохондріи, истерики, эпилепсіи, меланхоліи, пляски Св. Витта, столбняка (вмѣстѣ съ *Скроф.* и *Эл. Желт.*), и пр.

Оно также прерываетъ всѣ нервные кризисы, спазмы въ желудкѣ и маткѣ, нѣкоторыя періодическія желудочныя боли, запоры, хроническій поносъ, головную боль и способствуетъ пищеваренію такъ же хорошо, какъ и *Скроф.*

Противорвотное свойство *Верм.* 1 усиливается отъ совмѣстнаго употребленія внутрь *Эл. Желт.*

Верм. 1 примѣняютъ въ слабой довѣ противъ косоглазія у дѣтей (вмѣстѣ съ *Скроф.* 1), а въ сухихъ крупинкахъ противъ образованія слизей при бронхитѣ у дѣтей, и въ особенности при коклюшѣ оно производитъ слизистыя испражненія и этимъ отдаляются приступы кашля.

Кромѣ того *Верм.* 1 обладаетъ еще свойствомъ противопаразитнымъ и потому съ успѣхомъ употребляется въ массивныхъ дозахъ для уничтоженія чесоточнаго клеща въ чесоткѣ, трихинъ — въ трихинной болѣзни и бациллъ—въ мокротѣ чахоточныхъ; въ послѣднемъ случаѣ также когда изнурительная лихорадка уступаетъ *Анж.* и *Фебр.*

Кругъ дѣйствія Vermifugo 2 или nuovo.

Вермифуго 2 или *нуово* = **Verm. 2.**

Это лѣкарство употребляется въ тѣхъ случаяхъ, когда *Верм.* 1 прекратило свое дѣйствіе или мало соотвѣтствуетъ организму больного.

Верм. 2 тоже дѣйствуетъ на нервную систему, но *Верм.* 1 ему предпочитается и отличается отъ него только своими противоглистными свойствами и дѣйствуетъ болѣе глубоко.

Мазь изъ 20 круп. *Верм.* 2, растворенныхъ въ 4 каплях *Эл. Желт.* съ унціею вазелина втираютъ: при легочной чахоткѣ въ грудь и между лопатками, при чесоткѣ въ мѣста, пораженныя этою болѣзнью и при глистахъ—въ животъ, и въ послѣднемъ случаѣ ставятъклистиры въ дозѣ 20 круп. *Верм.* 2 съ 10 каплями *Эл. Желт.* на стаканъ воды. Это наружное

Digitized by Google

примѣненіе значительно способствуетъ дѣйствію *Верм.* 1, принимаемаго внутрь.

При глистахъ, чесоткѣ и трихинной болѣзни *Верм.* 2 можетъ быть употреблено въ теплыхъ общихъ ваннахъ, въ дозѣ отъ 100 до 300 круп. на одну ванну (ср. еще Гл. IV).

Дифференціальное свойство Vermifugo (*Вермифуго*) въ различныхъ дозахъ.

Эти лѣкарства одни изъ тѣхъ, которыя оказываютъ свое дѣйствіе только въ сильныхъ дозахъ во всѣхъ случаяхъ, исключая нервныя болѣзни.

Первый стаканъ назначается противъ глистовъ у взрослаго и дѣйствіе его усилится отъ употребленія съ пищею по 10 круп., или утромъ и вечеромъ по 5 круп.

Второй стаканъ назначается дѣтямъ противъ косоглазія поперем. съ *Скроф.* 1 изъ 2-го стакана.

Третій стаканъ спеціально употребляется противъ нервныхъ разстройствъ: истерики, происходящей отчасти отъ глистовъ, отчасти отъ неправильнаго кровообращенія; также противъ безсонницы, ипохондріи, эпилепсіи, меланхоліи, пляски Св. Витта, столбняка (вмѣстѣ съ *Скроф.* 1 и *Эл. Желт.*) и проч.

Массивныя дозы. Противъ глистовъ, чесоточнаго клеща, трихинъ и бациллъ взрослый можетъ принять отъ 30 до 50 круп., а малолѣтній отъ 5 до 20 круп., растворенныхъ въ стаканѣ воды въ 5 пріемовъ; отъ 5 до 10 сухихъ крупинокъ взрослому противъ нервныхъ кризисовъ, спазмъ въ желудкѣ или маткѣ, желудочной или головной боли и для правильнаго пищеваренія; 5 сухихъ крупинокъ при непроизвольныхъ испражненіяхъ и вонючемъ дыханіи при тифѣ; противъ запора по 1 круп. тро мъ и вечеромъ въ чайной ложкѣ воды.

Для дѣтей доза противъ глистовъ различна, смотря по возрасту; отъ одной до трехъ крупин. въ ложкѣ воды, молока или бульона до трехъ разъ въ день, или отъ 2 до 20 сухихъ круп. каждый день въ одинъ пріемъ ложась спать, независимо отъ перваго стакана, который даютъ въ продолженіе дня.

Digitized by Google

Отъ массивныхъ дозъ глисты и чесоточные клещи выходятъ цѣльными, а глисты иногда живыми, а отъ пріема раствора глисты выходятъ по частямъ вмѣстѣ съ слизью.

Послѣ употребленія *Верм.* въ продолженіе двухъ или трехъ дней сряду полезно принять страдающимъ отъ солитера отваръ Александрійскаго листа отъ 5 до 15 граммъ.

Характеристика серіи Pettorale (*Петтораль*) = P.

Серія этихъ лѣкарствъ состоитъ изъ четырехъ одноименныхъ средствъ, каждое другого состава, а именно: *Петт.* 1, *Петт.* 2 или *нуово*, *Петт.* 3 и *Петт.* 4. Эти лѣкарства обладаютъ специфическими свойствами противъ различныхъ болѣзней дыхательныхъ органовъ.

Только въ двухъ видахъ кашля они оказываются недѣйствительными и ихъ замѣняютъ *Скроф.* Это—гортанный кашель глубокій, глухой, звонкій, крупозный, и кашель, появляющійся послѣ кори, скарлатины, тифа, или сопровождающій состояніе ослабленія у лифматиковъ.

Эта серія лѣкарствъ употребляется для полосканія и пульверизаціи гортани и для втиранія въ грудь.

Кругъ дѣйствія Pettorale 1 (*Петтораль 1*) = P. 1.

Безпрестанная потребность кашлять вслѣдствіе раздраженія или щекотанія гортани; конвульсивный кашель; коклюшъ; кровохарканіе; чувство тяжести или сжиманія въ груди при дыханіи, гриппъ; ложный крупъ, катарральный кашель; нервный кашель; острый и хроническій бронхитъ; одышка; воспаленіе: горла, легкихъ, плевры, язычка и миндалевидныхъ железъ; колотье въ боку; трудное глотаніе; горловая боль, усиливающаяся, преимущественно вечеромъ или послѣ полудня. Молочная лихорадка попер. съ *Канч.*

Digitized by Google

Кругъ дѣйствія Pettorale 2 или nuovo.
Петторале 2 или *нуово* = **P. 2.**

Потеря голоса и боль гортани при разговорѣ. Кашель съ вонючимъ дыханіемъ. Кашель съ зеленоватою мокротою. Крупъ Хроническое воспаленіе гортани, даже съ изъязвленіями. Хроническое воспаленіе легкихъ. Легочная чахотка съ потерею голоса и рвотою пищею. Спазмодическая одышка. Грудная жаба. Легочные туберкулы. Капиллярный бронхитъ. Кровотеченіе изъ легкихъ, какъ симптомъ образованія туберкуловъ. Эмфизема легкихъ.

Кругъ дѣйствія Pettorale 3 (*Петторале 3*) = P. 3.

Застарѣлый катарръ. Ослизеніе легкихъ у стариковъ. Кашель съ желтоватою мокротою и охриплостью. Судорожная и сжимающая боль во всей груди. Катарральная лихорадка попер. съ *Фебр. 1.*

При болѣзни легкихъ и вообще дыхательныхъ органовъ у дѣтей лучше имъ соотвѣтствуетъ, чѣмъ его одноименныя.

Кругъ дѣйствія Pettorale 4 (*Петторале 4*) = P. 4.

Хроническій катарръ бронховъ и легкихъ. Расширеніе бронховъ. Чахотка во второмъ періодѣ. Одышка. Горловая чахотка. Крупъ. Обильное образованіе въ гортани слизи, которая побуждаетъ постоянно харкать. Колотье въ груди. Насморкъ.

Дифференціальное свойство Pettorale (*Петторале*) въ различныхъ дозахъ.

Первый стаканъ [1]) соотвѣтствуетъ лучше въ острыхъ болѣзняхъ, а *второй стаканъ*—въ хроническихъ, а также противъ молочной лихорадки попер. съ *Канч.* изъ 2-го стакана и противъ катарральной лихорадки попер. съ *Фебр.* 1 изъ 1-го стакана.

---

[1]) См. Гл. IV.

Digitized by Google

Когда кашель отъ одной изъ этихъ дозъ усиливается, то ея не уменьшаютъ, но разбавляютъ.

Третій стаканъ лучше соотвѣтствуетъ дѣтямъ.

Противъ простого кашля или остраго насморка служитъ *Петт.* 1—для взрослыхъ изъ 1-го стакана, а для дѣтей изъ 2-го стакана. Если чрезъ 12 часовъ нѣтъ улучшенія, то для взрослыхъ *Петт.* 4, а дѣтямъ *Петт.* 3.

Когда *Петт.* 1 не дѣйствуетъ, то *Петт.* 4 рѣдко не оказываетъ своего дѣйствія.

Вмѣсто 1-го стакана можно принимать сухія крупинки по одной черезъ часъ или полчаса.

Противъ катарра легкихъ, когда нѣтъ туберкуловъ (кавернъ) даютъ *Петт.* 3 попер. съ *Скроф.* 1.

Кровохарканіе лѣчится *Петт.* 1 попер. съ *Анж.*, а легочная чахотка—*Петт.* 2 попер. съ *Канч.*

Массивныя дозы. Отъ сухихъ круп. *Петт.* 1 мгновенно останавливается кашель и часто гораздо скорѣе, чѣмъ отъ крупинокъ въ растворахъ; отдѣленіе мокроты можетъ начаться въ продолженіе 10 минутъ послѣ пріема 5 или 10 крупинокъ, что способствуетъ болѣе свободному дыханію. Эти дозы примѣнимы въ хроническихъ катаррахъ съ давленіемъ въ груди, но при легочной чахоткѣ отдѣленіе мокроты должно быть остановлено, и не слѣдуетъ, по нашему мнѣнію, ея вызывать сухими крупинками.

Мазь изъ 20 круп. *Петт.* 3, растворенныхъ въ 4 капляхъ *Эл. Бѣл.* на унцію свиного сала или вазелина, быстро прекращаетъ острую боль въ груди. Напротивъ, хроническія боли въ груди скорѣе проходятъ отъ мази *Канч.* 5. Но при воспаленіи легкихъ и плевры приложеніе *Эл. Крас.* на 6 главныхъ точекъ (см. чертежъ въ концѣ книги) предпочтительнѣе мази. (См. Гл. IV).

Характеристика и кругъ дѣйствія Venereo. (*Венерео*) = V.

Это лѣкарство не имѣетъ одноименныхъ, оно назначается для лѣченія сифилиса первичнаго, вторичнаго, третичнаго и

Digitized by Google

всѣхъ его послѣдствій, даже самыхъ сложныхъ и самыхъ застарѣлыхъ, какъ только эти послѣдствія начнутъ проявляться наружно. Но при этомъ необходимо обратить вниманіе и на тѣлосложеніе больного и вообще на общее состояніе его организма и давать это средство попеременно съ соотвѣтствующими главными средствами: преимущественно со *Скроф.* 1 или *Скроф.* 5, если имѣется трипперное заболѣваніе; съ *Канч.* 1 или *Канч.* 5, если заболѣваніе—сифилитическое.

При лѣченіи первичной сифилитической язвы *Вен.* даютъ попер. съ *Анж.* 2, которое уничтожаетъ внутреннее и наружное воспаленіе и предупреждаетъ разъѣдающій характеръ его.

При лѣченіи вторичныхъ проявленій сифилиса у субъекта, предрасположеннаго къ зараженію сифилисомъ, къ лишаямъ и болѣзнямъ кожи, *Вен.* даютъ попер. съ *Скроф.*

При боли въ костяхъ и при явленіяхъ третичнаго сифилиса, которыя поражаютъ костную систему, *Вен.* даютъ попер. съ *Канч.* 4, которое есть специфическое средство противъ болѣзней костей.

Такъ какъ сифилисъ остается часто въ организмѣ въ скрытомъ состояніи, что особенно выражается въ наслѣдственномъ сифилисѣ, то всякая накожная болѣзнь и болѣзни железистыхъ органовъ, которыя не поддаются своимъ специфическимъ лѣкарствамъ, должны быть лѣчимы *Вен.* вмѣстѣ съ прочими лѣкарствами, которыя служатъ основаніемъ лѣченія.

Вен. употребляется также противъ нѣкоторыхъ воспаленій глазъ и вѣкъ; нѣкоторыхъ опухолей къ маткѣ; истеченія гноя изъ ушей съ воспаленіемъ слухового прохода; воспалительной опухоли заушныхъ железъ; нѣкоторыхъ бронхитовъ послѣ употребленія *Петр.*; потемнѣнія роговой оболочки (бѣльма); помутнѣнія хрусталика и его сумки (катаракты); всѣхъ болѣзней слизистыхъ оболочекъ; катарровъ, полиповъ, фиброидовъ, насморка, бѣлей и проч.; съуженія и ущемленія кишекъ; трещинъ на грудныхъ соскахъ; сифилитическихъ фистулъ; тучности, попер. съ *Канч.* 1 или 5.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ бѣли ѣдкія и зеленоватыя скорѣе облегчаются и даже скорѣе вылѣчиваются *Вен.*, чѣмъ *Канч.*

Digitized by Google

Вен. назначаютъ также противъ запора и разныхъ невральгій, хотя бы послѣднія и не происходили отъ венерической болѣзни.

Дифференціальное свойство Venereo (*Венерео*) въ различныхъ дозахъ.

Первый стаканъ [1]) вызываетъ наружно: сыпи, истеченіе изъ мочевого канала и язвы, давно исчезнувшія у тѣхъ, которыя считали себя вылѣченными ртутью отъ сифилиса. Назначается противъ первичнаго сифилиса.

Второй и третій стаканъ дѣйствуетъ проницательнѣе, чѣмъ первый; они нейтрализуютъ то, что первый стаканъ вызываетъ наружно. Назначаются противъ боли и разныхъ невральгій.

Нѣсколько чайныхъ ложекъ изъ 3-го стакана, данныхъ въ продолженіе дня дѣтямъ, которымъ была привита оспа, нейтрализуютъ дурные зародыши, которые могли перейти въ организмъ черезъ оспопрививаніе и которые, со временемъ, порождаютъ всякаго рода упорныя болѣзни.

Массивныя дозы. Отъ 2 до 20 сухихъ крупинокъ въ день даютъ для усиленія дѣйствія внутреннихъ растворовъ при лѣченіи первичнаго сифилиса; отъ 6 до 10 круп. на стаканъ воды для внутренняго употребленія при лѣченіи сифилиса вторичнаго и третичнаго; 20 круп. на рюмку воды въ одинъ пріемъ противъ запоровъ случайныхъ, но не обычныхъ.

Наружно *Венерео* употребляется при лѣченіи сифилиса въ полосканіи, обмываніи, мази, примочкахъ, въ ваннахъ общихъ и мѣстныхъ—въ дозахъ, указанныхъ въ Гл. IV.

Втираніе въ больное мѣсто раствора *Вен.* (3 круп. на столовую ложку виннаго спирта) быстро прекращаетъ нѣкоторыя боли и невральгіи.

Кругъ дѣйствія Anti-mal di mare (*Анти-маль ди маре*).

Самое дѣйствительное средство противъ морской болѣзни и вообще противъ тошноты и рвоты.

---

[1]) См. Гл. IV.

Digitized by Google

Взрослымъ на одинъ пріемъ назначаютъ по 10 сухихъ крупинокъ, два или три раза въ теченіе дня, и кромѣ того изъ 1-го стакана по глотку въ разные промежутки времени.

Scrofoloso lassativo (*Скрофолозо лассативо*) = **S. las.**

Особнякомъ среди прочихъ электрогомеопатическихъ средствъ стоитъ Скрофолозо лассативо и назначается исключительно противъ недавнихъ запоровъ. Взрослому отъ 5 до 10 круп. въ столовой ложкѣ воды на ночь. Дѣтямъ отъ 3 до 5 круп. въ чайной ложкѣ воды. На нѣкоторыхъ субъектовъ это лѣкарство лучше дѣйствуетъ, если его принимаютъ на тощакъ.

ГЛАВА IV.

Способъ употребленія электрогомеопатическихъ крупинокъ и дозировка ихъ.

I. Внутреннее употребленіе крупинокъ.

а) **Водные растворы или разведенія** примѣняются наиболѣе часто въ электрогомеопатической практикѣ, такъ какъ они болѣе дѣйствительны, чѣмъ прочія формы примѣненія нашихъ средствъ.

Вода для растворовъ должна быть самая чистая, фильтрованная; если вода получается изъ совершенно чистаго источника, то она можетъ быть и сырая, въ противномъ случаѣ она должна быть отварная или перегнанная [1]). Больнымъ, которые

---

[1]) Растворы крупинокъ дѣлаются такимъ образомъ: опускаютъ назначенное количество крупинокъ въ стаканъ воды, даютъ постоять нѣсколько минутъ и затѣмъ размѣшиваютъ ложкой (предпочтительно не металлической). Если образуются маленькіе хлопья, то растереть ихъ ложкой. *Эти хлопья нисколько не мѣшаютъ дѣйствію растворовъ.*

Digitized by Google

не переносятъ воду, могутъ принимать лѣкарства въ свѣжемъ или вареномъ молокѣ.

Различаютъ слѣдующія степени растворовъ или разведеній:

Крѣпкій растворъ, для приготовленія котораго разводятъ 4 крупинки въ чайной ложкѣ (4 грамма) воды или, напримѣръ, 60 крупинокъ *Скрофолозо* 1 въ двухъ унціяхъ или 4 столовыхъ ложкахъ воды. Острыя болѣни лѣчатся въ началѣ слабыми разведеніями (отъ 3-го до 1-го), отъ которыхъ наступаетъ улучшеніе, но часто для полнаго излѣченія требуется уже усиленное первое разведеніе или же крѣпкій растворъ. До тѣхъ поръ, пока имѣется значительное возбужденіе нервной системы, должны употребляться исключительно высшія (слабыя) разведенія.

Первое разведеніе или такъ называемый *первый стаканъ* получается изъ раствора одной крупинки въ стаканѣ воды. Емкость стакана — 12 столовыхъ ложекъ или 6 унцій. Это первое разведеніе заключаетъ въ себѣ лѣкарственныя свойства крупинки въ усиленной степени. Больные съ легко возбудимой нервной системой, вообще же женщины и дѣти должны лишь съ осторожностью принимать изъ перваго стакана, который часто производитъ ухудшеніе страданія, что лишь рѣдко бываетъ отъ сухихъ крупинокъ.

Всякое лѣченіе слѣдуетъ начинать съ третьяго разведенія (стакана), и это должно служить правиломъ, изъ котораго допускаются исключенія. Такъ, взрослымъ субъектамъ, крѣпкимъ и не нервознымъ, лѣченіе, особенно въ хроническихъ болѣзняхъ, можетъ начинаться первымъ разведеніемъ. Если, что не рѣдко случается, послѣднее ими не переносится и вызываетъ, спустя нѣсколько часовъ, тошноту, рвоту или общее недомоганіе, то даютъ среднее разведеніе, которое вообще заслуживаетъ предпочтенія въ самомъ же началѣ болѣзни, когда показано первое разведеніе. Если улучшеніе достигнуто, но не подвигается еще дальше впередъ, тогда даютъ первое разведеніе но, если надо, то, постепенно усиливая дозу, доходятъ до усиленнаго перваго разведенія.

Усиленное первое разведеніе приготовляется такъ, что отъ

Digitized by Google

2 до 20 крупинокъ разводятъ въ стаканѣ воды, и оно дается такъ же, какъ и первое разведеніе, т. е. черезъ каждые полчаса или часъ по чайной ложечкѣ, если перваго разведенія недостаточно для того, чтобы закончить лѣченіе. Въ такихъ случаяхъ не сразу приступаютъ къ усиленному первому или же къ крѣпкому разведенію, а лишь постепенно усиливая первое разведеніе.

Среднее разведеніе (средняя доза) приготовляется изъ раствора 1 крупинки въ 4 стаканахъ воды. Средняя доза есть лишь видоизмѣненное первое разведеніе; она настолько же дѣйствительна, какъ и послѣднее, только не имѣетъ непріятныхъ побочныхъ дѣйствій, которыя первое разведеніе производитъ на нѣкоторыхъ субъектовъ.

Второе разведеніе или такъ наз. *второй стаканъ* приготовляется такъ, что одну большую чайную ложку раствора (двѣ драхмы) изъ *перваго стакана* размѣшиваютъ въ другомъ стаканѣ воды.

Второй стаканъ дѣйствуетъ обыкновенно проницательнѣе, интенсивнѣе, чѣмъ *первый стаканъ*, такъ какъ, благодаря продолженному разведенію, частицы (молекулы) первоначальнаго вещества крупинки еще болѣе освобождаются изъ состоянія сцѣпленія. При томъ же дѣйствіе высшаго разведенія часто противоположно дѣйствію нисшаго разведенія. Такъ, напримѣръ:

Скроф. 1 въ первомъ разведеніи ускоряетъ движеніе лимфы, усиливаетъ поэтому имѣющійся поносъ или способствуетъ скорѣйшему появленію сыпи, когда послѣдняя почему либо задерживается; третье же и четвертое разведеніе съуживаетъ лимфатическіе сосуды и такимъ образомъ устраняетъ имѣющійся поносъ или сыпь (напримѣръ—мокнущую экзему).

Анж. 1 дѣйствуетъ въ первомъ разведеніи ускоряющимъ образомъ на кровообращеніе, способствуетъ, напримѣръ, появленію мѣсячныхъ, тогда какъ третье и четвертое разведеніе съуживаютъ кровеносные сосуды и поэтому останавливаютъ имѣющіяся кровотеченія и устраняютъ воспаленіе.

Канч. 1 усиливаетъ въ первомъ разведеніи отдѣленіе слизистыхъ оболочекъ, серозныхъ оболочекъ и железъ, наоборотъ

Digitized by Google

же уменьшаетъ его въ 3 и 4 разведеніи, напримѣръ при бѣляхъ, насморкѣ, бронхіальномъ катаррѣ, плевритическихъ выпотахъ, при отдѣленіи молока и т. д.

Фебриф. 1 расширяетъ въ 1-мъ разведеніи капилляры селезенки, печени, поджелудочной железы и т. д. и показано поэтому при закупоркѣ выводныхъ желчныхъ каналовъ и т. д. При лихорадкахъ же и невральгіяхъ оно напротивъ того дается въ 3-мъ, 4-мъ и еще высшемъ разведеніи.

Въ практическомъ отношеніи знаніе противоположныхъ дѣйствій нисшихъ и высшихъ разведеній необычайно важно. Чѣмъ сильнѣе, напримѣръ, кровотеченіе, тѣмъ высшія разведенія *Анж. 2* показаны.

Третье, четвертое и высшія еще разведенія или *3-ій, 4-ый* и т. д. *стаканъ* приготовляются такимъ же образомъ, какъ второе разведеніе изъ первого, т. е. одна чайная ложечка изъ предыдущаго разведенія размѣшивается въ стаканѣ воды и такъ поступаютъ послѣдовательно отъ стакана къ стакану, смотря по требуемому разведенію.

Всякое разведеніе дается по чайной ложечкѣ и въ тѣмъ болѣе частые промежутки времени, чѣмъ сильнѣе заболѣваніе— лихорадка, боли и т. д., черезъ каждыя 5—15 минутъ. Среднее разведеніе дается по чайной или столовой ложкѣ или же по винной рюмкѣ (3 раза въ день и чаще).

Если же возбудимость нервной системы очень понижена, если имѣется чрезмѣрная слабость, то надо давать нисшее, усиленное или крѣпкое разведеніе, черезъ каждые полчаса или часъ, рѣдко чаще. Часто даютъ рядомъ съ разведеніями тѣ же средства и сухими крупинками, но въ болѣе рѣдкіе промежутки, черезъ каждые 2—3 часа.

Опытные практики могутъ, когда показаны нѣсколько средствъ, давать ихъ *въ смѣси*, но чтобы это дѣлать, надо обладать основательнымъ знаніемъ дѣйствія лѣкарствъ. Начинающіе же лучше сдѣлаютъ, если будутъ слѣдовать указаніямъ графа Маттеи и давать нѣсколько средствъ *попеременно*, а не въ смѣси.

Если показано *Анжіоитико* попеременно съ другими сред-

Digitized by Google

ствами, то слѣдуетъ начинать всегда съ *Анж.* Такъ, если оно показано съ *Скроф.*, то въ острыхъ случаяхъ даютъ раньше чайную ложечку *Анж.* и 10—15 минутъ спустя—*Скроф.*, въ хроническихъ же случаяхъ попеременно черезъ $^1/_2$ часа или часъ, и такъ надо продолжать до тѣхъ поръ, пока наступитъ улучшеніе, послѣ чего пріемы даются уже рѣже, въ острыхъ случаяхъ черезъ каждые $^1/_2$—1 ч., въ хроническихъ—черезъ 2—3 часа или лишь 3 раза въ день. Подобнымъ же образомъ поступаютъ, когда показаны 3 и 4 средства попеременно.

Можно однако поступить и такъ, что, смотря по количеству примѣняемыхъ средствъ, дѣлятъ день на 2 — 4 части. При четырехъ средствахъ даютъ въ первые часы дня (наприм. отъ 7 до 9 ч.) *Анж.* 1, во вторую четверть дня (10 — 12 ч.) — *Скроф.*, въ третью четверть дня (1—3 ч.)—*Фебриф.* и въ четвертую четверть (отъ 4 до 6 ч.) — *Петтор.* или какое другое показанное средство, въ разведеніяхъ; въ острыхъ случаяхъ черезъ каждыя 5—30 минутъ, въ хроническихъ черезъ часъ, по чайной ложечкѣ. Кромѣ того даютъ по одной сухой крупинкѣ каждаго соотвѣтствующаго лѣкарства и въ соотвѣтствующее время: въ острыхъ случаяхъ каждый часъ, а въ хроническихъ — каждые 2 часа; такъ, въ данномъ примѣрѣ, въ первую четверть дня 2 раза или разъ крупинку *Анж.*, во вторую четверть дня—*Скроф.*, въ третью *Фебриф.*, въ четвертую—*Петтораль*.

Если больной спитъ, то даже днемъ его, ради пріема лѣкарства, не слѣдуетъ будить, но за то, по пробужденіи, онъ долженъ чаще принимать, чѣмъ назначено было, такъ какъ очень важно для него, чтобы онъ каждый день принималъ сполна предписанное количество разведеній и сухихъ крупинокъ.

Часто даются и спеціальныя лѣкарства въ сухихъ крупинкахъ. Такъ, напримѣръ, въ только что приведенномъ примѣрѣ, утромъ натощакъ 2—5 крупинокъ *Фебриф.*, до полудня *Анж* и послѣ полудня *Скроф.* въ разведеніи, а вечеромъ 2—5 крупинокъ *Петтораль*; кромѣ того нерѣдко назначается еще по 3 — 5 крупинокъ *Скроф.* передъ пріемами пищи 2 — 3 раз

Digitized by Google

въ день; иногда даже еще вставочное средство, напримѣръ— каждое утро натощакъ чайную или столовую ложку раствора электрогомеопатической жидкости.

Такъ какъ дѣти и женщины имѣютъ обыкновенно очень возбудимую нервную систему, старики же наоборотъ мало возбудимую, то первымъ слѣдуетъ давать обыкновенно высокія, вторымъ низкія разведенія.

Въ хроническихъ болѣзняхъ и когда больному, по занятіямъ его, дѣйствительно затруднительно принимать лѣкарства такъ часто, какъ бы собственно слѣдовало, можно въ видѣ исключенія разрѣшить болѣе рѣдкіе пріемы, но за то въ бо́льшихъ дозахъ, наприм.—1 или 2 столовыя ложки разведенія 3 раза въ день, дабы онъ такимъ образомъ принималъ все предписанное количество назначеннаго лѣкарства; когда, по той же причинѣ, больной не можетъ оставаться весь день дома, чтобы принимать лѣкарство, онъ можетъ брать съ собою растворъ лѣкарства въ плоской стклянкѣ, удобной для ношенія въ карманѣ.

Для пріемовъ лѣкарствъ надо по возможности избѣгать употребленія металлической ложки, а предпочитать стеклянную, фарфоровую или роговую, при чемъ для каждаго разведенія цѣлесообразно имѣть отдѣльную ложку. Если, за неимѣніемъ другихъ, приходится довольствоваться металлическими ложками, то ихъ слѣдуетъ послѣ употребленія класть въ стаканъ воды и брать оттуда по мѣрѣ надобности, при чемъ для каждаго разведенія должна употребляться отдѣльная ложка.

Когда принимаютъ слабые растворы, то нѣтъ надобности приготовлять ежедневно дозу изъ перваго стакана; въ такомъ случаѣ первый стаканъ приготовляется на отварной или перегнанной водѣ и сохраняется въ закупоренной стклянкѣ (вдали отъ печки и солнца), для ежедневнаго приготовленія требуемаго разведенія. Такой запасной растворъ, въ продолженіе даже нѣсколькихъ дней, не теряетъ своего свойства.

Всякая доза, которая, вмѣсто успокоенія и облегченія больного, вызываетъ или усиливаетъ болѣзнь его, въ какой бы то ни было степени, должна быть немедленно уменьшена. Облегчающая доза будетъ всегда слѣдующая по разведенію за

Digitized by Google

той, которая усилила. Дѣйствіе лѣкарства точно такъ же будетъ слабѣе, если оно будетъ принято въ той же дозѣ, которая усилила болѣзнь, но только въ меньшемъ количествѣ.

Въ безнадежныхъ случаяхъ вмѣсто дозы изъ перваго стакана даютъ 40 или 50 крупинокъ на стаканъ воды, и отъ 40 до 50 капель *Эл. Анж.* или *Бѣл.*

Дозы для дѣтей. При болѣзни грудного ребенка лѣкарство даютъ кормилицѣ изъ перваго стакана, и ребенку дается то же самое лѣкарство изъ 3-го или 4-го стакана отъ 2-хъ до 6-ти чайныхъ ложекъ въ день. Если производится искусственное вскармливаніе ребенка, то лѣкарство даютъ въ количествѣ отъ 1 до 3 крупинокъ на полштофа (литръ) молока. Дѣтямъ до двухъ лѣтъ — изъ 3-го стакана; отъ 2-хъ до 10-ти лѣтъ дается вообще 2-й стаканъ, въ обоихъ случаяхъ не болѣе полустакана въ день, и отъ 10-ти до 12-ти лѣтъ назначаются дозы для взрослыхъ.

По устраненіи болѣзни не слѣдуетъ никогда сразу прекратить пріемы лѣкарствъ, а надо ихъ продолжать, хотя и рѣже, до тѣхъ поръ пока больной совершенно оправился.

При описаніи отдѣльныхъ болѣзней въ этой книгѣ приведено въ каждомъ случаѣ наиболѣе цѣлесообразное лѣченіе, дабы и неопытный въ электрогомеопатической практикѣ могъ возможно правильно лѣчить каждое заболѣваніе.

Нѣкоторые субъекты, особенно лимфатическаго тѣлосложенія, вообще не переносятъ водныхъ разведеній, которыя вызываютъ у нихъ тошноту и непріятное вообще состояніе. Такимъ надо принимать соотвѣтствующія имъ лѣкарства въ сухихъ крупинкахъ или въ растираніи послѣднихъ съ молочнымъ сахаромъ (см. ниже) въ видѣ порошка или прессованныхъ таблетокъ. Въ нѣкоторыхъ болѣзняхъ крупинки (или вообще сухая форма лѣкарствъ) даютъ повидимому болѣе быстрые и лучшіе результаты, чѣмъ водные растворы. Ниже въ отдѣлѣ болѣзней будутъ даны въ этомъ отношеніи болѣе подробныя указанія.

б) **Примѣненіе крупинокъ въ сухомъ видѣ или въ растираніяхъ.** Въ случаѣ, если больной не переноситъ водныхъ растворовъ, можно давать сухія крупинки подходящихъ средствъ по-

Digitized by Google

перемѣнно, какъ и при разведеніяхъ, но рѣже, напримѣръ— черезъ часъ попеременно 1—2 крупинки или 3 раза въ день 5—10 крупинокъ (утромъ 5 круп. *Анжіоитико,* въ полдень 5 крупинокъ *Канчерозо* и вечеромъ 5 крупинокъ спеціальнаго лѣкарства, напримѣръ — *Фебр.*). Въ рѣдкихъ случаяхъ достаточенъ для выздоровленія разовой пріемъ въ 10—20 крупинокъ лѣкарства.

У лицъ съ очень возбудимой нервной системой иногда даже сухія крупинки вызываютъ непріятныя побочныя дѣйствія. Въ такихъ случаяхъ рекомендуется приготовить растиранія изъ одной вѣсовой части крупинокъ съ 9 вѣсовыми частями молочнаго сахара (подобно какъ въ гомеопатіи по десятичной системѣ) и давать ихъ нервнымъ паціентамъ по одному грану (количество, умѣщающееся на кончикѣ перочиннаго ножа или на гомеопатической костяной лопаточкѣ) въ острыхъ случаяхъ—каждый часъ, въ хроническихъ 3—4 раза въ день, во второмъ или третьемъ растираніи (соотвѣтственно второму или третьему стакану разведеній). Такимъ образомъ *первое растираніе* получится, если, напримѣръ, одинъ гранъ крупинокъ растереть (въ фарфоровой или стеклянной ступкѣ съ такимъ же пестикомъ) съ 9 гранами молочнаго сахара; *второе растираніе* — если одинъ гранъ перваго растиранія растереть опять съ 9 частями молочнаго сахара; третье растираніе состоитъ изъ одной части второго растиранія съ 9 частями молочнаго сахара, и т. д.

Вообще же, какъ сказано уже выше, въ большинствѣ случаевъ разведенія дѣйствуютъ болѣе цѣлебно, чѣмъ лѣкарства въ сухомъ видѣ. Въ послѣднемъ видѣ они дѣйствуютъ болѣе быстро, болѣе энергически, но менѣе продолжительно, чѣмъ растворы; ихъ употребляютъ преимущественно всякій разъ, когда необходимо прервать симптомъ безпокоющій, и какъ только это будетъ достигнуто, то начинаютъ принимать лѣкарство въ растворѣ, который обыкновенно представляетъ лѣкарству наилучшій способъ дѣйствовать *цѣлебно.* Иногда сухія крупинки назначаютъ, въ разныхъ количествахъ, или чтобы усилить дѣйствіе внутреннихъ растворовъ, или чтобы ввести въ лѣченіе лѣкарство менѣе существенное при сложномъ лѣченіи.

Digitized by Google

Подъ конецъ лѣченія растворы можно замѣнить сухими крупинками.

Массивныя дозы сухихъ крупинокъ разгорячаютъ, и у нѣкоторыхъ лицъ производятъ запоры, и если будутъ замѣчены подобныя явленія, то не слѣдуетъ принимать крупинки въ сухомъ видѣ.

При острыхъ воспаленіяхъ, а также при обострившихся хроническихъ воспаленіяхъ сухія крупинки не производятъ почти никакого улучшенія, а потому должны быть замѣнены растворами, которые дѣйствуютъ быстро [1]).

II. Наружное употребленіе крупинокъ.

Наружное употребленіе крупинокъ очень обширно и многообразно. Тогда какъ при внутреннемъ употребленіи крупинокъ стараются избѣгать смѣсей различныхъ сортовъ ихъ, при наружномъ употребленіи, наоборотъ, смѣшиваніе различныхъ подходящихъ крупинокъ даже цѣлесообразно и очень полезно, при чемъ къ крупинкамъ прибавляется часто та и другая подходящая Электро-Гомеоп. жидкость.

Всѣ ниже приводимые препараты для наружнаго употребленія приготовляются опредѣленнымъ образомъ и, для практическаго различенія, носятъ названія цвѣтовъ — *краснаго*, *бѣлаго*, *зеленаго*, *синяго* и *желтаго*, въ зависимости отъ употребленной электрогомеоп. жидкости, или спеціальныхъ лѣкарствъ.

1. Мази (Pommades—Помады). Мази почти никогда не примѣняются на открытыхъ поврежденіяхъ и ранахъ, такъ какъ въ такихъ случаяхъ лучше дѣйствуютъ холодные или теплые компрессы. Для приготовленія мазей употребляются обыкновенно вторые нумера крупинокъ, какъ *A.* 2, *P.* 2, *F.* 2, *Verm.* 2; изъ *Скрофолозовъ*—*S.* 3 и *S.* 5 и изъ *Канчерозовъ*—*C.* 1, *C.* 4 и *C.* 5.

---

[1]) См. еще о различныхъ дозахъ при описаніи диференціальныхъ свойствъ каждой серіи лѣкарствъ на страницахъ 46, 53, 64.

Digitized by Google

Мазь приготовляется такимъ образомъ: 20 крупинокъ растираются съ 20 каплями Электро-Гомеоп. жидкости (стеклянным ъ или фарфоровымъ пестикомъ) и затѣмъ, продолжая растирать, прибавляютъ постепенно унцъ вазелина или миндальнаго масла, или свиного сала, пока образуется равномѣрная мазь, которую надо сохранять въ плотно закрывающейся стеклянной или фарфоровой баночкѣ.

Опытный практикъ можетъ приготовлять свои мази такъ, какъ онъ сочтетъ нужнымъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ. Тутъ же приводятся лишь тѣ мази, которыя являются въ практикѣ главными и наиболѣе дѣйствительными.

а) **Красная мазь** приготовляется изъ 20 крупинокъ *Скроф. 5* и 20 капель *Эл. Красн.* съ унціей жира.

Мазь эта примѣняется наиболѣе часто, она и самая цѣлебная изъ всѣхъ мазей и самое лучшее средство при всѣхъ сухихъ накожныхъ болѣзняхъ, но также при краснотѣ и воспаленіи вѣкъ и носа, при кожномъ зудѣ, при трещинахъ рукъ, при трещинахъ губъ и грудныхъ сосковъ, при ожогахъ первой степени (пока верхняя кожица цѣла), при астмѣ, при боляхъ спины и подостромъ ревматизмѣ. Она показана во всѣхъ случаяхъ, въ которыхъ наиболѣе подходящи Скрофолозы и Эл., Красн., слѣдовательно—при лимфатическомъ тѣлосложеніи.

Рядомъ съ наружнымъ примѣненіемъ красной мази слѣдуетъ принимать и внутрь *Скрофолозо*, временами и *Линфатико*.

б) **Бѣлая мазь** состоитъ изъ 20 крупинокъ *Анж. 2*, 20 капель *Эл. Бѣл.* и одной унціи жира. Она примѣняется очень часто и съ наилучшимъ результатомъ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда показаны *Анжіоитико* и *Эл. Бѣл.*, слѣдовательно — для всѣхъ заболѣваній у лицъ смѣшаннаго тѣлосложенія съ преобладаніемъ лимфатизма. Болѣзненныя состоянія, въ которыхъ Бѣлая мазь оказываетъ превосходныя услуги, суть слѣдующія: сердцебіеніе съ неправильнымъ пульсомъ, кровоточивый или скрытый геморрой, воспаленіе яичекъ вслѣдствіе ушиба или удара или вслѣдствіе гонорреи, водяночныя опуханія вслѣдствіе сердечныхъ страданій, подострое воспаленіе венъ, орга-

Digitized by Google

ническіе пороки сердца, астма съ сердцебіеніемъ и проч. Бѣлая мазь есть прекрасная помада для волосъ, когда корни волосъ высыхаютъ вслѣдствіе недостаточнаго питанія.

При употребленіи Бѣлой мази принимается внутрь *Линфатико* или *Скрофолозо* или *Канчерозо* (особенно № 1) попеременно съ *Анж.* 3.

в) **Синяя мазь** содержитъ 20 крупинокъ *Анж. 3*, 20 капель *Эл. Анж.* и одну унцію жира.

Она примѣняется съ наилучшимъ результатомъ во всѣхъ острыхъ страданіяхъ въ сферѣ Анжіоитическаго или смѣшаннаго тѣлосложенія, съ преобладаніемъ перваго, словомъ — во всѣхъ случаяхъ, гдѣ показаны *Эл. синее* или *Анжіоитико.* Напримѣръ, во всѣхъ острыхъ воспаленіяхъ и лихорадкахъ (исключая перемежающіяся), въ остромъ суставномъ ревматизмѣ (въ первой стадіи), также при аневризмѣ, грудной жабѣ, блѣдной немочи, водянкѣ яичка, гемморроѣ, расширеній венъ сѣменного канатика, въ нѣкоторыхъ случаяхъ эпилепсіи, при внутреннихъ кровотеченіяхъ и т. п.

Одновременно должны приниматься внутрь *Анжіоитики*, особенно *А.* 1, попеременно съ *Канчерозами.*

г) **Зеленая мазь** состоитъ изъ 20 крупинокъ *Канч.* 5, 20 капель *Эл. зелен.* и одной унціи жира и обладаетъ очень сильными антисептическими свойствами. Мазь эта необходима во всѣхъ подострыхъ и хроническихъ заболѣваніяхъ, которыя являются въ сферѣ смѣшаннаго тѣлосложенія и въ которыхъ показаны *Канчерозы* (попеременно съ *Анж.*) и *Эл. Зел.* Она превосходно дѣйствуетъ при всѣхъ опухоляхъ, желвакахъ и узлахъ (особенно при раковыхъ узлахъ и опуханіяхъ железъ) до тѣхъ поръ, пока они закрыты; сюда относятся напримѣръ: зобъ, бубоны, ногтоѣда въ началѣ развитія, опухоли въ животѣ (особенно у женщинъ), но также и болѣзненные грудные соски, выпаденіе прямой кишки, носовые полипы и проч.

Одновременно должны приниматься внутрь *Канчерозы* (особенно *С.* 1 и *С.* 5) попеременно съ *Анж.* (особенно *А.* 3).

д) **Желтая мазь** состоитъ изъ 20 крупинокъ *Фебрифуго* 2, 20 капель *Эл. Желт.* и одной унціи жира. Мазь эта очень

Digitized by Google

цѣлебна во всѣхъ заболѣваніяхъ печени и селезенки и во всѣхъ лихорадкахъ, которыя сопровождаются опуханіями печени и особенно селезенки. Она должна втираться всегда въ область печени и селезенки. Также употребляется противъ гноеточащихъ раковидныхъ язвъ, опухолей железъ, опухолей въ носу, грыжи, зоба.

Внутрь одновременно дается *Фебр.* 1 поперемѣнно съ главнымъ лѣкарствомъ, т. е. *Скрофолозо*, или *Канчерозо* поперемѣнно съ *Анж.*, особенно—*Анж.* 3.

е) Вермифуго-мазь состоитъ изъ 20 круп. *Верм.* 2, 20 капель *Эл. Желт.* и 1 унц. жира—втирается въ животъ и дѣйствуетъ превосходно у дѣтей, страдающихъ глистами, но также при брюшномъ тифѣ и проч.

Нижеслѣдующія (всѣ бѣлаго цвѣта) мази приготовляются, какъ и предыдущія, изъ одной унціи жира, 20 крупинокъ того лѣкарства, названіе котораго мазь носитъ, и всегда 20 капель Эл. *Бѣл.* Мази эти слѣдующія:

ж) Линфантико-мазь, облегчающая ревматическія и подагрическія страданія.

з) Петторале-мазь очень полезна при хроническихъ страданіяхъ легкихъ и гортани.

и) Венерео-мазь примѣняется съ большимъ успѣхомъ при закрытыхъ венерическихъ бубонахъ, при сифилитическихъ опухоляхъ, сифилитическихъ утолщеніяхъ костей и для устраненія сифилитическихъ костныхъ болей. Для первой стадіи сифилиса мазь эта приготовляется не съ Бѣлымъ, а съ Синимъ Электрич. (Эл. *Анж.*).

і) Домъ-финъ-мазь прекрасно дѣйствуетъ при дифтеритѣ, крупѣ и крупозной пневмоніи.

Для лучшаго сохраненія этихъ мазей, особенно для лѣтняго времени, къ нимъ прибавляютъ еще немного парафина, при чемъ масло, вазелинъ или жиръ растапливается съ парафиномъ и затѣмъ до охлажденія основательно размѣшивается. Мази, предназначенныя для кожныхъ заболѣваній или для трещинъ кожи, приготовляются всего лучше съ миндальнымъ масломъ.

2. Втиранія. Для втираній пользуются тѣми же лѣкарствами,

Digitized by Google

какъ и для мазей, но крупинки растворяютъ въ одной унціи горячей воды и прибавляютъ двѣ унціи виннаго спирта. Смотря по тому, какая употребляется при этомъ Электро-Гомеоп. жидкость, говорятъ о красномъ, синемъ, зеленомъ, желтомъ или бѣломъ втираніи.

3. **Обмыванія**. Для обмыванія употребляются тѣ же лѣкарства, что и для мазей, при чемъ ихъ растворяютъ въ двухъ стаканахъ воды. Такіе растворы употребляются для обмыванія всего тѣла. При сильной лихорадкѣ такія обмыванія, съ растворомъ 30 круп. *Ф.* 2 и 30 капель *Эл. Желт.* въ двухъ стаканахъ воды, дѣйствуютъ очень освѣжающе. Губкой, намоченной въ этой жидкости, проводятъ по всему тѣлу 3—4 раза въ день. Какъ о втираніяхъ, говорятъ также о бѣломъ, красномъ, желтомъ и т. д. обмываніи, смотря по употребленной Эл.-Гом. жидкости.

4. **Полосканія** приносятъ большую пользу при всѣхъ болѣзняхъ рта и зѣва, особенно при дифтеритѣ. Лѣкарства употребляются тѣ же, что для мазей, но растворенныя въ стаканѣ воды.

5. **Спринцованія** примѣняются для промываній отдѣльныхъ полостей тѣла, напримѣръ—полости носа (тутъ спринцованіе можетъ быть замѣнено втягиваніемъ въ носъ), мочеиспускательнаго канала, наружнаго слухового прохода, влагалища, прямой кишки (*клистиры*). Крѣпость раствора для спринцованія зависитъ отъ болѣзни и отъ мѣста примѣненія и подробнѣе указывается ниже въ соотвѣтствующихъ статьяхъ о болѣзняхъ.

6. **Ванны**. Для общихъ *ваннъ*, т. е. на все тѣло обыкновенная доза состоитъ изъ 100, 150 и 200 крупинокъ на ванну для взрослаго, а для грудныхъ и малолѣтнихъ дѣтей отъ 25 до 75 крупинокъ. Воды наливаютъ въ ванну до подмышекъ. Для полуваннъ 50 круп., для мѣстныхъ ваннъ (рукъ или ногъ) отъ 20 до 30 круп. на кувшинъ или ведро воды.

Температура для теплыхъ ваннъ назначается отъ 27 до 29° Р., пребываніе въ ваннѣ полагается отъ получаса до часа. Ванны принимаютъ каждые два или три дня, и даже еже-

Digitized by Google

дневно, смотря по производимому ими дѣйствію. Но, если послѣ ваннъ больной чувствуетъ себя слабымъ или вообще хуже, чѣмъ до ванны, то такому больному ваннъ не слѣдуетъ брать.

Теплыя ванны (до 30° Р.) вызываютъ приливъ крови къ кожѣ, увеличенное отдѣленіе пота и легкое возбужденіе всѣхъ отправленій тѣла; боли и разстройства нервной системы устраняются отъ дѣйствія ваннъ и является продолжительный сонъ. Онѣ назначаются въ случаяхъ, гдѣ нужно понизить раздражительность организма, ослабить боли и вызвать сонъ. Наблюденія показываютъ, что на большинство людей ванны отъ 0° до + 20° Р. дѣйствуютъ возбуждающимъ образомъ, ванны отъ + 20 до + 28° Р.—успокаивающимъ, а ванны выше 28° Р. опять возбуждающимъ.

Лѣкарства, которыя употребляютъ въ ваннахъ, слѣдующія: *Скрофолозо* и его одноименныя: противъ золотухи, накожныхъ и нервныхъ болѣзней, болѣзни костей и пр.—*Канчерозо* и его одноименныя: противъ значительной порочности крови и лимфы, женскихъ болѣзней и проч. *Анж.* 1 и *Анж.* 2: противъ болѣзней крови и кровеносныхъ сосудовъ. *Верм.* 1 и *Верм.* 2. противъ глистовъ, и *Венер.* противъ сифилиса.

7. Холодныя примочки на больныя мѣста (въ дозѣ 10—20 круп. на стаканъ или 50—100 круп. на литръ воды +12—15° Р.), возобновляемыя каждыя 5—10 минутъ, утоляютъ боль. Онѣ въ особенности полезны во всѣхъ болѣзняхъ живота; въ этомъ случаѣ на животъ кладутъ салфетку, смоченную въ лѣкарственномъ растворѣ и покрываютъ ее другою сухою салфеткою. Салфетки слѣдуетъ крѣпче выжимать и возобновлять, когда онѣ высохнутъ; при лѣченіи же воспаленія болѣе или менѣе опаснаго, примочки употребляются болѣе влажныя и чаще возобновляются.

8. Согрѣвающій компрессъ. Онъ дѣлается такимъ образомъ: берутъ кусокъ полотна или холста, складываютъ въ 2—3 слоя соотвѣтствующей величины, намачиваютъ въ растворѣ крупинокъ (20 круп. на стаканъ воды) комнатной температуры, слегка выжимаютъ и кладутъ на пораженное мѣсто; сверхъ его кладутъ клеенку, на клеенку фланель, и все это

Digitized by Google

вмѣстѣ забинтовывается бинтомъ настолько крѣпко, чтобы эта повязка плотно прилегала къ тѣлу. Согрѣвающій компрессъ остается на тѣлѣ часа три, или до тѣхъ поръ, пока не высохнетъ совершенно, и тогда замѣняется другимъ. Кожа подъ такимъ компрессомъ какъ бы распаривается; къ ней и къ органамъ глубоко лежащимъ подъ нею приливаетъ много крови, дѣятельность клѣточекъ усиливается, и пораженное мѣсто уменьшается въ объемѣ, или нагноеніе ускоряется. Компресы эти очень мало тревожатъ, отлично успокаиваютъ боль и при хроническихъ воспаленіяхъ могутъ быть примѣняемы въ теченіе долгаго времени. Перемѣнять компрессъ въ этихъ случаяхъ слѣдуетъ только утромъ и вечеромъ; при ношеніи согрѣвающихъ компрессовъ возможно исполненіе всѣхъ обыденныхъ работъ, также пребываніе на открытомъ воздухѣ.

9. Тампоны. Тампономъ называютъ всякое постороннее тѣло, вводимое въ каналы, какъ, напримѣръ, въ ноздри, влагалище, прямую кишку и пр. при помощи пальцевъ, щипцовъ, зеркала и проч. съ цѣлью разъединенія стѣнокъ, приведенія въ соприкосновеніе ихъ съ лѣкарствами или выполненія его просвѣта. Тампонъ бываетъ различной величины, смотря по цѣли, съ какою употребляется: въ видѣ палочки, цилиндра, шара или конуса, рыхло или крѣпко свернутыхъ; приготовляется изъ корпіи или губки, гигроскопической ваты, мягкой марли и проч. и вводится смоченный въ примочкѣ при кровотеченіяхъ, изъязвленіяхъ и другихъ болѣзняхъ.

10. Пульверизація. Она употребляется для направленія врачебныхъ средствъ въ распыленномъ видѣ на поверхность тѣла (напримѣръ, раны, язвы); на доступныя извнѣ слизистыя оболочки: рта, носа, наружнаго слухового прохода и черезъ вдыханіе — въ гортань и легкія. Она производится особеннымъ снарядомъ, называемымъ *пульверизаторомъ*. Пульверизаторы бываютъ *холодные* и *паровые*. Для пульверизаціи ранъ, язвъ и проч. пульверизаторъ ставятъ на разстояніи 2-хъ или 4-хъ вершковъ отъ опыливаемой части; для вдыханія — у самаго рта больного, который долженъ широко раскрыть его, придавить языкъ книзу и дѣлать глубокія вдыханія. Ды-

Digitized by Google

ханіе не должно быть стѣснено одеждой. Пульверизація производится съ отдыхами на 1—2 минуты, и послѣ принятія пищи черезъ часъ. Паровой пульверизаторъ не всегда удобно употреблять для вдыханій, потому что попадаетъ значительное количество пара. Для пульверизаціи потребляютъ растворъ крупинокъ въ *перегнанной водѣ* (20—30 круп. и 20—30 капель электр. жидкости на стаканъ). Вдыханіе должно продолжаться отъ 3-хъ до 15-ти минутъ; въ одинъ сеансъ нужно употребить не болѣе столовой ложки распыливаемой жидкости.

11. Пластыри. Они гуще и дѣйствіе ихъ часто предпочтительнѣе мазей. Для приготовленія пластыря нужно растопить вмѣстѣ по вѣсу $^1/_4$ бѣлаго воска и $^3/_4$ вазелина или свиного сала, и смѣшать ихъ съ растворенными крупинками въ дозѣ, назначенной для мази. Для употребленія эту массу намазываютъ не толстымъ слоемъ на холстъ или лайку требуемой величины. Такіе пластыри прикладываютъ на твердыя опухоли, раковыя затвердѣнія, на область почекъ, грудь и прочее. Прикрѣпляютъ къ тѣлу лентами изъ липкаго пластыря. Мѣняютъ одинъ разъ въ день. Дозы лѣкарствъ какъ при мазяхъ.

12. При болѣзняхъ глазъ и вѣкъ употребляется **глазная ванна**, овальной формы; въ нее наливаютъ растворъ крупинокъ, приставляютъ плотно къ глазу и держатъ въ такомъ положеніи нѣсколько минутъ; при этомъ совѣтуется моргать вѣками.

Лучше всего приготовить себѣ основной растворъ для глазныхъ ваннъ, изъ котораго берутъ 10—20 капель, вливаютъ ихъ въ глазную ванну и прибавляютъ воды до наполненія послѣдней. Для полученія того раствора разводятъ 30 круп. спеціальнаго глазного средства *Марина* и 30 капель электрогомеопатической жидкости въ 1 или 2 унціяхъ воды. Такимъ образомъ приготовляютъ бѣлую, красную, желтую и т. д. (смотря по примѣняемой электр. жидкости) глазную воду, изъ которой дѣлается упомянутый растворъ для глазной ванны.

При наружномъ употребленіи крупинокъ вода можетъ быть теплая, лѣтняя или холодная, но при этомъ лучше употреблять воду перегнанную, дестиллированную. Если въ водѣ

Digitized by Google

имѣется осадокъ отъ крупинокъ, то его легко удалить черезъ процѣживаніе раствора сквозь чистую тряпку или пропускную бумагу.

Вмѣсто ванночки можно примѣнять **глазныя примочки.** Для этого на больной глазъ прикладываютъ плоскую губку, смоченную въ растворѣ для примочки. Она имѣетъ преимущество передъ полотномъ или холстомъ въ томъ отношеніи, что ее удобнѣе приложить и она не такъ скоро высыхаетъ. До употребленія каждую новую губку нужно выварить и очистить отъ попадающихъ въ нее загрязненій, держать вообще въ безусловной чистотѣ и тщательно мыть въ горячей водѣ послѣ каждаго употребленія.

Примѣненіе это дѣлается, смотря по болѣзни или по дѣйствію, отъ 2-хъ и до 4-хъ разъ въ день.

13. Суппозиторіи, свѣчи, приготовляются изъ масла какао, смѣшаннаго съ показанными крупинками и электр. жидкостями, въ такой же пропорціи, какъ при мазяхъ. Суппозиторіи приготовляются въ различныхъ формахъ, смотря по мѣсту ихъ предназначенія. Такъ, суппозиторіи для прямой кишки имѣютъ коническую или палочкообразную форму; суппозиторіи для влагалища — овальную или шарообразную форму (**маточные шарики**); приготовляются суппозиторіи и для ушныхъ каналовъ. Смотря по входящей въ суппозиторіи электрогомеопатической жидкости, различаютъ красныя, бѣлыя, зеленыя и проч. суппозиторіи. *Суппозиторіи для прямой кишки* необходимы при нѣкоторыхъ заболѣваніяхъ этой части, особенно при геморроидальныхъ страданіяхъ и мелкихъ глистахъ. На 10 суппозиторій приходится 25 крупинокъ и 25 капель электр. жидкости.

Маточные шарики замѣняютъ собою спринцованія, если почему либо послѣднія не могутъ быть производимы, или же они служатъ въ подмогу таковымъ.

На 10 маточныхъ шариковъ берутъ 50 крупинокъ и 50 капель электр. жидкости.

Ушныя суппозиторіи приносятъ большую пользу при многихъ ушныхъ страданіяхъ. На 10 суппозиторій берутъ 10 крупинокъ и 10 капель электр. жидкости.

Digitized by Google

14. Бужи. Къ суппозиторіямъ примыкаютъ бужи, приготовляемые также изъ масла какао съ электрогомеопатическими крупинками и электр. жидкостями въ видѣ тонкихъ палочекъ цилиндрической формы. Они употребляются преимущественно для введенія въ мочеиспускательный каналъ, при болѣзняхъ послѣдняго; ихъ можно вводить также въ носовую полость и въ ушной каналъ. Бужи для мужчинъ должны имѣть въ длину, по крайней мѣрѣ, 10 сантиметровъ. На каждый бужъ приходится 4—5 крупинокъ и 3—5 капель электр. жидкости.

Къ суппозиторіямъ, для большей прочности, прибавляютъ, при приготовленіи ихъ, немного воску, и вообще для надлежащаго приготовленія ихъ требуется навыкъ и умѣнье.

15. Пудра для присыпки приготовляется изъ различныхъ электрогомеопатическихъ крупинокъ (безъ электр. жидкостей), растираемыхъ съ равною по вѣсу частью молочнаго сахара. Нельзя поэтому говорить о зеленой, синей, бѣлой и проч. пудрѣ, а только о пудрѣ-канчерозо, пудрѣ-венерео, домфинъ и проч. Электро-гомеопатическая пудра служитъ для присыпки ракообразныхъ и сифилитическихъ язвъ; ее можно и вдувать съ помощью стеклянкой трубочки, напримѣръ, при дифтеритѣ, въ зѣвъ и въ носовую полость.

ГЛАВА V.

Электрогомеопатическія жидкости.

Характеристика и кругъ дѣйствія ихъ.

Эти жидкости добыты точно также изъ растеній *неядовитыхъ*. Первоначально онѣ назначались исключительно только для наружнаго употребленія, (какъ это между прочимъ сказано на стр. 30), но *затѣмъ ихъ начали употреблять и во внутрь*.

Онѣ одинаково сильны, но свойство и дѣйствіе ихъ разно-

Digitized by Google

образно; а смотря по темпераменту и степени болѣзни, производятъ большее или меньшее ощущеніе.

Онѣ не подвергаются порчѣ и отъ замерзанія не теряютъ своихъ свойствъ. *Если образуются хлопья, то пропустить жидкость черезъ марлю.* Сохранять ихъ слѣдуетъ закупоренными и подальше отъ жара.

Ихъ дѣйствіе быстро, даже часто моментально, какъ уже выше сказано, но всегда безъ болѣзненныхъ и вредныхъ послѣдствій.

Графъ Маттеи назвалъ эти жидкости «электричествами», такъ какъ онъ видѣлъ, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ онѣ уничтожаютъ боль съ такой быстротой, на какую способно только электричество; иногда же онѣ вызываютъ даже ощущеніе, подобное содраганію отъ электрическаго тока. Путемъ различныхъ испытаній графъ нашелъ, что красная и синяя электр. жидкости обладаютъ положительными свойствами электричества, желтая и зеленая — отрицательными, тогда какъ бѣлая жидкость должна быть разсматриваема какъ нейтральное электричество.

До тѣхъ поръ, пока положительное и отрицательное электричества находятся въ человѣческомъ тѣлѣ въ равновѣсіи, оно находится въ состояніи нейтральнаго электричества, когда же это равновѣсіе нарушено, появляется состояніе, которое мы обозначаемъ положительнымъ или отрицательнымъ, и которое, при прикосновеніи съ другимъ тѣломъ, вызываетъ въ послѣднемъ противоположное электричество. Если поэтому въ человѣческомъ тѣлѣ электрическое равновѣсіе (нейтральность) нарушено такъ, что преобладаетъ отрицательное электричество, то соприкосновеніе данной части тѣла съ отрицательнымъ электричествомъ вызоветъ противоположное положительное электричество и немедленно устранитъ боль и вообще страданія, явившіяся вслѣдствіе того разстройства, и наоборотъ. Если же электрическое разстройство въ тѣлѣ вытекаетъ изъ недостаточной жизненности всей нервной системы, то соприкосновеніе съ нейтральнымъ электричествомъ должно дѣйствовать укрѣпляющимъ образомъ и устранять имѣющіяся страданія.

Digitized by Google

Эти жидкости, при *внутреннихъ лѣкарствахъ*, уничтожаютъ боль, установляютъ правильную циркуляцію, способствуютъ выздоровленію, усиливая и ослабляя жизненность болѣзненныхъ частей (если нѣтъ порока или излишества), и такимъ образомъ доводятъ организмъ до *безукоризненнаго состоянія*, или равновѣсія, т. е. до наисовершеннѣйшаго выздоровленія. Ихъ можно считать неоцѣнимымъ благодѣяніемъ, въ особенности во *всѣхъ болѣзняхъ рака* и вообще при *язвахъ и ранахъ всѣхъ родовъ*.

Сами по себѣ онѣ не могутъ излѣчивать болѣзней, поражающихъ цѣлый организмъ, и въ этомъ смыслѣ не слѣдуетъ считать ихъ фундаментальными средствами.

Всѣхъ жидкостей пять:

1) *Красная* (El. R., *Эл. Кр.*), положительнаго свойства, возбуждаетъ жизненность и соотвѣтствуетъ лимфатикамъ. Какъ и всѣ прочія жидкости, она способствуетъ внутреннему лѣченію, если будетъ примѣнена своевременно. Напримѣръ отъ втиранія ея въ большой симпатическій нервъ, на сплетеніе нервовъ, въ затылокъ, по обѣимъ сторонамъ позвоночнаго столба и въ подошвы ногъ, получится общее ея дѣйствіе на весь организмъ, которое выразится въ прибавленіи силы. Черезъ это она будетъ полезна людямъ анемичнымъ и ослабленнымъ физическими разстройствами, или когда нужно укрѣпить мускулы.

Жидкость эта не должна примѣняться при чрезмѣрной раздражительности нервной системы и волненіяхъ крови, особенно у сангвиниковъ, равно какъ не должна прикладываться къ открытымъ ранамъ и язвамъ, такъ какъ она производитъ въ нихъ сильное раздраженіе. Въ компрессахъ между плечами (симпатическій нервъ) попеременно съ примочкою изъ круп. *Анж.* она вылѣчиваетъ жабу; въ компрессахъ къ сочлененію бедра полезна при лѣченіи бедреного вывиха случайнаго или самороднаго, а къ сплетенію нервовъ при лѣченіи нервной одышки. Приложенная къ лобковой кости, на промежность и на область почекъ, она оказываетъ хорошее дѣйствіе при лѣченіи паралича мочевого пузыря, при хроническомъ воспаленіи почекъ и при бѣлковомъ мочеизнуреніи, когда послѣдняя болѣзнь представляетъ симптомъ пассивнаго прилива и атрофіи

Digitized by Google

почекъ. Приложенная къ вискамъ, къ подглазнымъ и надглазнымъ нервамъ, она полезна при лѣченіи катарракты въ самомъ ея началѣ, темной воды и гранулезнаго воспаленія глазъ, потому что укрѣпляетъ глазной нервъ, и этимъ оказываетъ большую услугу людямъ, у которыхъ зрѣніе очень ослаблено или утомлено продолжительными занятіями, чтеніемъ или безсонницей. Приложенная на большіе, а въ особенности на малые подъязычные нервы, она укрѣпляетъ голосъ и способствуетъ при лѣченіи потери голоса, болѣзней гортани и языка Въ болѣзняхъ живота и желудка, при бедреной и нервной боляхъ она служитъ большимъ пособіемъ, когда ее приложатъ на мѣсто, наиболѣе болящее. При холерѣ, будучи приложена во-время на подложечку и къ большему симпатическому нерву, она уничтожаетъ сильныя боли въ брюшной области и этимъ ускоряетъ дѣйствіе *Скроф.*, даннаго внутрь.

Если при рожѣ приложить эту жидкость вокругъ воспаленной части, то воспаленіе проходитъ быстро, и очень рѣдко послѣ перваго приложенія чувствуется еще боль.

Эта жидкость примѣняется въ различныхъ видахъ, въ смѣси съ крупинками, съ большой пользой въ подмогу внутреннему лѣченію (см. выше, гл. IV).

Красная жидкость, принятая *внутрь*, возстановляетъ упадокъ силъ. Одна капля этой жидкости, влитая въ стаканъ раствора крупинокъ, усиливаетъ жизненность.

2) *Желтая* (El. G., *Эл. Жел.*), отрицательнаго свойства. Дѣйствіе ея противоположно дѣйствію красной жидкости и потому нейтрализуетъ слишкомъ сильное ея дѣйствіе, напримѣръ, если отъ приложенія красной жидкости усилились боли. Но попеременное ихъ приложеніе способствуетъ часто болѣе скорому выздоровленію.

Желтую жидкость никогда не прикладываютъ ни къ какой ранѣ. Она также никогда не должна примѣняться при упадкѣ жизнедѣятельности; но большую пользу она приноситъ при приложеніи ея на 6 главн. точекъ (см. рис. въ концѣ книги) и ко всѣмъ соотвѣтствующимъ нервамъ при чрезмѣрномъ возбужденіи, слѣдовательно въ такихъ болѣзняхъ, какъ столбнякъ,

Digitized by Google

судорожное сведеніе рукъ, ногъ и челюстей, пляска Св. Витта, истерическія спазмы, холерныя судороги и въ прочихъ спазмодическихъ страданіяхъ. Втираніе въ грудь *Эл. Жел.*, при катарральной одышкѣ, способствуетъ выздоровленію.

Прекратившееся выдѣленіе молока изъ женскихъ грудей возстановляется въ четыре дня черезъ обмываніе грудей въ первые два дня утромъ, среди дня и вечеромъ *Эл. Жел.*, а въ слѣдующіе два дня смѣсью изъ $^3/_4$ *Эл. Жел.* съ $^1/_4$ чистаго виннаго спирта, тоже по три раза въ день; послѣ каждаго обмыванія на груди кладутъ примочки изъ этой же смѣси.

Въ этой жидкости можно растворить крупинки *Верм. 1* и *Верм. 2* для приготовленія желтой мази (см. выше, стр. 91).

Употребленная *внутрь* въ количествѣ отъ 3 до 10 капель на кускѣ сахара или въ чайной ложкѣ воды дѣйствуетъ противъ глистовъ, трихинной болѣзни, чесотки, сильнаго кровотеченія, грудныхъ болѣзней, упорной боли желудка, скорбута, спазмы желудка, воспаленія желудка; уменьшаетъ сокращеніе мускуловъ и нервное напряженіе при столбнякѣ, эпилепсіи, холерѣ и другихъ нервныхъ припадкахъ, но только въ томъ случаѣ, если подобныя состоянія не сопровождаются лихорадкой. Въ количествѣ 10 капель въ ложкѣ воды, принятой за часъ до начала пѣнія, проясняетъ голосъ. При лѣченіи родимчика, если *Скроф.* или *Анж.* не помогаютъ, то разводятъ 1 каплю *Эл. Жел.* въ стаканѣ воды и даютъ ребенку по чайной ложкѣ въ частыхъ пріемахъ; противъ истерики употребляется въ этой же дозѣ, но по столовой ложкѣ утромъ и вечеромъ. *Эл. Жел.* имѣетъ слабительное дѣйствіе и способствуетъ отхожденію глистовъ. При сильномъ запорѣ даютъ 2 — 10 капель разъ въ день или утромъ и вечеромъ, но только въ исключительныхъ случаяхъ, такъ какъ продолжительное употребленіе можетъ быть вредно (предпочтительнѣе *Канч.* 1 изъ 3-го стакана). Ту же дозу даютъ противъ глистовъ.

3) *Бѣлая* (El. B., *Эл. Бѣл.*), средняго свойства, не производитъ никакого разстройства и соотвѣтствуетъ всѣмъ темпераментамъ, но въ особенности людямъ нервнымъ и желчнымъ; приложенная на темя, она вылѣчиваетъ головную боль и не-

Digitized by Google

вральгію. Оказывается особенно дѣйствительной при болѣзняхъ печени, матки и нижней части живота вообще, также при истерикѣ, воспаленіяхъ брюшины, кишекъ и яичниковъ, и въ этихъ случаяхъ она прикладывается въ компрессахъ на животъ и на соотвѣтствующія мѣста. Назначается также при болѣзняхъ груди и гортани вслѣдствіе боли отъ избытка рѣчи. Съ пользою употребляется въ компрессахъ на раны и язвы. Отъ приложенія компресса на 20 сек. на високъ и подъ ухомъ почти всегда проходитъ зубная невральгія, а также и мигрень.

При приложеніи на темя, приноситъ большую пользу при лихорадкахъ, но ея не нужно долго употреблять, потому что утомляетъ голову. Чайная ложка этой жидкости въ полустаканѣ воды употребляется при параличѣ и ревматизмѣ для обмыванія; но при параличѣ въ то время, когда обмываютъ, нужно приложить на темя компрессъ изъ этой жидкости безъ воды.

Примѣняется наружно въ различныхъ видахъ какъ отдѣльно, такъ и въ смѣсяхъ съ крупинками (см. стран. 88).

Употребленная *внутрь*, эта жидкость имѣетъ противъ нервныхъ болѣзней нѣкоторое противоспазмодическое свойство, но далеко уступающее желтой жидкости. Отъ ста капель этой жидкости, принятыхъ внутрь, проходили упорныя боли, апоплексіи, злокачественныя лихорадки, но въ этой дозѣ она возбуждаетъ нервную систему и потому не соотвѣтствуетъ нервнымъ больнымъ. Принятая внутрь на тощакъ или на ночь, она излѣчиваетъ упорные запоры и возстанавливаетъ дѣйствіе кишекъ; но опыты показали, что это единичное дѣйствіе и потому не можетъ считаться общимъ правиломъ.

4) *Синяя* или *Анжіоитико* (El. A. или Azurra, *Эл. Анж.*) положительнаго свойства, назначается для сангвиническихъ темпераментовъ, которымъ красная жидкость не соотвѣтствуетъ, успѣшно умѣряетъ неправильность кровообращенія и точно также, какъ и красная, возбуждаетъ жизнедѣятельность. *Эл. Анж.* останавливаетъ всякое кровотеченіе даже изъ раковыхъ язвъ, унимаетъ боль, заживляетъ раны. Приложенная

Digitized by Google

на область сердца, успокаиваетъ сердцебіеніе, способствуетъ излѣченію аневризмы и всѣхъ прочихъ болѣзней сердца, а также и болѣзней крови. Отъ приложенія въ компрессахъ на венные узлы, послѣдніе сокращаются и приходятъ въ свое нормальное состояніе. Отъ приложенія къ головѣ при апоплексіи и солнечномъ ударѣ, способствуетъ выздоровленію. При остромъ воспаленіи глазъ, будучи приложена на подглазные и надглазные нервы, на виски, темя и затылокъ, уменьшаетъ боль и воспаленіе глазъ. Кровотеченіе изъ носа останавливается отъ приложенія на переносицу и темя, а въ упорномъ случаѣ и чрезъ втягиваніе носомъ отъ 50 до 100 капель на стаканъ воды. При мигрени прикладываютъ на темя и въ особенности на лобъ. При диспепсіи—на солнечное сплетеніе. Противъ всѣхъ болѣзней сердца прикладывается на область сердца въ цѣльномъ видѣ, а если сердцебіеніе отъ этого усилится, то разводятъ ее пополамъ съ водою, а противъ расширенія венъ употребляютъ въ примочкахъ на вены и, какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ, вмѣстѣ съ внутреннимъ употребленіемъ *Анж.* 1. Противъ воспаленія гортани и слизистыхъ оболочекъ рта *Эл. Анж.* употребляютъ въ полосканіи (20 капель на полстакана воды) попеременно съ полосканіемъ изъ *Канч.* 5. Противъ порѣзовъ примочки прекращаютъ боль и останавливаютъ кровотеченіе. При колотьи въ боку, воспаленіи легкихъ и плевритѣ *Эл. Анж.*, будучи приложено къ большому симпатическому нерву и на солнечное сплетеніе, ослабляетъ лихорадку, прекращаетъ давленіе, боль и всѣ опасные симптомы, но при этомъ во внутрь даютъ *Скроф.* и *Петт.*

Для приготовленія мази, крупинки *Анжіоитико* можно растворять въ этой жидкости; примѣняется и въ разныхъ другихъ видахъ (см. стр. 92).

Жидкость *Анжіоитико*, принятая *внутрь* въ количествѣ одной капли, влитой въ стаканъ съ растворомъ крупинки *Анжіоитико*, дѣйствуетъ прямо на сердце; пять капель *Эл. Анж.* въ ложкѣ воды прекращаютъ боль въ сердцѣ; отъ 5 до 10 капель утромъ и вечеромъ на кускѣ сахара употребляются противъ застарѣлаго сухого гортаннаго кашля; двѣ капли въ ста-

Digitized by Google

канѣ воды, принятомъ такимъ же образомъ, какъ растворы крупинокъ, вылѣчиваютъ упорную бедреную боль; пятьдесятъ капель въ одинъ пріемъ дѣйствуютъ съ замѣтною пользою при апоплексіяхъ и солнечномъ ударѣ, при чемъ эту жидкость прикладываютъ на темя; двѣ или три капли въ день въ чайной ложкѣ воды приносятъ пользу противъ метроррагіи у слабыхъ женщинъ; отъ ста капель *Эл. Анж.* проходили упорныя боли, апоплексіи и злокачественныя лихорадки. Внутреннее употребленіе этой жидкости приводитъ въ порядокъ регулы и прекращаетъ приливъ крови къ легкимъ, который бываетъ при гриппѣ и бронхитѣ. Эта жидкость предупреждаетъ простуду у сангвиниковъ.

Эл. Анж. противоположно *Эл. Кр.*, которое не успокаиваетъ, а усиливаетъ кровообращеніе. Тогда какъ *Эл. Кр.* больше подходитъ для мужчинъ, *Эл. Анж.* годится особенно для женщинъ, но отнюдь не исключительно.

Дѣйствіе *Эл. Анж.* на кровообращеніе гораздо слабѣе чѣмъ *Анж.* 1 изъ 1-го стакана.

Во всѣхъ болѣзняхъ сердца *Эл. Анж.*, данное внутрь, приноситъ большую пользу вмѣстѣ съ внутреннимъ употребленіемъ крупинокъ *Анжіоитико* въ растворѣ.

Быстрота дѣйствія *Эл. Анж.* на неправильное біеніе сердца, можетъ быть сравнена съ массивными дозами крупинокъ *Анж.*

5) *Зеленая* (El. V., *Эл. Зел.*) отрицательнаго свойства и соотвѣтствуетъ смѣшанному тѣлосложенію, какъ и *Канчерозо*; спеціально употребляется для прекращенія боли, какъ-то: при ракѣ, будь онъ закрытый или открытый, съ язвою, при боли въ сочлененіяхъ, грыжѣ, подагрѣ и ревматизмѣ, также при воспаленіи брюшины, надкостной плевы и прочее, и въ этихъ болѣзняхъ она дѣйствуетъ не только успѣшно, но даже съ изумительною быстротою. При приложеніи къ сплетенію нервовъ и подложечки ослабляются боли. Въ компрессахъ на раны и язвы всякаго рода она унимаетъ боль и способствуетъ заживленію. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ она прикладывается или цѣльная, или разведенная водою.

Внутрь употребляется она рѣдко для усиленія дѣйствія

Digitized by Google

Канчерозо отъ 1 до 3 капель въ день; она можетъ быть употреблена въ полосканіи (20 капель на стаканъ воды) съ *Канч.* 5, при язвахъ во рту и въ горлѣ. Въ этой же дозѣ даютъ хорошіе результаты втягиванія носомъ при лѣченіи хроническаго насморка и вонючаго нагноенія въ носу.

ГЛАВА VI.

Наружное примѣненіе электрогомеопатическихъ жидкостей.

Наружно жидкости эти примѣняются для утоленія боли и для воздѣйствія укрѣпляющимъ образомъ на всю нервную систему или на отдѣльныя нервныя области, напримѣръ — на нервъ глазной, ушной и т. д.

Для прекращенія боли на отдѣльныхъ мѣстахъ тѣла примѣняютъ обыкновенно электр. жидкости такимъ образомъ, что откупоренную бутылочку приставляютъ плотно отверстіемъ горлышка къ болящему мѣсту и держатъ такъ съ полминуты времени. Затѣмъ бутылочку отнимаютъ, стараясь не пролить понапрасну жидкость, а смоченное ею мѣсто слегка растираютъ пальцемъ. Если болящее мѣсто обширно, то электр. жидкость приставляютъ поочередно въ нѣсколькихъ мѣстахъ, въ промежуточныхъ разстояніяхъ въ нѣсколько дюймовъ. Если боль идетъ вдоль нерва, приставленіе жидкости начинаютъ съ мѣста происхожденія нерва и также послѣдовательно отступаютъ на нѣсколько дюймовъ. Если затихшая боль спустя нѣкоторое время вновь появляется, то повторяется описанная только что процедура.

Часто повторяемое приставленіе электр. жидкости на самое короткое время (отъ 10 до 30 секундъ) есть самый лучшій способъ. Иногда однако такія короткія примѣненія остаются безъ успѣшнаго результата, который является лишь тогда, когда жидкость держалась на тѣлѣ отъ 5 до 15 минутъ. Если желательно воздѣйствовать на всю нервную

Digitized by Google

систему или на отдѣльныя нервныя области, то необходимо примѣнять электр. жидкость въ теченіе нѣсколькихъ недѣль, утромъ и вечеромъ, на главныя нервныя точки всего тѣла или на таковыя отдѣльной нервной области. Какъ для прекращенія боли, такъ и для укрѣпленія, цѣлесообразно примѣнять непосредственно другъ за другомъ, поперемѣнно, противоположно поляризирующія электричества, напримѣръ—раньше красное, затѣмъ желтое, или за синимъ — зеленое. Но въ такомъ случаѣ надо всегда не раньше приставить послѣдующее электричество, пока первое не высохло на тѣлѣ, и всегда начинать съ краснаго или синяго, а не съ желтаго или зеленаго. Въ случаѣ, если боль уже прошла отъ перваго электричества, то второго примѣнять не надо.

Электрогомеопатическія жидкости можно еще примѣнять и иными способами. Такъ, можно наносить ее на тѣло съ помощью кисточки, при чемъ для каждой электр. жидкости надо имѣть отдѣльную кисточку. Или ею смачиваютъ кружокъ тонкой пропускной бумаги и прикладываютъ къ болящему и вообще указанному мѣсту.

При очень болѣзненныхъ ранахъ и язвахъ, напримѣръ—гангренѣ, раковыхъ язвахъ, а также при вывихахъ и дисторзіяхъ полезно положить на больное мѣсто кусочекъ мягкой марли, пропитанной бѣлой электр. жидкостью, а при гноѣ — зеленой, и оставить на 12—24 часа, поверхъ же ея дѣлать предписанные компрессы. Такимъ образомъ предупреждается раздраженіе, какое часто смѣняемые компрессы могутъ причинить пораженному мѣсту. Если послѣднее имѣетъ незначительное отдѣленіе или этого вовсе нѣтъ, то такой кусокъ марли можетъ нѣсколько дней лежать; слѣдуетъ только каждый день смачивать его электр. жидкостью, нанося ее съ помощью кисточки. При обильномъ отдѣленіи гноя марля эта должна почаще смѣняться, даже черезъ 2—6 часовъ.

При сильной нервной возбудимости, особенно при острыхъ заболѣваніяхъ головного или спинного мозга, электричества должны примѣняться наружно лишь разжиженными (1 ч. эл. на 10 частей воды). Иной разъ приходится для успокоенія боли при-

Digitized by Google

мѣнять другъ за другомъ всѣ электр. жидкости, начиная съ бѣлой. Если никакая изъ нихъ не успокоитъ боли, то это доказываетъ, что нервный токъ въ данномъ мѣстѣ прерванъ. Въ такомъ случаѣ дѣлаютъ въ теченіе получаса до часа компрессы изъ раствора 20 крупинокъ *Канч. 5* и 10 круп. *Анж. 2* въ 2 стаканахъ воды, послѣ чего нервный токъ обыкновенно возстанавливается, и то или другое электричество уже дѣйствуетъ болеутоляюще.

Электро-Гомеопатическія жидкости употребляются: *въ ваннахъ*, въ количествѣ отъ одной до пяти столовыхъ ложекъ для взрослаго, а также *въ впрыскиваніяхъ*, *спринцованіяхъ*, *полосканіи и примочкахъ* въ количествѣ одной чайной ложки, и даже болѣе, на стаканъ воды, особенно же часто въ мази (см. гл. IV). Въ нѣкоторыхъ случаяхъ для полосканія употребляютъ жидкость въ цѣльномъ видѣ безъ воды. Никогда не употребляютъ желтую жидкость въ вспрыскиваніяхъ.

Законъ поляризаціи.

Электрогомеопатія обязана своимъ быстрымъ распространеніемъ во всѣхъ частяхъ свѣта главнымъ образомъ электрогомеопатическимъ жидкостямъ и ихъ примѣненіямъ согласно ученію о тѣлосложеніяхъ. Позднѣе какъ графъ Маттеи, такъ и послѣдователи его стали примѣнять эти жидкости согласно закону поляризаціи, открытому *Reichenbach*'омъ, а впослѣдствіи и французскими врачами *Chazarain*'омъ и *Décle*. Эти ученые нашли, что каждый здоровый человѣкъ окруженъ свѣтящейся парообразной оболочкой, которая имѣетъ на правой сторонѣ синеватый, на лѣвой желтокрасный цвѣтъ, но что она въ такой же мѣрѣ уменьшается, въ какой одинъ или другой органъ болѣе или менѣе заболѣваетъ или совсѣмъ сводится на нѣтъ, когда онъ становится неизлѣчимымъ вслѣдствіе непоправимыхъ патологическихъ измѣненій.

Не каждый человѣкъ способенъ видѣть эти удивительныя излученія. Самъ *Reichenbach* не обладалъ этой способностью, а имѣли ее нѣкоторыя лица, съ которыми онъ былъ знакомъ:

Digitized by Google

онъ ихъ назвалъ сенситивами (одаренные тонкой чувствительностью). *Reichenbach* называлъ эти лучи одъ-лучами и обнародовалъ цѣлый рядъ сообщеній о томъ, что эти «сенситивы» воспринимали. Одно изъ этихъ лицъ видѣло каждый разъ, при приближеніи кончиковъ своихъ пальцевъ къ кондуктору электрической машины, что послѣдніе становились совершенно прозрачными въ одъ-лучахъ, исходившихъ изъ того кондуктора, и въ нихъ ясно просвѣчивались сосуды, сухожилія, мышечныя волокна и нервы. Такъ какъ однако *Reichenbach* не могъ ни самъ видѣть, ни другимъ показать этихъ удивительныхъ явленій, то люди науки сочли его за легковѣрнаго глупца, дающаго себя дурачить этимъ „сенситивамъ", и такимъ образомъ въ 1876 году *Fechner*, профессоръ физики въ Лейпцигѣ, выпустилъ въ свѣтъ брошюру: „Воспоминанія о послѣднихъ дняхъ одъ-ученія и его творца", которая, казалось, похоронила навѣки его ученіе.

Упомянутые выше французскіе врачи вновь предприняли изысканія Reichenbach'a и въ 1887 году обнародовали тотъ законъ поляризаціи человѣческаго тѣла, который для электрогомеопатіи имѣетъ громадное значеніе. Такъ какъ лица сверхъсенситивныя крайне рѣдко встрѣчаются, то эти врачи старались при своихъ испытаніяхъ искусственно повысить чувствительность испытуемыхъ посредствомъ гипнотизма, благодаря которому получалась возможность демонстрировать и передъ зрителями справедливость рейхенбаховскихъ наблюденій.

Состоянія наличной въ организмѣ поляризаціи могутъ повидимому измѣняться вслѣдствіе ли нѣкоторыхъ болѣзней или вслѣдствіе продолжительнаго примѣненія электрогомеопатическихъ жидкостей, такъ что въ теченіе болѣзни должны иной разъ примѣняться положительныя электричества тамъ, гдѣ въ началѣ показаны были отрицательныя, и наоборотъ. Именно, при хроническихъ нервныхъ страданіяхъ приходится часто мѣнять положительныя и отрицательныя электричества для достиженія излѣченія.

По *Chazarain*'у и *Décle* одна половина человѣческаго тѣла поляризируетъ положительно, другая—отрицательно, тогда какъ

Digitized by Google

средняя разграничительная линія между этими двумя противоположно поляризирующими половинами тѣла поляризируетъ перемѣнчиво—то положительно, то отрицательно (сравни—рисунокъ въ концѣ книги).

Положительно (+) **поляризируютъ:** лѣвая половина головы, туловища, живота, наружная сторона верхнихъ и нижнихъ конечностей и подошвы ногъ.

Отрицательно (—) **поляризируютъ**: правая половина головы, туловища, живота и внутренняя сторона верхнихъ и нижнихъ конечностей.

Перемѣнчиво, то положительно, то отрицательно, поляризируетъ срединная линія тѣла.

Поэтому *положительныя* электричества (*красное* или *синее*) должны прикладываться къ тѣмъ частямъ тѣла, которыя отрицательно поляризируютъ, *отрицательныя* же электричества (*желт.* или *зелен.*) къ тѣмъ частямъ, которыя положительно поляризируютъ. *Эл. кр.* (+) поперемѣнно съ *Эл. жел.* (—) и *Эл. син.* (+) поперемѣнно съ *Эл. Зел.* (—) должны прикладываться къ срединной линіи тѣла. *Эл. Бѣл.* (нейтральное) можно прикладывать ко всякому мѣсту тѣла.

Нервныя точки для приложенія электрогомеопатической жидкости.

Чтобы подѣйствовать *на всю голову*, жидкость прикладываютъ къ затылку, по обѣимъ сторонамъ перваго шейнаго позвонка (см. рисунокъ въ концѣ книги), на ступни ногъ, виски, переносицу и темя.

Чтобы подѣйствовать *на правую сторону* головы—на правый високъ, а *на лѣвую сторону* — на лѣвый високъ, и ко лбу, переносицѣ, подгл. и надгл. нервамъ и за уши.

Чтобы подѣйствовать *на языкъ*—на большой и въ особенности на малый подъязычные нервы, которые очень близки къ тѣлу, и потому очень чувствительны, и затылку.

Чтобы подѣйствовать *на глаза*—на симпатическіе, подглазные и надглазные нервы, и къ затылку.

Digitized by Google

Чтобы подѣйствовать *на носъ*—на переносицу, подглазн. и надглазн. нервы и къ затылку.

Чтобы подѣйствовать *на уши*—подъ уши и въ полосканіи рта. Также впрыскиваніе въ уши.

Чтобы подѣйствовать *на все тѣло*—къ затылку, къ большому симпатическому нерву, по обѣимъ сторонамъ позвоночнаго столба, къ тремъ мѣстамъ на животѣ и къ ступнямъ ногъ (по рис. 11, 12, 5, 6, 7, 15, 17, 16 и 18).

Чтобы подѣйствовать *на руки* — на средній плечевой нервъ—въ трехъ мѣстахъ (рис.).

Чтобы подѣйствовать *на ногу* — на три мѣста бедреного нерва, или на три мѣста берцоваго нерва, смотря по мѣсту боли, и на ступню ноги.

Чтобы подѣйствовать на мочевой пузырь, на матку и на другіе низшіе органы—къ поясницѣ, на промежность (между двумя проходами), лобковую кость и на симпатическій нервъ. Къ этимъ приложеніямъ прибавляютъ еще компрессы на темя изъ *Эл. Б.* или *А.*

Наконецъ, изъ всѣхъ этихъ мѣстъ надо умѣть выбрать наиболѣе болѣзненныя, прикладывая жидкость на эти мѣста; эти боли часто сами указываютъ мѣста, наиболѣе доступныя дѣйствію.

Если при *сильной лицевой рожѣ* и при *боляхъ въ боку* приложить *жидкость Красную* по сторонамъ перваго шейнаго позвонка и на затылокъ и дать одновремено во внутрь *Скроф.*, то краснота, опухоль, боль, лихорадка и всѣ другіе симптомы быстро исчезаютъ.

Если у больного отъ приложенія *жидкости Красной* произойдетъ обморокъ, то онъ возвратится къ чувству тотчасъ же, какъ только ему положатъ въ ротъ 8 или 10 сухихъ крупинокъ *Скроф.* 1.

Если при *воспаленіи легкаго* и при *колотьи въ боку*, приложить жидкость къ симпатическимъ нервамъ и гдѣ сплетеніе нервовъ (на рис. 5, 6, 7), а во внутрь притомъ дать *Скроф.* или *Пет.*, то всѣ симптомы, т. е. лихорадка, щемленіе, боль и проч. одинаково всѣ проходятъ.

Digitized by Google

Когда же, въ *острыхъ ломотныхъ боляхъ бедеръ*, жидкость, приложенная къ мѣсту сплетенія нервовъ и къ самымъ нижнимъ конечностямъ бедеръ, не уменьшаетъ боли, то это доказываетъ, что есть порочность кровообращенія, которую скоро можно устранить компрессами или мазью изъ крупинокъ *Канч.* 5 и *Анж.* 2, приложенными на тѣ же самыя мѣста.

При апоплексіяхъ слѣдуетъ быть очень осторожнымъ въ выборѣ этихъ жидкостей, потому что тѣ, которыя опредѣлены исключительно для нервнаго удара, могутъ повредить въ томъ случаѣ, когда ударъ произошелъ отъ прилива крови. Для этого послѣдняго существуетъ одна только, единственная *жидкость Анжіоитико* (*Эл. А*).

Благодѣтельное вліяніе, оказываемое этими жидкостями въ лѣченіяхъ, обнаруживается, напримѣръ, въ *воспаленіяхъ глазъ*, въ которыхъ отъ приложенія жидкости къ затылку, симпатическимъ, надглазнымъ и подглазнымъ нервамъ, видимо быстро прекращается слезотеченіе и уменьшается опухоль и воспаленіе.

Такъ же *при ранахъ*, жидкость, приложенная къ нервамъ, которые имѣютъ отношеніе къ больнымъ мѣстамъ, вызываетъ моментально нагноеніе и отдѣленіе самаго гноя.

Во всѣхъ этихъ случаяхъ улучшеніе становится прямо видимымъ.

ГЛАВА VII.

Тѣлосложенія и темпераменты.

Тѣлосложеніе и его виды.

Внутренняя причина болѣзни, разсматриваемая въ самомъ широкомъ смыслѣ, представляетъ собою тѣ условія въ организмѣ, которыя способствуютъ появленію и развитію въ немъ той или другой болѣзни или придаютъ послѣдней тотъ или другой характеръ.

Digitized by Google

Эти внутреннія условія, въ первоначальномъ ихъ образованіи, составляютъ то, что называется *тѣлеснымъ сложеніемъ* или *тѣлесной конституціей*. Условія эти присущи каждому организму и въ его такъ называемомъ здоровомъ состояніи.

Здоровье продолжается до тѣхъ поръ, пока эти внутреннія условія находятся въ уравновѣшенномъ состояніи, пока они поддерживаютъ правильную дѣятельность того сложнаго механизма, который мы называемъ организмомъ, и защищаютъ послѣдній отъ воздѣйствующихъ на него условій окружающей среды. Когда внѣшнія условія берутъ перевѣсъ надъ внутренней жизнедѣятельностію организма и разстраиваютъ ее, то получается состояніе, которое мы называемъ болѣзнію. Поэтому болѣзнь не является чѣмъ-то новымъ въ организмѣ, а представляетъ лишь видоизмѣненную дѣятельность его. И дѣйствительно мы видимъ, что въ болѣзни приливъ крови, нервное напряженіе, воспаленіе и проч. имѣютъ свои періодическія колебанія въ опредѣленные часы дня и въ опредѣленные дни, такъ же, какъ эти колебанія имѣются и въ здоровомъ состояніи организма въ его кровообращеніи, обмѣнѣ веществъ и проч. Эти періодическія колебанія зависятъ отъ процессовъ, присущихъ организму и характеризующихъ его тѣлесную конституцію. Поэтому и предметомъ лѣченія долженъ быть весь организмъ, а не только отдѣльныя проявленія болѣзни, вся тѣлесная конституція, нарушенная въ своемъ равновѣсіи, а не пневмонія, дизентерія, тифъ и проч., которые являются лишь названіями болѣзни, а не ихъ сущностью. Названія болѣзней имѣютъ смыслъ въ отношеніи классификаціи или схематизаціи, но не могутъ служить главными указателями способа лѣченія.

По графу Маттеи человѣческій организмъ состоитъ изъ двухъ основныхъ, элементарныхъ жидкостей: *лимфы* и *крови*. Отъ состоянія и характера этихъ двухъ составныхъ частей зависятъ здоровье и болѣзнь.

Какъ здоровье зависитъ отъ нормальнаго и уравновѣшеннаго взаимодѣйствія этихъ двухъ жидкостей, такъ болѣзнь происходитъ отъ разстройства или порчи одной или другой, крови или лимфы, или ихъ обоихъ.

Digitized by Google

Такимъ образомъ имѣются лишь три основныхъ причины болѣзней, соотвѣтственно которымъ различаются три категоріи больныхъ:

1) Больные *лимфатическаго* тѣлосложенія, которые встрѣчаются чаще всего;

2) Больные *анжіоитическаго* или *сангвиническаго* тѣлосложенія, т. е. страдающіе неправильностями со стороны крови.

3) Больные *смѣшаннаго* тѣлосложенія, которые, вслѣдствіе порчи и лимфы и крови, принадлежатъ къ предыдущимъ двумъ категоріямъ.

Въ практикѣ главный діагнозъ сводится къ тому, анжіоитическаго-ли тѣлосложенія больной или нѣтъ. Если онъ таковъ, то главныя его средства будутъ *Анжіоитики*, какая бы ни была форма его болѣзни.

Анжіоитическое тѣлосложеніе легко узнать. Признаками его являются: румяный цвѣтъ лица, наклонность къ кровотеченіямъ, приливы и головокруженіе, сердцебіеніе, сильное біеніе артерій, геморрой, расширенныя жилы (вены) и проч.

Если у больного нѣтъ никакихъ такихъ признаковъ, то онъ безусловно лимфатическаго тѣлосложенія.

Его цѣлебныя средства будутъ *Скрофолозы*, какова бы ни была форма болѣзни.

Если при одномъ или другомъ анжіоитическомъ признакѣ имѣются также признаки лимфатическаго тѣлосложенія, какъ, напримѣръ, опухоли, увеличенныя железы, накожныя сыпи и проч., то испорчены кровь и лимфа, болѣзненное состояніе поэтому смѣшанное. Цѣлебными средствами являются тутъ *Скрофолозы* и *Канчерозы* попеременно съ *Анжіоитиками*.

Остановимся нѣсколько подробнѣе на характеристикѣ упомянутыхъ трехъ тѣлосложеній.

1) Лимфатическое тѣлосложеніе.

Основною причиною этого тѣлосложенія является главнымъ образомъ *чрезмѣрное содержаніе воды въ тѣлѣ, гигроскопичность (водянистость) крови*, и являющееся отсюда понижен-

Digitized by Google

ное теплопроизводство въ тѣлѣ. Такой характеръ тѣлосложенія узнается особенно по явленіямъ, сопровождающимъ любое заболѣваніе у такихъ субъектовъ. Больной съ такимъ тѣлосложеніемъ чувствуетъ себя хуже на *холодѣ*, въ *сырую погоду* и *въ дождь*. Причиною этого является недостатокъ кислорода въ тѣлѣ и слабое его соединеніе съ углеродомъ, что влечетъ за собою недостаточное развитіе въ немъ теплоты и усиленное вліяніе сырости. Поэтому страданія лимфатика при всякой болѣзни ухудшаются отъ всего того, что увеличиваетъ количество атомовъ воды въ тѣлѣ, напримѣръ — отъ ваннъ, все равно — обыкновенныхъ водяныхъ или минеральныхъ, отъ напитковъ и сочныхъ плодовъ, даже отъ употребленія въ пищу животныхъ, живущихъ въ водѣ, какъ рыбы, раки, устрицы и проч. Страданія въ данномъ случаѣ ухудшаются также отъ холода, отъ холодныхъ кушаній и напитковъ и отъ охлаждающихъ веществъ (какъ, напримѣръ, простокваша, огурцы, грибы), даже отъ крутыхъ яицъ, особенно же отзывается дурно проживаніе вблизи болотъ и стоячихъ водъ. Такіе больные часто зябнутъ, имѣютъ холодныя руки и ноги; отъ малѣйшаго холода лицо ихъ синѣетъ.

Обстоятельства эти необычайно важны, и если при лѣченіи такихъ больныхъ, при выборѣ средствъ, руководствоваться даже лишь ими, можно скоро и основательно излѣчивать многихъ такихъ больныхъ, которые до тѣхъ поръ въ теченіе многихъ лѣтъ посылались на разныя купанья, но никогда не получали тамъ облегченія, а наоборотъ—обыкновенно лишь значительное ухудшеніе.

Малѣйшія колебанія земного электричества тотчасъ же отражаются на лимфатиковъ, ухудшая ихъ страданія, тогда какъ, наоборотъ, сангвиники чувствуютъ себя при этомъ условіи много лучше.

Затѣмъ, заболѣванія у лимфатиковъ отличаются *періодичностью* проявленій, *припадочностью* ихъ, а не бо́льшимъ или меньшимъ постоянствомъ.

Такъ, время отъ времени появляются припадки ночного удушья, сопровождающіеся временной неправильностью пульса,

Digitized by Google

перебоями его, глуховатостью тоновъ, и если не знать ничего о лимфатизмѣ, то подобные припадки являются совершенно необъяснимыми; не подвергнутые же надлежащему лѣченію, они могутъ кончиться очень печально. Особенно у грудныхъ дѣтей припадки эти могутъ появляться незамѣтно для окружающихъ и вести къ смертельному исходу. И взрослый человѣкъ можетъ подвергнуться той же участи, если его будутъ лѣчить отъ сердцебіенія и удушья, а не отъ лимфатизма, которымъ онъ одержимъ. Онъ можетъ, напримѣръ, быть внезапно пораженъ параличемъ, который можетъ и пройти сразу. Но если это повторяется, а основная причина—лимфатизмъ—не принята во вниманіе (въ данномъ случаѣ одна изъ его разновидностей—малярійность организма),—и не проведено соотвѣтствующее лѣченіе, тогда отъ возобновившагося припадка больной можетъ и умереть.

На почвѣ малярійно-лимфатическаго сложенія могутъ развиться и всевозможныя воспаленія и заболѣванія вообще нервныхъ и тѣлесныхъ органовъ; могутъ развиваться такія болѣзни, какъ нервная астма, бронхитъ и воспаленіе легкихъ или припадки ночного удушья, о которыхъ уже упомянуто и которыя являются вслѣдствіе ослабленія задерживающихъ нервовъ сердца или сосудодвигательныхъ нервовъ, а то и другое имѣютъ источникомъ своимъ малярійное вліяніе, лежащее въ основѣ лимфатизма.

Эта же причина можетъ дать картину и другихъ болѣзненныхъ состояній, какъ, напримѣръ, остраго суставнаго ревматизма. Такой ревматизмъ отличается тѣмъ, что боли рѣзко усиливаются всегда въ опредѣленный часъ дня или ночи. Если такой ревматизмъ лѣчить, какъ обыкновенный—не малярійный ревматизмъ, который встрѣчается на почвѣ сангвиническаго или смѣшаннаго тѣлосложенія, то результаты могутъ получиться самые печальные. Или неожиданно является картина скоротечной чахотки, или ночные припадки удушья обрываются въ концѣ концовъ разрывомъ сердца.

Главное болѣзненное состояніе лимфатическаго тѣлосложенія, это—золотуха или вѣрнѣе сказать, предрасположеніе къ ней,

Digitized by Google

именно—ко всякой формѣ ея, торпидной или тѣстообразной. Лимфатизмъ по существу предрасполагаетъ къ самымъ опаснымъ болѣзнямъ, въ особенности къ гнойнымъ. Накожныя болѣзни представляютъ безконечный каталогъ, начиная отъ сыпи, лишая и язвъ до рака и слоновой болѣзни. Болѣзни костей пріобрѣтаютъ иногда характеръ острый и болѣзненный.

У дѣтей это тѣлосложеніе распознается по блѣдному цвѣту лица, большой сравнительно головѣ, съ предрасположеніемъ къ водянкѣ ея, по лбу, выдающемуся впередъ. Такія дѣти подвержены глистамъ, воспалительнымъ болѣзнямъ глазъ и вѣкъ, разслабленности, безсонницѣ, конвульсіямъ (въ особенности при прорѣзываніи зубовъ), насморку и наконецъ слизямъ. Болѣзни, которыя могутъ ихъ постигнуть, слѣдующія: сыпи, скарлатина, корь, оспа, молочная сыпь, болѣзни волосистой кожи, заушница, нарывы, дѣтская сухотка, вздутіе живота.

У лимфатика въ юности затвердѣніе миндалевидныхъ железъ или шейныхъ, или подъ мышками, бываетъ очень часто. Это затвердѣніе случается въ особенности при возмужалости и поражаетъ преимущественно обѣ заушныя железы, которыя въ продолженіе многихъ лѣтъ могутъ быть гипертрофированы, если вскорѣ не начнутъ лѣчить ихъ.

2) Сангвиническое и анжіоитическое тѣлосложеніе.

Это тѣлосложеніе отличается недостаткомъ бѣлковъ и жировъ и крайне сильнымъ распадомъ, сгораніемъ веществъ, ослабленной устойчивостью органическихъ образованій противъ вліянія дѣйствующаго извнѣ кислорода, поэтому оно характеризуется главнымъ образомъ предрасположеніемъ къ заболѣванію крови и кровеносныхъ сосудовъ. Люди съ такимъ тѣлосложеніемъ чувствуютъ себя лучше въ атмосферѣ, въ которой имѣется избытокъ азота или углерода вслѣдствіе сгоранія смолистыхъ веществъ, жировъ и т. п. Мясная пища имъ часто противна, растительная же, наоборотъ, нравится, и это по-

Digitized by Google

нятно, если принять во вниманіе, что растительная пища, содержащая углеводы, подвергается окисленію гораздо медленнѣе, чѣмъ мясо.

Характерно для лицъ съ такимъ тѣлосложеніемъ то, что уже за цѣлые часы и даже дни до наступленія сырой погоды они чувствуютъ себя скверно, особенно если они чѣмъ-нибудь больны, то же и непосредственно передъ грозой, приближенія которой другіе даже и не подозрѣваютъ, и лишь съ первыми каплями выпавшаго дождя или съ первыми хлопьями снѣга проходятъ всѣ боли и страданія; въ туманную же погоду, а также въ туманѣ, исходящемъ изъ лѣсу, тѣмъ болѣе—при нехолодномъ воздухѣ, они чувствуютъ себя всего лучше, между тѣмъ какъ эти послѣднія условія на людей съ смѣшанной конституціей дѣйствуютъ очень непріятно и доводятъ ихъ, какъ, напримѣръ, въ Англіи съ ея туманами въ теченіе цѣлаго года, до самой мрачной меланхоліи, даже до самоубійства.

Иногда впрочемъ, они чувствуютъ себя нехорошо и при выпавшемъ дождѣ; это бываетъ тогда, когда въ воздухѣ при этомъ содержится значительное количество озона (усиленный кислородъ). На лимфатиковъ, наоборотъ, обстоятельство это дѣйствуетъ хорошо. Присутствіе озона въ воздухѣ узнается, между прочимъ, по тому, что вершины горъ и верхушки лѣса не задернуты туманомъ.

Это тѣлосложеніе, какъ уже сказано, обусловливается недостаточностью противодѣйствующей силы крови, что̀ отражается и на всѣ питаемые ею органы. Оно можетъ быть врожденное, но можетъ развиться и позднѣе, на почвѣ лимфатической конституціи, которая несомнѣнно устойчивѣе и менѣе опасна, нежели конституція сангвиническая. Такой переходъ лимфатизма въ сангвинизмъ наблюдается чаще у дѣтей послѣ, напримѣръ, неправильно лѣченныхъ заболѣваній, развивающихся на почвѣ лимфатической, у взрослыхъ же, въ случаѣ заболѣванія крови на почвѣ испорченной лимфы, развивается тѣлосложеніе, имѣющее характеръ смѣшанный.

Формы, составляющія анжіоитическую конституцію, суть слѣдующія: флоридная или тощая золотуха, хлорозъ (блѣдная

Digitized by Google

немочь) и тяжелыя заразныя заболѣванія, исключая малярію, которая, какъ сказано выше, нарушаетъ больше характеръ лимфы. Изъ острыхъ заразныхъ болѣзней особенно пагубно дѣйствуетъ въ этомъ направленіи сифилисъ.

Сангвиники предрасположены въ особенности къ воспаленію гортани, легкихъ и кишекъ; къ горячимъ нарывамъ, которые образуются съ тремя симптомами: краснотой, жаромъ и болью (карбункулъ, чирья), и къ аневризмамъ.

Всякое заболѣваніе или разстройство быстро появляется и хотя бываетъ непродолжительно, но пока существуетъ, имѣетъ бурный характеръ. Физическое здоровье обыкновенно хорошее и крѣпкое, и медленныя или продолжительныя болѣзни рѣдко случаются, но за то, если возникаютъ болѣзни, склонныя принять бурный, воспалительный характеръ, то онѣ бываютъ чрезвычайно серьезны и принимаютъ весьма быстрое теченіе.

Дѣти, рождающіяся сангвиниками, отличаются полнотою, отсюда запоры или стѣсненіе дыханія, красный цвѣтъ лица, губы гіацинтоваго цвѣта; они предрасположены къ лихорадкѣ, коклюшу, воспаленію легкихъ и плевры и проч., и послѣ того становятся чувствительными къ вліянію температуры.

3) Смѣшанное тѣлосложеніе.

При смѣшанномъ тѣлосложеніи наклонностію къ заболѣванію отличаются и лимфа и кровь, и оно развивается обыкновенно въ позднѣйшемъ возрастѣ изъ лимфатическаго или сангвиническаго тѣлосложенія, видоизмѣненнаго какимъ либо соотвѣтствующимъ заболѣваніемъ или прямымъ вліяніемъ внѣшнихъ причинъ; лишь очень рѣдко оно является врожденнымъ, унаслѣдованнымъ.

Способность крови къ окисленію (къ воспріятію кислорода) при этомъ тѣлосложеніи уменьшена, вслѣдствіе чего въ организмѣ накопляются въ избыткѣ углеродъ и азотъ, отчего въ немъ долженъ происходить рядъ страданій со стороны легкихъ, сердца, печени и проч., обусловливающихся уменьшеннымъ поступленіемъ кислорода въ кровь.

Digitized by Google

Такіе больные чувствуютъ себя всего лучше на свѣжемъ воздухѣ, сырость и холодъ не ухудшаютъ, какъ мы это видимъ у лимфатиковъ; дыханіе у нихъ учащено, число пульсовыхъ ударовъ въ минуту увеличено, но они этихъ явленій у себя не замѣчаютъ, а являются къ врачу съ жалобою то на катарръ или кашель, то на одышку при подниманіи на лѣстницу и т. п., или на приливы къ головѣ и головокруженіе, необычайную раздражимость и вообще скверное настроеніе, на общую слабость, быструю утомляемость, на запоры, поносы, на ломотныя боли головы, лица, шеи и той или другой части позвоночника, реберъ, рукъ, ногъ и проч.

Если не обратить должнаго вниманія на основную причину такихъ явленій и годами, какъ это часто бываетъ, лѣчить ихъ лишь по ихъ мѣстно-патологическимъ названіямъ, тогда развиваются и болѣе глубокія разстройства, какъ масса геморроидальныхъ страданій, циррозъ и другія болѣзни печени, являющіяся послѣдствіемъ образа жизни, постоянно подтачивающаго обмѣнъ веществъ (чрезмѣрное употребленіе кофе, спиртныхъ напитковъ); или же подагра, происходящая отъ затрудненнаго вліянія кислорода, вслѣдствіе чего азотъ-содержащія образованія не окисляются въ мочевину, а выдѣляются въ видѣ мочевой кислоты; или торпидная золотуха съ углеродистыми и азотъ-содержащими отложеніями вслѣдствіе дурного питанія и вдыханія испорченнаго воздуха; высыпи, астма (сухая), эмфизема и другія легочныя болѣзни и гипертрофія сердца съ расширеніемъ его полостей, причемъ затрудняется обмѣнъ газовъ въ легкихъ, а кровь, лишенная достаточнаго количества кислорода, насыщается углеродомъ. Послѣдствіемъ такихъ измѣненій являются застои крови и общая водянка. Всѣ эти разстройства могутъ доходить и до спинного мозга и центровъ, руководящихъ нервной системой, дѣйствуя вначалѣ раздражающимъ, затѣмъ разслабляющимъ образомъ, вызывая ипохондрію, анэстезіи, параличи и проч.

Къ подобнымъ разстройствамъ ведутъ, на почвѣ такого сложенія, такія обстоятельства, какъ онанизмъ, половыя излишества, подавленныя хиною перемежающіяся лихорадки или

Digitized by Google

тяжелыя инфекціонныя болѣзни, какъ тифъ, холера и проч., также продожительныя душевныя угнетенія.

Болѣзненныя явленія, развивающіяся на почвѣ смѣшанной конституціи, столь разнообразны и многочислены по той причинѣ, что эта конституція слагается изъ предыдущихъ двухъ и, вслѣдствіе неодинаковаго преобладанія той или другой, является не столь постоянной, какъ каждая изъ нихъ въ отдѣльности; на образованіе этой конституціи изъ той или другой предыдущей имѣетъ большое вліяніе привычный запоръ, ведущій часто къ заваламъ (копростазъ).

Темпераменты, ихъ теорія и виды.

Тѣлосложеніе и темпераментъ—это два термина соотносительные, но не тождественные. Тѣлосложеніе — это явленіе первоначальное, предшествовавшее; темпераментъ же —это явленіе послѣдующее, будущее. Тѣлосложеніе есть личная особенность (идіосинкразія)—первоначальная и почти неизмѣняемая; темпераментъ же есть идіосинкразія второстепенная, подверженная нѣкоторымъ колебаніямъ. Иногда можно измѣнить темпераментъ, но не тѣлосложеніе.

На самомъ дѣлѣ, тѣлосложеніе опредѣляетъ субъекта въ цѣломъ видѣ въ его чертахъ, въ его суставахъ, начиная съ связи его костнаго остова до сѣти нервовъ, которые проходятъ въ его органахъ. Оно даетъ ему внѣшній видъ, оно налагаетъ на него печать и призракъ его судьбы. Тѣлосложеніе есть перевѣсъ одной изъ главныхъ функцій надъ другою. Существуютъ четыре главныхъ органическихъ функцій: 1) *устойчивость* или равновѣсіе статики въ тѣлѣ и костяхъ; 2) *движеніе внутреннее* или питаніе; 3) *движеніе внѣшнее*, т. е. пищеварительное и возстановленіе, и 4) *инервація*, нервное вліяніе, или равновѣсіе динамическое въ нервной системѣ. Перевѣсъ той или другой функціи устанавливаетъ для каждаго субъекта общую личную особенность (идіосинкразію) и строеніе тканей организма (морфологію); затѣмъ этотъ перевѣсъ даетъ ему спеціальныя способности для измѣненія веществъ под-

Digitized by Google

вижныхъ и жидкихъ организма, и онъ же создаетъ ему и предрасположеніе къ болѣзнямъ.

Сообразно этому существуютъ четыре темперамента. Такъ, лимфатическому тѣлосложенію, происходящему отъ преобладанія функцій *устойчивости*, соотвѣтствуетъ темпераментъ *лимфатическій*, который характеризуется преувеличеннымъ содержаніемъ въ кровеносныхъ сосудахъ безцвѣтныхъ кровяныхъ тѣлецъ и перевѣсомъ въ организмѣ лимфы, или жидкости, уравновѣшивающей пластическій элементъ стойкости. Тѣлосложенію, происходящему отъ преобладанія функцій питательныхъ или *движенія внутренняго*, соотвѣтствуетъ темпераментъ *сангвиническій*, характеризующійся преувеличеннымъ содержаніемъ и образованіемъ въ кровеносныхъ сосудахъ красныхъ кровяныхъ тѣлецъ и учащеннымъ кровообращеніемъ, то есть перевѣсомъ крови или жидкости питательной. Если въ тѣлосложеніи преобладаютъ функціи пищеварительныя или *движеніе внѣшнее*, получается темпераментъ *желчный*, характеризующійся перевѣсомъ желчи, или пищеварительнаго сока по преимуществу; онъ наблюдается въ особенности въ жаркихъ странахъ въ Испаніи, Португаліи, на югѣ Франціи. И наконецъ, если въ тѣлосложеніи преобладаютъ функціи *инерваціи*, то получается темпераментъ *нервный*, характеризующійся преобладаніемъ нервной системы надъ всѣми прочими.

Темпераменты распознаются по четыремъ родамъ признаковъ: по признакамъ внѣшнимъ, по расположенію духа, по способностямъ физіологическимъ и по болѣзненнымъ предрасположеніямъ.

Признаки внѣшніе. Всякій темпераментъ распознается по внѣшнимъ признакамъ, почти вѣрнымъ: по плотности или жидкости его ткани, по формамъ округленнымъ или угловатымъ тѣла, которыя образуютъ худобу или тучность, по кожѣ твердой или мягкой, пористой или нѣтъ, то есть болѣе или менѣе способной къ потѣнію, имѣя чрезъ то своимъ послѣдствіемъ нѣкоторую степень влажности или сухости. Затѣмъ слѣдуютъ волосы: ихъ обиліе или недостатокъ, ихъ длина и толщина, ихъ ростъ, борода и брови. Въ третьихъ, и это знакъ наиболѣе

Digitized by Google

выдающійся — это цвѣтъ тѣла, глазъ и волосъ. Цвѣтъ лица представляется главнымъ признакомъ: онъ происходитъ отъ цвѣта нервныхъ трубочекъ или жидкостей, обращающихся въ организмѣ. Этотъ цвѣтъ сѣрый для нервовъ; переходящій изъ желтаго въ зеленый для желчи, изъ краснаго въ черный, съ сине-красными оттѣнками для крови; онъ бѣлый, непрозрачный и молочный для лимфы. Отсюда цвѣтъ лица можетъ видоизмѣняться до безконечности, смотря по состоянію болѣзненному или здоровому, которое переживаетъ человѣкъ. Цвѣтъ радужной оболочки, которая съуживаетъ или расширяетъ зрачокъ, придаетъ ему болѣе или менѣе рѣзкій блескъ. Цвѣтъ бороды, бровей и волосъ обыкновенно гармонируетъ съ цвѣтомъ лица и довершаетъ внѣшнюю индивидуальность темперамента.

Къ этимъ признакамъ анатомическимъ и физіологическимъ нужно присоединить внѣшніе моральные признаки, то, что называютъ *расположеніемъ духа*, то есть: манеры, осанку, видъ, походку, которые выражаютъ съ большимъ разнообразіемъ тѣлосложеніе, жесты или позу, разговоръ и тонъ голоса.

Способности физіологическія. Это признаки болѣе внутренніе, болѣе скрытые. Эти способности происходятъ отъ самыхъ функцій, зависящихъ отъ тѣлосложенія, преобладаніе коихъ создаетъ темпераментъ черезъ перевѣсъ существеннаго элемента лимфы, крови, желчи или нервовъ. Это — предрасположеніе разстройства въ отправленіяхъ, наклонность испытывать по преимуществу тотъ или другой актъ, совпадающій съ гармоніею и равновѣсіемъ вселенной. Призваніе и судьба человѣка обнаруживаются чрезъ его физіологическія способности. Ихъ гармонія представляетъ *нормальную жизнь*, доставляетъ радость и даетъ понимать и чувствовать счастіе.

Повторяемое отправленіе этихъ актовъ, необходимость ихъ осуществить, желанія, которыя они порождаютъ, удовольствія, которыя они доставляютъ, составляютъ *моральную жизнь*, рождаютъ и поддерживаютъ *страсти*. Человѣкъ живетъ своими страстями: чѣмъ болѣе предметъ ихъ благороденъ, возвышенъ, общъ, въ предѣлахъ впрочемъ энергіи его способностей, тѣмъ болѣе онъ поддерживается въ правильномъ равновѣсіи съ са-

Digitized by Google

мимъ собою и съ внѣшнимъ міромъ и тѣмъ болѣе онъ себѣ обезпечиваетъ здоровье и жизнь во всемъ ихъ избыткѣ.

Болѣзненныя предрасположенія. Патологическія способности находятся въ прямомъ соотношеніи со способностями физіологическими. Если существуетъ предрасположеніе функціональное, наклонность къ поддержанію равновѣсія, то точно также существуетъ и наклонность, черезъ излишество или недостатокъ, къ разрыву этого равновѣсія — болѣзненное предрасположеніе. Отсюда неудавшееся призваніе въ человѣческой судьбѣ, аномаліи, страданія, несчастія.

Лимфатическій темпераментъ.

Внѣшніе признаки. Цвѣтъ тѣла блѣдный, тѣло плотное характеризующееся толщиною верхней кожицы, кожа влажная; вообще субъекты изъ себя полные; формы округленныя; цвѣтъ лица блѣдный съ легкимъ румянцемъ; синеватость губъ и десенъ; глаза то голубые съ оттѣнкомъ стали, то зеленые съ изумруднымъ оттѣнкомъ, то сѣрые нѣжнаго цвѣта и тусклые. Волосы бѣлокурые, иногда пепельные, свѣтлорусые, довольно густые и вьющіеся; борода рѣдкая, медленно растущая и появляется поздно.

Расположеніе духа у лимфатика ровное, безъ буйности и вспыльчивости; его гнѣвъ сдержанный. Въ его рѣчи мало воображенія, она безъ очарованія и взрыва хохота. Его осанка кроткая, его поза спокойная, его движенія медленныя, мѣрныя, осторожныя.

Физіологическія способности, вкратцѣ сказать, заключаются въ выдающейся способности къ покою, къ статическому равновѣсію. У него нѣтъ видимаго функціональнаго преобладанія; всѣ функціи органической жизни исполняются со спокойствіемъ, правильно, безъ рѣзкой остановки и не вдругъ. Въ мъ заключается большой запасъ внутренней прочности.

Про лимфатика можно сказать, что онъ не имѣетъ страстей. го моральное безсиліе полное. У него вкусъ къ порядку авновѣсіе и ясность во всемъ. Эта наклонность къ покою

Digitized by Google

порождаетъ иногда безпечность: лимфатикъ склоненъ къ лѣности. Онъ хорошій совѣтникъ, потому что на всѣ затруднительныя положенія онъ смотритъ спокойно. Его аналитическія способности, его хладнокровіе, даютъ ему большое преимущество передъ людьми пылкими, коихъ страсти волнуютъ. Субъекты такого темперамента находятся между чиновниками, врачами, дипломатами, юристами, во всѣхъ общественнымъ должностяхъ, которыя требуютъ спокойствія съ безпристрастіемъ. Юстиніанъ, Лемуаньонъ, Меттернихъ несомнѣнно были лимфатики.

Сангвиническій темпераментъ.

Внѣшніе признаки. Ростъ достаточно высокій; цвѣтъ тѣла свѣжій; тѣло крѣпкое и плотное, сложеніе среднее между тучностію и худобою, кожа теплая и не много влажная вслѣдствіе легкости потѣнія. Лицо темнокрасное, румяное, полно одушевленія съ яркимъ румянцемъ губъ и десенъ. Глаза черные и блестящіе, взглядъ быстрый, члены гибкіе и подвижные, формы хорошо выдающіяся. Борода и волосы густые, часто черно-матовые, иногда каштановые, рыжіе.

Расположеніе духа у сангвиника живое и веселое. Онъ иногда раздражителенъ, но его гнѣвъ непродолжительный. Его осанка представляетъ что-то одновременно благородное и красивое. Его жесты увѣренные, его движеніе свободно, быстро и хорошо размѣрено.

Физіологическія способности сангвиника происходятъ отъ группы функцій, которая обнимаетъ на своемъ протяженіи общее питаніе. Ритмическое біеніе сердца, правильное отправленіе легкихъ утверждаютъ въ его организмѣ счастливое равновѣсіе. Но какъ избытокъ и образовательная сила его крови поддерживаютъ съ одной стороны напряженность мускуловъ, а съ другой стороны вызываютъ обильное отдѣленіе сѣмени, то функціональныя предрасположенія сангвиника одновременно относятся къ мышечнымъ движеніямъ и къ размноженію рода. Его мозговыя функціи совершаются точно также свободно; хорошая память, воображеніе сильное и блестящее; способность

Digitized by Google

къ мечтательности; нравъ влюбчивый, легкій; веселость и добродушіе.

Съ точки зрѣнія моральной сангвиникъ прежде всего человѣкъ дѣятельный. Его движущая сила для достиженія цѣли—не алчность: напротивъ онъ щедръ, безкорыстенъ; онъ охотно принимаетъ подъ свою защиту слабаго и угнетеннаго. Онъ способенъ на геройство. Истинные типы сангвиниковъ—это Ахиллъ, Маркъ Антоній, Герцогъ Ришелье.

Сангвиникъ склоненъ къ гнѣву, къ обжорству, къ сладострастію. Преобладающія его страсти—это война и удовольствія. Если онъ артистъ, то его произведенія радостныя, потрясающія; если его идеалъ возвышается, то его воинственные и сладострастные вкусы становятся потребностію справедливости, обожаніемъ любви. Викторъ Гюго представляетъ превосходный типъ поэта сангвиническаго темперамента.

Желчный темпераментъ.

Внѣшніе признаки. Цвѣтъ тѣла желтоватый, ростъ средній, тѣлосложеніе крѣпкое, скорѣе худоба, чѣмъ полнота тѣла; формы мало округленныя и грубыя; мускулы крѣпкіе и выдающіеся; вены очень выдаются; кожа сухая. Лицо сухое, цвѣтъ лица желтый, измѣняется отъ свѣтло-желтаго до смуглаго. Глаза черные отъ чрезвычайнаго расширенія зрачковъ, радужная оболочка темно-каштановая, иногда съ желтизною, зрачки блестящіе. Борода скорѣе рыжая, брови и волосы густые, черные, лоснящіе.

Расположеніе духа у желчныхъ раздражительное, вспыльчивое или веселое, ихъ малѣйшіе поступки представляются расчитанными; они не унываютъ. Ихъ осанка твердая и смѣлая, ихъ манеры гибкія, проворныя, осторожныя.

Физіологическія способности у желчнаго человѣка зависятъ отъ главной функціи, которая въ немъ преобладаетъ. Это функція пищевая. Но это вовсе не означаетъ, чтобы всѣ желчные были по необходимости обжорливы. Напротивъ, воздержаніе можетъ соединиться съ этою личною особенностію.

Digitized by Google

Только желчные имѣютъ, съ точки зрѣнія питанія, предрасположеніе къ голоду; у нихъ аппетитъ сильный. Всасываніе пищи у нихъ быстрое, ихъ пищевареніе скорое и легкое. Превосходное строеніе ихъ желудка, здоровое состояніе ихъ кишекъ, энергически очищаемое желчью, даетъ другимъ ихъ функціямъ, преимущественно функціямъ мозговымъ, большую энергію и много душевной силы.

Преобладающая страсть у желчнаго — это честолюбіе, и это понятно; у него, въ его моральной жизни большія потребности, какъ и въ жизни физической. Его способности усвоенія громадны, его желаніе пріобрѣтенія неопредѣленно, его жажда господствовать безгранична. Вотъ почему онъ склоненъ къ скупости и жестокости. Всѣ завоеватели, всѣ бичи Божіи: Александръ Македонскій, Аннибалъ, Цезарь, были желчные. Желчный всегда уступаетъ страсти зависти, онъ никого не ставитъ выше себя, ни рядомъ съ собою. Его злопамятство глубоко, скрытно хранимое, его мщеніе неумолимо. Но онъ способенъ тоже и къ благородству души. Его мысли глубокія, иногда величественныя, у него болѣе генія, чѣмъ ума; характеръ меланхолическій. Артисты этого темперамента могутъ достигнуть, какъ Мейерберъ, верха искусства. Въ любви — желчный постояненъ, но властительный, мстительный и ревнивый. Пылкій, дѣятельный, надменный, раздражительный и упрямый человѣкъ съ желчнымъ темпераментомъ. Наконецъ онъ доходитъ иногда до отвращенія, къ ненависти человѣчества, и легко впадаетъ въ мизантропизмъ, нелюдимость.

Болѣзненное предрасположеніе желчнаго — это меланхолія, въ собственномъ смыслѣ этого слова, что означаетъ «*черная желчь*». Онъ предрасположенъ къ разлитію желчи, воспаленію кишекъ, къ болѣзнямъ почекъ и мочевого пузыря, въ особенности же къ болѣзнямъ печени. Этотъ органъ, неизвѣстный еще въ нѣкоторыхъ изъ своихъ функцій, въ одно и то ж время представляетъ его силу и мученіе. Гипертрофія, разлитіе желчи, желчные камни, циррозъ, ея разстройства ему причиняютъ жестокія страданія, тупыя, продолжительныя, постоянныя. Печень, черезъ свое соотношеніе съ кровью произ-

Digitized by Google

водитъ желтуху (желтую кровь); въ соотношеніи съ мозгомъ порождаетъ мрачныя мысли и поддерживаетъ сплинъ и ипохондрію.

Нервный темпераментъ.

Внѣшніе признаки. Субъекты нервные отличаются худобою, тѣльный цвѣтъ мало развитъ, напряженность и сухость верхней кожицы, цвѣтъ лица имѣетъ оттѣнокъ сѣро-свинцовый; глаза вообще сѣрые или темноголубые, сверкающіе, борода густая, развивающаяся рано; волосы бываютъ густые и даже натурально курчавые или завитые, но ихъ цвѣтъ преимущественно пепельный или свѣтлокаштановый.

Расположеніе духа у нѣкоторыхъ нервныхъ тихое, миролюбивое, ихъ походка спокойная, ихъ осанка холодная, равнодушная. У другихъ же безпокойная, подвижная, странная; отъ шальной веселости они внезапно впадаютъ въ уныніе, задумчивость; ихъ ухватки, жесты грубые и неровны, большая живость въ походкѣ, особенная странность себя держать. Это различіе внѣшнихъ признаковъ между двумя видами того же темперамента объясняемъ ниже.

Физіологическія способности у нервныхъ людей представляютъ развитіе умственныхъ дарованій или же развитіе силы ощущеній. И нужно съ осторожностію различать нервнаго человѣка жизни умственной отъ нервнаго человѣка жизни животной. У перваго *развитіе передней части черепа*, которая содержитъ большой мозгъ, указываетъ способность къ наукамъ отвлеченнымъ, къ философіи, къ математикѣ. Декартъ, Спиноза, Лейбницъ, Ньютонъ были нервные люди умственной жизни. Счетчики, изобрѣтатели принадлежатъ къ этой же категоріи. Вдавленіе же малаго мозга, содержащагося въ задней части репа, есть признакъ умѣренной чувствительности и почти ниожнаго воображенія; слабая жизненность нервныхъ ганглій іеньшаетъ силу умственныхъ способностей и чувствительныхъ ізерцаній, что даетъ человѣку спокойность, кротость, разсудиельность и всѣ признаки темперамента хладнокровнаго.

Digitized by Google

Нервные люди животной жизни намъ представляютъ *чрезвычайное развитіе задней части черепа*, которая содержитъ малый мозгъ; у нихъ этотъ органъ могущественный рефлекторъ явленій, которыя происходятъ во внѣшнемъ мірѣ; съ жизненностію этого органа соединяется энергія и напряженность органовъ чувствъ и означаетъ большое развитіе силы воображенія, способность къ искусствамъ пластическимъ или же умственнымъ, смотря потому—преобладаетъ ли при этомъ зрѣніе или слухъ. Рафаэль, Моцартъ, Альфредъ де Мюссе принадлежали къ нервнымъ людямъ животной жизни. Нервная ганглiозная система у нихъ тоже значительно развита, чрезвычайная воспріимчивость, характеръ раздражительный. Люди этого темперамента склонны къ гордости. Въ своей жизни они охотно дѣйствуютъ по чуству, созерцанію и предчувствію, по инстинктивному внушенію, по произвольному стремленію. У нихъ мало склонности къ размышленіямъ метафизическимъ, и они неспособны къ наукамъ математическимъ; ихъ разсужденія плодовиты на вымыслы, украшены, прихотливы, и имѣютъ только видъ отвлеченнаго изложенія. Однимъ словомъ, это артисты, они преклоняются передъ прекраснымъ, какъ ученые, которые представляютъ нервныхъ людей умственной жизни, преклоняются передъ истиною.

Коренное *болѣзненное предрасположеніе* этого темперамента—это сумашествіе. Люди нервные жизни умственной доходятъ, черезъ уклоненіе разума и злоупотребленіе умственной дѣятельностію, которое производитъ всѣ виды душевныхъ болѣзней, до сумашествія, а именно—резонирующаго. Люди нервные животной жизни подвержены припадкамъ истерическимъ, галлюцинаціямъ, припадкамъ безумія и бреду. Ихъ воображеніе, безпрестанно возбужденное,—опасное явленіе. Кромѣ того, привычки нервныхъ имѣютъ что-то необыкновенное и безразсудное: они безпрерывно находятся въ состояніи постояннаго безпокойства; сумасшествіе же, которое начинается, нервнымъ раздраженіемъ и оканчивается маніею, можетъ дойти черезъ незамѣтное перерожденіе до навязчивой мысли (idée fixe) породить неистовство и произвести идіотизмъ и размягченіе

Digitized by Google

мозга. Субъекты нервные предрасположены къ нервозамъ всѣхъ органовъ, сердцебіенію, невральгіи, спазмодическимъ страданіямъ—истерикѣ, столбняку и проч., и острыя болѣзни у нихъ часто осложняются конвульсіями и бредомъ.

Смѣшанный темпераментъ.

Этотъ темпераментъ представляетъ промежуточный оттѣнокъ между четырьмя предъидущими, но въ очень непостоянныхъ размѣрахъ, и потому нельзя опредѣлительно описать его признаки.

Предшествующее описаніе относится къ четыремъ темпераментамъ неограниченнымъ, къ первоначальнымъ типамъ. Это наиболѣе рѣдкіе. Наибольшая часть людей, и въ числѣ ихъ люди, отличающіеся своимъ развитіемъ умственнымъ или моральнымъ, принадлежатъ къ смѣшанному темпераменту. Эти соединенія очень различныя, часто производятъ самые счастливые результаты и объясняютъ безконечную разность характеровъ въ свѣтѣ. Темпераментъ лимфатическій, смѣшанный съ нервнымъ, желчный—съ сангвиническимъ или лимфатическимъ, или еще нервный смѣшанный съ сангвиническимъ, нервный и желчный, соединенные вмѣстѣ, представляютъ продукты жизненности очень разнообразные. Иногда, но очень рѣдко, можно различить дѣйствіе трехъ темпераментовъ у одного и того же субъекта. Человѣкъ, который соединялъ бы въ себѣ всѣ четыре темперамента, осуществилъ бы самыя превосходныя условія равновѣсія статики и динамики, онъ былъ бы безсмертенъ. Такого человѣка не существуетъ, потому что каждый субъектъ приноситъ при рожденіи, съ своимъ тѣлосложеніемъ, свое расположеніе духа и свое болѣзненное предрасположеніе, то-есть съ своею жизнію онъ приноситъ и зародышъ своей смерти. Это печать рода человѣческаго.

Digitized by Google

ГЛАВА VIII.

О діагностикѣ.

Искусство опредѣлять данную болѣзнь по представляющимся болѣзненнымъ припадкамъ (признакамъ, явленіямъ или симптомамъ) называется *діагностикой*.

Задача діагностики заключается не только въ опредѣленіи сущности страданія главнаго пораженнаго болѣзнью органа, но вмѣстѣ съ тѣмъ и въ составленіи себѣ возможно болѣе точнаго понятія о состояніи всѣхъ органовъ заболѣвшаго человѣка, при помощи имѣющихся въ нашемъ распоряженіи средствъ для распознаванія болѣзней, равно какъ и особенно въ опредѣленіи тѣлосложенія даннаго больного субъекта.

Методъ, который позволилъ бы классифицировать болѣзни по ихъ естественному характеру, былъ бы большимъ пособіемъ для медицины. Но, къ сожалѣнію, правильную классификацію не такъ легко найти какъ классификаціи, которыя такъ могущественно способствовали прогрессу естественныхъ наукъ— Ботаникѣ и Зоологіи. Однако, несмотря на трудности, пробовали разрѣшить задачу классификаціи, которая соотвѣтствовала бы безконечнымъ разнообразіямъ, введеннымъ природой въ человѣческія болѣзни. Многіе это пробовали, но никому не удалось. Безчисленныя системы были предложены, но ни одна не заключала въ себѣ общей связи, подобно методамъ натуралистовъ Кювье и Жюсьенъ. Надо сказать, что существуетъ много искусственныхъ классификацій, но естественной классификаціи нѣтъ.

Какую бы ни принять классификацію, всегда будутъ встрѣчаться болѣзни, коихъ причина сомнительна, и неизвѣстно, въ какую группу ихъ включить.

Итакъ, для діагностики въ цѣляхъ электрогомеопатическаго лѣченія важно и достаточно знать: 1) какого тѣлосложенія и темперамента больной, 2) симптомы наружные и внутренніе, которыми выражается болѣзненное состояніе даннаго субъекта,

Digitized by Google

и 3) всѣ обстоятельства, такъ или иначе связанныя съ имѣющейся болѣзнію.

О тѣлосложеніяхъ и темпераментахъ рѣчь была уже выше въ главѣ VII. Здѣсь же мы изложимъ общія правила, которыми слѣдуетъ руководствоваться для болѣе подробнаго и детальнаго опредѣленія каждаго болѣзненнаго случая.

Въ практическомъ отношеніи приходится прежде всего различать мѣстныя заболѣванія и общія разстройства организма.

Мѣстныя болѣзни или такъ и остаются, въ продолженіе всего своего существованія, ограниченные извѣстною тканью организма или частью его, или *распространяются далѣе*, т. е. поражаютъ весь организмъ. Распространеніе болѣзней происходитъ главнымъ образомъ тремя путями: 1) непосредственно съ одного органа на смежныя части (напримѣръ катарръ носовой слизистой оболочки распространяется на зѣвъ, гортань, эвстахіевы трубы, слезные каналы и проч.); 2) черезъ *кровь и лимфу* (напримѣръ при отравленіяхъ, желтухѣ) и 3) по сходству въ строеніи и отправленіяхъ различныхъ органовъ и тканей (напримѣръ при ревматизмѣ, бугорчаткѣ, ракѣ, рожѣ).

Общія разстройства поражаютъ или весь организмъ, или нѣсколько различныхъ органовъ и сочетаній тканей. Тѣ общія болѣзни, при которыхъ измѣняется составъ крови, называются *худосочіями*, напримѣръ блѣдная немочь, цынга; тѣ же, при которыхъ разстройство дѣлается общимъ черезъ посредство крови, воспринимающей при этомъ какое-либо ядовитое вещество, однако, безъ видимаго измѣненія въ своемъ составѣ, изъ органическаго или растительнаго міра, называются *отравленіями* (напримѣръ отравленіе свинцомъ, опіемъ, алкоголемъ) и *заразами* (инфекціями)—если ядъ или болѣзнетворное начало происходитъ отъ больного человѣка (скарлатина, оспа, корь, коклюшъ, тифъ, холера, сифилисъ), или животнаго (сапъ, сибирская язва, водобоязнь).

Кромѣ того болѣзни подраздѣляются на *острыя*, имѣющія весьма быстрое теченіе, сопровождающіяся лихорадкой, по крайней мѣрѣ въ началѣ, и оканчивающіяся выздоровленіемъ

Digitized by Google

или смертью черезъ нѣсколько дней, или много, недѣль (напримѣръ тифъ, воспаленіе легкаго); на *скоротечныя* — такія, которыя также имѣютъ довольно быстрое теченіе, но все-таки менѣе бурное, чѣмъ острыя и длятся отъ нѣсколькихъ недѣль до трехъ мѣсяцевъ (напримѣръ скоротечная чахотка, перемежающаяся лихорадка); на *хроническія*, которыя имѣютъ болѣе или менѣе длительное (отъ нѣсколькихъ мѣсяцевъ до нѣсколькихъ лѣтъ) и болѣе или менѣе ровное теченіе (напримѣръ катарры, ревматизмы, чахотка); на *эндемическія*—свойственныя данной мѣстности (напримѣръ желтая горячка въ Крыму и на Кавказѣ); на *спорадическія*—если данная болѣзнь въ извѣстной мѣстности появляется въ ограниченномъ числѣ заболѣваній (напримѣръ холерина, тифъ во время отсутствія эпидемій), и на *эпидемическія*, если какая-либо болѣзнь, наоборотъ, одновременно поражаетъ въ данной мѣстности большое число людей, напримѣръ при эпидеміяхъ тифа, чумы, холеры.

Внѣшніе признаки, которыми обнаруживается болѣзнь, называются *болѣзненными припадками, симптомами или болѣзненными явленіями*.

Нѣкоторые симптомы непреложно указываютъ на существованіе извѣстнаго разстройства или страданія внутри тѣла, какъ напримѣръ мокрота ржаваго цвѣта при воспаленіи легкихъ. Такіе болѣзненные признаки называются *постоянными симптомами*. Но они немногочисленны, а потому нельзя дѣлать никакого заключенія по одному отдѣльному симптому, а необходимо сопоставлять всѣ имѣющіеся въ наличности симптомы. Послѣдніе подраздѣляются на *прямые* и *косвенные*. Первые находятся въ непосредственной связи съ больнымъ органомъ, напримѣръ цвѣтъ и другія свойства кожи, объемъ органовъ, ихъ твердость или мягкость, гладкость или неровность. *Косвенные* припадки суть слѣдствія извѣстнаго состоянія органовъ, недоступнаго изслѣдованію. Сюда относится пульсъ, въ томъ смыслѣ, что онъ не всегда обусловливается болѣзненнымъ состояніемъ артеріальнаго ствола, но часто страданіями другихъ органовъ; многія видоизмѣненія мочи и пота относятся точно также къ косвеннымъ припадкамъ, напримѣръ

Digitized by Google

болѣзней легкихъ и головного мозга; нѣкоторыя явленія со стороны желудка составляютъ косвенные припадки болѣзней почекъ и т. д.

Далѣе, болѣзненные признаки подраздѣляются на *субъективные и объективные.*

Субъективными называются такіе, которые можетъ замѣтить (чувствовать) самъ больной, напримѣръ боль, тошнота, головокруженіе и т. д.

Изъ числа субъективныхъ припадковъ первое мѣсто занимаетъ *боль,* т. е. неестественное раздраженіе или неестественно усиленная дѣятельность чувствительныхъ нервовъ. Боль принадлежитъ къ такъ называемымъ *ощущеніямъ.* Къ ощущеніямъ, кромѣ боли, относятся: зудъ, ползаніе мурашекъ по кожѣ, содроганіе, усталость, голодъ, жажда, отвращеніе, тошнота и проч., которые, при извѣстныхъ условіяхъ, могутъ доходить до степени боли.

Боль слагается изъ двухъ моментовъ: самого ощущенія боли и проявленія или обнаруженія ея. Для ощущенія боли необходимо, чтобы раздраженіе чувствительныхъ нервовъ безпрепятственно доходило по нимъ до головного мозга и воспринималось имъ. Для проявленія же боли необходима, кромѣ того, способность выражать свои впечатлѣнія посредствомъ рѣчи, звуковъ или движеній.

Объективными болѣзненными признаками называются такіе, которые замѣтны также или только для посторонняго наблюдателя. Они распознаются посредствомъ различныхъ механическихъ и другихъ искусственныхъ пріемовъ.

Способы изслѣдованія болѣзней.

Главные способы изслѣдованія болѣзней суть слѣдующіе:

1) **Перкуссія** или *постукиваніе* употребляется главнымъ образомъ для опредѣленія состоянія легкихъ и сердца, положенія послѣдняго, объема печени, селезенки и почекъ, положенія и величины матки, скопленія кала и газовъ въ кишечномъ каналѣ, пустоты мочевого пузыря или накопленія въ

Digitized by Google

немъ мочи, накопленія воды въ грудной и брюшной полостяхъ (при водянкѣ), а также для опредѣленія объема и свойства нѣкоторыхъ внутреннихъ опухолей (напримѣръ кистъ яичниковъ).

Понятно, что перкуссія можетъ принести пользу при распознаваніи болѣзни только въ такомъ случаѣ, если производящій ее хорошо знаетъ нормальное положеніе и состояніе перкутируемыхъ органовъ и имѣетъ нѣкоторый навыкъ въ этомъ дѣлѣ.

2) **Аускультація** или *выслушиваніе* внутреннихъ шумовъ производится или просто ухомъ, или при помощи особо устроенной трубки (деревянной или металлической), называемой стетоскопомъ. Выслушиваніе играетъ весьма важную роль при распознаваніи грудныхъ болѣзней, особенно легкихъ и сердца, но употребляется также для выслушиванія сосудовъ, напримѣръ шейныхъ или яремныхъ венъ при малокровіи и блѣдной немочи, шумовъ въ кишечномъ каналѣ и полости живота. Выслушиваніе производится въ стоячемъ, въ сидячемъ и въ лежачемъ положеніи.

Легкія, въ здоровомъ состояніи, даютъ при выслушиваніи три звука: одинъ соотвѣтствующій вдыханію или вступленію воздуха въ легочные пузырьки, другой—выходу его изъ нихъ, и третій — обусловливаемый треніемъ проходящаго воздуха о стѣнки дыхательныхъ вѣтвей. Въ болѣзненномъ же состояніи эти звуки или шумы болѣе или менѣе приглушаются, а иногда къ нимъ присоединяются посторонніе шумы и звуки, хрипы и свисты и т. д.

Ясный звукъ, вызывающій представленіе о свободной полости, служитъ достаточнымъ доказательствомъ того, что грудная полость и легкія свободны отъ ненормальныхъ новообразованій или скопленій, напримѣръ, крови, гноя, мокроты, бугорковъ или воды; чѣмъ либо подобнымъ и обусловливается измѣненная звучность.

Тупой или приглушенный звукъ, вызывающій представленіе о полости, звучность которой приглушена, указываетъ на присутствіе скопленій, напримѣръ бугорковъ, чѣмъ и обусловливается притупленіе звука.

Digitized by Google

Звуки, воспринимаемые спереди, сзади и съ боковъ одной половины груди, должны быть тщательно сравниваемы съ звуками на соотвѣтствующихъ мѣстахъ другой стороны; но такъ какъ нормально тупой звукъ получается надъ областью печени, то мы не должны ожидать встрѣтить ясный звукъ ниже шестаго ребра спереди, восьмаго ребра сбоку и непосредственно ниже лопатки сзади, или надъ областью сердца (см. рисунокъ въ концѣ книги).

Приложивъ ухо къ тому мѣсту грудной стѣнки, позади котораго лежитъ *сердце*, можно слышать въ нормальномъ состояніи его два звука, такъ называемые *тоны* сердца. Первый звукъ совпадаетъ съ толчкомъ, т. е. съ сокращеніемъ (систолой) сердца и производится заслонками (двухъ и трехъ-створчатою), колеблющимися подъ давленіемъ на нихъ крови. Второй звукъ производится колебаніями полулунныхъ заслонокъ и слышенъ во время расширенія (діастолы) сердца.

Животъ выслушивается при водянкѣ, скопленіи газовъ въ кишечномъ каналѣ и при воспаленіи брюшины; грудная полость—при воспаленіи подреберной плевы (плевры).

3) **Термометрія**, или *измѣреніе температуры тѣла*. При опредѣленіи температуры тѣла термометромъ, шарикъ его помѣщается въ *подмышковой* ямкѣ, или вводится черезъ задній проходъ въ *прямую кишку*, а у женщинъ при исхудалости—во *влагалище* (понятно, если послѣднія три части не воспалены, такъ какъ въ этомъ случаѣ температура ихъ будетъ выше прочихъ частей тѣла). Самое удобное мѣсто—подмышковая ямка.

Если шарикъ термометра не слишкомъ великъ (приблизительно отъ 3 до 4 лин. въ поперечникѣ), то онъ прогрѣвается въ 10—15 минутъ.

Практически *вѣрность термометра* можно опредѣлить довольно точно такимъ образомъ, что здоровый человѣкъ *нѣсколько разъ* измѣритъ, въ подмышковой ямкѣ, свою температуру, [illegible]дый разъ въ одно и то же время—часъ спустя послѣ [illegible]чняго чая. Если средній выводъ такихъ измѣреній со[illegible]итъ +37 Ц. или нѣсколько меньше, то испытуемый термо[illegible]ръ считается годнымъ.

Digitized by Google

Прежде нежели приложить термометръ, нужно хорошенько вытереть подмышку, чтобы не было пота.

По возрастамъ и поламъ температура у здороваго человѣка слѣдующая: у новорожденнаго ребенка средняя температура равняется 37,4° Ц.; въ первой ваннѣ она понижается среднимъ числомъ на 1° Ц.; а затѣмъ чрезъ 24—36 часовъ температура равняется 37,6° Ц. До юношескаго возраста температура бываетъ постоянна и равняется +37,6° Ц. Температура взрослыхъ мужчинъ отъ 25 до 30 лѣтъ бываетъ среднимъ числомъ 36,9° Ц. Затѣмъ до 80 лѣтъ она постепенно повышается до 37,5° Ц.; но послѣ 80 лѣтъ начинаетъ понижаться.

При измѣреніи температуры необходимо принимать во вниманіе: кровотеченія, потъ, рвоту, обильное горячее или холодное питье, время дня, температуру комнаты и, наконецъ, состояніе желудка.

Измѣренія температуры нужно производить по крайней мѣрѣ два раза въ день—утромъ, между 8 и 10 часами, и вечеромъ между 5 и 7 часами.

Слѣдующая таблица, составленная по проф. Вундерлиху, показываетъ температуру тѣла въ здоровомъ и больномъ состояніи у взрослыхъ:

I.	1. Нормальное состояніе температуры	отъ +36°	до	37,6°	Ц.
	2. Нормальное состояніе близкое къ лихорадочному	» +37,6°	»	38°	Ц.
II.	Выше нормальнаго:				
	1. Легкая лихорадка	отъ +38°	до	38.4°	Ц.
	2. Умѣренная лихорадка	» +38,5	»	39°	Ц.
	3. Значительная лихорадка	» +39,5	»	40,5	Ц.
	4. Высокая степень лихорадки . .	» +40,5	Ц. и выше.		
	5. Вѣроятность смертельнаго исхода	» +41,75	до	42,5	Ц.
III.	Ниже нормальнаго состоянія:				
	1. Умѣренный упадокъ силъ . . .	» +35°	»	36°	Ц.
	2. Упадокъ силъ, при которомъ еще возможно выздоровленіе .	» +35,5	»	35°	Ц.
	3. Смертельный упадокъ силъ . .	ниже		33°	Ц.

4) Изслѣдованіе пульса. При этомъ изслѣдованіи, къ пульсу (лучевой артеріи около кисти) любой руки больного прикладываются кончики указательнаго и средняго пальцевъ правой

Digitized by Google

руки, большой же палецъ долженъ приходиться на тыльной поверхности послѣдней.

Пульсъ происходитъ отъ расширенія, которое претерпѣваютъ артеріи вслѣдствіе массы крови, вливающейся въ нихъ при каждомъ сокращеніи сердца, и отъ самостоятельнаго сжиманія артерій, слѣдующаго тотчасъ за приливомъ въ нихъ крови изъ сердца. Артеріи при этомъ дѣлаются немного шире и длиннѣе. *Расширеніе* ощущается подъ видомъ біенія пульса, въ легко доступныхъ артеріяхъ, въ особенности въ лучевой; *увеличеніе артерій въ длину* всего лучше можно видѣть на височной артеріи по причинѣ большой ея извилистости.

Пульсъ служитъ среднимъ мѣриломъ здоровья, такъ:

1. Здоровый *пульсъ младенца*, до начала періода прорѣзыванія зубовъ, можетъ быть опредѣленъ отъ 100 до 120 ударовъ въ минуту, смотря по тому—крѣпкій или слабый ребенокъ; у *крѣпкаго ребенка* пульсъ обыкновенно менѣе частый, но болѣе сильный.

2. Здоровый *пульсъ ребенка ниже семилѣтняго возраста*, начиная съ періода прорѣзыванія зубовъ, можетъ быть опредѣленъ отъ 86 до 96 ударовъ въ минуту.

3. Здоровый *пульсъ ребенка отъ 7-ми до 14-ти лѣтъ* равняется отъ 80 до 86 ударовъ въ минуту.

4. Здоровый *пульсъ у взрослаго мужчины* средняго сложенія и роста долженъ быть умѣренно полный, ровный и правильный отъ 70 до 75 ударовъ въ минуту. Если нормальный пульсъ будетъ медленнѣе или быстрѣе этого, то это можно принять за личную особенность, потому что въ литературѣ извѣстны случаи, гдѣ пульсъ взрослаго мужчины колебался отъ 30 до 35 ударовъ въ минуту. Извѣстно, что у *маленькихъ дѣтей* пульсъ равняется иногда 140—150 ударамъ въ минуту. Если при этомъ температура нормальна, кожа влажная и не краснѣе обыкновеннаго, то это не есть признакъ заболѣванія.

5. Здоровый *пульсъ у взрослой женщины* равняется 80—85 ударамъ въ минуту; не можетъ быть, конечно, никакого сомнѣнія въ томъ, что пульсъ взрослой женщины, по силѣ и пол-

Digitized by Google

нотѣ, не можетъ быть равенъ пульсу взрослаго мужчины, и нельзя придавать большого значенія случайнымъ возбужденіямъ пульса у чрезвычайно нервныхъ женщинъ.

6. Здоровый *пульсъ первой степени увяданія жизни* можетъ быть опредѣленъ вообще для мужчины 70 ударовъ, а для женщины 75 ударовъ въ минуту.

7. Здоровый *пульсъ второй степени увяданія жизни* или старости — для мужчины 55 — 65 ударовъ, а для женщины 65—75 ударовъ въ минуту.

Частота и правильность пульса зависитъ отъ сердца; если сердце сокращается у взрослаго до 80 разъ въ минуту, то такой пульсъ—*частый*, если число ударовъ пульса въ минуту отъ 59 до 65, то такой пульсъ—*рѣдкій*.

Правильность пульса нарушается трояко: 1) когда сокращеніе сердца совершенно пріостанавливается, тогда *пульсъ* будетъ *перемежающимся*, 2) когда паузы не одинаковы, то *пульсъ* дѣлается *неритмическимъ*, неправильнымъ (такъ называемые перебои) и 3) если величины двухъ пульсовыхъ волнъ, слѣдующихъ другъ за другомъ, бываютъ не одинаковы, то *пульсъ* будетъ *нервный*.

Пульсъ учащается при лихорадкѣ, а также отъ рода пищи и напитковъ, высокой температуры воздуха, уменьшенія воздушнаго давленія, ускореннаго дыханія, душевныхъ потрясеній, большихъ движеній и пониженія температуры тѣла при воспалительныхъ процессахъ. Такъ что собственно по одному лишь пульсу нельзя судить объ уклоненіяхъ частоты его, если до того времени не была извѣстна нормальная его частота. Пульсъ также бываетъ различенъ до и послѣ ѣды.

5) Ощупываніе (пальпація) тѣла и внутреннихъ органовъ. Оно употребляется для опредѣленія какъ всѣхъ наружныхъ болѣзней (опухолей, наростовъ и т. д.), такъ и положенія, припухлости, мягкости или плотности и проч. внутреннихъ органовъ, а также для опредѣленія того же въ новообразованіяхъ внутри тѣла. Поверхностныя части тѣла ощупываются всей рукой, однимъ или нѣсколькими пальцами (напримѣръ для опредѣленія зыбленія въ нарывѣ или опухоли, натянутости

Digitized by Google

кожи и т. д.). Изъ внутреннихъ органовъ преимущественно такъ изслѣдуются брюшныя внутренности (печень, селезенка, кишки, матка и проч.). Больной долженъ лечь при этомъ на спину или на бокъ, правый или лѣвый, смотря по тому, какой органъ подвергается изслѣдованію (т.-е. если изслѣдуется печень, то больной ложится на лѣвый бокъ, если селезенка—то на правый и т. д.) и согнуть ноги въ колѣняхъ, чтобы такимъ образомъ ослабить стѣнки живота. Изслѣдующій становится сбоку и, положивъ обѣ руки ладонною поверхностью на животъ въ противоположномъ концѣ отъ изслѣдуемаго органа (напримѣръ, если изслѣдуется печень, то начать съ нижней части живота), или на самую изслѣдуемую часть (напримѣръ при изслѣдованіи кишекъ), постепенно пожимая его, идетъ вверхъ или внизъ, и при изслѣдованіи плотныхъ (паренхиматозныхъ) органовъ (печени, селезенки, матки), равно какъ опухолей, старается ощущать ихъ края или очертанія.

6) Изслѣдованіе пальцемъ. Пальцемъ изслѣдуются полости рта, носа, передней части заднепроходной кишки, влагалища, рукавной части матки, а также надгортанникъ. Изслѣдованіе производится обыкновенно указательнымъ пальцемъ, который смазывается прованскимъ или деревяннымъ масломъ и вводится въ прямую кишку и влагалище.

7) Изслѣдованіе зондомъ производится для опредѣленія состоянія нѣкоторыхъ полыхъ органовъ (матки, мочевого пузыря), каналовъ, ранъ и свищей. Для этого употребляется металлическій (преимущественно) и гуттаперчевые зонды (тонкіе прутики), которые бываютъ полыми и не полыми.

8) Изслѣдованіе посредствомъ разныхъ снарядовъ: гортаннаго, маточнаго и проч. зеркалъ, производится для опредѣленія состоянія полостей и органовъ, недоступныхъ простому глазу (влагалищной части матки, влагалища, гортанной полости, глаза, уха, задней части носовой полости и проч.). Всѣхъ роще изслѣдованіе влагалищной части матки и влагалища при омощи маточнаго зеркала; изслѣдованіе же прочихъ полостей і органовъ довольно затруднительно и требуетъ извѣстнаго навыка, почему они могутъ производиться только опытнымъ врачемъ.

Digitized by Google

9) Взвѣшиваніе тѣла употребляется для опредѣленія разницы между вѣсомъ тѣла во время теченія болѣзни, послѣ ваннъ и т. д.

10) Измѣреніе тѣла производится довольно рѣдко. Для такихъ измѣреній служитъ особенная тесьма, раздѣленная на дециметры и сантиметры. Посредствомъ него опредѣляется степень увеличенія извѣстныхъ полостей (напримѣръ живота—при водянкѣ и проч.), и объема органовъ (напримѣръ, печени). Для измѣренія, больного опоясываютъ тесьмой на данныхъ мѣстахъ тѣла (какъ портные снимаютъ мѣрку), отмѣчаютъ полученное число сантиметровъ, затѣмъ повторяютъ измѣреніе на другой день и т. д.

11) Микроскопическое изслѣдованіе въ извѣстныхъ случаяхъ (при раковыхъ новообразованіяхъ, глистахъ, бугорчаткѣ) доставляетъ самые точные результаты. Микроскопическому изслѣдованію подвергаются: мокрота, извергаемое рвотой, моча, испражненія (калъ), гной, кровь; кусочки мяса, извлекаемые посредствомъ особеннаго инструмента, называемаго гарпуномъ (особенно при трихинной болѣзни), различныя плевы и перепонки, отдѣляющіяся отъ тѣла (напримѣръ стѣнки кистъ матки), содержимое язвъ, нарывовъ, опухолей и проч.

12) Химическое изслѣдованіе или *химическій анализъ* употребляется для опредѣленія химическаго состава различныхъ выдѣленій и отдѣленій, нормальныхъ (т. е. естественныхъ) и болѣзненныхъ, какъ-то: слюны, слизи, мокроты, извергаемаго рвотой, испражненій (кала), мочи, пота, крови, гноя, содержимаго опухолей, кистъ и т. д. Химическій составъ узнается отъ прибавленія къ испытуемой жидкости извѣстныхъ химическихъ веществъ, такъ называемыхъ реагентовъ, отъ которыхъ присутствіе постороннихъ веществъ обнаруживается или осажденіемъ ихъ, или особеннымъ окрашеніемъ изслѣдуемой жидкости.

Возрастъ и соотвѣтствующія болѣзни.

Человѣческая жизнь раздѣляется на семь отдѣльныхъ періодовъ, ихъ коихъ дѣтство обнимаетъ три, зрѣлый возрастъ два и старческій—два періода.

Digitized by Google

1. *Первый періодъ* младенчества, простирающійся *до времени перваго прорѣзыванія зубовъ*, чрезвычайно чувствителенъ къ внѣшнимъ вліяніямъ и до нѣкоторой степени ко всякому неожиданному раздраженію отъ незначительной причины, *мозгъ* особенно расположенъ къ приливамъ крови, и сильная чувствительность всей нервной системы вообще дѣлаетъ спазмодическія и конвульсивныя страданія преобладающими. Дѣти въ этомъ возрастѣ расположены къ поносамъ и къ слабости всасывающаго аппарата, выражающейся атрофіей или изнуреніемъ.

2. *Во второмъ періодѣ*, простирающемся въ нашемъ климатѣ *до семилѣтняго возраста*, слѣдуетъ опасаться воспаленій дыхательныхъ органовъ, мозга, нервной системы и неправильнаго развитія отдѣльныхъ частей тѣла.

3. *Въ третьемъ періодѣ дѣтства*, простирающемся въ нашемъ климатѣ *до 14-го года*, равновѣсіе между физическими отправленіями и умственными способностями уже лучше установилось, ткани менѣе чувствительны къ внѣшнимъ вліяніямъ, и вышеозначенныя болѣзни надо разсматривать въ связи съ вліяніемъ тѣлосложенія, обстоятельствъ, личныхъ привычекъ, занятій, спеціальнаго положенія и другихъ мѣстныхъ и общихъ причинъ.

4. *Въ періодѣ* приближенія и развитія *возмужалости*, простирающемся въ нашемъ климатѣ *до 25-го года*, энергія всего организма должна находиться въ полномъ развитіи. Мы должны предвидѣть возможность серьезнаго развитія скрытаго или явнаго худосочія и расположенія къ наслѣдственнымъ болѣзнямъ.

5. *Періодъ зрѣлости*, простирающійся въ нашемъ климатѣ *отъ 25-го до 45-го года*, долженъ быть разсматриваемъ по отношенію къ привычкамъ, образу жизни, занятіямъ, обитаемой мѣстности и климатическимъ перемѣнамъ. Всѣ эти обстоятельства естественно ведутъ къ продленію или сокращенію срока здоровой возмужалости, въ нѣкоторыхъ случаяхъ онъ простирается до 55-го года, а въ иныхъ—ограничивается 35-ю годами.

Digitized by Google

6. *Первый періодъ увяданія*, который простирается въ нашемъ климатѣ *отъ 45-го до 55-го года*, можетъ обнаружиться уменьшеніемъ тѣлесной и душевной дѣятельности, появленіемъ неправильностей въ жизненныхъ отправленіяхъ, ослабленіемъ силъ и выносливости, возвращеніемъ воспріимчивости къ внѣшнимъ вліяніямъ и постепеннымъ угасаніемъ энергіи у обоихъ половъ.

7. *Второй періодъ увяданія* или *старость* начинается въ нашемъ климатѣ *между 50-ю и 60-ю годами*, иногда раньше или позже, смотря по предшествовавшимъ обстоятельствамъ. Онъ характеризуется уменьшеніемъ силы умственныхъ способностей и ослабленіемъ органовъ чувствъ: зрѣнія, слуха, обонянія и вкуса, кромѣ того притупленіемъ душевной воспріимчивости, ослабленіемъ воли, истощеніемъ тѣла, уменьшеніемъ физическихъ силъ, коченѣлостью связокъ мускуловъ, сухостью и морщиноватостью кожи, разстройствомъ кровообращенія и т. п.

Вмѣстѣ съ тѣмъ возрастъ долженъ быть разсматриваемъ по отношенію къ прежнему здоровью, къ климату, образу жизни, привычкамъ, занятію или ремеслу больного, которые могутъ быть причиною его болѣзни или ее поддерживать; также принять въ соображеніе здоровье родителей, жилище, пищу и наслѣдственныя болѣзни. Относительно женщины, достигшей половой зрѣлости, обратить вниманіе на ея регулы; если она замужняя, то не беременна ли она; если рожала, то какіе были роды—легкіе или тяжелые; если имѣетъ грудного младенца, то сама ли кормитъ его грудью?

При болѣзни грудного ребенка имѣть въ виду родъ его пищи и прорѣзываніе зубовъ.

ГЛАВА IX.

Выборъ лѣкарства по тѣлосложенію и темпераменту.

Подробно о тѣлосложеніяхъ сказано въ главѣ VII. Мы видѣли тамъ, что источникъ жизни кроется въ крови и лимфѣ.

Digitized by Google

Изъ 10 случаевъ—въ девяти причина болѣзни, въ какой бы формѣ послѣдняя не проявлялась, заключается въ испорченности лимфы, и лишь въ одномъ случаѣ — въ испорченности крови или той и другой вмѣстѣ.

Такимъ образомъ имѣются лишь три основныя болѣзнетворныя причины, соотвѣтственно тремъ категоріямъ больныхъ: лимфатической, анжіоитической и смѣшанной.

На практикѣ вопросъ сводится главнымъ образомъ къ тому, анжіоитикъ ли больной или нѣтъ. Если онъ анжіоитикъ, то средства его—*Анжіоитики*, какая бы ни была форма болѣзни. Если больной не имѣетъ никакихъ признаковъ, характеризующихъ анжіоитическое тѣлосложеніе, то онъ безусловно лимфатикъ и его средства—*Скрофолозы*, какая бы ни была форма болѣзни.

Если при одномъ или другомъ анжіоитическомъ признакѣ имѣются также признаки, свойственные лимфатизму, какъ опухоли, увеличенныя железы, накожныя сыпи и проч., то это доказываетъ, что испорчены и кровь и лимфа, что болѣзненное состояніе смѣшанное; въ такихъ случаяхъ примѣняются *Скрофолозы* и *Канчерозы* попеременно съ *Анжіоитиками*.

Обыкновенно едва-ли можетъ представиться затрудненіе въ рѣшеніи вопроса, выбрать-ли *Скрофолозы* или *Канчерозы*. Если у больного имѣется ослизненіе, или же нагноеніе железъ, злокачественныя золотушныя язвы, затвердѣнія, холодные нарывы, ракъ, то основные цѣлебные специцифики надо искать въ серіи *Канчерозовъ;* прочія средства могутъ быть вспомогательными, они могутъ мѣняться, но никогда не должны быть исключены *Канчерозы*.

Вотъ тѣ основныя правила, которыми надо руководствоваться въ случаяхъ болѣзней, вполнѣ выраженныхъ.

Но бываютъ случаи, не до такой степени ясные, и если имѣется сомнѣніе въ томъ, есть-ли данное тѣлосложеніе лимфатическое или анжіоитическое, то лѣчить его надо, какъ тѣлосложеніе смѣшанное.

Для опредѣленія тѣлосложенія необходимо выяснить, между прочимъ, прежнее состояніе здоровья, болѣзни, какія были въ

Digitized by Google

дѣтствѣ или въ періодѣ созрѣванія, равно какъ и ближайшія причины заболѣванія. Весьма важныя указанія могутъ дать и состояніе здоровья и болѣзни родителей, въ виду несомнѣнно существующей наслѣдственной передачи.

Лѣченіе болѣзней у желчныхъ и нервныхъ субъектовъ основывается на совмѣстномъ употребленіи *Фебрифуго*, *Скрофолозо* и *Анжіоитико*, которыя будутъ для нихъ одинаково необходимыми лѣкарствами, и въ такой степени, что каждое изъ нихъ, употребленное отдѣльно, произведетъ только нѣкоторое улучшеніе, которое скоро и прекратится. Но здѣсь нужно различать степень симптомовъ сангвиническаго темперамента: чѣмъ послѣдніе значительнѣе, тѣмъ въ болѣе слабой дозѣ и въ меньшемъ количествѣ должно быть употреблено Анжіоитико.

Если болѣзнь не улучшается отъ *Фебрифуго*, *Скрофолозо* и *Анжіоитико*, то точно также прибавляютъ *Канчерозо*, попеременно съ двумя изъ нихъ.

Затѣмъ, когда болѣзнь, не взирая на тѣлосложеніе и на темпераментъ, входитъ въ кругъ дѣйствія одного изъ спеціальныхъ лѣкарствъ *Фебр.*, *Пет.*, *Верм.* или *Вен.*, тогда спеціальное средство принимаютъ одно, или смотря по обстоятельствамъ, съ однимъ или двумя изъ главныхъ лѣкарствъ до совершеннаго прекращенія болѣзни; послѣ чего его оставляютъ и тогда остаются главными фундаментальными средствами для совершеннаго возстановленія здоровья: лимфатику *Скрофолозо*, сангвинику *Анжіоитико*, а прочимъ *Скрофолозо* вмѣстѣ съ *Анжіоитико*.

Не надо быть ученымъ докторомъ, чтобы умѣть отличить разстройство, напримѣръ, желудка отъ болѣзней дыхательныхъ органовъ, или болѣзни глазъ и вѣкъ отъ болѣзни ушей, накожныя сыпи отъ болѣзни костей, страданія сердца отъ болѣзни языка и т. д. Если же встрѣтится случай неясный, то онъ обыкновенно остается таковымъ и для врачей, такъ что нѣсколько врачей даютъ и нѣсколько діагнозовъ.

Громадное же преимущество электрогомеопатіи заключается въ томъ, что даже въ сомнительныхъ случаяхъ она не безсильна; она назначаетъ на нѣкоторое время одно изъ сво-

Digitized by Google

ихъ главныхъ средствъ, и если оно не окажется спецификомъ, то оно по крайней мѣрѣ укажетъ путь къ нахожденію таковаго. Такимъ главнымъ средствомъ является въ большинствѣ случаевъ *Скролофозо* 1 и 5.

Особенно часто ставятъ втупикъ болѣзни печени и селезенки, а также страданія, вызываемыя глистами, особенно солитеромъ. Такіе случаи становятся ясными послѣ примѣненія *Вермифуго* 1 внутрь и *Фебрифуго* 2 наружно.

Упорство нѣкоторыхъ пораженій зависитъ иной разъ отъ скрытаго или наслѣдственнаго сифилиса. Въ случаѣ сомнѣнія *Венерео* попеременно съ подходящимъ главнымъ средствомъ разъясняетъ дѣло. Объ этомъ надо подумать особенно при ракѣ, затвердѣніяхъ и подозрительныхъ язвахъ. Надо однако помнить, что *Канчерозо* 1 есть спецификъ противъ застарѣлаго сифилиса.

Въ этомъ случаѣ надо руководствоваться успѣшностью результата. Если средства, хорошо и правильно выбранныя, остаются безуспѣшными, то можно быть увѣреннымъ, что имѣютъ дѣло съ *дѣйствительно неизлѣчимымъ* случаемъ. Бываютъ, конечно, такіе случаи, и хотя электро-гомеопатія въ состояніи еще и тутъ приносить облегченіе, но *невозможнаго* она сдѣлать не можетъ. Она производитъ лишь *возможныя чудеса* излѣчиваніемъ даже отчаяннѣйшихъ болѣзней, въ которыхъ аллопатія оказывается совершенно безсильной, но только при томъ условіи, если къ электро-гомеопатіи прибѣгаютъ раньше, чѣмъ успѣла испортиться вся масса крови, а не тогда, когда уже совершенно разрушены ткани и органы.

Тутъ предѣлъ вліянія электро-гомеопатіи, какъ и вообще силы человѣческой.

Digitized by Google

ГЛАВА X.

Выборъ дозы, продолжительность опыта и самаго лѣченія.

О дозахъ неоднократно уже упоминалось выше при описаніи лѣкарствъ вообще и дифференціальныхъ (отличительныхъ) свойствъ каждой серіи ихъ (см. гл. II и III), равно какъ и въ главѣ IV. Такъ какъ вопросъ о дозировкѣ лѣкарствъ играетъ въ электро-гомеопатіи первенствующую роль, то нелишне разсмотрѣть ее еще въ отдѣльной статьѣ, въ связи съ продолжительностію опыта и лѣченія и сдѣлать еще нѣкоторыя дополненія.

Выборъ дозы зависитъ отъ *пола*, *возраста*, *воспріимчивости больного* и отъ *степени болѣзни*. Въ особенности же должно наблюдать *за результатами дѣйствія лѣкарствъ*.

Если представляется мужчина взрослый, сильный, то ему назначается доза изъ перваго стакана, какъ наиболѣе соотвѣтствующая въ большинствѣ случаевъ. Если это женщина, и въ особенности женщина нервная, ослабленная, или люди престарѣлые, или дѣти отъ 2-хъ до 12-ти лѣтъ, то имъ назначается доза изъ втораго стакана.

Нервнымъ особамъ, въ хроническихъ болѣзняхъ, лѣкарства назначаются въ слабыхъ дозахъ.

На людей вялыхъ, флегматичныхъ, сонливыхъ слабыя дозы, часто повторяемыя, не производятъ никакого дѣйствія, тогда какъ большіе глотки, даже по полустакану, прежде чѣмъ лечь спать, сразу производятъ видимо хорошее дѣйствіе.

Степень болѣзни. Общее правило заключается въ томъ, что, чѣмъ сильнѣе болѣзнь, тѣмъ должно быть *слабѣе* разведеніе лѣкарства и чаще должны быть пріемы его. И наоборотъ, по мѣрѣ того, какъ болѣзнь слабѣетъ—лѣкарство усиливаютъ, промежутки же между пріемами удлиняютъ. Слабые растворы усиливаютъ или уменьшеніемъ количества воды опредѣленнаго на одну крупинку, или прибавленіемъ двухъ крупинокъ на одинъ стаканъ воды, смотря по надобности. Но

Digitized by Google

опредѣлить съ точностью ни сильныхъ, ни слабыхъ дозъ, невозможно, потому что все зависитъ отъ организмовъ, которые до безконечности разнообразны. Это уже предоставляется личному усмотрѣнію врачующаго и наблюдающаго результаты дѣйствій лѣкарства. Бываютъ случаи, въ которыхъ можно доходить до самыхъ сильныхъ дозъ и получать блестящіе результаты.

Воспріимчивость больного. Если болѣзнь, при соотвѣтственномъ лѣкарствѣ *усиливается*, то слѣдуетъ *ослабить* дозы. Неудачно выбранное противъ болѣзни лѣкарство не произведетъ никакого дѣйствія. Усиленіе болѣзни служитъ лучшимъ доказательствомъ, что лѣкарство найдено, но что доза только неправильно назначена. Дѣйствіе лѣкарства несомнѣнно и не можетъ обманывать, лишь бы болѣзнь входила въ кругъ дѣйствія того лѣкарства, которое избрано, и если при этомъ органъ, необходимый для жизни, безвозвратно не разрушенъ; каждое испытаніе, неизбѣжное во всякомъ случаѣ, становится довольно легкимъ при практикѣ, которая безконечно важнѣе и болѣе полезна, чѣмъ всѣ теоріи, и изъ практики убѣдятся, что одно и то же лѣкарство въ разныхъ дозахъ представляетъ столько же различныхъ лѣкарствъ. Это подтверждается дифференціальнымъ свойствомъ крупинокъ въ различныхъ дозахъ (см. гл. IV).

Самое существенное—это умѣть хорошо различить, къ какому тѣлосложенію принадлежитъ больной, безъ этого нельзя сдѣлать ничего хорошаго; часто сама болѣзнь, а иногда и лѣкарство способствуютъ этому распознаванію (См. гл. IX).

Такъ какъ не всегда возможно опредѣлить продолжительность опыта, то вотъ общее правило, котораго слѣдуетъ держаться: если лѣкарство не дѣйствуетъ послѣ пріема нѣсколькихъ чайныхъ ложекъ по одной чрезъ 5—15 минутъ въ продолженіе не болѣе трехъ часовъ при острой болѣзни, сопровождающейся болью и лихорадкой (напр. воспаленіе легкихъ или брюшины, или гортани), или въ продолженіе не болѣе 12 часовъ при простой и неопасной болѣзни, или въ теченіе восьми дней при хронической или застарѣлой болѣзни, или если лѣкарство продолжаетъ безпокоить больного, несмотря на уменьшенную дозу, то это доказываетъ, что оно не специфическое средство про-

Digitized by Google

тивъ этой болѣзни, и тогда его замѣняютъ другимъ. При этомъ, кромѣ того, нужно соображаться съ внѣшними вліяніями или съ другими, которыя вызываютъ появленіе нѣкоторыхъ періодическихъ симптомовъ. Напримѣръ, нѣкоторые изъ нихъ появляются у женщины только во время регулъ, другіе же по той или другой причинѣ являются каждые 15 дней. Въ подобномъ случаѣ очевидно опытъ долженъ быть продолженъ до появленія этихъ симптомовъ, ослабленіе или усиленіе которыхъ должно служить руководствомъ, потому что послѣдствіе лѣченія можетъ быть только тогда замѣчено.

Въ случаѣ неудачи, нужно принять *Верм.* 1 или еще *Венер.* утромъ и вечеромъ по 10 круп. въ рюмкѣ воды въ одинъ пріемъ, продолжая при томъ принимать прежнее лѣкарство, потому что доказано, что если болѣзнь упорствуетъ, не смотря на то, что лѣкарство и дозы избраны правильно, то есть присутствіе глистовъ, если только не сифилиса.

Усиленіе, происшедшее отъ сильныхъ дозъ, хотя и не продолжительно, но больной при этомъ испытываетъ безпокойныя ощущенія. Уменьшеніемъ дозы можно прекратить эти недуги, но умѣнье опредѣлить дозу достигается только ежедневною практикою.

Для прекращенія недуга, происшедшаго отъ сильныхъ дозъ, достаточно размѣшать двѣ капли того самаго лѣкарства, отъ котораго произошло усиленіе, въ цѣломъ стаканѣ воды въ 6 унцій, и изъ него принимать по чайной ложкѣ каждыя пять минутъ. Чрезъ 10 или 15 минутъ усиленіе, если оно дѣйствительно произошло отъ лѣкарства, прекратится.

Мѣсячныя очищенія нисколько не должны препятствовать началу и продолженію лѣченія; напротивъ, въ этотъ періодъ дѣйствіе каждаго лѣкарства усиливается, лишь бы не входило въ лѣченіе *Анж.* Въ этомъ случаѣ *Анж.* должно быть оставлено, потому что въ обыкновенной дозѣ оно употребляется противъ остановки регулъ, а въ слабыхъ дозахъ противъ обильныхъ регулъ и противъ кровотеченія вообще. Слѣдовательно, при *ненормальныхъ* регулахъ можетъ быть употреблено и *Анж.* въ соотвѣтствующей дозѣ. То же самое должно сказать

Digitized by Google

о внутреннемъ употребленіи *Эл. Анж.* и *Линф.* Но наружно эти лѣкарства при регулахъ можно употреблять во всякомъ случаѣ.

Наблюденія показываютъ, что въ сложныхъ болѣзняхъ только совокупное дѣйствіе нѣсколькихъ лѣкарствъ можетъ уничтожить различныя болѣзненныя проявленія въ больныхъ частяхъ организма. А потому приходится часто принимать попеременно *два*, даже *три* лѣкарства въ день. Въ такихъ случаяхъ, каждое лѣкарство приготовляется въ соотвѣтствующей дозѣ и въ отдѣльныхъ стаканахъ и изъ каждаго стакана принимаютъ по половинѣ или по одной трети стакана въ день, не сразу, а по чайной ложкѣ, или по глотку, какъ выше сказано, но *всего не болѣе одного стакана въ день.*

Въ хроническихъ болѣзняхъ, когда принимаютъ два или три лѣкарства, то допускается принимать одинъ день одно лѣкарство, на второй день второе и на третій день третье лѣкарство. Но въ острыхъ болѣзняхъ, напротивъ, если принимаютъ три лѣкарства, то ихъ нужно принять въ одинъ день по трети стакана каждаго такимъ образомъ: въ первые три часа дня одно лѣкарство, въ слѣдующіе три часа другое лѣкарство и третье лѣкарство въ остальное время дня; если принимаютъ два лѣкарства, то одно выпиваютъ до обѣда, а другое послѣ обѣда. Промежутокъ времени при переходѣ отъ одного къ другому лѣкарству полагается не менѣе пяти минутъ.

Еще способъ попеременнаго употребленія лѣкарствъ, и котораго слѣдуетъ придерживаться по преимуществу, состоитъ въ послѣдовательномъ пріемѣ двухъ или трехъ лѣкарствъ, одного послѣ другого, чрезъ каждыя 5, 10 или 15 минутъ, по чайной ложкѣ. Дѣйствіе лѣкарствъ мгновенное, такъ что если чрезъ пять минутъ послѣ пріема одного лѣкарства примутъ другое, то дѣйствіе перваго уже достигнуто, и никогда не нарушается пріемомъ другого лѣкарства. Этотъ послѣдній способъ употребленія лѣкарствъ приноситъ большую пользу въ болѣзняхъ, сопровождающихся мучительною болью.

Когда представляется надобность принимать четыре лѣкарства въ день, то четвертое принимаютъ въ сухихъ крупинкахъ отъ одной до пяти въ одинъ пріемъ, одинъ или три раза въ день, или по одной каждый часъ.

Digitized by Google

Если въ лѣченіе входитъ *Скроф.*, то его принимаютъ послѣднимъ, въ томъ предположеніи, что прочія лѣкарства взволновали больного; *Скроф.* же его успокоитъ и будетъ способствовать хорошему сну. Если входитъ *Анж.*, иногда волнующее, то его принимаютъ первымъ.

Въ умѣренномъ или въ холодномъ климатѣ, какъ подтверждаютъ наблюденія и опыты, лѣкарство дѣйствуетъ сильнѣе, а потому дозы должны быть слабѣе, чѣмъ въ жаркомъ климатѣ, и наоборотъ.

Для того, чтобы отыскать настоящую дозу для больного чувствительнаго и слабаго, лучше всего начинать лѣченіе слабой дозой и постепенно усиливать ее.

Бываютъ болѣзни, при которыхъ *слабыя дозы* всегда *дѣйствуютъ вѣрнѣе*. Какъ напримѣръ: *аневризма, всѣ органическія болѣзни сердца* (*въ особенности при водянкѣ*) и *нѣкоторыя конвульсивныя болѣзни*, особенно *истерика и падучая болѣзнь*. Въ этихъ случаяхъ растворяютъ одну крупинку въ *литрѣ воды* [1]) и даютъ не болѣе 3—4 *ложечекъ въ день*. Это даже еще сильная доза, такъ какъ часто даютъ изъ 2-го или 3-го стакана. Въ другихъ случаяхъ даютъ очень сильныя дозы, напримѣръ въ холерѣ или при обмираніяхъ отъ 25 до 30 крупинокъ прямо на языкъ.

Во многихъ болѣзняхъ даютъ по 3—5 сухихъ круп. *Скроф.* 2—3 раза въ день для подкрѣпленія силъ, въ особенности лимфатику.

Если лѣкарство, принимаемое внутрь, приноситъ пользу, то нужно употреблять его и наружно, т. е. стараться насытить все тѣло медикаментомъ, что при лѣченіи приноситъ громадную пользу. Наилучшимъ и при томъ наиболѣе простѣйшимъ къ тому способомъ представляются теплыя лѣкарственныя ванны, при чемъ ванны изъ *Канч.* 5 весьма полезны во всѣхъ болѣзняхъ какъ для лимфатиковъ, такъ и для сангвиниковъ. Но при этомъ необходимо обращать вниманіе, какъ

---

[1]) Литръ равняется почти обыкновенному нашему полуштофу, т. е. $6^2/_3$ чарки или четыремъ стаканамъ.

Digitized by Google

о томъ уже выше сказано, чтобы ванны не ослабляли и не разстраивали больного. Опытомъ доказано, что однѣ и тѣ же крупинки, употребленныя въ ваннахъ противъ однородныхъ болѣзней, однимъ больнымъ приносятъ болѣе пользы, чѣмъ другимъ, а на иныхъ вовсе не дѣйствуютъ, что́ происходитъ отъ безконечнаго разнообразія организмовъ или отъ осложненія болѣзней.

Черезмѣрное дѣйствіе лѣкарства можно ослабить приложеніемъ *Эл. Кр.* или *Эл. Син.* къ затылку, сплетенію и симпатическому нерву. Уксусъ и лимонъ, положенные на языкъ, имѣютъ свойство́ уничтожать дѣйствіе лѣкарствъ, т. е. служатъ *антидотами*; но эти кислоты имѣютъ то неудобство, что послѣ нихъ нельзя продолжать лѣченіе въ продолженіи около 2 часовъ.

При уменьшеніи внутреннихъ дозъ часто цѣлесообразно бываетъ уменьшеніе ихъ и при наружномъ примѣненіи; для такихъ случаевъ мы даемъ слѣдующую *приблизительную* соразмѣрность дозы:

Внутрь:	1-й стак.	2-й стак.	3-й стак.	4-й стак.
Наружное:				
Примочка				
Обмываніе				
Вспрыскиваніе				
Втягиваніе				
Спринцованіе				
Клистиры.	20 круп.	15 круп.	10 круп.	5 круп.
Полосканіе				
Пульверизація				
Мазь				
Ванна	100 круп.	75 круп.	50 круп.	25 круп.

Имѣющіяся уже или же готовыя мази и прочіе наружные препараты можно ослаблять такимъ образомъ, что, напримѣръ, изъ мази, состоящей изъ 20 круп. лѣкарства и 20 капель электр. жидкости, берутъ 3 части и смѣшиваютъ съ одной частію жира или 2 части ея съ 2-мя частями или 1 ея часть съ 3 частями жира. Если растворъ жидкій, то поступаютъ такъ же, только вмѣсто жира берутъ воду и т. д.

Digitized by Google

Само собою разумѣется, что для выбора каждой дозы всякій долженъ руководиться производимымъ дѣйствіемъ.

Во многихъ случаяхъ не доставало настойчивости слѣдовать этому правилу соразмѣрности дозъ (тогда какъ новѣйшіе опыты подтверждаютъ эту необходимость), и только этому можно приписать бывшія неудачи. Будемъ надѣяться, что настоящее указаніе поставитъ на путь выздоровленія многихъ обезкуражившихся больныхъ. Слѣдуетъ безпрестанно припоминать рекомендуемое графомъ Маттеи правило: «*чѣмъ труднѣе поддается болѣзнь, тѣмъ болѣе нужно разводить лѣкарство*».

Слабыя дозы нисколько не уменьшаютъ силы дѣйствія лѣкарства. Онѣ только болѣе соотвѣтствуютъ слабому состоянію больного.

Необходимость принимать лѣкарство *чайными* ложечками вытекаетъ изъ факта, опытомъ доказаннаго, что каждое лѣкарство, принятое залпомъ, значительно теряетъ въ своемъ цѣлебномъ дѣйствіи.

Точно также изъ опыта извѣстно, что при наружномъ употребленіи крупинокъ, нѣкоторымъ организмамъ лучше соотвѣтствуютъ примочки, а другимъ мази. Тутъ необходимо пробовать и наблюдать за послѣдствіями.

Считаемъ нужнымъ присовокупить, что исцѣленія, болѣе или менѣе легко достигнутыя, были только временныя; и даже опасныя болѣзни послѣ излѣченія возвращались еще съ большею силою, отъ того, что прервали слишкомъ рано лѣченіе. Считали себя здоровыми съ того момента, когда почувствовали, что *видимые* или *чувствительные* симптомы болѣзни исчезали, упустивъ изъ виду, что по этой методѣ лѣчатъ не боль, но организмъ, и этотъ послѣдній, освободившись отъ скрытаго порока, который его разстроилъ, въ свою очередь освобождается отъ болѣзни, происшедшей отъ этого порока.

Болѣзни подобны растеніямъ; послѣднія состоятъ изъ видимой части (стебель и проч.) и изъ невидимой части (корень, скрытый въ почвѣ). Отрѣзавъ растеніе у самаго корня, этимъ его не уничтожатъ, это по большей части его укрѣпитъ, такъ какъ оно вновь вырастетъ. Чтобы его убить, нужно вырвать корень.

Digitized by Google

Въ болѣзняхъ есть *видимая часть*:—симптомы скрытой боли и *корень*: причина или скрытая порча въ организмѣ. Нужно уничтожить то и другое, т.-е. послѣ уничтоженія всѣхъ видимыхъ или чувствительныхъ симптомовъ болѣзни, нужно еще продолжать благотворное лѣченіе, которое ихъ уничтожило, чтобы вполнѣ очистить организмъ отъ порока и такимъ образомъ уничтожить самый *корень* болѣзни.

Сколько времени должно продолжаться такое лѣченіе?

Это зависитъ отъ времени, которое было необходимо, чтобы уничтожить видимые или чувствительные симптомы.

Послѣ лѣченія, продолжавшагося отъ одного до двухъ мѣсяцевъ, будетъ хорошо, если удвоятъ время. Когда же лѣченіе было болѣе продолжительное, полезно продолжать еще не менѣе двухъ мѣсяцевъ. Въ болѣзняхъ упорныхъ, застарѣлыхъ въ особенности у лицъ, ослабленныхъ болѣзнью или возрастомъ, полезно продолжать лѣченіе отъ шести мѣсяцевъ до одного года, соображаясь со степенью болѣзни.

Скорѣе невозможно вылѣчить организмъ. И это понятно.

ГЛАВА XI.

Діэта и нѣкоторыя гигіеническія указанія.

Чистота, опрятность, питательная удобоваримая пища, чистая, прѣсная, свѣже-взятая изъ колодца или рѣки, вода, правильный образъ жизни, избѣганіе дурно провѣтриваемыхъ помѣщеній, поздняго отхода ко сну, чрезмѣрныхъ занятій, огорченія, всякихъ волненій, достаточное количество свѣжаго воздуха и движенія, составляютъ необходимыя условія существованія человѣческаго организма, какъ въ здоровомъ его состояніи, такъ въ особенности, во время болѣзни.

Діэта одна изъ наиболѣе простыхъ: нужно остерегаться уничтоженія цѣлебнаго дѣйствія лѣкарства вполнѣ или частью, и для этого *при лѣченіи* избѣгать всего кислаго, въ особенности уксуса и лимона въ чистомъ видѣ и въ видѣ приправы,

Digitized by Google

также кислыхъ винъ и кислыхъ минеральныхъ водъ. Но принимающіе эти лѣкарства съ цѣлію укрѣпить свое здоровье и способствовать физіологическому отправленію функцій всего организма, или же съ цѣлію предохранительною, могутъ употреблять уксусъ и лимонъ, лишь бы между этимъ употребленіемъ и пріемомъ лѣкарства прошелъ нѣкоторый промежутокъ времени—около двухъ часовъ.

Если важно не уничтожить дѣйствіе лѣкарства чѣмъ бы то ни было, то не надо терять изъ виду, что есть множество пищевыхъ веществъ и напитковъ, которые могутъ вредно вліять на здоровье больныхъ, уже разстроенное. Больные сами должны различать, что имъ полезно и что имъ вредно. Во всякомъ случаѣ, чтобы облегчить этотъ выборъ, мы приводимъ здѣсь нѣсколько общихъ указаній:

Пища нѣжная, легкая и питательная соотвѣтствуетъ людямъ слабаго сложенія, выздоравливающимъ и старикамъ, которые не могутъ легко переваривать тяжелую пищу; тогда какъ пища болѣе тяжелая пригодна скорѣе людямъ болѣе крѣпкаго сложенія, тѣмъ, которыхъ обыденная работа требуетъ постояннаго и значительнаго расхода физическихъ силъ.

Освѣжающая пища необходима людямъ, которые подвержены запору. Они должны избѣгать, если не вполнѣ, то отчасти: говядину, красное вино, кофе, шоколадъ, рѣпу и мучную пищу, какъ-то: печенія, картофель, каштаны и проч., и предпочесть бѣлое мясо, бѣлое виноградное вино, свѣжіе овощи, фрукты свѣжіе и вареные, въ особенности яблоки и сливы. Эти послѣднія имѣютъ послабляющее дѣйствіе, которое можетъ быть достаточнымъ; въ противномъ случаѣ одна крупинка *Скроф. 2* на стаканъ воды, который выпить утромъ натощакъ, установитъ правильность отправленія желудка, котораго нельзя было достигнуть діэтой.

Укрѣпляющей діэты должны придерживаться люди, подверженные поносу. Имъ нужно употреблять говядину, красное виноградное вино, немного подогрѣтое (когда нѣтъ воспаленія и раздраженія въ пищеварительныхъ органахъ), яичный бѣлокъ, мучную пищу, какао, шоколадъ и проч.

Digitized by Google

Если въ неопредѣленные промежутки бываютъ утромъ натощакъ поносистыя испражненія незначительныя, но болѣзненныя, то это указываетъ на разстройство пищеварительнаго аппарата и легко устраняется сухими крупинками *Скроф. 1* вмѣстѣ съ *Февр. 1*, а въ упорномъ случаѣ *Скроф. 1* замѣняютъ сухими крупинками *Канч. 1*. При этомъ нужно избѣгать пряностей, спиртныхъ напитковъ, кофе, соли, фруктовъ, яицъ въ смятку, всего сырого, солонины, вообще всякихъ напитковъ, исключая, можетъ быть, молоко, которое можно пить въ маломъ количествѣ. Эта же діэта и это же запрещеніе употреблять напитки одинаково относится къ страдающимъ катаромъ кишекъ или желудка и диспепсіей, и вообще къ тѣмъ, которые послѣ пищи жалуются на тяжелое вздутіе живота, или у которыхъ образованіе газовъ въ желудкѣ и кишкахъ представляетъ частое явленіе. Въ этомъ случаѣ чистое какао и шоколадъ въ плиткахъ, но не въ конфектахъ, спеціально рекомендуются.

Людямъ нервнымъ, страдающимъ ипохондріей, безсонницей, у которыхъ ночныя поллюціи и кошмары составляютъ обыкновенное явленіе, и вообще всѣмъ страдающимъ какимъ-нибудь разстройствомъ нервной системы слѣдуетъ питаться преимущественно растительной пищей, и они должны избѣгать веществъ возбуждающихъ, каковы: спиртные напитки, пиво, кофе, чай, перецъ, куреніе табаку у проч. и имъ слѣдуетъ ложится спать съ тощимъ желудкомъ. Когда же нервное разстройство сопровождается желчнымъ, тогда не нужно употреблять спиртныхъ напитковъ, масла, жира, пирожнаго, сливокъ, молочныхъ продуктовъ, однимъ словомъ всего, что тяжело и трудно переваривается. Эта же діэта одинаково относится къ больнымъ, страдающимъ печенью, желудкомъ, диспепсіей и воспаленіемъ желудка и кишекъ.

При накожныхъ болѣзняхъ, какъ сыпи, лишаи, парша, угри, пузырьки и проч., вовсе не употреблять соленаго, копченаго и жирнаго мяса, такой же рыбы и сыра, въ особенности швейцарскаго, также картофеля, меда, и какъ можно менѣе мучной пищи. Это же запрещеніе одинаково относится къ страдающимъ золотухою.

Digitized by Google

Вообще при всякаго рода болѣзняхъ нужно избѣгать: несвѣжаго и слишкомъ жирнаго мяса, свинины, гуся, утки; копченаго и соленаго; изъ рыбъ: угря, щуки, трески, бѣлужины, осетрины, лососины и проч., въ особенности соленой; всякаго рода пряностей; грибовъ; луку, чесноку и т. д.; *при полнокровіи* избѣгать мяса, яицъ, стручковыхъ овощей, вина и пива; *при малокровіи*—кислыхъ плодовъ.

Чѣмъ тяжелѣе болѣзнь, тѣмъ строже нужно соблюдать правила діэты. Если привычныя пища и питье не имѣютъ прямого вліянія на болѣзнь, то ихъ можно продолжать, только уменьшить количество; если же они имѣютъ на нее вредное вліяніе, то отвыкать отъ нихъ постепенно, мало по малу уменьшая количество.

Во всѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо укрѣпить силы больнаго послѣ перенесенной болѣзни, а также при слабо развитомъ питаніи, отвращеніи къ пищѣ, малокровіи, болѣзняхъ желудка, ракѣ, чахоткѣ, рахитизмѣ и пр. въ медицинской литературѣ рекомендуются хорошія питательныя средства, какъ Соматоза и Санатогенъ, первое изъ мяса, второе изъ молока въ формѣ порошка. Больному назначаютъ по чайной ложкѣ отъ 2 до 4 разъ въ день такого порошка въ $^1/_2$ стаканѣ молока или супа.

Употребленіе крѣпкихъ ликеровъ безусловно запрещается во всѣхъ случаяхъ.

Виноградное вино можно пить въ умѣренномъ количествѣ съ водою послѣ изнурительныхъ болѣзней, обильныхъ кровотеченій и тифа.

Употребленіе курительнаго и нюхательнаго табаку должно быть по возможности уменьшено стариками и совершенно запрещено молодымъ людямъ. Нюханіе табаку совершенно запрещается при болѣзняхъ носа и гортани; курильщики должны перестать курить при болѣзняхъ глазъ, рта, сердца, дыхательныхъ и пищеварительныхъ органовъ.

Употребленіе зубныхъ порошковъ и эликсировъ для чистки и полосканія зубовъ не припятствуетъ вообще лѣченію.

Правильныя, но не продолжительныя прогулки въ экипажѣ,

Digitized by Google

а еще лучше пѣшкомъ, всегда благотворны, конечно при отсутствіи серьезной болѣзни, на которую такія прогулки могутъ имѣть обратное дѣйствіе. Но воздерживаться отъ быстрой ходьбы и продолжительной ѣзды въ экипажѣ или верхомъ. Въ особенности совѣтуются экскурсіи и пребываніе въ деревнѣ на свѣжемъ воздухѣ, соотвѣтствующемъ свойству болѣзни. Больнымъ дозволяются дружескія бесѣды, точно также чтеніе пріятныхъ книгъ, не утомляющихъ голову, тщательно избѣгать возбужденія и чувственности, вызываемыя чтеніемъ бульварныхъ романовъ и поэзіи.

Платье должно представлять надежное покрывало противъ перемѣны погоды, холодныхъ вѣтровъ и стужи. Оно не должно быть слишкомъ тѣсно, чтобы не стѣсняло ни дыханія, ни свободнаго движенія членовъ, и чтобы не было никакого давленія на пищеварительные органы.

Цвѣты и растенія слѣдуетъ вообще удалять изъ спаленъ, въ особенности на ночь, когда они выдѣляютъ вредный газъ; въ случаяхъ тяжкой болѣзни они не должны находиться въ комнатѣ больного.

ГЛАВА XII.

Нѣкоторые практическіе совѣты начинающимъ примѣнять электрогомеопатію.

Лѣкарственныя указанія, приводимыя при каждой болѣзни во второй части этой книги, имѣютъ лишь относительное значеніе, т. е. могутъ встрѣчаться случаи одной и той же болѣзни, требующіе того или другого измѣненія данныхъ указаній. Чѣмъ болѣе опыта читатель пріобрѣтаетъ въ лѣченіи электрогомеопатіей, тѣмъ скорѣе онъ убѣдится, что, особенно въ трудныхъ заболѣваніяхъ, часто, для достиженія излѣченія, необходимо примѣнить иныя лѣкарства или иные нумера ихъ, иныя комбинаціи или иныя разведенія, чѣмъ тѣ, которыя ука-

Digitized by Google

заны во второй части. Но въ одномъ читатель можетъ быть увѣренъ, что изложенныя въ этой книгѣ руководящія правила для выбора лѣкарствъ наведутъ его въ каждомъ случаѣ на надлежащій путь. Начинающій же можетъ смѣло начинать съ приводимыхъ мною указаній; вреда онъ никогда такимъ образомъ не принесетъ, успѣшные же результаты въ большинствѣ случаевъ окажутся. Выбранныя лѣкарства надо примѣнять съ выдержкой, а не метаться, подъ вліяніемъ страха или отчаянія, отъ однихъ лѣкарствъ къ другимъ, не перемѣнять ихъ безъ достаточнаго основанія; надо лѣкарству дать время дѣйствовать. Спокойствіе, обдуманность, ясное соображеніе и серьезная воля суть необходимыя качества хорошаго врача.

Главная задача при лѣченіи заключается въ опредѣленіи тѣлеснаго сложенія, и соотвѣтственно послѣднему должно быть выбрано лѣкарство, именно—главное, конституціональное, лѣкарство. Затѣмъ, если имѣется какое либо заболѣваніе отдѣльнаго органа, то назначается подходящее органическое или спеціальное лѣкарство, которое дается попеременно съ главнымъ.

Всякій, усвоившій основательно ученіе о тѣлосложеніяхъ и кругъ дѣйствія особенно главныхъ лѣкарствъ, пойметъ, почему во второй части этого руководства при совершенно различныхъ болѣзняхъ встрѣчаются часто одни и тѣ-же или очень подобныя указанія, а при подобныхъ болѣзняхъ, наоборотъ, иной разъ — различныя.

Когда кто либо впервые приступаетъ къ лѣченію нашими лѣкарствами, будетъ всего лучше, если онъ поступитъ слѣдующимъ образомъ:

Въ каждомъ остромъ случаѣ болѣзни, сопровождающемся лихорадкой или воспаленіемъ, равно какъ при *жестокихъ боляхъ* или *спазмотической одышкѣ* уложите больного въ постель и давайте внутрь *Анж.* 3 попеременно съ *Скроф.* 1, оба изъ 3-го стакана или болѣе сильнаго разведенія, черезъ каждыя 15 минутъ по чайной ложкѣ, и 3 раза въ день передъ кушаньемъ *Скроф.* 1 по 5 крупинокъ. Кромѣ того: если болѣзнь сопровождается запоромъ, то сдѣлайте клистиръ изъ тепловатой воды; если имѣется рвота, то дайте 10 круп. *Скроф.* 1

Digitized by Google

или 5 круп. *Анти-маль-ди-маре*; при сильномъ поносѣ—10—20 крупинокъ *Скроф.-джіап.* послѣ каждаго испражненія; при малярiи—утромъ и вечеромъ по 5 круп. *Фебриф.* 1; при подозрѣніи на сифилисъ—утр. и веч. по 5 круп. *Венерео*; при глистахъ—утр. и веч. по 5 круп. *Вермифуго* 1; при кровотеченіяхъ—черезъ $^1/_4$—$^1/_2$ часа 5—10 капель *Эл. Синяго*; при кашлѣ—черезъ каждые 2 часа по 2—3 крупинки *Петт.* 3 въ чайной ложечкѣ горячей воды; при судорогахъ—намачивайте голову *Эл. Бѣл.* или *Эл. Красн.* попеременно съ *Эл. Желт.*

У лихорадящихъ дѣтей осмотрите всегда зѣвъ, дабы удостовѣриться, имѣется ли дифтеритъ или нѣтъ. При красномъ лицѣ и горячей головѣ прикладывайте черезъ каждыя 5—15 минутъ холодные компрессы на голову.

Принявъ такія *первыя* мѣры, вы значительно выигрываете во времени и можете уже спокойнѣе позаботиться о дальнѣйшемъ: о названіи болѣзни или объ отдѣльномъ заболѣвшемъ органѣ, обратившись за этимъ къ врачу или разобравшись по книгѣ.

Въ хроническихъ случаяхъ болѣзней давайте въ началѣ лѣченія *Анж.* 3 попеременно съ *Скроф.* 1, оба изъ 3 го или 2-го стакана черезъ каждыя 30—60 минутъ по чайной ложкѣ. Сдѣлавъ это, примитесь за болѣе подробное ознакомленіе съ даннымъ случаемъ и постарайтесь узнать, какое органическое разстройство лежитъ въ основѣ его: узнайте названіе болѣзни и подыщите лѣченіе ея въ настоящемъ руководствѣ. При нѣкоторомъ упражненіи читатель скоро и самъ въ состояніи будетъ судить о томъ, имѣется ли хроническое заболѣваніе легкихъ, печени, почекъ, желудка и проч. При всякой хронической болѣзни приносятъ всегда пользу теплыя ванны съ *Скроф.* 5, 1—2 раза въ недѣлю, или обтиранія тѣла спиртомъ и бѣлой электрической жидкостью.

Послѣ того, какъ начинающій выбралъ и примѣнилъ наиболѣе подходящія лѣкарства, онъ часто натыкается на новыя трудности. Что ему дѣлать, если напримѣръ, въ острой болѣзни спустя нѣсколько часовъ, а въ хронической—спустя

Digitized by Google

нѣсколько дней, не замѣчается никакого улучшенія или даже наступаетъ ухудшеніе, или если послѣ наступившаго улучшенія таковое не продолжается дальше или больному даже хуже дѣлается. Онъ справляется въ книгѣ и очень разочарованъ, если прочитываемое часто не соотвѣтствуетъ его ожиданіямъ. Такіе случаи бываютъ столь часто и они уже столь многихъ удержали отъ дальнѣйшаго примѣненія электрогомеопатическихъ средствъ, что мы считаемъ необходимымъ остановиться на нихъ подробнѣе.

Чаще всего подобныя неудачи постигаютъ тѣхъ начинающихъ, которые узнали названіе данной болѣзни отъ какого либо врача и только этимъ діагнозомъ руководствуются, а не общимъ тѣлосложеніемъ больного. Выше мы указали, какъ общее правило, давать въ началѣ всякаго остраго заболѣванія *Анж.* 3 попеременно съ *Скроф.* 1. Кой кто изъ читателей можетъ видѣть въ этомъ противорѣчіе съ тѣмъ, что раньше было нами сказано, и возразить намъ, что разъ лѣченіе должно быть конституціональное, то лимфатическій субъектъ долженъ получать *Скроф.*, анжіоитическій—*Анж.*, субъектъ смѣшаннаго тѣлосложенія—*Анж.* попеременно съ *Скроф.* Но противорѣчіе тутъ только кажущееся, такъ какъ при всякой лихорадкѣ и при всякомъ воспаленіи болѣзнь отражается какъ на лимфу, такъ и на кровь, и поэтому каждое лимфатическое и каждое анжіоитическое тѣлосложеніе, по крайней мѣрѣ на время болѣзни, превращается въ смѣшанное. Въ громадномъ большинствѣ случаевъ болѣзнь начинается лихорадкой, и поэтому для нихъ подходятъ *Анж.* и *Скроф.* въ попеременномъ употребленіи. Оба эти средства суть главнѣйшія конституціональныя средства и въ большинствѣ случаевъ достаточны для излѣченія. Если отъ этихъ средствъ не становится вскорѣ лучше, то это доказываетъ, что имѣется трудное заболѣваніе; тогда необходимо обратиться къ опытному врачу. Если же наступаетъ улучшеніе, но оно не прогрессируетъ, то разведенія должны быть постепенно усилены. Лишь рѣдко будетъ встрѣчаться надобность давать *Анж.* 3 попеременно съ *Скроф.* въ сухихъ крупинкахъ или растираніяхъ, вмѣсто разведеній если послѣднія не переносятся и вызываютъ тошноту (см. стр.86)

Digitized by Google

Вообще же не слѣдуетъ рабски держаться назначеній, указанныхъ во второй части этого руководства, а необходимо настолько освоиться со всѣми правилами электрогомеопатіи и кругомъ дѣйствія электрогомеопатическихъ лѣкарствъ, чтобы можно было въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ выбрать и провести надлежащіе способъ и форму примѣненія послѣднихъ. Затѣмъ надо имѣть въ виду, что начинающій склоненъ очень часто смѣнять лѣкарства, не имѣетъ надлежащей выдержки и легко поддается отчаянію, если болѣзнь не такъ скоро уступаетъ, какъ бы ему желательно было. Въ трудныхъ и опасныхъ болѣзняхъ часто *большимъ успѣхомъ* является уже одно то, что наши лѣкарства вообще поддерживаютъ жизнь въ больномъ. Въ такихъ случаяхъ надо обладать терпѣніемъ и не требовать отъ нашихъ лѣкарствъ того, чтобы они излѣчивали скорѣе, чѣмъ это вообще возможно. То же приходится сказать и о хроническихъ болѣзняхъ, продолжавшихся много лѣтъ и значительно ослабившихъ реакціонную силу больного. Первый успѣшный результатъ обнаруживается у хроническихъ больныхъ обыкновенно улучшеніемъ общаго состоянія; раковые, наприм., больные пріобрѣтаютъ болѣе здоровый цвѣтъ лица, лучшій аппетитъ и т. д.; послѣ этого только начинаютъ медленно уменьшаться раковые узлы и язвы. Главнымъ правиломъ остается то, чтобы не раньше давать нисшее разведеніе, пока наступившее улучшеніе продолжается.

Заключающіяся въ этой книгѣ предписанія, особенно при лѣченіи тяжелыхъ заболѣваній, ни въ коемъ случаѣ не выдуманы или искусственно составлены. За нѣкоторыми лишь исключеніями, всѣ они взяты изъ записей о больныхъ, которыя регулярно велись въ теченіи болѣе 30 лѣтъ. Надо однако сказать, что обычно въ практикѣ далеко не всегда приходится примѣнять въ буквальной точности всѣ указанныя во второй части этой книги внутреннія и наружныя средства. В многихъ случаяхъ, особенно въ бѣдной практикѣ, совершенно невозможно примѣнить во всей полнотѣ всѣ наши средства, да въ большинствѣ случаевъ это и совершенно не нужно. Въ руководствѣ по электрогомеопатіи лѣченіе, особенно—тя-

Digitized by Google

желыхъ болѣзней, должно быть возможно полнѣе изложено. Въ отдѣльныхъ случаяхъ должно быть все испробовано для предотвращенія угрожающей опасности для жизни. Но такіе случаи вообще, слава Богу, рѣдки, въ остальныхъ же удается обыкновенно преодолѣвать даже довольно трудныя заболѣванія самымъ несложнымъ, простымъ лѣченіемъ, съ помощью лишь крупинокъ и ихъ разведеній безъ обязательнаго широкаго примѣненія наружныхъ средствъ. Такъ, въ послѣдніе годы неоднократно появлялись и появляются сообщенія въ электрогомеопатической литературѣ объ излѣченіяхъ, достигнутыхъ въ тяжелыхъ раковыхъ болѣзняхъ (но еще не дошедшихъ до изъязвленій) отъ примѣненія лишь *Канч.* 1 попеременно съ *Анж.* 3 (оба изъ 3-го, а позднѣе изъ 2-го, 1-го и усиленнаго 1-го разведенія) безъ примѣненія наружныхъ средствъ.

Начинающему можно посовѣтовать слѣдовать этому примѣру, а именно—придерживаться возможно болѣе простого конституціональнаго (съ примѣненіемъ главныхъ, конституціональныхъ лѣкарствъ) лѣченія. Лишь мало по малу и сообразуясь съ необходимостью въ каждомъ данномъ случаѣ, онъ можетъ перейти къ употребленію, кромѣ этихъ, еще и спеціальныхъ (органическихъ) лѣкарствъ, основательно ознакомившись съ кругомъ дѣйствія ихъ, и съ вспомогательной цѣлью примѣнять электрическія жидкости и многочисленныя наружныя средства. Послѣднія имѣютъ очень большое значеніе и въ нѣкоторыхъ случаяхъ являются прямо необходимыми. Если же начинающій сразу, безъ надлежащей опытности, сталъ бы употреблять сложныя комбинаціи лѣкарствъ, то онъ только запутался бы въ дѣлѣ лѣченія. Мало по малу будетъ увеличиваться его опытъ и наконецъ онъ въ состояніи будетъ излѣчивать даже самыя тяжелыя болѣзни, если только, конечно, больной обладаетъ еще необходимой жизнеспособностію и реактивностью, а также достаточной выдержкой въ лѣченіи. Для начала же онъ лучше сдѣлаетъ, если будетъ браться за лѣченіе болѣзней болѣе простыхъ и легкихъ. Поэтому совѣтъ нашъ —не приступать съ самаго начала къ лѣченію болѣзней безнадежныхъ и необыкновенныхъ, какъ будто бы эти лѣкар-

Digitized by Google

ства обладали неограниченною силою. Болѣзни опасныя или сложныя могутъ быть и неизлѣчимы этими средствами, но это еще ничего не говоритъ противъ нихъ, но важное неудобство состоитъ въ томъ, что это можетъ обезкуражить тѣхъ, которые дѣлаютъ опыты.

Лучше избрать болѣзни болѣе легкія и простыя. Нѣтъ недостатка въ людяхъ съ больнымъ желудкомъ, неимѣющихъ аппетита, съ слабымъ пищевареніемъ, страдающихъ безсонницей, слабостью, лихорадкою, головною или зубною болью.

Дальнѣйшій нашъ совѣтъ—не совмѣщать это лѣченіе одновременно съ аллопатическимъ, потому что всѣ аллопатическія лѣкарства, кромѣ нѣкоторыхъ слабительныхъ, уничтожаютъ дѣйствіе этихъ лѣкарствъ.

Не примѣнять эту методу къ больнымъ, погрязшимъ въ грубый матеріализмъ, психопатамъ и приверженцамъ аллопатіи, такъ какъ никто изъ нихъ ей слѣдовать не будетъ.

Вообще думаютъ, что нужно имѣть *вѣру* въ лѣкарства, чтобы чувствовать хорошее дѣйствіе ихъ; аллопаты и ихъ приверженцы утверждаютъ, что только въ этомъ и состоитъ сила Электро-Гомеопатіи. Но въ такомъ случаѣ почему вѣра въ аллопатію при лѣченіи не помогаетъ? Развѣ вѣра вылѣчиваетъ грудного младенца, который не имѣетъ другого лѣкарства, кромѣ того, которое даютъ внутрь кормилицѣ? Неужели малолѣтнія дѣти, которыхъ долго лѣчили аллопатіей совершенно безуспѣшно, выздоравливали быстро отъ Электро-Гомеопатіи потому, что они въ нее вѣрили, и не подавали никакой надежды на выздоровленіе при лѣченіи аллопатіей потому, что ей не вѣрили, не понимая при томъ, чѣмъ ихъ лѣчатъ? Какая вѣра можетъ быть у человѣка въ безсознательномъ состояніи отъ паралича или у женщины въ припадкѣ тяжелой формы истеріи, которыхъ тѣмъ не менѣе этими лѣкарствами приводятъ въ чувство и вылѣчиваютъ.

Приведемъ еще нѣсколько поразительныхъ фактовъ, которые многіе могутъ легко провѣрить сами.

Влейте въ комнатный акваріумъ, смотря по его величинѣ, чайную или столовую ложку раствора *Скроф.* изъ 1-го стакана,

Digitized by Google

если въ немъ плаваютъ рыбки вверхъ брюхомъ на поверхности воды; размѣшайте воду съ тѣмъ растворомъ и вы увидите, что черезъ нѣсколько минутъ рыбки, плавающія вверхъ брюхомъ, перевернутся, останутся живы и примутъ свое нормальное положеніе.

Размѣшайте нѣсколько капель раствора *Скроф.* 1 изъ 1-го стак. въ пойлѣ канарейки, которая перестала пѣть, ничего не ѣстъ, перья приподнялись, голова между крыльями, и если она проглотитъ нѣсколько глотковъ этой воды и въ ней выкупается—она поправится и будетъ опять пѣть.

Собакамъ, отравившимся мерзостью, которую они съѣли въ выгребныхъ ямахъ, дайте 4 раза въ день по 10 или 20 сухихъ крупинокъ *Скроф.* 1 и они выздоровѣютъ.

Давайте до выздоровленія, каждый день три пріема по рюмкѣ раствора изъ 9—10 крупинокъ *Анж.* 1 на шампанскую бутылку воды каждой коровѣ, заболѣвшей кровавою мочею въ видѣ повальной болѣзни, и если вы это сдѣлали во время, то у васъ не будетъ ни падежа, ни убытка.

Что же, неужели и рыбы, и канарейки, и собаки, и рогатый скотъ должны *вѣрить* въ дѣйствіе этихъ лѣкарствъ, чтобы поправиться? Безъ сомнѣнія, *довѣріе* необходимо не для достиженія дѣйствія этихъ лѣкарствъ, но чтобы исполнить въ точности изложенныя правила и указанія. Оно собственно нужно вначалѣ новичкамъ; когда же увидятъ, то пріобрѣтаютъ убѣжденіе и увѣренность, что Электро-Гомеопатія дѣйствительно представляетъ одно изъ великихъ и наиболѣе полезныхъ открытій истекшаго вѣка.

На всѣ возраженія, по этому поводу, завистниковъ графа Маттеи и субъектовъ съ животными инстинктами, мы укажемъ на аксіому Аристотеля, усвоенную нѣкоторыми учеными нашего времени, и между ними извѣстнымъ профессоромъ анатоміи Гиртель. Онъ говоритъ: „есть *нѣчто*, что стоитъ выше анатомическаго и физіологическаго сужденія; нѣчто, передъ которымъ наука должна преклоняться въ смиреніи, и это *нѣчто* называется **ОПЫТОМЪ**. Что доказано **ОПЫТОМЪ**, то не можетъ быть отрицаемо никакими научными мудрствованіями.

Digitized by Google

Вниманію иногороднихъ.

Если иногородній читатель встрѣтитъ затрудненіе при примѣненіи Электро-Гомеопатіи по этому руководству и пожелаетъ получить спеціальныя разъясненія и указанія (письменный совѣтъ), то онъ, въ виду смерти автора этой книги С. В. Смирнова, можетъ обратиться въ *Центр. Гомеоп. Аптеку*, которая передастъ письмо для полученія совѣта врачу-спеціалисту. При такихъ обращеніяхъ необходимо подробно описать всѣ болѣзненные признаки, какія имѣются у больного, равно какъ и общее состояніе его организма. Послѣднее необходимо для выясненія тѣлосложенія и темперамента больного. Безъ выясненія особенно рода тѣлосложенія трудно бываетъ выбрать заочно соотвѣтствующее главное, основное лѣкарство. По этому о такихъ, напримѣръ, явленіяхъ, какъ головокруженіе, запоры, насморкъ, неправильное біеніе сердца, краснота лица и проч., надо упомянуть, если ихъ и нѣтъ въ данное время, бывали-ли они раньше, а если бывали, то уменьшились или усилились или не измѣнились или совершенно прекратились во время послѣдняго заболѣванія. Для облегченія читателю такого подробнаго описанія болѣзни и общаго состоянія организма приводятся нижеслѣдующіе вопросные пункты, на которые предлагается дать обстоятельные отвѣты при обращеніи за совѣтомъ:

1) *Сколько лѣтъ* больному или больной?

2) *Имя и фамилія?*

3) Въ бракѣ или нѣтъ?

4) Есть-ли дѣти или нѣтъ?

5) Были-ли какія болѣзни или ненормальности вообще раньше?

6) Какое предшествовало лѣченіе?

7) *Какая давность и какіе признаки настоящей болѣзни (подробно описать).*

8) Каково внѣшнее сложеніе тѣла: крѣпкое, среднее, слабое или разслабленное, тощее или жирное?

Digitized by Google

9) Бываютъ-ли *приливы къ головѣ?*

10) Бываетъ-ли *головокруженіе?*

11) Каковъ *сонъ* теперь и каковъ раньше былъ?

12) Каково *душевное и умственное состояніе* теперь и раньше?

13) Есть-ли жаръ въ тѣлѣ или холодъ или ознобъ или потъ?

14) Было-ли и есть-ли что ненормальное со стороны *носа, полости рта, зѣва, горла, глазъ, ушей?*

15) Каковъ *аппетитъ* теперь и каковъ раньше былъ?

16) Имѣется-ли отрыжка, тошнота и рвота?

17) Имѣется-ли *запоръ* или *поносъ?*

18) Что чувствовалось и чувствуется въ *животѣ?*

19) Бываетъ-ли кровь въ испражненіяхъ на низъ, или слизь?

20) Имѣются-ли (и имѣлись-ли) шишки въ заднемъ проходѣ.

21) Имѣются-ли (и имѣлись-ли) кишечные *глисты?*

22) Есть-ли (было-ли) что ненормальное со стороны *мочеотдѣленія* и *половыхъ органовъ* (течь, бѣли, неправильное мѣсячное очищеніе и проч.)?

23) Есть-ли что ненормальное со стороны *дыхательныхъ органовъ* и *сердца* (кашель, отхаркиваніе, охриплость, одышка, сердцебіеніе)?

24) Каковъ *видъ кожи*: чистый или имѣются (были-ли) сыпи, чирьи и т. п.?

25) Имѣются-ли расширенныя жилы (вены) на ногахъ?

26) Имѣется-ли что ненормальное со стороны туловища и конечностей (рукъ и ногъ)?

27) Личныя замѣчанія и дополненія.

28) Подробный четко написанный адресъ обращающагося за совѣтомъ.

Каждый письменный совѣтъ оплачивается тремя рублями.

Переводы и письма адресуются: *С.-Петербургъ, въ Центральную Гомеопатическую Аптеку, Гороховая, 17.*

Digitized by Google

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Каталогъ болѣзней.

Читатель тѣмъ большую пользу извлечетъ изъ этой второй части книги, чѣмъ основательнѣе онъ ознакомится съ общими основаніями и правилами, изложенными въ первой части, особенно въ главахъ IV, VI, IX, X и XII. Послѣдняя, XII глава, даетъ наиболѣе близкія указанія въ этомъ отношеніи.

Въ виду того, что всякій, заболѣвъ, обращаетъ прежде всего вниманіе на выдающіеся симптомы и болящую часть тѣла, какъ напримѣръ при болѣзни глазъ—на глаза, при сердцебіеніи—на сердце, при боляхъ въ животѣ—на послѣдній и т. д., мы расположили *всѣ органы или части тѣла* въ *алфавитномъ порядкѣ* съ анатомическимъ ихъ описаніемъ, а *при каждомъ изъ нихъ—свойственныя ему болѣзни.*

Общія болѣзни и болѣзни, проявляющіяся въ разныхъ частяхъ тѣла, равно какъ различныя иной разъ названія одной и той же болѣзни значатся въ *алфавитномъ указателѣ* (въ концѣ книги) съ указаніемъ соотвѣтствующихъ въ текстѣ страницъ).

При каждой болѣзни объяснены ея симптомы и лѣченіе; надо имѣть въ виду, что дозы лѣкарствъ указаны, за малыми исключеніями, для взрослыхъ; для дѣтей же дозы указаны въ гл. IV. Послѣ изложенія болѣзней приведены мѣстами примѣры излѣченій.

Digitized by Google

СПИСОКЪ

сокращеній, принятыхъ въ этой части, и объясненіе ихъ.

1) **Сокращенія названій лѣкарствъ** (сравните стран. 34):

S.	означаетъ	**Скрофолозо (Antiscrofoloso).** (рядомъ съ этой буквой S стоящая цифра означаетъ № лѣкарства: 1, 2, 3, 5, 6).
S. G.	»	**Скрофолозо Джіаппоне (Antiscrofoloso Giappone).**
S. las.	»	**Скрофолозо лассативо (Antiscrofoloso lassativo).**
A.	»	**Анжіоитико (Antiangioitico).** (рядомъ стоящая цифра обозначаетъ № лѣкарства: 1, 2, 3).
C.	»	**Канчерозо (Anticanceroso).** (рядомъ стоящая цифра обозначаетъ № лѣкарства: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10).
C. T. B.	»	**Канчерозо Т. Б (Anticanceroso T. B.).**
L.	»	**Линфатико (Antilinfatico).**
F.	»	**Фебрифуго (Febrifugo), 1 и 2.**
Verm.	»	**Вермифуго (Vermifugo), 1 и 2.**
V.	»	**Венереo (Antivenereo).**
P.	»	**Петторале (Pettorale) 1, 2, 3, 4.**
M.	»	**Марина (Marina).**
Эл. Кр.	»	**Электрич. красное (Elettricita Rossa).**
Эл. Ж.	»	**Электрич. желтое (Elettricita Gialla).**
Эл. З.	»	**Электрич. зеленое (Elettricita Verde).**
Эл. Анж.	»	**Электрич. синее или Эл. Анжіоитико (Elettr. Angioitico или Azzurra)**
Эл. Б.	»	**Электрич. бѣлое (Elettricita Bianca).**

Digitized by Google

бедр.	означаетъ	бедреные.
берц.	»	берцовые.
больш.	»	большой.
веч.	»	вечеромъ.
вн.	»	во внутрь.
впрыск.	»	впрыскиваніе.
зат.	»	затылокъ.
компр.	»	компресъ.
круп.	»	крупинка.
мин.	»	минута.
надгл.	»	надглазный.
нар.	»	наружно.
обтир.	»	обтираніе.
перен.	»	переносица.
плеч.	»	средній плечевой нервъ.
подвзд.	означаетъ	подвздошье.
подгл.	»	подглазный.
подъяз.	»	подъязычный.
полоск	»	полосканіе.
поясн.	»	поясница.
прил.	»	приложеніе.
рис.	»	рисунокъ.
симп.	»	симпатическій.
см.	»	смотрите.
соотв.	»	соотвѣтствующіе.
сплет.	»	солнечное сплетеніе.
спринц.	»	спринцованіе.
ср.	»	сравните.
ст.	»	стаканъ.
ч.	»	часъ.

(1-й ст.) (2-й ст.) (3-й ст.) (4-й ст.) Означаетъ принимать лѣкарство, передъ которымъ или послѣ котораго стоитъ одинъ изъ такихъ знаковъ, въ дозѣ 1-го, или изъ 2-го, или изъ 3-го, или изъ 4-го стакана по чайной ложкѣ, приблизительно каждыя четверть часа.

6 гл. точ. — шесть главныхъ точекъ, то есть: затылокъ, ложечка, солнечное сплетеніе и симпатическій нервъ (по рис. 5, 6, 7, 17, 18 и 18).

× означаетъ попеременно. Напримѣръ *S* 1 × *A* 1 значитъ *Скроф.* № 1 попеременно съ *Анж.* № 1. Или: *A.* 3 × *F.* 1 × *C.* 1 (2-й ст.) значитъ *Анж.* № 3 попеременно съ *Февр.* № 1 и *Канч.* № 1 каждое изъ 2-го стакана. Или: *Эл. Кр.* × *Желт.* значитъ *Эл. Кр.* попеременно съ *Эл. Желт.*

C—въ концѣ параграфа означаетъ излѣченія автора этой книги.

Прочія встрѣчающіяся сокращенія ясны по смыслу и безъ объясненія ихъ.

Digitized by Google

РАЗЛИЧНЫЯ БОЛѢЗНИ И ИХЪ ЛѢЧЕНІЕ.

въ алфавитномъ порядкѣ.

Англійская болѣзнь (или *Рахитъ*) свойствена дѣтскому возрасту отъ 1 до 5 л. Иногда уже 2-хъ или 3-хъ мѣсячный ребенокъ поражается этою болѣзнію. Началомъ ея бываетъ разстройство пищеваренія, запоръ перемежается поносомъ, иногда рвота, животъ вздутъ газами, моча отдѣляется въ большомъ количествѣ и даетъ обильный осадокъ. худоба, болѣзненный видъ, цвѣтъ лица сѣровато-желтый, старческое выраженіе. Трубчатыя кости очень мягки, гнутся и даже ломаются при малѣйшемъ на нихъ давленіи. Концы костей значительно утолщаются. Форма членовъ измѣняется—стопы ногъ выворачиваются, бедра и голени сгибаются дугою, безобразіе грудной клѣтки и на тазовыхъ костяхъ, искривленіе позвоночнаго столба, относительно большіе размѣры черепа сравнительно съ развитіемъ лицевыхъ костей, сильное выпячиваніе лобныхъ и темянныхъ бугровъ, незакрытіе родничковъ.

Лѣченіе. Чистый воздухъ, хорошее питаніе, для младенцевъ—грудное молоко, а при искусственномъ вскармливаніи—безусловно хорошее коровье или козье молоко, все это необходимыя условія при лѣченіи. *A. 3* × *C. 1* × *V.* (3-й ст.) кажд. $^1/_2$—1 ч. по чайн. лож., передъ кажд. ѣдой 1—3 круп. *S. 1*; 3—4 раза въ недѣлю тепловатая ванна съ прибавленіемъ по 10 — 30 круп. *A. 2*, *C. 5*, *V.*; вытираніе всего тѣла растворомъ *A. 2*, *C. 5*, *V.*, по 10 круп. на унцію воды и 3 унц. алкоголя съ 20 каплями *Эл. Кр.* или *Эл. Бѣл.* Дѣтямъ постарше не давать картофеля, полезны молоко, яйца и мясо, съ небольшимъ лишь количествомъ хлѣба и вообще мучного.

Антоновъ огонь, омертвѣніе, гангрена. Эта болѣзнь появляется на разныхъ частяхъ тѣла въ двухъ видахъ: *сухомъ* и *мокромъ*. Первый видъ заключается въ высыханіи мягкихъ тканей до того, что онѣ, при постукиваніи, издаютъ нѣкоторую звонкость. Цвѣтъ пораженныхъ частей бурый, а иногда чер-

Digitized by Google

ный, какъ уголь. *Мокрый* Антоновъ огонь является въ видѣ язвы большей или меньшей обширности. Эта язва, нечувствительная при прикосновеніи, выдѣляетъ большое количество жидкаго вонючаго гноя. Причины: сильный холодъ или жаръ, ушибъ и давленіе. Антоновъ огонь обусловливается совершеннымъ застоемъ крови или недостаточнымъ притокомъ ея.

Лѣченіе. Вн. при мокрой гангренѣ черезъ 15—20 мин. по чайн. лож. *А. 3* × *С. 5* (3-й ст.); этихъ же лѣкарствъ по 2 круп. черезъ часъ поперем. и 3 раза въ день 1—3 капли *Эл. Зел.* въ стол. лож. воды. Наружно: на омертвѣвшее мѣсто—тряпочку съ *Эл. Зел.*, а поверхъ послѣдней—смѣняемые черезъ кажд. 10 мин. горячіе компрессы изъ раствора *А.2* и *С.5* по 15 круп. на стак. воды, съ прибавл. чайн. лож. *Эл. Зел.*

Излѣченія. Антоновъ огонь въ ногѣ, вслѣдствіе рожи у м. 56 л. былъ вылѣченъ прим. изъ *А. 2* и вн. *S. 5* (3-й ст.) въ двѣ недѣли (С).

— Мокрый Антоновъ огонь въ огнестрѣльныхъ ранахъ былъ вылѣченъ *С.* 1 внутр. и наруж.

— М. 50 л. съ гангренозною язвою въ ноздряхъ, признанный неизлѣчимымъ, былъ вылѣченъ въ 2 мѣс. внутр. и нар. *А. 1* × *S. 1* × *С. 1.*

Апоплексія мозга, ударъ—внезапное заболѣваніе, которому нерѣдко предшествуютъ головныя боли, жужжаніе въ ушахъ, мельканіе передъ глазами и т. д. Болѣзнь эта происходитъ отъ кровоизліянія въ вещество мозга или его оболочки вслѣдствіе разрыва мельчайшихъ головныхъ артерій. Мгновенно больной падаетъ, лишившись сразу сознанія, чувствъ, чувствительности и движенія; дыханіе становится медленнымъ, храпящимъ, пульсъ также замедляется, зрачки съуживаются и не дѣйствуютъ на свѣтъ, иногда бываетъ рвота и непроизвольное испражненіе. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ смерть наступаетъ мгновенно или черезъ нѣсколько дней, безъ возвращенія сознанія у больного. Обыкновенно же сознаніе вскорѣ возвращается мало-по-малу и слѣдствіемъ апоплексическаго удара въ боль-

Digitized by Google

шинствѣ случаевъ является параличъ одной половины тѣла, противоположной мѣсту пораженія въ мозгу (Ср. *Параличъ*).

Лѣченіе. Прежде всего нѣсколько словъ о предупрежденіи мозговаго удара. Лица, страдающія съ нѣкоторыхъ поръ тупой головной болью, шумомъ въ ушахъ, головокруженіемъ, общимъ возбужденіемъ, безсонницей и засыпаніемъ отдѣльныхъ членовъ, должны совершенно избѣгать спиртныхъ напитковъ и питаться преимущественно растительной пищей. Очень важно заботиться о правильныхъ испражненіяхъ на низъ. Во всѣхъ случаяхъ удара имѣется смѣшанное тѣлосложеніе, поэтому давайте *A. 1* × *C. 1* (2-й или 1-й ст.), черезъ 15—60 мин. по чайн. лож., утромъ на тощакъ и вечеромъ передъ сномъ 5 круп. *L.* Въ полдень передъ пищей 5′ круп. *S. 1* На главн. нервн. точки *Эл. Кр.* × *Эл. Желт.* и обмыванія головы утр. и веч. растворомъ *Эл. Б.*

Лѣченіе самаго припадка мозгового удара. Возвышенное положеніе головы, освобожденіе отъ всѣхъ тѣсныхъ платьевъ. На языкъ положить 10 круп. *S.1* и вливать въ ротъ черезъ кажд. 5 мин. по 1 каплѣ *Эл. Анж.* Когда больной начнетъ глотать, то давать ему черезъ кажд. 5 мин. по чайн лож. *A. 2* × *C. 1* (3-й ст.). На голову тряпку, смоченную съ *Эл. Анж.* или *Эл. Б.*, а поверхъ нея—холодныя примочки изъ раствора 10 круп. *A. 2* и 20 круп. *C. 5* въ двухъ стак. воды. Лѣченіе это продолжать нѣсколько дней, ставя кромѣ того 1—2 раза въ день клистиръ изъ тепловатой воды. Больному необходимъ полный покой, ему даютъ лишь жидкую теплую пищу. Въ эту пору не дѣлать никакихъ растираній тѣла.

Лѣченіе послѣдствія удара—паралича—см. ниже: *Параличъ.*

Аппетитъ. Потеря аппетита, если онъ не происходитъ отъ болѣзни, возстановляется *S.1* (1-й ст.), также 2—3 раза въ день по 2—5 круп. передъ ѣдой; на сплетеніе нервовъ *Эл. Кр.* попер. съ *Желт.* Ванны изъ *Сапс. 5.* Ср. *Желудокъ, болѣзни его.*

Извращенный аппетитъ у беременныхъ женщинъ и у дѣвушекъ, страдающихъ блѣдною немочью, лѣчится точно также.

Астма или судорожное дыханіе зависитъ отъ разстройства сосудодвигательныхъ нервовъ. Симптомы: больной мечется'

Digitized by Google

сильно откашливается, лицо блѣдное или багровое съ отпечаткомъ страха; конечности, носъ и уши холодные; лицо и грудь покрыты холоднымъ потомъ; сердце сильно бьется, пульсъ измѣнчивъ; приступы астмы появляются преимущественно ночью, держатся отъ 2—3 до 36 часовъ, пока не наступитъ отхаркиваніе мокроты или обильный потъ или обильное мочеиспусканіе. Астма часто осложняется бронхіальнымъ катарромъ и эмфиземой. При осложненіи бронхитомъ у страдающихъ скоро развивается куриная или плоская грудь, плечи надвигаются вверхъ, голова нѣсколько выдается и отвисаетъ къ низу, глаза на выкатѣ, значительная худоба.

Астма чаще встрѣчается у мужчинъ, чѣмъ у женщинъ; чаще припадки бываютъ лѣтомъ, чѣмъ зимою; она поражаетъ обыкновенно людей пожилыхъ.

Одышка при болѣзняхъ сердца не имѣетъ ничего общаго съ астмою.

Существованіе астмы, по *Brugelmann*'у, исключаетъ возможность развитія легочной бугорчатки у даннаго больного. Онъ же говоритъ, что не существуетъ опредѣленнаго климата, особенно благопріятнаго для астматиковъ, и точно также нѣтъ для нихъ специфической минеральной воды.

Припадокъ астмы быстро прерывается 10 сух. кр. *S.1*, и при легочномъ приливѣ 5 или 10 каплями *Эл. Анж.* на кускѣ сахара или въ рюмкѣ ледяной воды. Въ томъ и другомъ случаѣ приложеніе на 6 гл. т. *Эл. Б.* или *Эл. А.* или *Кр.* можетъ быть очень полезно. Въ теченіе дня *A.1* (2-й ст.), или попер. съ *S.1* (2-й ст.); на грудь и область сердца мазь *A. 2.*

Это же лѣченіе назначается при астмѣ, осложненной эмфиземой. Если астма осложняется бронхитомъ, то даютъ *P. 1* или *P. 3* × *S. 1* или *A. 1* (смотря по тѣлосложенію). Въ упорн. случаѣ на симп. нерв. мазь *C.5.* Теплыя ванны не годятся. Легкая пища и постоянное пребываніе на чистомъ воздухѣ дополняютъ лѣченіе.

Довольно часто астма является у людей золотушныхъ, какъ явленіе лишайнаго и подагрическаго предрасположенія.

Digitized by Google

Тогда она бываетъ попеременно то съ болѣзнью желудка, кишекъ, гортани, матки и пр. органовъ, то попер. съ раною, лишаемъ, экземою, сыпью, рожею, или еще при боли ревматической и въ сочлененіяхъ. Въ этомъ случаѣ, а равно, если причиною болѣзни скрывшаяся сыпь, экзема или подагра, главнымъ лѣкарствомъ должно быть *S. 1* (3-й ст.). Его даютъ, смотря по обстоятельствамъ, нѣкоторое время попер. съ *F. 1* или *A. 2* или *C. 1.*

Часто нервная астма у лимфатиковъ прекращалась отъ одного прил. *Эл. Кр.* къ зат. и сплет. нерв. Если послѣ этого приложенія астма усилится, то *Эл. Кр.* надо развести пополамъ съ водою.

Облегчаетъ часто также растворъ изъ 10—20 круп. *P. 3* въ полустаканѣ воды, частыми глоточками.

Для предупрежденія припадка астмы больной долженъ пребывать въ хорошо провѣтриваемомъ помѣщеніи, заботиться о правильномъ испражненіи на низъ и принимать: одну недѣлю 3 раза въ день по 5 круп. *S. 5*, въ другую недѣлю такъ же часто *A. 3*, и такъ продолжать втеченіе нѣсколькихъ недѣль; кромѣ того каждое утро 2—3 круп. *P. 1* и веч. 2—3 круп. *F. 1.* Почаще тепловатыя ванны съ 25 круп. *L.*

Излѣченія. Совѣты черезъ корреспонденцію: 1) въ Тульскую губ. М. 78 л. страдалъ бронхіальной астмой болѣе 2 лѣтъ. Въ Іюлѣ 1891 г. было назначено вн. *Эл. Анж. 1×A. 1* и нар. *P. 3* и *Эл. Анж.* Черезъ 5 мѣс. выздоровѣлъ. 2) Въ Москву. Дѣв. 24 л., съ 12 лѣт. возраста, вскорѣ послѣ скарлатины, страдала астмой, противъ которой ни аллопатія, ни гомеопатія не помогли. Въ Февралѣ 1892 г. было назначено вн. *A.* 3 × *S.* 1, нар. мазь *A.* 2. Черезъ 2 мѣс. выздоровѣла. 3) Въ Витебскую губ. М. 63 лѣтъ страдалъ астмой, осложненной эмфиземой, болѣе 20 л. Въ Мартѣ 1895 г. было назначено вн. *Эл. Анж., S. 1* и *A. 1* и нар. мазь *A. 2.* Черезъ три недѣли припадки астмы почти совершенно исчезли.

4) Въ г. Витебскъ. М. 44 л. около 4 л. страдалъ неврастеніей. Лѣчился у аллопатовъ стрихниномъ и мышьякомъ, и послѣ кратковременнаго облегченія неврастенія возвратилась. Назначено 30 окт. 1892 г. вн. *A. 2* × *S. G.* × *F.*, нар. *A. 2* и *F. 2* и ван. съ круп. Въ письмѣ отъ 4 февраля 1893 г. жена

Digitized by Google

пацiента написала автору этой книги, что отъ назначеннаго лѣченiя боли у ея мужа почти совершенно прошли, и безъ ваннъ, которыя не принималъ по случаю холода (*C*).

5) Въ г. Эривань. М. 23 л. страдалъ много лѣтъ сердцеб., приливами, слабостью въ ногахъ и безпричиннымъ страхомъ; начало своего невроза онъ не помнитъ. Назначено 24 окт. 1889 г. вн. *A.* 3 × *S.* *G.* × *F.*, нар. *A. 2.* Въ январѣ 1890 г. больной увѣдомилъ автора этой книги, что назнач. лѣченiе дѣйствуетъ волшебно, и что онъ на пути къ выздоровленiю, и что точно также тамъ выздоравливаетъ и знакомая его дама, обратившаяся къ автору этой книги за совѣтомъ относительно своихъ неврозовъ (*C*).

Ж. 42 л. страдала нервн. припадками, причемъ ея лицо принимало страшный видъ. Вылѣчена въ три недѣли: внутр. утромъ 5 сух. кр. *C. 1*, веч. 5 сух. кр. *S. 2*; внутрь 2 раза въ день по 10 капель *Эл. Желт.* въ ложкѣ воды, на лицо мазь *C.* 5 и на темя 10 капель *Э. Бѣл.* (*C*).

Безсонница является очень тягостнымъ осложненiемъ различныхъ болѣзней, лихорадочныхъ, нервныхъ и сопровождающихся сильными болями или мучительнымъ кашлемъ. Безсонница бываетъ также слѣдствiемъ чрезмѣрнаго нервнаго напряженiя, переутомленiя, возбуждающихъ напитковъ, обремененiя желудка и т. п.

Лѣченiе. Прежде всего необходимо устранить производящую причину, если таковыя извѣстны. Противъ безсонницы и нервнаго возбужденiя, бывающаго особенно вечеромъ въ постели, и при слабости и тяжести ногъ даютъ вн. *S. 1* × *F. 1* (2-й ст.); въ упорномъ случаѣ прибавить *A.* 1 (2—3-й ст.), а для дѣтей утр. и веч. по 2 круп. *Verm.* Противъ полной безсонницы принимать вечеромъ теплую ванну изъ *S.* 1 или *F. 2* или *L.*

Противъ безсонницы вслѣдствiе нервнаго напряженiя тѣ же средства и еще прил. на нервн. точки головы *Эл. Кр.* у мужчинъ, *Эл. Анж.* у женщинъ и дѣтей. Часто благотворно дѣйствуетъ прил. *Эл. Бѣл.* къ подошвамъ ногъ на 10—15 мин. Если имѣется запоръ, то должны быть приняты противъ него мѣры (См. *Запоръ*).

Боль составляетъ одинъ изъ самыхъ частыхъ болѣзненныхъ признаковъ. Рѣдкая болѣзнь не сопровождается болью

Digitized by Google

въ пораженномъ мѣстѣ или во всемъ тѣлѣ. Болью сопровождается большинство какъ острыхъ, такъ и хроническихъ болѣзней. Но боли бываютъ весьма различны и появляются на различныхъ частяхъ тѣла. Здѣсь мы укажемъ лишь тѣ боли, общія и мѣстныя, которыя могутъ служить болѣе или менѣе вѣскимъ признакомъ различныхъ болѣзней.

Головная боль (см. *Голова*).

Боль въ деснахъ составляетъ постоянный припадокъ флюса или воспаленія десенъ; встрѣчается при цынгѣ, общемъ сифилисѣ, отравленіи ртутью.

Боль въ языкѣ—при воспаленіи послѣдняго и ракѣ.

Боль въ нёбѣ—при костоѣдѣ нёбныхъ костей.

Боль въ зѣвѣ и глоткѣ (особенно при глотаніи)—при заглоточныхъ нарывахъ, воспаленіи надгортаннаго хряща, дифтеритѣ или гнилой жабѣ, иногда при крупѣ (при существованіи припадковъ этой болѣзни со стороны глотки).

Боль въ миндалевидныхъ железахъ и въ *нёбной занавѣскѣ*, особенно при глотаніи, — при простой, крупозной и гнилой жабѣ этихъ частей.

Боль во всей полости рта—при плѣсени, молочницѣ, изъязвленіяхъ во рту; при ртутномъ отравленіи и сифилитическомъ пораженіи рта.

Боль въ носу—при насморкѣ, простомъ (въ сильныхъ степеняхъ) и зловонномъ; болячкахъ, изъязвленіяхъ и полипахъ въ носу.

Боль въ ухѣ—при различныхъ страданіяхъ этого органа. Смотря по тому, на какой глубинѣ ощущается боль, можно съ нѣкоторою достовѣрностью опредѣлить и самое мѣсто пораженія.

Боль шеи. Вся шея болитъ, если отлежишь ее, т. е. если она неловко лежала во время сна; также если надуетъ въ нее, равно какъ при воспаленіи подкожной клѣтчатки шеи. Боли въ *передней части* шеи (гдѣ кадыкъ) указываютъ на пораженіе гортани (катарръ, воспаленіе, коклюшъ, дифтеритъ, гортанную чахотку и проч.); въ *задней*; около шейныхъ позвонковъ — на страданіе послѣднихъ (костоѣду), нижней части глотки или пищепровода (напримѣръ—нарывы).

Боли груди. Боли въ *верхней* части груди, *надъ ключицей*, по бокамъ шеи, бываютъ большею частью при бугорчаткѣ легкихъ; боль въ разныхъ частяхъ груди — при бугорчаткѣ легкихъ, воспаленіи послѣднихъ и подреберной плевы; боль въ *боковыхъ* сторонахъ груди (колотье)—при страданіи плевры; *меж*

Digitized by Google

реберная боль—при межреберной невралгіи (пораженія межреберныхъ нервовъ); боль на мѣстахъ прикрѣпленія грудобрюшной преграды—при воспаленіи послѣдней.

Боль въ правомъ подреберьи, простирающаяся до позвоночнаго столба и доходящая до праваго плеча, при различныхъ страданіяхъ печени.

Боли въ *лѣвомъ боку*, въ области селезенки—при болѣзняхъ послѣдней, бугорчаткѣ легкихъ, малокровіи, бѣлокровіи и перемежающихся лихорадкахъ.

Боли *въ лѣвомъ боку*, сопровождающіяся головокруженіями и сердцебіеніями--при болѣзняхъ сердца.

Боли въ лѣвомъ подреберьи—при различныхъ страданіяхъ желудка (катаррѣ, круглой язвѣ, ракѣ, воспаленіи и проч.).

Боли въ глубинѣ лѣваго подреберья (въ желудкѣ), появляющіяся всегда на одномъ и томъ же мѣстѣ и чрезъ извѣстное время послѣ принятія пищи, указываютъ на круглую язву или ракъ желудка.

Боли сердца -- при нервныхъ спазмахъ сердца; рѣдко при воспаленіи и органическихъ порокахъ его.

Боли въ животѣ. Мучительныя боли во всемъ животѣ, или на ограниченномъ мѣстѣ его, усиливающіяся отъ прикосновенія, служатъ признакомъ пораженія брюшины. Долговременныя боли въ *глубинѣ* живота (въ кишечномъ каналѣ), на одномъ и томъ же мѣстѣ, и усиливающіяся чрезъ извѣстное время послѣ принятія пищи, указываютъ на круглую язву кишекъ. Тупая боль у женщинъ *на средней линіи, надъ лобкомъ* составляетъ одинъ изъ припадковъ страданія матки и мочевого пузыря, *сбоку* яичниковъ или фаллопіевыхъ трубъ; у мужчинъ, особенно если она усиливается передъ мочеиспусканіемъ, — на страданіе мочевого пузыря. Мучительная боль *подъ лобкомъ*, пронизывающая до промежности, бываетъ при воспаленіи предстательной железы. Схватывающія коликообразныя боли во всемъ животѣ, или, вѣрнѣе, кишечномъ каналѣ, бываютъ при свинцовой коликѣ, воспаленіи кишекъ, холерѣ, воспаленіи брюшины, кровавомъ поносѣ, бугорчаткѣ кишечныхъ железъ; иногда при глистахъ.

Боль подъ лопаткой встрѣчается обыкновенно при бугорчаткѣ; также при чумѣ (пронизывающая, стрѣляющая боль); иногда при воспаленіи легкихъ и подреберной плевы.

Боли позвоночнаго столба--при сухоткѣ и различныхъ страданіяхъ спинного мозга.

Боли по бокамъ верхнихъ брюшныхъ по-

Digitized by Google

звонковъ, въ области почекъ, — сопровождаютъ страданія послѣднихъ; *боли на подобіе коликъ* въ почкахъ указываютъ на присутствіе камней или пузырчатыхъ глистовъ въ этихъ органахъ.

Боли въ крестцѣ и поясницѣ — при геморроѣ, оспѣ, страданіяхъ матки, предстательной железы, беременности.

Потугообразныя боли въ низу живота—при беременности признакъ выкидыша или родовъ; внѣ беременности—кистъ и другихъ новообразованій въ маткѣ.

Боли внутри брюшной полости, вдоль позвоночнаго столба, сопровождаютъ обыкновенно воспаленіе подвздошной мышцы.

Боли въ суставахъ составляютъ обыкновенно признакъ членосуставнаго ревматизма, подагры и бѣлой опухоли суставовъ.

Боль въ бедреномъ или вертлужномъ сочлененіи составляетъ постоянный припадокъ при бедреной боли и золотушномъ пораженіи бедреного сустава.

Боль въ колѣнѣ—при бѣлой опухоли въ колѣнномъ суставѣ, золотушномъ пораженіи колѣнной чашки.

Боль кожи (при прикосновеніи) встрѣчается обыкновенно при воспаленіи кожи и подкожной клѣтчатки.

Боли въ подкожныхъ мышцахъ — при мышечномъ ревматизмѣ и трихинной болѣзни.

Общая боль (ломъ) въ членахъ, особенно въ конечностяхъ, служитъ признакомъ простуды, тифа, чумы, возвратной горячки; оспы, кори и другихъ острыхъ и простудныхъ болѣзней.

Боли въ костяхъ носа, въ особенности если онѣ усиливаются ночью въ теплой постелѣ, а также *боли*, въ послѣднемъ позвонкѣ спинного хребта, *у поясницы*,—указываютъ на присутствіе послѣдствій сифилиса.

Боли въ стрѣловидномъ швѣ черепа *) у женщины служитъ признакомъ истерическаго состоянія.

Боль въ нижней части живота у женщины съ выдѣленіемъ изъ половыхъ частей жидкостей указываетъ на страданіе половыхъ органовъ. См. *Половые органы женскіе и ихъ болѣзни.*

Считаемъ излишнимъ входить здѣсь въ объясненіе прочихъ мѣстныхъ болей, какъ, напримѣръ, боли въ яичкахъ, зубахъ и проч., такъ какъ они уже сами по себѣ указываютъ мѣсто страданія.

---

*) Этотъ шовъ идетъ по продольному направленію черепа спереди назадъ и образуется между двумя темянными костями.

Digitized by Google

Эти различныя указанія необходимы при выборѣ лѣкарствъ.

Вообще всѣ боли, если онѣ случайныя и не происходятъ отъ внутренней причины или разстройства организма, проходятъ сразу и окончательно отъ приложенія Электро-Гомеопатическихъ жидкостей на соотвѣтствующіе нервы.

Если боль не поддается дѣйствію этихъ жидкостей, это значитъ, что нервы не служатъ болѣе проводниками; тогда, чтобы возстановить ихъ чувствительность, примѣняютъ ванны или примочки, или мазь изъ круп. *А*.1 и затѣмъ прикладываютъ электр. жидкости, которыя тогда дѣйствуютъ.

Послѣ того какъ боль пройдетъ вполнѣ или частію, и потомъ вновь возвратится, то это доказываетъ, что она происходитъ отъ внутренней причины, и потому противъ производящей причины примѣняютъ внутреннее лѣченіе, которое указано въ своемъ мѣстѣ.

Бредъ составляетъ постоянное явленіе при всѣхъ тяжкихъ лихорадочныхъ, воспалительныхъ и горячечныхъ болѣзняхъ, острыхъ сыпяхъ (оспа, корь, скарлатина), бѣлой горячкѣ и всѣхъ хроническихъ страданіяхъ, которыя влекутъ за собою разстройство дѣятельности мозга, какъ-то: сильная степень истощенія, бугорчатка, анемія мозга, душевныя болѣзни и пр.

Брюхо или **животъ** заключаетъ въ своей полости *брюшныя внутренности*. Онъ лежитъ между грудью и тазомъ, и своей передней стѣнкой выдается впередъ, болѣе или менѣе закругляясь. Боковыя области его между грудной клѣткой и безъименными костями таза называются *подвздошными*; области же на задней, или спинной сторонѣ, по обѣимъ сторонамъ позвоночнаго столба, называются *поясничными* или *почечными*. Стѣнки живота большею частію мягки (*брюшныя мышцы*); только сзади лежатъ кости, именно *5 поясничныхъ* или *брюшныхъ позвонковъ*, и на верхней (грудной) границѣ 5 послѣднихъ реберъ. Брюшныя мышцы не только покрываютъ, защищаютъ и движутъ брюшныя внутренности, но служатъ также для сгибанія верхней части туловища впередъ и въ стороны. Передняя брюшная стѣнка, у нижняго конца грудной кости, въ выемкѣ грудной клѣтки, представляетъ углубленіе (*подло-*

Digitized by Google

жечную ямку). Почти въ центрѣ живота, ниже подложечной ямки, находится *пупокъ*. Нижняя граница живота, гдѣ онъ сходится съ тазомъ, называется *паховою областью*; подъ нею находятся *бедреные сгибы*. *Брюшная полость* гораздо обширнѣе, чѣмъ бы можно было полагать по наружному объему живота. Это зависитъ отъ того, что крыша брюшной полости образуется *грудобрюшной преградой*, вдающейся за послѣдними ребрами вверхъ въ грудную полость. Кромѣ того, брюшная полость простирается и внизъ, въ большой тазъ. По вскрытіи живота, прежде всего бросается въ глаза тонкій, гладкій, блестящій, голубовато-бѣлый покровъ, одѣвающій большую часть брюшныхъ внутренностей и стѣнокъ; это *брюшина*. Содержащее жиръ продолженіе ея свѣшивается надъ кишками (какъ передникъ)—это такъ называемый *большой сальникъ*; другія продолженія брюшины служатъ для прикрѣпленія кишокъ и называются *брыжейками*.

Брюшная водянка происходитъ отъ накопленія воды въ брюшинѣ. Симптомы: больные жалуются на полноту; одежда, бывшая прежде свободною, становится узкою; при увеличеніи наполненія живота появляется одышка; давленіе, производимое жидкостію на прямую кишку, на почки и ихъ сосуды, можетъ причинить запоръ и уменьшеніе отдѣленія мочи. При стоячемъ положеніи нижняя половина живота представляется выпуклою, при лежачемъ животъ оказывается широкимъ.

При сильной брюшной водянкѣ въ брюшныхъ покровахъ почти всегда замѣчаются синія венныя сплетенія; пупокъ выпячивается, а раздвигающаяся ткань кожи образуетъ синевато-бѣлыя, просвѣчивающія полосы. Когда уровень жидкости поднялся выше малаго таза, то чувствуется зыбленіе, если одну руку приложить всею ладонью къ животу, а пальцами другой быстро ударить по противоположному мѣсту.

Брюшная водянка не есть самостоятельная болѣзнь, а является слѣдствіемъ различныхъ заболѣваній печени или почекъ или сердца и проч.

Лѣченіе. Искусственный проколъ для выпусканія накопившейся жидкости не приноситъ никакой существенной пользы,

Digitized by Google

такъ какъ она вскорѣ опять накопляется еще въ большемъ количествѣ, и онъ долженъ примѣняться лишь при угрожающей опасности задушенія, въ цѣляхъ сколь возможнаго еще продленія жизни.

Изъ лѣкарствъ необходимо во всѣхъ случаяхъ брюшной водянки *C*.5 въ мази и согрѣвающихъ компрессахъ. Такъ какъ водянка развивается лишь на почвѣ смѣшаннаго тѣлосложенія, то главными лѣкарствами являются Анжіотики попеременно съ Канчерозами, съ прибавленіемъ Фебрифуго при пораженіи печени.

Итакъ, если основная болѣзнь кроется въ почкахъ, то даютъ *A*. 1 (3-й, 2-ой ст.) × *C*. 6 (3—1 ст.)

Если причина — болѣзнь печени, то—*F*. 1 × *A*.3 × *C*.2 или *C*. 5 (3-й—1-й ст. до усилен. 1-го развед.); утр. и веч. втираніе въ подвздошья *Фебр.-мази* (желтой мази), а во все тѣло—*Кинчерозо-мазь* (зеленая). Теплыя ванны изъ *F*. 2.

Если она происходитъ отъ болѣзни сердца, то въ очень слабыхъ дозахъ (6-й—4-й ст.) *A*. 1 или *A*. 1 × *C*. 5 (3-й—2-й ст.).

Во всѣхъ случаяхъ подходитъ также *S*.1 вмѣсто *C*. или какъ прибавочное—2—3 раза въ день по 2—5 круп. сухими съ пищей.

Ср. въ алфавитномъ указателѣ „*Водянка*".

Воспаленіе брюшины, то-есть оболочки, одѣвающей внутреннюю поверхность полости живота и брюшныя внутренности. Симптомы: при острой формѣ, возвышеніе температуры до +40° Ц. и больше; сильная боль живота, увеличивающаяся отъ нажатія; рвота, частый пульсъ, сильное искаженіе лица. Если болѣзнь хроническая, боли появляются каждые 2, 3 или 4 дня, запоръ попеременно съ поносомъ, трудное пищевареніе, безпрестанныя напряженія живота, изліяніе воды.

Лѣченіе. На животъ положить кусокъ полотна, смоченный *Эл. Бѣл.*, а поверхъ сего смѣняемые черезъ 10—15 минутъ большіе горячіе компрессы изъ раствора *A*. 2, *C*. 5 и *F*. 2 по 20 круп. въ двухъ стаканахъ воды. Внутрь: *A*. 1 × *C*. 1 × *F*. 1 (3-й или 2-й ст.), черезъ каждыя 5—10 мин. по чайн.

Digitized by Google

лож. Не давать при этой болѣзни никакихъ слабительныхъ и съ клистиромъ быть очень воздержными. Полезно вводить утр. и веч. въ задній проходъ бѣлый или синій суппозиторій. Послѣ каждой рвоты давайте 5—10 круп. *S.* 1 или *Анти-маль-ди-маре* Пища можетъ быть лишь прохладная и жидкая и приниматься лишь въ очень маленькихъ количествахъ; противъ жажды брать въ ротъ маленькіе кусочки льда. При мучительномъ напорѣ на мочу черезъ кажд. 1—2 часа по 1—2 круп. *C.* 6 или *C.* 5 брать сухими, какъ промежуточное средство, а на область мочевого пузыря класть упомянутые выше компрессы. Въ каждую чайную ложку пищи класть 1 круп. *S.* 1.

При хронической формѣ тѣже вн. лѣкарства изъ 2 или 3 ст., также чрезъ $^1/_2$ часа по 1 кр. *C.* 5; а при лихорадкѣ *F.* 1. попер. съ однимъ изъ предыдущихъ.

Излѣченіе. Совѣтъ черезъ корреспонденцію. Брюшная водянка у молодой дѣвицы, значительная опухоль живота, происходящая отъ увеличенія брыжжеечныхъ железъ съ чрезвычайною худобою, вылѣчена вн. *C. 1* (2-й ст.) (С.).

Воспаленіе брюшины у беременной женщ. 35 л. вылѣчено *F.* 1 × *C.*1 на подвзд. *F.*2 и на жив. компр. *C. 5* и каждые $^1/_2$ часа по 1 круп. *C. 5* (С.).

Воспаленіе брюшины вслѣдствіе родовъ у женщ. 30 л. вылѣчено *F.*1 × С. 1 (2-й ст.), на подвзд. *F.*2 и на животъ прим. С. 5.

Бубоны бываютъ простые и сифилитическіе. Простые заключаются въ воспаленіи паховыхъ железъ вслѣдствіе золотухи, раздраженія ихъ внѣшними вліяніями и пр. лѣчатся какъ *болѣзни железъ и нарывы*. О лѣченіи же сифилитическихъ бубоновъ см. *Сифилисъ*.

Кромѣ того бубоны почти постоянно сопровождаютъ *чуму* и иногда *тифъ*.

Верхнія конечности, руки, прикрѣпляются къ туловищу и состоятъ каждая изъ нѣсколькихъ отдѣловъ, соединенныхъ между собою сочлененіями. Въ каждомъ отдѣлѣ отличаютъ двѣ поверхности, переднюю и заднюю и два края — наружный и внутренній. При отвѣсномъ положеніи тѣла руки свѣшиваются съ верхней части грудной клѣтки до середины реберъ; своими

Digitized by Google

нижними частями, костями, онѣ могутъ касаться до всѣхъ областей тѣла. На рукѣ отличаютъ *плечо*, *плечевину*, *предплечье* и *кисть*.

а) *Плечо* — самая верхняя часть руки, придающая туловищу, въ верхнемъ ея отдѣлѣ, надлежащую ширину. Спереди плечо образуется *ключицей*, сзади *лопаткой*. На лопаткѣ находится *суставная впадина* для плечевой кости (*плечевое сочлененіе*); ключица поддерживаетъ плечевое сочлененіе въ надлежащемъ удаленіи отъ грудной клѣтки и этимъ даетъ рукѣ свободу въ ея движеніяхъ. Подъ плечевымъ сочлененіемъ, между сильными мышцами, находится *подмышечная ямка*, въ которой заключены большая артерія и вена, нѣсколько толстыхъ ручныхъ нервовъ и многочисленные лимфатическіе сосуды.

б) *Плечевина руки* простирается отъ плечевого сочлененія до локтевого; она состоитъ изъ одной кости—*плечевой*, обложенной кругомъ мышцами, движущими предплечіе. Главная артерія пробѣгаетъ по внутренней сторонѣ этой части руки.

в) *Предплечіе*, лежащее между локтевыми и кистевыми сочлененіями, имѣетъ остовъ изъ двухъ костей: *локтевой*, на внутренней сторонѣ, соотвѣтствующей мизинцу, и лучевой, на наружной, соотвѣтствующей большому пальцу. Мышцы предплечія могутъ двигать лучевую кость, кисть и пальцы.

г) *Кисть*, на которой отличаютъ *ладонь* и *тылъ*, распадается на *запястье*, образованное 8 меленькими косточками (этотъ отдѣлъ примыкаетъ прямо къ кистевому сочлененію), *пястъ* съ 5-ю костями и 5 *пальцевъ* (большой, указательный, средній, безъимянный и мизинецъ), который, за исключеніемъ большого пальца, имѣютъ всѣ по 3 *сустава*; на послѣднемъ, третьемъ суставѣ, находится *ноготь*. Въ ладонѣ лежатъ двѣ артеріальныхъ дуги и множество нервовъ. На тылѣ ясно видны глазамъ и ощупываются плотныя сухожилія, принадлежащія длинной, идущей съ предплечія мышцѣ, разгибающей пальцы.

Атрофія. См. Мышцы.

Перемѣщеніе локтеваго нерва. Для лѣченія см. Атрофія.

Digitized by Google

Боль, препятствующая свободному движенію руки, проходитъ отъ приложенія *Эл. Кр.*, и если упорствуетъ, то на руку *C.* 5 или *S.* 5 или *A.* 2, ван. *C.* 5 или *S.* 1.

Онѣмѣніе руки лѣчится точно также, и потомъ *A.* 1 изъ 1-го ст.

Полунеподвижность суставовъ въ локтѣ и кисти лѣчится точно также.

Сведеніе руки вслѣдствіе порѣза нерва. Вн. *S.* 1 и компр. на плечев. нерв. *Эл. Бѣл.* попер. съ *Эл. Анж.*, или *Эл. Кр.* попер. съ *Желт.*

Въ упорномъ случаѣ на руку мазь или прим. *C.* 5, также мазь *S.*, тоже *Эл. Б.* въ компр., ван. *C.* 5.

Бездѣйствіе пальцевъ руки. Лѣчится какъ сведеніе руки.

Сжатый палецъ. Лѣчится точно также.

Ногтоѣда, или нарывъ на пальцѣ, большею частью образуется около ногтя, но можетъ быть на серединѣ и у основанія пальца. Такой нарывъ обыкновенно сопровождается значительнымъ воспаленіемъ окружающихъ частей съ чрезвычайно сильною болью, и нерѣдко причиняетъ костоѣду, отдѣленіе цѣлаго сустава или, по крайней мѣрѣ, обезображеніе и сведеніе пальца. Вн. и нар. *A.* 1 × *C.* 5 или *S.* 5 (2-ой, 3-ій ст.) черезъ каждые $^1/_4$—$^1/_2$ часа по чайной ложечкѣ.

Въ 2 дня проходитъ ногтоѣда отъ погруженія пальца въ теченіе дня въ *Эл. Зел.* и завертыванія пальца на ночь въ компр. изъ того же *Эл.* Точно также оказалось полезнымъ *Эл. Кр.* въ компр. и мазь *S.* 5, или *C.* 5. Цѣлесообразны горячія и мѣстныя ванны.

Вкусъ. *Измѣненіе вкуса* является вслѣдствіе разстройства желудка при лихорадочныхъ, воспалительныхъ и нервныхъ болѣзняхъ, страданіяхъ кишекъ, печени, селезенки, воротной вены, матки, головн. и спин. мозга, глистахъ, малокровіи и и при всѣхъ болѣзняхъ, отражающихся на пищеварительном каналѣ.

Потеря вкуса бываетъ полная и неполная, постоянная и временная. Полная происходитъ при параличѣ вкусоваго нерв (см. параличъ) и нѣкоторыхъ нервныхъ страданіяхъ причем

Digitized by Google

аппетитъ и дѣятельность бываютъ иногда совершенно нормальными, неполная—при разстройствѣ пищеваренія, лихорадкѣ и проч.

Лѣченіе должно быть направлено противъ производящей причины измѣненія и потери вкуса. Иногда потеря вкуса возстанавливается отъ прилож. *Эл. Кр.* на зат. и за уши съ правой стороны, *Эл. Желт.*—съ лѣвой.

Вн. *S.* 1 или *C.* 1 (3-й, 2-ой ст.), полосканіе, 3 раза въ день, изъ 10 круп. *C.* 5 въ стак. воды съ прибавленіемъ 20 капель *Эл. Кр.* или *Бѣл.*

Внезапный волчій голодъ. Внутр. *A.* 1 иногда *S.* 1 попер. съ *A.*1. Ср. *желудокъ*, *хроническій катарръ желудка*, *глисты*.

Водяная. Это болѣзненное накопленіе жидкости, болѣе или менѣе подобной сывороткѣ крови, въ толщѣ тканей и органовъ или въ закрытыхъ серозныхъ полостяхъ. Эта болѣзнь всегда составляетъ только признакъ и послѣдствіе (или произведеніе) другой, глубже лежащей болѣзни. Она бываетъ *легкая* (подкожная, отекъ) и *трудная*, внутри разныхъ полостей тѣла; можетъ появляться быстро вслѣдствіе острыхъ, скоротечныхъ мѣстныхъ и общихъ воспаленій, наприм., послѣ скарлатины (подкожная водянка), воспаленія шулятъ (отекъ), воспаленія оболочекъ мозга (острая головная водянка у дѣтей); происходитъ и отъ длительныхъ страданій съ измѣненіемъ состава разныхъ внутреннихъ органовъ,—отъ болѣзней сердца, печенки, селезенки, почекъ, яичниковъ, брюшныхъ железъ, суставовъ и разныхъ сывороточныхъ оболочекъ (подреберной плевы, околосердечной сумки, брюшины).

Лѣченіе. Количество излѣченій водяной лѣкарствами графа Маттеи весьма значительно. Въ каждомъ случаѣ водяной необходимо выяснить, какого органа заболѣваніе является причиной ея и давать соотвѣтствующія лѣкарства въ малыхъ, но часто повторяемыхъ дозахъ. См. *статьи, относящіяся къ соотвѣтствующимъ органамъ.*

Лѣченіе кромѣ того должно сообразоваться съ тѣлосложеніемъ больного, которое, впрочемъ, во всѣхъ случаяхъ водяной бываетъ всегда смѣшаннымъ. Поэтому во всѣхъ случаяхъ

Digitized by Google

водянки слѣдуетъ давать, между прочимъ, *Канчерозо*, особенно *C*.5 внутрь и въ ваннахъ; ванны теплыя, 2—3 раза въ недѣлю, а въ острыхъ случаяхъ даже каждый день съ послѣдующимъ потѣніемъ въ постели. Кромѣ того во всѣхъ случаяхъ давать 3 раза въ день передъ пищей *S*. 1, по 5 круп. сух.

Пища во всѣхъ случаяхъ должна быть легкая и питательная, нѣжные овощи, какъ спаржа, молодой, зеленый горошекъ, молодые бобы и т. д.; мясо лишь бѣлое и не жирное въ мелкихъ количествахъ; особенно же молоко, свѣжее пахтанье. Жажду свою больные могутъ утолять достаточнымъ питьемъ, но ни въ какомъ случаѣ не разрѣшаются спиртные напитки, ни вино, ни пиво.

Излѣченія. Совѣтъ черезъ корреспонденцію въ г. Кишиневъ М, 45 л. страдалъ общею водянкою отъ болѣзни печени, съ болью въ кишкахъ, вздутіемъ живота и запорами. Лѣченіе началось 2 ноября 1886 г.: вн. *A* × *C*. 2 × *F*. 1, нар. *F*. 2 и *A*. 2; въ письмѣ отъ 18 того же ноября больной увѣдомилъ, что онъ отъ этихъ лѣкарствъ ожилъ, ходитъ по двору, а сперва не могъ пройти по комнатѣ, а въ письмѣ отъ 16 января 1888 г. сообщилъ, что его здоровье измѣнилось до неузнаваемости къ лучшему, и черезъ мѣсяцъ совершенно выздоровѣлъ (*C*.).

Подобныхъ случаевъ излѣченій черезъ корреспонденцію общей водянки, происходившей отъ разныхъ причинъ, было много (*C*).

Волосы бываютъ длинные, короткіе и въ видѣ пушка; въ нихъ различаютъ *корень* или часть, заключенную въ углубленіе кожи, оканчивающуся внизу *волосовою сумкою*, и *стержень*, или свободно стоящую на поверхности кожи часть волоса. Главную массу стержня составляютъ роговыя пластинки (клѣтки), крѣпко сросшіяся между собою и образующія снаружи корковое вещество въ видѣ цилиндра; внутри этого цилиндра находится *мозговое вещество волоса* изъ пигментовыхъ клѣтокъ, сообщающихъ волосамъ различный цвѣтъ у различныхъ людей; отъ высыханія этихъ клѣтокъ, при недостаточномъ питаніи ихъ пигментъ въ нихъ исчезаетъ и волосы сѣдѣютъ.

Лѣченіе. При слабомъ рощеніи волосъ или при начи-

Digitized by Google

нающемся выпаденіи ихъ, если не имѣется сифилиса или какой-либо накожной болѣзни, слѣдуетъ избѣгать всякихъ помадъ и мазей. Всего лучше утромъ и вечеромъ втирать спиртнымъ растворомъ *C.* 5, *S.* 5, по 10 крупинокъ съ каждаго въ 1 унціи воды и 3 унціяхъ виннаго спирта, съ добавленіемъ 1 ч. л. *Эл. Кр.* и 3 раза въ день принимать *S.* 1 по 5 круп. передъ ѣдой. Необходимо, кромѣ того, заботиться о надлежащей чистотѣ кожи и удаленіи (счесываніи) накопляющейся перхоти. Если причина—сифилисъ, то къ упомянутому раствору прибавить также 10 круп. V. при соотвѣтствующемъ внутреннемъ лѣченіи. При выпаденіи волосъ послѣ тяжелыхъ лихорадочныхъ болѣзней—къ тому же раствору прибавить 10 круп. *F.* 2.

Перхоть на головѣ. См. *Себоррея.*

Плѣшивость у м. 42 л., продолжавшаяся 16 л., вылѣчена въ семь недѣль, и голова покрылась волосами отъ внутр. употребленія *A.*3 и *V.*, втиранія въ голову три раза въ день *Эл. Зел.*, и мази *V.*, разъ въ недѣлю бритье головы.

Воспаленіе. Слово *воспаленіе* выражаетъ собою особаго рода мѣстный процессъ, сопровождаемый возвышеніемъ температуры, и оно будетъ существовать во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ *жаръ*, *краснота*, *опухоль* и *боль* присутствуютъ въ одно и то же время. Присоединивъ къ этому еще *разстройство отправленія* въ воспаленной части, какъ пятый признакъ, получатся всѣ явленія, лежащія въ основѣ многихъ процессовъ, особенно въ видимыхъ слизистыхъ оболочкахъ и кожѣ, извѣстныхъ подъ именемъ воспаленія. Краснота, присутствіе которой необходимо для того, чтобы назвать часть воспаленною, предполагаетъ уже собою непремѣнное существованіе въ этой части кровеносныхъ сосудовъ. Но въ частяхъ, не имѣющихъ сосудовъ, какъ напримѣръ средина роговой оболочки, могутъ и безъ красноты происходить тѣ же самыя измѣненія, которымъ подвергаются сосудистыя части, если только первыя будутъ поставлены въ условія, при которыхъ происходитъ воспаленіе послѣднихъ. Посему воспаленіемъ поражаются всѣ ткани тѣла, какъ сосудистыя, такъ и безсосудистыя, слизистыя и роговыя оболочки, кости, хрящи,

Digitized by Google

мускулы и пр. Если воспаленіе развивается на слизистыхъ оболочкахъ, то они дѣлаются темно-красными, припухаютъ и выдѣляютъ сначала слизистую, а потомъ слизисто-гнойную жидкость.

Воспаленіе слизистыхъ оболочекъ называютъ *катарромъ*; то, что въ общежитіи называется насморкомъ, есть катарръ или воспаленіе слизистой оболочки носа; бѣли есть выдѣленіе, сопровождающее воспаленіе или катарръ слизистой оболочки влагалища и матки.

Кромѣ катарральнаго, слизистыя оболочки поражаются еще крупознымъ и дифтеритическимъ воспаленіемъ. *Крупознымъ* воспаленіе называется тогда, когда выдѣляемое слизистыми оболочками сгущается и превращается въ пленки, плотно пристающія къ оболочкѣ; *дифтерическимъ* называется тогда, когда воспаленіе развивается не на поверхности оболочки, а въ толщѣ, и часть оболочки омертвѣваетъ.

Отсутствіе или внезапное прекращеніе боли въ случаѣ воспаленія есть зловѣщее проявленіе; оно можетъ указывать на внезапный переходъ воспаленія на другой органъ, въ большинствѣ случаетъ на мозгъ. Впрочемъ, это не такъ опасно, какъ переходъ воспаленія въ омертвѣніе и послѣдующую потерю ощущенія.

Воспаленіе распространяется или на непрерывномъ продолженіи, или на близлежащія ткани, или же на отдаленные органы и ткани. Послѣднее происходитъ или помощью кровеносныхъ сосудовъ, механическимъ и химическимъ путемъ, или помощью лимфатическихъ сосудовъ.

Исходы воспаленія бываютъ различные. Прежде всего оно можетъ прекратиться безъ всякихъ явленій: опухоль начнетъ опадать, краснота и жаръ исчезнутъ, прекратится и боль, начнетъ появляться возобновленіе функцій, и, наконецъ, возстановится нормальное состояніе воспаленной части. Этотъ исходъ называется *разрѣшеніемъ* воспаленія.

Второй исходъ воспаленія есть *затвердѣніе* или *оплотнѣніе*, при которомъ послѣ воспаленія остается плотная ткань, вновь образованная.

Digitized by Google

Третій исходъ—нагноеніе (suppuratio), когда въ воспаленной части образуется очагъ, наполненный *гноемъ*.

Четвертый исходъ—изъязвленіе, при которомъ ткани распадаются на мельчайшія частицы, невидимыя простымъ глазомъ, то есть ткань умираетъ и омертвѣвшій участокъ *теряетъ свою форму*.

И *пятый исходъ—омертвѣніе*, когда цѣлый участокъ ткани или даже цѣлый органъ, напримѣръ, палецъ, или рука, нога омертвѣваетъ и иногда отпадаетъ, при чемъ омертвѣвшія ткани, если онѣ не отпали, сохраняютъ свою форму.

Очевидно, что изъ всѣхъ этихъ исходовъ самый благопріятный есть разрѣшеніе, и потому къ достиженію его всегда и должно стремиться.

Воспалительный процессъ въ тканяхъ можетъ длиться нѣсколько дней, или много недѣль, и тогда называется *острымъ*, или отъ нѣсколькихъ мѣсяцевъ до нѣсколькихъ лѣтъ и называется *хроническимъ*.

При остромъ воспаленіи всегда бываетъ лихорадка, при хроническомъ—ея не бываетъ; если она показывается, то это означаетъ, что въ состояніи воспаленной части произошло ухудшеніе или, какъ говорятъ, хроническое воспаленіе обострилось.

При лѣченіи всѣхъ, безъ исключенія, воспаленій должно стараться скорѣе прервать лихорадку съ *F*. 1, внутрь въ частыхъ пріемахъ изъ 1-го или 2-го стакана и частыми компрессами на подвздошье изъ *F*. 2, а затѣмъ *S*. 1 или *A*. 1 или оба попеременно, а въ упорныхъ случаяхъ съ *C*. 1, а противъ сильной опухоли и боли *S*. 5.

Лѣченіе воспаленій отдѣльныхъ органовъ указано въ своихъ мѣстахъ.

Глаза. Главная часть зрительнаго органа—*глазное яблоко*; внутри его зрительный нервъ разстилается въ видѣ оболочки, нервной или *сѣтчатой оболочки*, и на этой оболочкѣ отражаются предметы, на которые обращенъ глазъ, въ видѣ маленькихъ изображеній. Отсюда изображенія передаются зрительнымъ нервомъ головному мозгу. Глазное яблоко лежитъ

Digitized by Google

въ костной полости глазницы, окруженное мягкимъ жиромъ. Стѣнка глазнаго яблока состоитъ изъ трехъ слоевъ: первый наружный слой составляется *роговою* оболочкою и *бѣлочною*. Этотъ слой даетъ форму глазному яблоку и служитъ мѣстомъ для прикрѣпленія глазныхъ мышцъ. *Роговая оболочка прозрачна* и лежитъ впереди, по срединѣ той части глаза, которая видима между вѣками при открытыхъ глазахъ; позади ея лежитъ голубое или бурое кольцо (*радужная оболочка*), съ круглымъ чернымъ отверстіемъ (*зрачекъ*). Бѣлокъ глаза есть передній отдѣлъ *непрозрачной бѣлочной оболочки глаза*, имѣющей позади отверстіе для входа зрительнаго нерва. Видимая между вѣками часть глазнаго яблока одѣта еще тонкою оболочкою, *соединительною*; на роговой оболочкѣ она образуетъ только тоненькій слой (эпителій); съ бѣлочной оболочки соединительная заворачивается на внутреннюю поверхность вѣкъ. *Второй, средній слой* состоитъ изъ *сосудистой оболочки* и *радужной*. Сосудистая лежитъ на внутренней поверхности бѣлочной и также имѣетъ въ заднемъ своемъ отдѣлѣ отверстіе для зрительнаго нерва. Ея передній, утолщенный край отчасти прикрѣпляется къ краю роговой оболочки посредствомъ *рѣсничной связки*, отчасти образуетъ *рѣсничное тѣло*, т.-е. вѣнецъ, лежащій вокругъ хрусталика. *Радужная оболочка* или *ирисъ* представляетъ пластинку съ круглымъ отверстіемъ въ срединѣ. Ирисъ лежитъ въ передней части глаза такимъ образомъ, что его передняя, пестрая (бурая или голубая) сторона видна чрезъ роговую оболочку, между тѣмъ какъ задняя, черная сторона направлена къ рѣсничному тѣлу и хрусталику. Круглое отверстіе въ центрѣ ириса, представляющееся, если смотрѣть въ глазъ, въ видѣ чернаго круга, окруженнаго пестрымъ кольцомъ—есть *зрачокъ*. Зрачокъ пропускаетъ свѣтовые лучи въ задній отдѣлъ глаза; такъ какъ радужная оболочка содержитъ мышечныя волокна, то зрачокъ можетъ расширяться или съуживаться, и такимъ образомъ пропускать большее или меньшее количество свѣтовыхъ лучей. *Третій* или *внутренній слой* расположенъ на внутренней поверхности сосудистой оболочки и образуется прозрачною *нервною* или *сѣтчатою* оболочкою.

Digitized by Google

Эта оболочка есть окончаніе *зрительнаго нерва*; она служитъ для зрительныхъ ощущеній и, слѣдовательно, есть самая существенная часть глаза. Нечувствительность сѣтчатой оболочки производитъ слѣпоту, называемую *темною водою*.

Прозрачное ядро, выполняющее полость глазного яблока, состоитъ изъ стекловиднаго тѣла, хрусталика и водянистой влаги. *Стекловидное тѣло* есть прозрачный, какъ вода, шаръ, выполняющій задній большой отдѣлъ глазного яблока и окруженный сѣтчаткою. Спереди, на той сторонѣ этого шара, которая обращена къ зрачку, находится углубленіе въ видѣ тарелки; здѣсь помѣщается *хрусталикъ*, который заключенъ въ прозрачную сумку; если онъ сдѣлается непрозрачнымъ принявъ бѣловато-сѣрый цвѣтъ, то происходитъ *катаракта*.

Глазное яблоко имѣетъ *вспомогательные органы*, которые служатъ или для его *движенія* (глазныя мышцы) или для *защиты*, какъ вѣки, рѣсницы, брови и сальныя железки, или для *очищенія* (слезный аппаратъ).

Глазныя мышцы, которыя по нашей волѣ могутъ двигать глазъ по всѣмъ направленіямъ, лежатъ внутри глазничной полости. Ихъ шесть: 4 прямыхъ и 2 косыхъ. При укороченіи какой-либо мышцы глазъ *коситъ*.

Вѣки (верхнее и нижнее) движутся отчасти произвольно, отчасти непроизвольно, напр., при миганіи. При движеніяхъ вѣкъ слезы омываютъ глазное яблоко, что необходимо для чистоты и прозрачности роговой оболочки. Короткіе, жесткіе, волоски по краямъ вѣкъ называютъ *рѣсницами*. Рѣсницы и края вѣкъ смазаны густою, жирною жидкостью, *глазнымъ саломъ*, которое приготовляется множествомъ маленькихъ мѣшечковъ, которые открываются позади рѣсницъ и заключены въ толщѣ вѣкъ (*мейбоміевы железки*).

Слезы, водянистая жидкость соленаго вкуса, при помощи миганья вѣками безпрерывно омываютъ переднюю поверхность глаза, очищая ее и предохраняя отъ высыханія. Они приготовляются въ *слезныхъ железахъ*, лежащихъ въ передней части глазницы, вверху и снаружи.

Брови оттѣняютъ глаза сверху, задерживаютъ потъ, стекающій со лба и не допускаютъ его до глазъ.

Digitized by Google

Болѣзни глазъ.

При лѣченіи глазныхъ болѣзней необходимо: 1) избрать лѣченіе, соотвѣтствующее тѣлосложенію больного (см. стр. 111), спеціально же примѣнять *Марина* вн. и нар.; 2) прежде всего примѣнить Эл. Гом. жидкости (*Кр.*, *Анж.*, *Бѣл.*), отъ приложенія которыхъ къ зат., подглаз., надглазн. и симп. нерв., видимо уменьшаются слезотеченіе, свѣтобоязнь, краснота, жженіе и опухоль; 3) если только одинъ глазъ страдаетъ, то нужно лѣчить оба глаза, потому что они солидарны и въ сущности составляютъ только одинъ органъ; употреблять глазную ванну (см. стр. 95), и 4) остерегаться прижиганій глазъ, чѣмъ бы то ни было.

Воспаленіе вѣкъ выражается краснотою и припухлостью ихъ слизистой оболочки. Въ остромъ состояніи чувствуется зудъ и даже боль въ вѣкахъ и по утрамъ выдѣляется густая слизистая жидкость, склеивающая вѣки. По большей части всѣ золотушные подвержены этой болѣзни. У нихъ воспаленіе имѣетъ хроническій характеръ. Внутрь *S.* 2 или *Марина* (2-й ст.) или *C.* 1 (3-й ст.) × *A.* 1 (3-й ст.) черезъ часъ по ч. л.; холодныя или тепловатыя примочки, смѣняемыя черезъ кажд. 10—15 м. изъ раствора 15 круп. *Мар.* и 1 ч. л. *Эл. Бѣл.* въ стаканѣ воды, въ застарѣлыхъ-же случаяхъ—изъ раствора 15 круп. *C.* 5 и 1 ч. л. *Эл. Зел.* въ стак. воды и смазываніе краевъ вѣкъ *бѣлой*, *красной* или *зеленой мазью*. Къ зат., симп. подглаз., надглаз. нерв., ко лбу и перен. *Эл. Анж.* или *Эл. Кр.* × *Ж.*; ван. *C.* 5.

Параличъ вѣкъ встрѣчается при одностороннемъ параличѣ и обнаруживается неподвижностью (сомкнутостію) вѣкъ. Вн. *S.* 1 и *Эл. Кр.* на виски, подглаз. и надглазн. нерв. Въ упорномъ случаѣ предъидущія лѣкарства, а также на вѣки мази *S.* или *A.* 2.

Судорожное сжатіе вѣкъ весьма трудно распознается отъ паралича вѣкъ и обусловливается почти исключительно общею золотухой. Утр. и веч. прил. *Эл. Кр.* × *Эл. Желт.* на гл. точки

Digitized by Google

головы. Въ упорномъ случаѣ *А.* 2 × *С.* 1 (2-й ст.). Прим. изъ этихъ же лѣкарствъ на надглаз. нерв. Къ зат., симп. и подглаз. нерв. *Эл. Б.*

Зернистость вѣкъ, трахома. При гнойномъ воспаленіи соединит. оболочки слизистая оболочка вѣкъ покрывается сплошною массою увеличенныхъ сосочковъ, они перемѣшаны съ сѣроватыми точками или расросшимися грануляціями, которыя тверды такъ, что внутренняя поверхность вѣкъ имѣетъ видъ гранулирующей язвы. Болѣзнь заразительная и можетъ быть причиною порчи зрѣнія, а иногда и полной слѣпоты. Вн. *С.* 3 × *А.* 3 × *V.* (1-й стак. или усилен. 1-е развед.), глазн. ванны изъ 2 круп. *С.* 3, *А.* 2 × *V.* на количество воды, заключающееся въ глазной ванночкѣ. Утр. и веч. *F.* 1, по 2 круп. и *Эл. Кр.* × *Эл. Желт.* на п. 7 головы. Если при трахомѣ роговая оболочка помутнена, то давать *А.* 1 × *С.* 3 (1-й ст.), постепенно усиливая дозу и указан. глазн. ванны. Нар. на гл. точку 7 *Эл. Анж.* утр. и веч.

Воспаленіе соединительной оболочки глазъ почти всегда бываетъ одновременно съ воспаленіемъ вѣкъ. Соединит. оболочка представляется красною, сосуды ея рѣзко очерчены и переполнены кровью; чувствуется жгучая боль, сильная свѣтобоязнь и слезотеченіе.

Хроническое воспаленіе соедин. оболочки. Тѣ же симптомы, безъ боли, но съ болѣе или менѣе обильнымъ выдѣленіемъ гноя.

Лѣченіе. Вначалѣ, при остромъ воспаленіи, холодныя примочки изъ раствора 20 круп. *Марина* и 10 круп. *А.* 2 и 1 чайн. лож. *Эл. Бѣл.* въ стак. воды, позднѣе и въ хронич. случаяхъ — согрѣвающ. компрессы изъ раствора *С.* 3, *А.* 2 и *Эл. Зел.* Въ глазъ пускать утр. и веч. по 1 каплѣ *Эл. Бѣл.*, позднѣе — *Эл. Зел.* Вн. *С.* 3 × *А.* 3 (1-й ст.). Въ упорн. случаѣ прибавить *V.* вн. и наружу.

Гнойное воспаленіе соедин. оболочки отличается отъ простаго воспаленія болѣе сильными припадками боли и свѣтобоязни, а также обиліемъ гноя; послѣдствіемъ бываетъ помутнѣніе и изъязвленіе прозрачной роговой оболочки и нерѣдко совершенная потеря зрѣнія. Болѣзнь заразительная. Ср. *сифилисъ, перелойное воспаленіе глазъ.*

Digitized by Google

Лѣченіе. Наружно *Эл. Кр.* × *Эл. Желт.* или *Эл. Анж.* × *Эл. Зел.* на гл. н. точки и холодные компрессы изъ раствора 10 круп. *V.*, 5 круп. *A.* 2 и 30 кап. *Эл. Бѣл.* въ стак. воды, на оба глаза. Этотъ же растворъ впускать, по 1—3 капли, во внутрен. уголъ глаза. Вн. черезъ часъ по очереди по 1 круп. *A.* 1 × *V.* × *S.* 2 и эти же лѣкарства изъ 3-го стакана. Когда раздраженіе глазъ уменьшилось, то холодн. компр. замѣнить согрѣвающими, внутрь тѣ же средства, но въ болѣе рѣдкихъ пріемахъ, не черезъ 15—20 минутъ, а черезъ часъ. Къ болѣе сильнымъ разведеніямъ перейти лишь при замѣтномъ улучшеніи.

Сифилитическое воспаленіе глазъ. См. *сифилисъ.*

Перелойное воспаленіе глазъ. См. *трипперъ.*

Золотушное воспаленіе глазъ всегда хроническое, *очень упорное*, часто сопровождается постояннымъ затвердѣніемъ подчелюстныхъ железъ и хроническимъ воспаленіемъ вѣкъ, которыя выпуклы, выворочены впередъ или изъязвлены. Эти изъязвленія бываютъ часто на глазномъ яблокѣ (у дѣтей), осложняютъ острое воспаленіе глазъ и по заживленіи оставляютъ послѣ себя *бѣльма.* Изъ глазъ и вѣкъ вытекаетъ липкій, желтоватый гной. Въ продолженіе двухъ мѣсяцевъ вн. *S.* 1 изъ 2-го ст., загѣмъ въ теченіе мѣсяца изъ 3-го ст. и, наконецъ, точно также *S.* 1, 5 и имъ заканчиваютъ лѣченіе. Наружно: прим., ван. *S.* 1 × *S.* 5 и *Эл. Кр.* Въ упорн. случаѣ *S.* 5 × *C.* 1 (3-й ст.).

Ослабленіе зрѣнія происходитъ иногда отъ малокровія, упорныхъ запоровъ, общей слабости, ночнаго бдѣнія и утомленія глазъ. Устранить причину, ея производящую, и вн. *S.* 1 или *A.* 1 и нар. *Эл. Кр.* или *Эл. Анж.*

Слѣпота внезапная зависитъ отъ прилива крови позади глазъ. Нужно спѣшить приложить прим. на глаза *Анж.* 1, а на зат., подглаз. и надглаз. нерв. *Эл. Анж.* Для предупрежденія возврата необходимо возстановить правильность кровообращенія внутреннимъ употребленіемъ *A.* 1 (средняя доза) и предупреждать запоры.

Слезная фистула. Маленькій нарывчикъ, образующійся въ

Digitized by Google

каналѣ внутренняго угла глаза. Сперва замѣчаютъ маленькую опухоль или мѣшокъ, который распухаетъ. При нажимѣ этого мѣшка изъ него вытекаетъ чрезъ глазъ или чрезъ соотвѣтствующую ноздрю содержимое этого мѣшка, затѣмъ опухоль исчезаетъ и потомъ вновь образуется. Выдѣленіе слезъ постепенно увеличивается; онѣ сгущаются, превращаются въ гной, послѣ чего опухоль воспаляется и маленькій узкій каналъ, язвеннаго свойства, открывается или по направленію къ глазу, или въ ноздрѣ. Это и есть фистула, которая столь упорна для аллопатіи и хирургіи. Вылѣчивается быстро вн. и нар. *S.* 1 и *Эл. Кр.* При нагноеніи вн. *S.* 1 × *C.* 1 и прим. *Марина.*

Темная вода, болѣзнь при которой глазныя яблоки кажутся здоровыми: чисты, свободно движутся, естественно ясны и блестящи, свѣтобоязни нѣтъ, но зрѣніе разстроено, а при хорошемъ освѣщеніи больные еще могутъ видѣть, но въ сумеркахъ ничего не видятъ; передъ глазами неподвижныя черныя точки, больной различаетъ предметы въ гораздо меньшемъ разстояніи въ стороны, все кажется окутаннымъ вуалемъ. Темная вода бываетъ въ одномъ или въ обоихъ глазахъ.

Лѣченіе. Утр. и веч. *Эл. Кр.* на нервн. точки головы, утр.—2—3 круп. *Марина (Marina)*, веч.—2—3 круп. *F.* 1.

Катаракта состоитъ въ обширномъ помутнѣніи хрусталика или его сумки, которое измѣняетъ различно цвѣтъ зрачка, при чемъ часто совершенно теряется зрѣніе, между тѣмъ стекловидное тѣло и сѣтчатая оболочка совершенно здоровы. *Лѣченіе.* Вначалѣ *A.* 3 × *S.* 2 × *Мар.* (3-й ст.); при значительномъ уже развитіи катаракты — эти же лѣкарства изъ 2-го и 1-го стак. до усиленнаго 1-го ст. Кромѣ того 3 раза въ день по 3—5 круп. *S.* 1 и утр. и веч. *F.* 1. Подагрическимъ субъектамъ: вмѣсто *S.* 1 принимать *L.* Наружно: глазн. ванны, на оба глаза одновременно, изъ раствора 2 круп. *C.* 3 и 2 кап. *Эл. Кр.* на каждую ванну. Въ упорн. случ.: по 5 — 15 круп. *Мар.* и *C.* 3 съ 10—30 капл. *Эл. Кр.* на глазн. ванну. Продолжительность глазной ванны: 8—10 минутъ.

Стафилома. Опухоль на глазномъ яблокѣ въ видѣ вино граднаго зерна лѣчится какъ катаракта, даже если бы он

Digitized by Google

была на обоихъ глазахъ отъ рожденія. При выпуклой стафиломѣ прим. на ночь на глаза *S.* 1 или *C.* 5, или *A.* 2, сообразуясь съ тѣлосложеніемъ, а на подвзд. *F.* 2 попер. съ *C.* 5. Вн. *S.* 1 (1-й ст.) одно или попер. съ *A.* 1, а въ упорн. случаѣ попер. съ *C.* 5 (1-й ст.) и на глаза прим. *L.* × *Эл. Бѣл.* Если она венерич. свойства, то лѣчится точно также, но съ прибавленіемъ вн. и нар. *V.* По прошествіи болѣе или менѣе короткаго времени, смотря по степени болѣзни, роговая оболочка очищается и становится прозрачною.

Бѣльма или пятна на роговой оболочкѣ бываютъ *поверхностныя*, въ видѣ неправильнаго облачка или налета, *толщевыя*—въ видѣ потемнѣній всей толщи рогов. оболочки молочнаго, бѣловато-сѣраго или сѣраго цвѣта; рубцовыя—сухожильнаго или перламутроваго вида.—При этомъ разстройство зрѣнія тѣмъ значительнѣе, чѣмъ бѣльмо больше и ближе къ центру роговой оболочки. Вн. *A.* 3 × *C.* 3 × *V.* (2 и 1 ст.), утр. и веч.—*F.* 1 по 2—3 круп. и глазн. ван. изъ 2—3 круп. *C.* 3 и 1—2 кап. *Эл. Зел.*

Кровоизліянія въ сѣтчатую оболочку происходятъ отъ общихъ страданій кровеносной системы, прекращенія регулъ приливовъ крови и проч. Зрѣніе болѣе или менѣе помрачается. Вн. и нар. *A.* 1. Въ упорномъ случаѣ *A.* 2 (2-й ст.), на всю голову мазь *A.* 2 и *C.* 5, ван. *C.* 5, къ зат., симп. и на всѣ нервы головы *Эл. Анж.* На подвзд. мазь или прим. *F.* 2 или *C.* 5.

Подтеки подъ глазами, глаза налиты кровью. Лѣчатся какъ предъидущая.

Ячмень на глазу есть результатъ засоренія одной изъ сальныхъ железъ и представляетъ небольшой нарывчикъ на краю вѣка. Вн. *A.* 1 × *S.* 1 (1-й ст.) и мазь *C.* 5.

Косоглазіе ведетъ къ разстройству зрѣнія. Проходитъ иногда отъ одного приложенія *Эл. Кр.* къ зат., виск., подгл. и надгл. нерв. Въ упорн. случаѣ вн. *S.* 1 попер. съ *C.* 1 и 2 раза въ день *Эл. Кр.* на тѣ же мѣста.

Близорукость и дальнозоркость зависятъ отъ ненормальнаго устройства глазъ и, если зрѣніе значительно страдаетъ.

Digitized by Google

то слѣдуетъ обратиться къ спеціалисту врачу для выбора надлежащихъ очковъ. Дѣтямъ въ одномъ и другомъ случаѣ полезно принимать сухими утр. и веч. *F.* 1, а днемъ 2 раза *S.* 1, для предупрежденія сильнаго развитія такой ненормальности.

Куриная слѣпота, болѣзнь, при которой больной днемъ видитъ вполнѣ хорошо, но вечеромъ, при лунномъ или искусственномъ свѣтѣ, не можетъ различить предметовъ или видитъ ихъ въ туманѣ. Лѣчится какъ темная вода, но иногда проходитъ отъ одного приложенія къ зат., подгл. и надгл. нерв. *Эл. Кр.*

Двоезрѣніе, болѣзнь, при которой предметы кажутся въ двойномъ видѣ, маленькіе предметы трудно различаются, чтеніе почти не возможно. Вн. *A.* 1 или *A.* 1×*S.* 1 (1-й ст.). Къ зат. подгл., надгл. и симп. нер. соотв. *Эл.* Примочки на глаза изъ *Эл. З.*

Слезотеченіе, болѣзненное и постоянное истеченіе слезъ. Вн. *S.* 1×*C.* 1. Промывать глаза въ глазной ваннѣ *Эл. Кр.* съ водою попер. съ *Марина.*

Объ очкахъ — консервахъ. Для консервовъ нужно брать стекла большія и круглыя.

Стекла должны быть чисты, безъ полосокъ, царапинъ, желобковъ, чисто-сѣраго дымчатаго цвѣта безъ желтоватаго или буроватаго оттѣнка. Недостатки стекла легче замѣтить, положивъ его на бѣлую бумагу.

Если нужно дымчатость стеколъ соединить въ очкахъ съ измѣненіемъ переломляемости, то нужно помнить, что при очень выпуклыхъ или выгнутыхъ №№ средина и края стекла будтъ окрашены неравномѣрно, и глазъ, вращаясь, будетъ встрѣчать разные оттѣнки свѣта. Поэтому лучше тѣ оптическія стекла, которыя не сами окрашены, а покрыты наклееннымъ на нихъ дымчатымъ стекломъ.

Показанія къ употребленію консервовъ: впечатлительность къ свѣту (блондины); свѣтобоязнь, плохое зрѣніе отъ разстройства сѣтчатки или сосудистой оболочки; воспаленія краевъ вѣкъ; отсутствіе рѣсницъ; воспаленіе роговой и радужной обо-

Digitized by Google

лочки; помутнѣнія роговицы или хрусталика; развивающаяся катаракта; золотушное воспаленіе глазъ у дѣтей; расширеніе зрачковъ послѣ операціи.

Для здоровыхъ: сильный отраженный свѣтъ отъ песковъ, смѣта, зданій, движущейся воды, искусственное желтое освѣщеніе.

Предосторожность: безъ надобности консервовъ не носить, напр. въ сумерки, въ комнатѣ, въ тѣни, выбирать №№ свѣтлыхъ оттѣнковъ, послѣ долгаго употребленія не переставать носить консервы сразу, особенно темныхъ оттѣнковъ, а постепенно переходить къ слабымъ и *постепенно* пріучать глаза къ свѣту. (Изъ календаря для врачей на 1885 г.)

Излѣченія. М. 55 л., страдалъ $1^1/_2$ года воспаленіемъ соед. оболочки, грануляціями и ослабленіемъ зрѣнія. Вылѣченъ въ 10 дней вн. *А.* 1 (2-й ст.) × *S.* 1 (1-й ст.) нар. прим. *А.* 1 и *S.* 1 и *Эл. Анж.* (*С*).

— Д. 20 л., часто подвергалась кровоизліянію въ сѣтчатую оболочку, съ болью и свѣтобоязнію. Для лѣченія прежде требовалось пребываніе 6 нед. въ темной комнатѣ. Въ этотъ разъ вылѣчена въ 4 дня вн. и нар. *А.* 1 и *Эл. Анж.* (*С.*).

— М. 30 л. внезапно заболѣлъ двоезрѣніемъ. Вылѣченъ въ два мѣс. вн. и нар. *А.* 1 × *С.* 1 × *S.* 3 (*С.*).

— Ж. 26 л., золотушная, страдала долгое время хрон. воспѣкъ и соедин. оболочки, съ бѣльмомъ на лѣвомъ глазу. Вылѣчена въ два мѣс. вн, и нар. *S.* 1 прим. на глаза *А.* 2 и на подгл. и надгл. нер. *Эл. Кр.* × *Бѣл.* × *Анж.* (*С.*).

— Ж. 41 г., страдала давно попеременнымъ воспаленіемъ, то одного, то другого глаза, бѣлями, запоромъ и зубною болью. Вылѣчилась отъ всего въ три мѣс. вн. и нар. *S.* 1 попер. съ *S.* 1 сухими круп. и *Эл. К.* × *Ж.* (*С.*).

— М. 35 л., съ сильною свѣтобоязнью и глазами налитыми кровью. Улучшеніе на другой день, и совершенно выздоровѣлъ въ пять дней отъ *А.* 1 вн. и нар. и компр. *Эл. А.*, для укрѣпленія зрѣнія назначено *S.* 1 (1-й ст.) въ продолженіи семи дней (*S.*).

— Начинающаяся темная вода. Улучшеніе оказалось отъ перваго приложенія *Эл. Кр.*, а полное излѣченіе черезъ мѣс. отъ *С.* 1 и *Эл. Кр.* въ зат. подгл. и надгл. нер. и ко лбу.

— *Темная вода,* доходившая почти до слѣпоты у М. 21 г., видѣвшаго неясно раму на стѣнѣ, но не различавшій ея содер-

Digitized by Google

жанія. Отъ приложенія къ зат. *Эл. Кр.* увидалъ, что въ рамѣ географ. карта, и отъ новаго приложенія къ зат. и симп. нерв. могъ читать книгу.

— М. 12 л., имѣлъ катаракту на правомъ глазу, совершенно затмившую зрѣніе въ продолженіи четырехъ лѣтъ. Вылѣченъ въ два мѣс. вн. и нар. *S.* 1 × *A.* 1 и *Эл. Анж.* къ зат., симп., подгл. и надгл. нер. (*C.*).

Совѣты черезъ корреспонденцію—М. 31 г., страдалъ темною водою съ постояннымъ сокращеніемъ лѣваго зрачка. Отъ прил. *Эл. Кр.* немедленное улучшеніе. Вн. и нар. *A.* Выздоровѣлъ въ одинъ мѣс. (*C.*).

— Дѣв. 6 л., страдала воспаленіемъ соединительной оболочки съ грануляціями. Вылѣчена въ одинъ мѣс. вн. и нар. *S.* 1. (*C.*).

— М. 55 л., страдалъ 6 недѣль трахомою, сопровождавшаяся болью, слезотеченіемъ, жженіемъ и свѣтобоязнью. Вылѣченъ въ три нед. вн. *A.* 1×*S.* 2 (2-й ст.) и нар. *S.* 5 и *Эл. Кр.* (*C.*).

— Сифилитическое воспаленіе соедин. оболочки глазъ у м. 40 л. вылѣчено въ три недѣли *A.* 1 × *V.* вн. и нар. (*C.*).

— Стафилома у м. 70 л., на лѣвомъ глазу, вылѣченъ въ восемь мѣс. *S.* 1 вн. и нар. (*C.*).

Число излѣченій катаракты, бѣльмъ, и др. болѣзней глазъ весьма значительно.

Глисты заводятся въ кишкахъ отъ разныхъ случайныхъ причинъ, но могутъ жить въ нихъ не иначе, какъ при благопріятномъ для нихъ болѣзненномъ состояніи организма. Потому и наблюдается, что изъ нѣсколькихъ человѣкъ, живущихъ при однихъ и тѣхъ же условіяхъ и питающихся одинаковой пищей, одни заболѣваютъ глистами, другіе—нѣтъ. Значитъ, для размноженія глистовъ въ кишечникѣ у человѣка требуется извѣстное его предрасположеніе къ этому. И дѣйствительно, изъ дѣтей, напримѣръ, всего чаще страдаютъ глистами тѣ, которыя одержимы неправильностію тѣлосложенія, золотухой и проч. Слѣдовательно, изгнаніе глистовъ такъ называемыми глистогонными средствами еще не составляетъ излѣченія, нужны средства, уничтожающія возможность питанія глистовъ. И дѣйствительно, при употребленіи электро-гомеопатическихъ средствъ, глисты уничтожаются. Припадки глистной болѣзни бываютъ чрезвычайно разнообразны. Сюда относятся, напримѣръ, рас-

Digitized by Google

ширеніе зрачковъ, свербѣніе въ носу, влеченіе къ черному хлѣбу и вообще къ мучному, разстройства пищеваренія, непроизвольное мочеиспусканіе, колика, лихорадочныя явленія, мозговыя раздраженія, судороги. Но подобныя явленія могутъ быть и отъ другихъ причинъ. Поэтому постоянныхъ и совершенно вѣрныхъ признаковъ, которыя указывали бы на глистовъ, нѣтъ, кромѣ одного—появленія самихъ глистовъ. Въ случаяхъ сомнительныхъ *Verm.* и *Эл. Желт.* выясняютъ дѣло.

Въ человѣческомъ организмѣ всего чаще встрѣчаются слѣдующіе виды глистовъ: *ленточный* или *тесемочный глистъ (солитеръ)*, *острица и круглый глистъ*.

Лѣченіе. Запоръ служитъ главнымъ условіемъ для развитія глистовъ въ кишечномъ каналѣ. Поэтому на него должно быть прежде всего обращено вниманіе, должны быть приняты мѣры къ недопущенію или устраненію его, для чего допускаются легкія слабительныя средства, рядомъ съ примѣненіемъ *Verm.* и *Эл. Желт.* и соотвѣтствующаго конституціональнаго средства всего чаще—*S.* 1 и *C.* 1.

Круглые глисты: Вн. *S.* 1 × *Verm.* 1 (1-й ст.), 3 раза въ день—*S.* 1 по 5 круп. передъ ѣдой, и вечеромъ, передъ отходомъ ко сну, 3—5 круп. *Verm.* 1. На область пупка—*Эл. Желт.*, втираніе въ животъ—*желтой мази*. Какъ промежуточное средство—*Эл. Желт.* внутрь 5 кап. на пріемъ. Избѣгать мучныхъ кушаній, картофеля и сладостей; допускаются небольшія количества бѣлаго хлѣба, поджареннаго. Главная пища—мясо, овощи, зелень.

Остриці (аскариды): то же внутрен. лѣченіе, какъ при кругломъ глистѣ, діэта—та же, хоть и не такъ строго проведенная. Кромѣ того каждый вечеръ—клистиръ изъ 10—20 круп. *Verm.* 2 въ стаканѣ воды.

Ленточный глистъ: Вн. *A.* 1 (или *A.* 3) × *C.* 1 (2-й ст.); каждый вечеръ, передъ отходомъ ко сну 25—30 круп. *Verm.* 1 въ полустаканѣ воды, за разъ принять; 3 раза въ день *Эл. Желт.* по 5 кап. въ ложкѣ воды, какъ промежуточное средство. Если головка осталась еще, то спустя нѣсколько недѣль или мѣсяцевъ, лѣченіе это должно быть повторено.

Ср. еще: *Трихинная болѣзнь*.

Digitized by Google

Излѣченія: Д. 19 л., страдала тошнотою по утрамъ, извращеніемъ вкуса, болью въ желудкѣ вслѣдствіе глистовъ. Отъ 3 кр. *Verm.*, принятыхъ вечеромъ въ рюмкѣ воды, утромъ изъ нея вышло большое количество аскаридовъ, и всѣ ея разстройства прекратились (*С.*).

— Трое дѣтей 2, 3 и 4 лѣтъ страдали семь дней поносомъ. Двое дѣтскихъ докторовъ признали болѣзнь за катарръ кишекъ, а третій докторъ—за катарръ желудка. Такъ какъ эти доктора были приглашены не для лѣченія, а только для опредѣленія болѣзни, то назначенныя ими лѣкарства не были даны дѣтямъ. Было употреблено *S.* 1 и *Эл. Кр.*, которыя не произвели никакого дѣйствія. На другой день дано *Verm.* (1-й ст.) и послѣ 4-й чайной ложки поносъ прекратился (*С.*).

— Д. 23 л., нѣсколько дней сряду страдала біеніемъ сердца, головною болью, обильнымъ потомъ и болью въ желудкѣ. Въ больницѣ (гдѣ была не принята за недостаткомъ мѣста) была признана за тифозную. Отъ *F.* 1 и *F.* 2 вн. и нар. не послѣдовало никакого улучшенія. Болѣзнь оказалась глистною. На другой день дано 5 кр. *Verm.* 2 въ рюмкѣ воды, и черезъ 10 минутъ послѣ пріема всѣ ея недуги прошли (*С.*).

Голова. Посредствомъ двухъ сочлененій (между головой и первымъ шейнымъ позвонкомъ, между первымъ и вторымъ шейными позвонками) голова можетъ свободно поворачиваться и наклоняться въ разныя стороны. Она имѣетъ сплошной костный скелетъ и на ней различаютъ черепъ и лицо.

Черепъ—верхняя, вверху шаровидно или яйцевидно закругленная часть головы, представляетъ плотное костное вмѣстилище для головного мозга. Черепъ образуется нѣсколькими плоскими костями (черепными), которыя своими зубчатыми краями (*швами*) тѣсно соединены между собою. Въ глубокой старости швы мѣстами сростаются. Поврежденія черепа могутъ быть очень опасны и вызываютъ неизлѣчимыя разстройства мозга. Большая часть кожи на поверхности черепа выше лба *покрыта волосами*. Въ кругловатой полости черепа, *черепной полости*, лежитъ *головной мозгъ*, завернутый въ мѣшокъ, который состоитъ изъ трехъ оболочекъ (*твердой*, *паутинной* и *мягкой мозговыхъ оболочекъ*). Головной мозгъ представляетъ двѣ симметричныя половины, правую и лѣвую; передній боль-

Digitized by Google

шій отдѣлъ назыв. *большимъ мозгомъ*, а задній меньшій отдѣлъ—*малымъ мозгомъ*. Въ бороздахъ большого мозга лежатъ *кровеносные сосуды*. На черепѣ отличаютъ: спереди *лобъ*, за которымъ лежатъ среднія доли большого мозга; сверху *темя*, подъ которымъ лежатъ среднія доли большого мозга; сзади *затылокъ* съ задними долями большого мозга и малымъ мозгомъ; съ боковъ тонкостѣнные *виски*, защищающіе слуховые органы и находящіяся надъ ними среднія доли большого мозга; снизу *основаніе*, покоющееся на шеѣ и на лицѣ. На костномъ основаніи черепа имѣется рядъ большихъ и малыхъ отверстій, чрезъ которыя выходятъ *12 паръ нервовъ головного мозга*; онѣ развѣтвляются на головѣ и шеѣ, отчасти въ груди, и одна пара опускается даже до желудка. Наибольшее отверстіе, въ задней части основанія черепа подъ затылкомъ, такъ назыв. большая *затылочная дыра*, служитъ для соединенія головного мозга со спиннымъ помощью промежуточной части, т. е. продолговатаго мозга.

Болѣзни головы и мозга.

Головная боль бываетъ *самостоятельная* и *послѣдовательная*. Головная боль обнаруживается тяжестью, ломомъ, біеніемъ (въ самой головѣ и височныхъ жилъ), сжатіемъ какъ бы въ тискахъ, сверленіемъ, щемленіемъ, жженіемъ, жаромъ съ присоединеніемъ шума и звона въ ушахъ, тошноты, рвоты и сонливости или безсонницы.

Самостоятельная головная боль отличается главнымъ образомъ тѣмъ, что при ней, за исключеніемъ общаго нерасположенія, не замѣчается никакихъ болѣзненныхъ припадковъ въ другихъ органахъ. *Послѣдовательная же* сопровождается болѣзненными явленіями въ другихъ органахъ, свойственными той болѣзни, которою она обусловливается.

Въ частности головная боль раздѣляется слѣдующимъ образомъ: а) давящая боль во лбу надъ бровями обусловливается обыкновенно разстройствомъ желудка; б) давящая боль во лбу и затылкѣ зависитъ большею частію отъ насморка; в) сверлящая же боль въ тѣхъ же частяхъ головы—отъ геморроя;

Digitized by Google

г) боль въ темени, сверлящая какъ бы буравомъ и давящая, щемящая и занимающая обыкновенно лишь половину головы, свойственна истерикѣ и ипохондріи; д) боль въ наружныхъ покровахъ головы ревматическаго (т.-е. простуднаго) свойства; ощущаемая же внутри головы, въ оболочкахъ мозга и самомъ мозгу обусловливается приливами крови къ мозгу, малокровіемъ его, наростами, кровоизліяніями и пр.; е) боль, вслѣдствіе прилива крови къ головѣ, чаще всего сопровождаетъ другія общія болѣзни: горячки, лихорадки, воспаленіе различныхъ органовъ, острыя сыпи, разстройства пищеваренія, равно какъ отъ разныхъ болѣзней грудныхъ и брюшныхъ органовъ, угара, злоупотребленія спиртными напитками и проч.

Причины послѣдовательной головной боли уже объяснены. Что касается самостоятельной, то она развивается преимущественно вслѣдствіе простуды (особенно непосредственно головы), угара, злоупотребленія напитками, продолжительнаго наклоненія головы во время работъ, сильнаго дѣйствія солнечныхъ лучей на обнаженную или покрытую чернымъ платкомъ голову, зловоній, сильныхъ благоуханій, дурного воздуха, духоты и жара, продолжительныхъ умственныхъ занятій, безсонныхъ ночей, запора, сильнаго утомленія и чрезмѣрнаго тѣлеснаго напряженія, ушибовъ головы и сотрясенія мозга вслѣдствіе паденія съ высокаго мѣста головою внизъ въ воду, купанія, не помочивъ предварительно голову и т. д.

Головная боль обусловливается, съ одной стороны, болѣзненно возвышенною чувствительностью и раздражительностью головного мозга и его нервовъ, и съ другой—напоромъ крови въ мозговые сосуды.

Распознаваніе головной боли не представляетъ никакихъ затрудненій. Нетрудно также отличить самостоятельную головную боль отъ послѣдовательной. Несравненно труднѣе опредѣлить свойства ея, т. е. зависитъ ли она отъ простуды, геморроя, малокровія, нервныхъ разстройствъ и т. д. Лѣченіе головной боли должно соотвѣтствовать производящимъ причинамъ. Когда желаютъ подѣйствовать на голову какой-нибудь жидкостью, то ее прикладываютъ такъ, какъ сказано на стр. 105.

Digitized by Google

Сначала пробуютъ въ компр. *Эл. Бѣл.*, которое оказываетъ наилучшее дѣйствіе на голову, въ особенности женщинамъ и дѣтямъ, при всѣхъ болѣзняхъ головы или невралгіяхъ. Можно также испробовать, сообразуясь съ темпераментомъ *Эл. Кр.*, *Желт.* или *Анж.* Если же боль чрезъ нѣсколько времени возобновится, тогда 1) если *боль нервная*, то въ слабыхъ дозахъ внутрь *S.* 2 × *F.* 1 (2-й ст.). Въ упорн. случаѣ: прим. на всю голову съ *Эл. Бѣл.* На всю голову и шею мазь *C.* 5 или *S.* 1 или *A.* 2. При *желудочн. страданіи или запорѣ*: 10 круп. *S.* 1 и 5 кап. *Эл. Бѣл.* внутрь; *Эл. Кр.* × *Эл. Желт.* на пп. 5, 6, 7 и 2—3 клистира въ день.

2) Если *боль отъ прилива крови*, то въ очень слабыхъ дозахъ внутрь *A.* 1. Въ упорн. случаѣ *Эл. Анж.* на всѣ нервы головы. На всю голову, шею и сердце мазь или прим. *A.* 2, ван. *A.* 2, на подвзд. мазь или прим. *F.* 2.

3) Если *боль* происходитъ *отъ разстройства въ маткѣ*: то вн. въ слабыхъ дозахъ *A.* 1 × *C.* 1. Въ упорномъ случаѣ, мазь *C.* 5, какъ выше сказано, ван. *C.* 5, по 1 сухой кр. *C.* 5 на языкъ каждые 2 часа. *Эл. Бѣл.* въ компр. на голову или на ступни ногъ.

4) Если *боль періодическая*, тогда вн. *F.* 1 (2-й ст.). Въ упорн. случаѣ на подвзд. мазь или прим. *F.* 1 или *F.* 2, или *C.* 5.

Упорная головная боль излѣчивалась *V.*

Утомленіе головы чрезмѣрными кабинетными занятіями. Вн. *S.* 1 въ упорныхъ случаяхъ *C.* 1 или *C.* 1 попер. съ *S.* 1.

Мигрень, большею частью односторонняя головная боль, нервнаго свойства, часто появляется періодически съ правильными промежутками, съ сверлящею болью на ограниченномъ мѣстѣ, какъ отъ гвоздя, съ тошнотою, рвотою, мѣстнымъ потомъ, остываніемъ и блѣдностью кожи, водянистою мочей и чрезвычайною чувствительностью ко всякому шуму, движенію и прикосновенію въ особенности у женщинъ и дѣвицъ. Во время приступа пульсъ чрезвычайно замедляется, печень припухаетъ и дѣлается чувствительною. Различаютъ двѣ формы мигрени: *паралитическую*, происходящую отъ разслабленія

Digitized by Google

соотвѣтствующаго симпатическаго нерва (симптомы: съуженіе зрачка, краснота пораженной части) и *спастическую*, судорожную (симптомы: расширеніе зрачка и блѣдность пораженной стороны; височная жила рѣзко выдѣляется).

Лѣченіе. При *паралитической формѣ*: *A.* 1 × *F.* 1 (3, 2-й ст.), черезъ 5—10 мин. по чайн. лож. и *Эл. Анж.* на главн. точки головы. Въ свободное отъ боли время: тѣ же лѣкарства изъ 2-го или 1-го ст., прилож. *Эл. Анж.* утр. и веч., мазь *F.* 2—въ подвздошья. Горячія сидячія ванны изъ *A.* 2 и *F.* 2.

При *спастической мигрени*: Во время припадка—*A.* 1 × *C.* 1 × *F.* 1, и *Эл. Анж.* или *Эл. Бѣл.* на нервн. точки головы. Въ свободное отъ припадка время тѣ же средства изъ 2-го и 1-го ст., прил. *Эл. Анж.* или *Эл. Бѣл.*

Во всѣхъ случаяхъ: 3 раза въ день по 5 круп. *S.*1 и горячія сидячія ванны утр. и веч. изъ *C.* 5 и *F.* 2.

Воспаленіе мозга. Главными и болѣе частыми причинами этой болѣзни бываютъ: раны, ушибы головы и воспаленіе внутренняго уха. Симптомы: сильная головная боль, не имѣющая опредѣленнаго мѣста; горячечное состояніе бываетъ весьма напряженное; пульсъ до 120 ударовъ въ минуту, дыханіе ускоряется; въ глазахъ рябитъ, при этомъ соединительная оболочка глазъ красная; шумъ въ ушахъ постоянный; появляется тошнота и рвота; сонъ безпокойный съ перемежающимся бредомъ; на 2-й или 3-й день отъ начала болѣзни появляются напряженія мускуловъ. Часто бываетъ параличъ: руки, ноги, вѣкъ, а иногда параличъ всей половины тѣла. Въ большинствѣ случаевъ бываютъ припадки столбняка, то есть нижняя челюсть плотно прижимается къ верхней, а вся голова къ груди или опрокидывается назадъ. Въ послѣднемъ случаѣ мышцы шеи *заднія* находятся въ состояніи сильнаго сокращенія, а въ первомъ—*переднія* мышцы шеи.

Симптомы воспаленія мозга имѣютъ сходство съ симптомами воспаленія его оболочекъ, а также и съ апоплексіею мозга, отличаясь болѣе медленнымъ теченіемъ, напряженіями мускуловъ и менѣе глубокимъ разстройствомъ умственныхъ способностей. Отъ тифа оно отличается отсутствіемъ страданія ки-

Digitized by Google

шечнаго канала, судорогами, напряженіями и параличами; послѣднихъ трехъ въ тифѣ не бываетъ, если онъ не осложняетси воспаленіемъ мозга.

Воспаленіе мозга болѣзнь тяжелая, можетъ перейти въ нагноеніе или размягченіе, а потому нужно энергически помогать больному.

Лѣченіе. Ежедневно 1—2 клистира съ тепловатой водой, *A*.1 × *C*.1 (3-й, 2-й ст.) кажд. 5 — 10 мин.; 3 раза въ день по 3—5 круп. *S*. 1 сухими. Поскѣ каждой рвоты 10 круп. *S*. 1 или 5 круп. *Анти-маль-ди-маре.*

Большія примочки на голову изъ раствора *Эл. Анж.* или *Эл. Бѣл.*, также *A*. 2, *C*. 5 и *S*. 5. Примочку изъ 1 части *Эл.* и 2 частей воды оставляютъ въ теченіе дня, не смѣняя а поверхъ нея кладутъ примочки, смѣняя ихъ черезъ 10—20 мин., изъ раствора 10 круп. *A*. 2 и по 20 круп. *C*. 5 и *S*. 5, въ двухъ стак. воды. Втираніе желтой мази въ подреберья утр. и веч. При высокой лихорадкѣ ежедневно 1—2 полныхъ тепловатыхъ ванны съ 30 круп. *S*. 5 и *C*. 5 и 15 круп. *A*. 2, съ прибавл. 1 столов. ложки *Эл. Бѣл.*; продолжительность ванны 15—20 минутъ. Во время ванны—упомянутыя примочки на голову. Прилож. *Эл. Кр.* × *Эл. Желт.* (1 ч. Эл. на 9 ч. воды) утр. и веч. на нервн. точки 11—22, 5, 6, 7.

Въ позднѣйшей стадіи, когда пульсъ замедленъ до 30—40 ударовъ въ минуту, даютъ *A*. 1 (2-й ст.) × *C*. 2 (3-й или 2-й ст.) и каждый часъ по 2—3 круп. *S*. 1.

Скоротечное воспаленіе сосудистой мозговой оболочки. Симптомы: лихорадочныя явленія, начинающіяся потрясающимъ ознобомъ, уменьшеніе скорости пульса съ 120 или 140 ударовъ въ минуту до 60 или 80 ударовъ, сильная головная боль отчасти съ раздражительностію, отчасти съ характеромъ угнетенія или совершеннаго паралича; безпокойство, безсонница, бредъ, больные не терпятъ яркаго цвѣта, громкаго шума прикосновенія къ кожѣ; шумъ въ ушахъ, представленіе искръ въ глазахъ, безпокойство тѣла, скрежетаніе зубами, судороги и часто даже съуживаніе зрачка и рвота. Лѣчится точно также, какъ воспаленіе мозга.

Digitized by Google

Водянка мозга. Развивается по большей части медленно у дѣтей золотушныхъ, у коихъ размѣръ головы очень увеличенъ, или же послѣ кровоизліянія въ мозгъ, которое производитъ головную боль, конвульсіи, спячку. Распознаваніе возможно только тогда, когда голова значительно увеличилась, и ея объемъ составляетъ контрастъ съ малостію членовъ. Бываетъ легкая рвота, головокруженіе, конвульсіи или сведенія. Вначалѣ даютъ *A.* 2 (3-й ст.) × *S.* 1 (2-й ст.), а для грудного ребенка эти лѣкарства даютъ кормилицѣ изъ 1-го ст.; на зат. и голову *Эл. Анж.* и прим. *C.* 5. Когда объемъ головы значительно уменьшится, продолжительное время даютъ *S.* 1 (1-й ст.).

Размягченіе мозга бываетъ въ острой и хронич. формѣ, и свойственно людямъ пожилымъ, у которыхъ всякая трудная лихорадочная болѣзнь можетъ повлечь за собою размягченіе мозга. Симптомы острой формы почти ничѣмъ не отличаются отъ воспаленія мозга, притомъ же первая форма всегда бываетъ послѣдствіемъ воспаленія мозга. При хроническомъ размягченіи мозга больные жалуются на общее нездоровье, головокруженіе и боль головы, сосредоточенную во лбу. Затѣмъ въ продолженіи нѣсколькихъ недѣль и даже мѣсяцевъ появляется ослабленіе рукъ и ногъ, и наконецъ больного поражаетъ параличъ цѣлой половины тѣла и почти всегда языка. Съ появленіемъ этого паралича начинается разстройство умственныхъ способностей. Прежде всего притупляется память и способность воспріятія. Настроеніе духа дѣлается тоскливымъ, или вѣрнѣе сказать плаксивымъ. Со временемъ появляются непроизвольныя испражненія и недержаніе мочи вслѣдствіе паралича шейки мочевого пузыря; наконецъ больные умираютъ въ припадкахъ обострившагося размягченія мозга или отъ крайняго истощенія организма. Вн. $^1/_4$ ст. *A.* 1 (3-й ст.) × съ $^3/_4$ ст. *C.* 1 (2-й ст.), и если приливы часты, то тѣ же лѣкарства въ тѣхъ же дозахъ по $^1/_2$ ст. въ день; на голову и сердце прим. *A.* 2; на 6 глав. точ. и на темя *Эл. Анж.* Предупреждать запоры.

Апоплексія мозга, ударъ. См. параличъ.

Анемія мозга. Отличительнымъ признакомъ служатъ нѣко-

Digitized by Google

торые шумы въ ушахъ (жужжаніе, свистъ, шумъ водопада), сопровождаемые трескомъ и болью въ темени. Встрѣчается у людей малокровныхъ, нервныхъ, ипохондриковъ или истеричныхъ, какъ симптомъ нервнаго состоянія. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ анемія мозга обнаруживаются признаки раздраженія душевныхъ отправленій: безсонница, сильное возбужденіе, бредъ и проч., причемъ иногда раздраженіе доходитъ до приступовъ бѣшенства и явственныхъ признаковъ помѣшательства. Вн. *S.* 1 (1—2 ст.), на нервы головы *Эл. Кр.* × *Бѣл.*

Излѣченія. М. 65 л. заболѣлъ размягченіемъ мозга. Вылѣченъ въ два мѣс. вн. *A.* 1 и *C* 1.; нар. *C.* 5, *A.* 2, *S.* 1 и *Эл. Анж.* (*C.*).

Анемія мозга у м. 80 л., заболѣвшаго почти внезапно, вылѣчена въ четыре мѣс. вн. *A.* 1, *F.* 1, *S.* 1; нар. *A.* 2 и *Эл. Анж.* (*C.*).

М. 16 л. страдалъ три года упорною головною болью, препятствующей занятіямъ, признанъ неизлѣчимымъ. Отъ одного приложенія *Эл. Бѣл.* къ нерв. головы совершенно выздоровѣлъ (*C.*).

Ж. 25 л. страдала пять лѣтъ хронич, голов. болью и катар. желудка; вылѣчена въ двѣ недѣли *Эл. Бѣл.* на 6 гл. точ. и всѣ нерв. головы, мазью *S.* 1 на лож. и ко лбу и вн. *S.* 1. Такой же случай (м. 30 л.) вылѣченъ мазью *C.* 5 и *Эл. Кр.*×*Желт.* на тѣ же мѣста и вн. *F.* 1 × *S.* 1 (*C.*).

Мол. дѣв. и дамы, страдавшія много лѣтъ жестокою періодическою мигренью, не поддавшеюся никакому лѣченію, совершенно вылѣчились отъ болѣе или менѣе продолжительнаго лѣченія вн. *F.* 1, иногда попер. съ *S.* 1 или *S.* 2 и нар. на подвзд. *F.* 2 и на голову *Эл. Бѣл.* При этомъ лѣченіи сила, продолжительность и частота мигрени постепенно уменьшаются и затѣмъ проходятъ (*C.*).

Головокруженіе состоитъ въ ощущеніи круговращенія видимыхъ предметовъ, находящихся на самомъ дѣлѣ въ спокойномъ состояніи, и сопровождаются нерѣдко рвотой. Вн. *A.* 1 (2-й или 3-й ст.); на голову и сердце прим. *A.* 2. При головокруженіи отъ выкидыша прибавляютъ вн. *C.* 5 (2-й ст.) и на подвзд. *F.* 2 или *C.* 5; если же оно происходитъ отъ дурного пищеваренія или отъ пьянства, тогда вн. 5—10 сух. круп. *S.* 1.

Голосъ происходитъ отъ того, что во время выдыханія

Digitized by Google

воздухъ выходитъ изъ легкихъ, задѣваетъ и сотрясаетъ края *голосовыхъ связокъ*. (См. *Гортань*). Чѣмъ больше напряжены связки, тѣмъ тонъ выше, и наоборотъ, при большомъ разслабленіи связокъ получается болѣе низкій тонъ; напряженіе же и разслабленіе связокъ находится въ прямой зависимости отъ сокращенія и разслабленія гортанныхъ мышцъ.

Охриплость и *сиплость* составляютъ самый обыкновенный припадокъ болѣзней гортани, легкихъ и носа. См. *гортань, легкія, носъ и ихъ болѣзни.*

Вн. *S.* 1, полоскаиіе съ *Эл. Кр.* или *Анж.* Въ упорномъ случаѣ *P.* 1 или *C.* 5 или *S.* 1 (1-й ст.); полосканіе изъ этихъ же лѣкарствъ.

Потеря голоса обусловливается золотухой, сифилисомъ и болѣзнями дыхательныхъ органовъ. Полосканіе съ *Эл. Кр.* или *Эл. Анж.* Вн. *S.* × *A.* 1 и тѣ же кр. въ сух. видѣ съ пищей. Въ упорн. случаѣ *P.* 1, и на 6 гл. точ. *Эл. Кр.*; чаще прикладывать на ложечку.

У л. 16 л. было *простудное безголосіе*; въ продолженіи двухъ дней нельзя было понять, что она говоритъ. Вылѣчена въ полчаса *Эл. Кр.* на подвзд. нерв. и на 6 гл. точ. и пульверизаціей гортани *S.* 5 (20 круп. на стак. воды) (*C*).

Охриплость и осиплость голоса у пѣвцовъ и пѣвицъ неоднократно проходила отъ *Эл. Желт.*, употребленнаго въ полосканіи, въ компрессахъ на подвзд. нар. и вн. 10 капель въ ложкѣ воды, за часъ до пѣнія.

Гортань лежитъ впереди и посерединѣ шеи, ниже языка, передъ глоткой; книзу она непосредственно соединяется съ дыхательнымъ горломъ. Гортань есть полый органъ въ верхней части треугольный, въ нижней круглый. Такая форма обусловливается хрящевыми ея частями, пластинками и кольцами, изъ которыхъ состоитъ остовъ гортани; эти хрящевыя части подвижно соединяются между собою помощью связокъ. Въ гортанной полости, выстланной слизистой оболочкой, помѣщаются органы, производящіе голосъ, а именно двѣ *нижнія голосовыя связки*, правая и лѣвая, колебаніями которыхъ исключительно и производится голосъ. Связки эти въ видѣ плоскихъ, перепончатыхъ, эластичныхъ тесемокъ, одѣтыхъ

Digitized by Google

слизистой оболочкой протягиваются горизонтально, сзади напередъ, чрезъ гортанную полость. Выше этихъ связокъ, производящихъ голосъ, находятся еще двѣ *верхнія голосовыя связки*, неимѣющія, впрочемъ, никакого отношенія къ образованію голоса; это просто складки слизистой оболочки. Между настоящими голосовыми связками остается узкая треугольная щель, *голосовая щель*, чрезъ которую и проходитъ воздухъ. Голосовыя связки могутъ натягиваться и ослабляться, голосовая щель съуживается и расширяется; все это дѣлается гортанными мышцами по нашей волѣ. Выше голосовой щели по направленію къ корню языка, находится хрящевая пластинка, грушевиднаго очертанія, *надгортанникъ*, служащій для того, чтобы при глотаніи закрывать голосовую щель и слѣдовательно предохранять гортань и дыхательное горло отъ постороннихъ тѣлъ. Передъ гортанью, прикрѣпляясь къ ея передней стѣнкѣ, лежитъ весьма богатая кровью *щитовидная железа*, состоящая изъ круглыхъ замкнутыхъ пузырьковъ, обильно снабженныхъ кровью и соединенныхъ въ грозды. Значеніе ея еще неизслѣдовано. Увеличеніе ея называется *зобомъ*. За гортанью лежитъ *глотка*, мышечный открытый мѣшокъ, чрезъ который пища входитъ въ замкнутую трубку пищепровода. *Пищепроводъ* есть продолженіе глотки, ведущее въ желудокъ. Это мышечный, въ спокойномъ состояніи спавшійся, но весьма растяжимый каналъ, со стѣнками, одѣтыми слизистой оболочкою. Пищепроводъ спускается по шеѣ, позади дыхательнаго горла, въ грудную полость, идетъ здѣсь позади сердца, чрезъ отверстіе въ грудобрюшной преградѣ, входитъ въ брюшную полость и оканчивается у входа въ желудокъ.

Болѣзни гортани и глотки.

При лѣченіи этихъ болѣзней необходимо: 1) избрать лѣченіе, соотвѣтствующее тѣлосложенію больного; 2) примѣнить для лимфатика *Эл. Кр.* и для сангвиника *Эл. Анж.* на 6 глоточ. и на шею до ушей, и 3) употреблять тѣ же вн. лѣкарства для полоск. или пульвер. не менѣе 3-хъ разъ въ день.

Digitized by Google

Скоротечный, острый катарръ гортани рѣдко начинается ознобомъ, прежде всего является чувство щекотанія, а при болѣе сильной формѣ болѣзни—чувство жженія или пораненія въ горлѣ, усиливающееся при разговорѣ, кашлѣ и т. д.; голосъ становится низкимъ, нечистымъ и можетъ сдѣлаться беззвучнымъ, хриплымъ.

Къ этому присоединяется сильный кашель, во время котораго лицо становится краснымъ, даже багровымъ, и яремныя вены напружаются кровью; при продолжительности болѣзни, самый тонъ кашля дѣлается ниже вслѣдствіе утолщенія голосовыхъ связокъ и болѣе грубымъ и хриплымъ—отъ неровности ихъ; хриплый кашель при крайнемъ усиленіи дѣлается лающимъ. Если катарръ ограничивается только одною гортанью, то мокроты бываетъ немного; въ началѣ болѣзни ея даже вовсе не бываетъ, или же она свѣтла и стекловидна; при наступленіи улучшенія мокрота дѣлается болѣе густою, желтоватою.

Лѣченіе. Вн. *A.* 3 × *P.* 1 × *F.* 1 (3-й ст.) въ возможно горячемъ видѣ черезъ полчаса по чайной ложкѣ и *P.* 3 по 5 круп. черезъ каждые 2 часа въ чайной ложечкѣ горячей воды и 3 раза въ день *S. G.* по 5 круп. передъ пищей. Полосканіе (каждый часъ) изъ *A.* 2, *C.* 4 и *Dom-fin* (*Домъ-финъ*), по 10 круп. на стаканъ воды, съ прибавленіемъ 30 капель *Эл. Кр.* или *Эл. Бѣл.*, если имѣется мучительная сухость въ гортани и отхаркивается тягучая слизь.

Въ трудныхъ случаяхъ: ингаляціи (вдыханіе паровъ) утр. и веч. изъ раствора *A.* 2, *C.* 4 и *P.* 3 по 15 круп. на стак. воды. съ прибавленіемъ 30 кап. *Эл. Бѣл.*; каждый разъ вдыхать 2 столов. лож. этого раствора. Горячіе компрессы на гортань (на шею) изъ раствора 15 круп. *L.* и *C.* на стаканъ воды. Лежать тепло укрытымъ въ постели.

При *хроническомъ катаррѣ гортани* почти вовсе не бываетъ щекотанія, жженія, чувства пораненія въ гортани. Зато при немъ гипертрофія слизистой оболочки и продолжительное толщеніе голосовыхъ связокъ необходимо должны производить измѣненіе голоса, который поэтому при разговорѣ бываетъ низкій, грубый и хриплый. Эта хроническая охриплость,

Digitized by Google

остающаяся послѣ повторявшихся скоротечныхъ катарровъ, составляетъ весьма важный и во многихъ случаяхъ единственный признакъ хроническаго катарра гортани. Къ этому иногда присоединяется періодическій судорожный кашель, приступы котораго обыкновенно проходятъ съ изверженіемъ небольшого количества особеннымъ образомъ скомканной, желтоватой слизи. И здѣсь кашель можетъ также сдѣлаться грубымъ, хриплымъ и при крайней степени усиленія—лающимъ.

Лѣченіе. Вн. *S.* 1 одно или поперем. съ *P.* 1. Обостренія болѣзни лѣчатся такъ же, какъ острый катарръ гортани. При судорожномъ кашлѣ—черезъ 2—3 часа по 5 круп. *P.* 4 × *P.* 3 въ чайной ложкѣ горячей воды. Въ упорномъ случаѣ мази или вдыханія или ванны изъ *S.* 5, *C.* 5, *Эл. Зел.* и *Эл. Бѣл.*

Катарральныя язвы гортани не сопровождаются никакими особенными припадками и въ большинствѣ случаевъ могутъ быть только предполагаемы, если хроническій катарръ продолжителенъ. Если при осмотрѣ зѣва оказывается, что покраснѣвшая слизистая оболочка мягкаго нёба покрыта мелкими, круглыми, желтоватыми язвами, то съ достовѣрностію можно предположить, что, вслѣдствіе существующаго хроническаго катарра гортани, образовались на ней язвы. Точно также должно предполагать о существованіи язвъ въ гортани, если къ хроническому катарру этой полости присоединяются и затрудненія при глотаніи, которыя выражаются постоянными попытками къ глотанію и происходятъ отъ окрѣплости надгортанника.

Сначала *Dom-Fin*; если мокрота съ кровью: *S.* 1 попер. съ *A.* 1, при вонючемъ дыханіи *S.* 1 × *A.* 1 и *C.* 1; оставить принимать *A.* 1, какъ только прекратится окрашиваніе мокроты кровью и продолжать *S.* 1 × *C.* 1. Въ упорн. случаѣ на грудь мазь *C.* 5, полоск. или пульвер. изъ *Dom-Fin*, *C.* 5 или *C.* 4 и *A.* 2, изъ кажд. по 10—20 круп на стаканъ воды, съ прибавленіемъ 30 капель *Эл. Кр.* При одышкѣ прим. на область сердца, сплет. и симпт. нерв. *A.* 2. На тѣ же мѣста *Эл. Анж.*

Digitized by Google

При *сифилитическомъ катаррѣ гортани* даютъ *S.* 1, или въ продолженіи 1—2 мѣсяц.: *V.* × *S.* 1, въ упорн. случаѣ *P.* 1 × *A.* 1 и *C.* 5.

Полипы по своимъ припадкамъ мало отличаются отъ простого хроническаго катарра гортани, если только по своей величинѣ не съуживаютъ гортани. Но если при извѣстной величинѣ они сидятъ вблизи гортанной щели, то производятъ сильное удушье и удлиненное, трудное и свистящее дыханіе, которымъ характеризуется съуженіе гортанной щели. Если наросты сидятъ на ножкахъ, то нечаянное измѣненіе ихъ положенія можетъ быть поводомъ къ съуженію и запиранію гортанной щели—къ приступамъ задушенія. Лѣчится точно также, какъ и скоротечный катарръ гортани.

Катарральный ложный крупъ случается у дѣтей. Дѣти, кашлявшія и охрипшія въ теченіи дня, но не чувствовавшія себя больными, ночью вдругъ просыпаются съ сильною одышкою; при этомъ вдыханіе бываетъ трудное; испуганное дитя мечется въ кровати, вскакиваетъ и въ испугѣ хватается за горло; кашель дѣлается хриплымъ и лающимъ. Ложный крупъ отличается отъ настоящаго одновременнымъ существованіемъ другихъ припадковъ; насморка, катарра, глотки и надгортанника и притомъ можетъ повторяться много разъ у одного и того же субъекта, чего съ настоящимъ крупомъ не бываетъ; кромѣ того при ложномъ крупѣ не бываетъ въ мокротѣ при откашливаніи крупозныхъ перепонокъ и на миндалевидныхъ железахъ также не бываетъ перепончатыхъ отложеній. Лѣчится какъ крупъ. Въ нѣсколькихъ случаяхъ ложный крупъ былъ прерванъ *F.* 1 и компр. изъ *Эл. Кр.*

Крупъ поражаетъ эпидемически дѣтей отъ 2 до 8 лѣтъ, преимущественно въ холодное время года. Отличается образованіемъ ложныхъ перепонокъ, припадками удушья и острымъ лихорадочнымъ теченіемъ. Начинается горячечнымъ состояніемъ, свистящимъ кашлемъ и опухолью миндалевидныхъ железъ. При дыханіи замѣчаются характеристическіе свистящіе шумы. Во время приступовъ появляется удушье. Бѣдныя дѣти тоскуютъ, на лицѣ ихъ выражается безпомощная борьба. Они

Digitized by Google

опрокидываютъ голову назадъ; хватаются за горло, какъ бы желая устранить препятствіе; періодическій кашель, голосъ сиплый, иногда вовсе пропадаетъ; поверхностное дыханіе; лицо надувается, багровѣетъ, выступаетъ холодный потъ, конечности холодѣютъ, пульсъ исчезаетъ и ребенокъ умираетъ въ ужасныхъ мукахъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ смерть наступаетъ медленнѣе и менѣе бурно вслѣдствіе постепеннаго развитія воспаленія легкихъ, сердца и мозга. Эта болѣзнь заразительна для окружающихъ дѣтей.

Лѣченіе. Когда имѣется опасность удушенія накопившимися въ гортани пленками, необходимо начать лѣченіе рвотными средствами, къ которымъ относится обильное питье теплой воды съ послѣдующимъ раздраженіемъ зѣва бородкой пера, а также медицинскія рвотныя—(по рецепту врача). Такимъ удаленіемъ массъ, закупоривающихъ гортань, достигается возможность дальнѣйшаго лѣченія. Черезъ каждые 2—3 часа вдыханія паровъ изъ раствора *Dom-Fin, P.* 1 по 15 круп. на стаканъ воды, съ прибавленіемъ 10 капель *Эл. Зел.* (каждый разъ 2 стол. ложки этого раствора). Внутрь: черезъ каждые 15 минутъ *F.* 1 × *P.* 1 (1-ый ст. или усиленное 1-е разведеніе) и каждый часъ по 1—3 круп. *P.* 3 × *Dom-Fin.* Если ребенокъ не въ состояніи вдыхать паровъ, то пульверизировать (распылять) тотъ же растворъ въ воздухѣ по близости его. На грудь и спину дѣлать горячіе компрессы изъ раствора *A.* 2 и *P.* 2 по 20 круп. на 2 стак. воды съ прибавленіемъ 30 капель *Эл. Кр.*

Удавалось прервать крупъ въ самомъ его началѣ полосканіемъ чистымъ, безъ воды, *Эл. Кр.*

Часто превосходное дѣйствіе при крупѣ оказывало *S.* 1, черезъ каждыя 5 минутъ по 5 круп. сухими на языкъ, съ часто смѣняемыми компр. *Эл. Кр.* на затылокъ и на горло до ушей. Когда опасные симптомы ослабѣваютъ, то *S.* 1 даютъ рѣже, черезъ каждыя 10—20—30 минутъ и затѣмъ—изъ 1-го ст. или средн. дозы въ продолженіе нѣсколькихъ недѣль.

Для правильнаго распознаванія ложнаго крупа отъ крупа мы помѣщаемъ здѣсь параллельно симптомы этихъ двухъ болѣзней.

Digitized by Google

Сравнительная таблица симптомовъ.

Ложный крупъ.	Крупъ.
1. Появляется *вдругъ*; первый припадокъ бываетъ обыкновенно *ночью*.	1. Образуется *медленно*; первый припадокъ бываетъ обыкновенно *днемъ*.
2. Болѣзнь не эпидемическая, и поражаетъ одного или двухъ субъектовъ.	2. Господствуетъ по большей части эпидемически.
3. Если существуетъ кашель, то онъ сухой, громкій, звонкій и безъ всякаго отдѣленія.	3. Кашель сухой и походитъ на пѣніе молодого пѣтуха, хриплый и удушливый. При кашлѣ и рвотѣ, выдѣляются ложныя перепонки.
4. Боли въ гортани нѣтъ; или она очень слабая; она замѣняется стѣсненіемъ во всей груди.	4. Боль гортани и надгортанника довольно острая; незначительная опухоль замѣтна не столько для глаза, сколько при ощупываніи.
5. Голосъ хриплый, сиплый, по внятный; потеря голоса случается рѣдко.	5. Голосъ имѣетъ спеціальный металлическій оттѣнокъ, свистящій, и всего чаще полное отсутствіе голоса.
6. Лихорадки не бываетъ, или же она очень незначительная.	6. Лихорадка всегда бываетъ; въ большинствѣ случаевъ она очень сильная.
7. Припадки раздѣляются промежутками, въ продолженіи которыхъ больной кажется совершенно здоровымъ.	7. Припадки продолжаются безъ всякаго перерыва; никакого замѣтнаго промежутка не бываетъ.
8. Свойство болѣзни конвульсивное.	8. Свойство болѣзни воспалительное.

Дифтеритъ появляется обыкновенно эпидемически у дѣтей. Начинается насморкомъ и припухлостію подчелюстныхъ железъ. При осмотрѣ полости носа замѣчается на слизистой его оболочкѣ бѣловатый налетъ въ видѣ перепонки. Въ полости рта—на мягкомъ нёбѣ видна матово-бѣлая перепонка. Эта болѣзнь развивается быстро и сопровождается сильнымъ горячечнымъ состояніемъ. Изо рта вытекаетъ вонючая слюна; тоска, боль при глотаніи и общая слабость. При осмотрѣ такихъ больныхъ нужно быть въ высшей степени осторожнымъ, такъ какъ эта болѣзнь крайне заразительна.

Лѣченіе. Даже въ самыхъ легкихъ случаяхъ ребенокъ долженъ лежать въ постели, отдѣленный отъ прочихъ дѣтей.

Digitized by Google

Температура комнатъ 14—15° по Реом., воздухъ въ послѣдней не долженъ быть слишкомъ сухимъ; для увлажненія его ставятъ время отъ времени тазъ съ кипяткомъ. При высокой лихорадкѣ—тепловатая ванна съ прибавленіемъ *F.* 2 и *Dom-Fin* по 25 круп.; продолжительность ванны 15—30 мин. съ холоднымъ компрессомъ изъ раствора *Эл. Бѣл.* Слабыя дѣти остаются въ ваннѣ 10—15 мин.

Лѣченіе начинаютъ обыкновенно опорожненіемъ кишечника съ помощью клистира. Внутрь даютъ: *A.* 1 × *Dom-Fin* × *F.* 1 (4-ый или 3-ій ст.) черезъ каждые $^1/_4$—$^1/_2$ часа по чайной ложкѣ и этихъ же лѣкарствъ по 1 круп. сух. по очереди. На горло, наружно, мазь *C.* 5 или *Зел. мазь*, или же прохладные компрессы, смѣняемые черезъ каждые 10—30 мин. изъ раствора *A.* 2 и *Dom-Fin* по 15 круп. въ 2 стаканахъ воды. Этотъ же растворъ для полосканія горла у старшихъ дѣтей, съ прибавленіемъ 10 кап. *Эл. Зел.* (или *Эл. Анж.*), если налеты въ горлѣ кровоточатъ. Если и носъ пораженъ, то и его промываютъ этимъ растворомъ.

При сердцебіеніи и сильномъ возбужденіи втирать въ область сердца *Эл. Анж.* или *Эл. Бѣл.* по нѣсколько капель на разъ повторно въ день.

Окружающимъ, съ цѣлью предохраненія отъ дифтерита, полезно принимать *Dom-Fin* по 5 круп. 3 раза въ день и столько же разъ въ день *S.* 1 или *A.* 3 по 5 круп. передъ ѣдой.

Вся посуда, употребляемая дифтерическими больными: ложки, чашки, стаканы и проч., во время болѣзни не должны употребляться другими лицами и должны быть тщательно вычищаемы. Самое лучшее держать эти вещи все время пока не употребляются, въ водѣ, которую слѣдуетъ черезъ нѣсколько дней перемѣнять. Бѣлье, употребляемое для вытиранія посуды, также не слѣдуетъ употреблять на что-нибудь другое. Бѣлье больного должно стираться основательно съ мыломъ, предварительно хорошенько вываренное.

Кромѣ лица, ухаживающаго за больнымъ, не дозволять никому находиться въ комнатѣ больного, особенно ночью и во время сна. Это вмѣстѣ съ тѣмъ полезно и для самого боль-

Digitized by Google

ного. Также никогда не слѣдуетъ помѣщать больше одного дифтерическаго больного въ одну комнату. Опасность для жизни при дифтеритѣ состоитъ въ томъ, что микроскопическіе организмы, распространяющіе болѣзнь, попавши въ кровь больного, тамъ чрезвычайно быстро размножаются и поглощаютъ находящійся въ крови и необходимый для жизни кислородъ. Вслѣдствіе того въ крови накопляется неокисленный углеродъ, дѣйствующій угнетающимъ образомъ на нервные центры, до полнаго паралича. Дифтеритъ убиваетъ, вызывая параличъ, а не вслѣдствіе механическаго запора дыхательныхъ путей. Поэтому трахеотомія не имѣетъ здѣсь ни цѣли, ни смысла. Изъ этого слѣдуетъ, что дифтерическому больному необходимо возможно большое количество свѣжаго воздуха. Для этой цѣли недостаточно дать ему обширную комнату, а необходимо, чтобы воздухъ въ этой комнатѣ былъ постоянно чистъ. Въ теплое время года можно держать окна и двери открытыми. При низкой температурѣ необходимо частое провѣтриваніе, причемъ только холодная струя воздуха не падала бы непосредственно на больного. Кромѣ того комнату дезинфекцировать какимъ-нибудь подходящимъ средствомъ: растворомъ карболовой кислоты или еще лучше марганцевокислымъ кали, такъ какъ послѣдній безъ запаха.

Марганцевокислое кали есть темная соль, очень легко растворимая въ водѣ. Само оно ничѣмъ не пахнетъ, слѣдовательно, провѣрка чистоты воздуха чрезвычайно легка. Притомъ оно въ высшей степени способно уничтожать (сжигать) всякое заразительное вещество, матерію, гной и т. п. Для приготовленія раствора, потребно самое малое количество этой соли. Нѣсколькихъ кристалликовъ, составляющихъ величину небольшой горошины, достаточно на полштофа воды. Когда соль растворится, вода окрасится въ красивый красносиній (фіолетовый) цвѣтъ. Для очищенія воздуха отъ зловонія и уничтоженія плавающей въ немъ заразы, растворъ этотъ распрыскивается по воздуху въ комнатѣ посредствомъ пульверизатора (пылетвора), т. е. двухъ металлическихъ трубочекъ, соединенныхъ въ видѣ треугольника или буквы Г. Длинный

Digitized by Google

конецъ этого инструмента вставляется въ растворъ, а въ короткій дуютъ ртомъ и жидкость разбрасывается въ видѣ самой тонкой пыли. Эта водяная пыль марганцевокислаго кали, пущенная въ воздухъ въ достаточномъ количествѣ, мгновенно уничтожаетъ всякое зловоніе и всякую заразу. Для дыханія пыль этого раствора не только невредна, но полезна, потому что заключаетъ въ себѣ избытокъ именно той составной части чистаго воздуха (кислорода), которая всего нужнѣе для здороваго дыханія.

Жаба происходитъ вслѣдствіе простуды и выражается припухлостію и краснотою нёба, миндалевидныхъ железъ и язычка, боль при глотаніи, чувство сухости и жженія въ глоткѣ, шея снаружи опухши, постоянное побужденіе глотать, много слюны, сильная боль простирается въ ухо, гадкій вкусъ во рту, опухоль одной или обѣихъ миндалинъ простирается до корня языка и до десенъ; начинается нагноеніе, опухоль становится неровною, бугроватою, свѣтло-красною или желтоватаго цвѣта, при глотаніи жидкости судорожное сжатіе глотки, хуже послѣ сна и отъ малѣйшаго прикосновенія къ горлу, затрудненное дыханіе, опасность задохнуться, иногда сильный лихорадочный жаръ и общее раздраженіе.

Лѣченіе. Вн. *A.* 3 × *Dom-Fin* (3-й ст. до усилен. 1-го разведенія), при лихорадкѣ эти лѣкарства поперем. съ *F.* 1 (2-й, 1-й ст.).

Полосканіе и компрессы на шею изъ *Dom.-Fin* или *C.* 5 и *A.* 2, изъ кажд. по 10 круп. на стак. воды. Полосканіе изъ *Эл. Кр.* или *Эл. Бѣл.*, послѣднее особенно при очень болѣзненномъ глотаніи. *S.* 1, 3 раза въ день по 5 круп. передъ кушаньемъ.

Хроническая жаба. Тѣ же симптомы, но ослабленные. Вн. *S.* 1 × *A.* 1. Въ упорномъ случаѣ вн. и полоск. *Dom-Fin* и *C.* 5 по 10 круп. на стаканъ воды и внутрь *L.* × *C.* 2 черезъ часъ по 1—2 круп. и *S.* 1, 3 раза въ день по 5 круп. передъ ѣдой.

Гортанная чахотка, изъязвленія въ гортани. Симптомы: перхота, щекотаніе въ гортани, сиплость, частый, сухой, пре-

Digitized by Google

рывистый кашель и т. д.; въ сущности можно убѣдиться только при изслѣдованіи полости гортани гортаннымъ зеркаломъ. Когда при этомъ оказываются язвы или нарывы въ гортани, то сущность ихъ легко опредѣлить, если въ то же время существуетъ бугорчатка легкихъ или общій сифилисъ. Лѣчится какъ бугорчатка легкихъ (См. Легкія), и даютъ вн. и полоск. *Dom-Fin* и вн. *P.* 2 (2-й ст.). См. *Сифилисъ*.

Ракъ гортани. Симптомы: охриплость, нѣмота, давленіе, съ признаками удушья; иногда изверженіе носомъ—жидкостей, а ртомъ—хрящей. Глотаніе трудное. Вн. *C.* 1 (2-й ст.) × *Dom-Fin* (средняя доза), полоск. *Dom-Fin*, на шею мазь *C.* 5 и *Эл. Зел.*

Излѣченія. Д. 22 л. страдала упорными катарральными язвами гортани. Вылѣчена въ три мѣс. вн. *A.* 1 × *C.* 1 × *S.* 1 (2-й ст.), пульвер. горт. *S.* 1 попер. съ *Эл. Бѣл.* На 6 гл. точ. *Эл. Анж.* (*C.*).

Реб. 5 л. болѣлъ крупомъ. Черезъ три часа лихорадка уменьшилась отъ *F.* 1 (2-й ст.) по ч. л. каждыя 5 мин., потомъ *S.* 1 (3-й ст.) точно также; въ одинъ день уничтожило всѣ признаки болѣзни.

Крупъ у реб. 10 л. вылѣченъ въ сутки *S.* 1 каждыя 5 мин. по 5 сухихъ круп. на языкъ, компр. *Эл. Кр.*, на горло до ушей, полоск. *S.* 1 (15 круп. на ст. воды), Въ нѣсколько часовъ симптомы прекратились. На другой день не осталось слѣда болѣзни (*C.*).

Гриппъ (*инфлуенца*) сопровождается крайнимъ упадкомъ силъ; при этомъ сонливость съ вздрагиваніемъ и общею дрожью; ревматическая боль или боль какъ бы отъ ушиба въ членахъ и спинѣ; сильная головная боль во лбу, иногда распространяющаяся въ кости лица съ мучительною болью въ другихъ частяхъ головы; головокруженіе; боль въ ухѣ и иногда опухоль околоушныхъ железъ и клейкій потъ; краснота глазъ съ ломотою и свѣтобоязнью; течь изъ носа или заложеніе его; кашель сухой, отрывистый или мокротный, вызывающій усталость въ груди; сухость горла; жгучій, сухой жаръ кожи; потеря аппетита, тошнота, раздраженіе горла и небольшая охриплость.

Digitized by Google

Гриппъ свирѣпствуетъ между дѣтьми также; какъ и между взрослыми, но онъ сопровождается болѣе сильными лихорадочными явленіями, затрудненіемъ дыханія и нервными симптомами.

Лѣченіе. Главное средство при гриппѣ *S. G.*, но въ нѣкоторыхъ эпидеміяхъ таковымъ оказывалась *S.* 1. Итакъ, давать крѣпкій растворъ *S. G.* (или *S.* 1) × *P.* 1, по 20—30 круп. на стак. воды и 2—5 круп. *A.* 1 въ стаканъ же воды, по возможности въ горячемъ видѣ чрезъ кажд. $^1/_4$—$^1/_2$ ч. по чайн. лож. Это—въ болѣе трудныхъ случаяхъ, когда приходится давать еще и *F.* 1 при высокой температурѣ тѣла (2-й—1-й стак.). Въ болѣе легкихъ даютъ разведенія послабѣе. На подреберья мазь *F.* 2. При горловой боли—полосканіе и компрессы, какъ при жабѣ (см. эту). Ср. также: Легкія (болѣзни ихъ) и проч.

Грусть. Нѣсколько продолжительное употребленіе *S.* 1 измѣняетъ расположеніе духа къ лучшему.

Грыжа. Ниже подложечной ямки, почти въ центрѣ живота находится *пупокъ* (см. Брюхо). Нижняя граница живота, гдѣ онъ сходится съ тазомъ, называется *паховою* областью; подъ нею находятся *бедренные сгибы*. Здѣсь мышечная и брюшная стѣнки имѣютъ тонкія мѣста и промежутки (*паховый и бедренный каналы*), чрезъ которые нерѣдко брюшныя внутренности, въ особенности кишки и сальникъ, выходятъ изъ брюшной полости подъ кожу живота. Происходящія такимъ образомъ, опухоли, называются *грыжею*. Грыжи по мѣстамъ, гдѣ онѣ показываются, называются *пупочными*, *паховыми* и *бедренными*. Они образуютъ на этихъ мѣстахъ большія или малыя опухоли, всегда покрытыя кожею. Большинство этихъ опухолей исчезаетъ отъ вправленія, т.-е. вдвиганія содержащихся въ нихъ внутренностей обратно въ брюшную полость. Но при кашлѣ и натугѣ опухоль опять появляется. Грыжа причиняетъ боль въ ней самой и въ животѣ, урчаніе въ кишкахъ, запоръ. Опасною становится *грыжа*, когда она *ущемляется*, т. е. когда часть внутренностей, содержащихся въ грыжевомъ мѣшкѣ, отшнуровывается отъ остальныхъ, лежа-

Digitized by Google

щихъ еще въ брюшной полости. Въ виду опасности ущемленія, на грыжу надо обращать серьезное вниманіе и имѣть хорошій грыжевой бандажъ.

Грыжа даже ущемленная. Вн. *S.* 1 и на опухоль подъ подушечку бандажа класть часто компр. изъ *Эл. Зел.* Въ упорномъ случаѣ *Эл. Бѣл.* или *Анж.*, *S.* 1 × *A.* 2 (2-й—1-й ст.), или *A.* 1 × *Lord* (3-й ст. съ постепен. усиленіемъ дозы до усиленнаго 1-го разведенія). Ван., мазь, прим. изъ *C.* 5, *S.* 5; *C.* 5 по 1 кр. вн. кажд. часъ. Противъ пупочной грыжи вн. и нар. *Lord.*

Грыжи у дѣтей излѣчиваются такимъ способомъ въ нѣсколько недѣль; для взрослыхъ требуются уже мѣсяцы; для стариковъ—годы для излѣченія.

Дикое мясо. Такъ назыв. мясистые красные, кровоточивые наросты, нерѣдко появляющіеся на ранахъ, особенно если въ отношеніи послѣднихъ не соблюдается достаточно чистоты. Эти наросты имѣютъ различную форму, величину, ростутъ чрезвычайно быстро и сильно кровоточатъ при малѣйшемъ прикосновеніи. Вн. *A.* 1 (2-й ст.) × *C.* 1 (1-й ст.). Наружно тѣ же лѣкарства въ примочкахъ. Соблюдать крайнюю чистоту. Въ упорн. случаѣ: *A.* 2 × *C.* 1 (2-й ст.), ван. мазь, прим. изъ *S.* 5 или *C.* 5, или *A.* 2. Компр. изъ *Эл. Бѣл.* На поясн. *Эл. Кр.* × *Желт.*, на сердце компр. *Эл. Анж.* и изъ *A.* 2.

Дрожаніе составляетъ или признакъ слабости и истощенія, или сильнаго волненія, или же пораженія мозга и мозговыхъ оболочекъ. См. въ соотвѣтствующихъ статьяхъ.

Душевныя болѣзни, психопатія. Къ самымъ легкимъ формамъ психопатіи причисляются тѣ умственныя разстройства, при которыхъ сохраняется сознаніе. Всѣ ея жертвы отличаются: ослабленіемъ контроля разсудка надъ самимъ собою, параличемъ воли и центровъ, задерживающихъ рефлексы, вслѣдствіе чего автоматизмъ нѣкоторыхъ частей мозга можетъ проявляться безъ всякой помѣхи; такъ что, не имѣя бреда въ точномъ значеніи этого слова и не теряя способности жить общественною жизнью, эти психопаты одержимы идеей преслѣдованія, безпричиннымъ страхомъ. Къ этому присоединяются

Digitized by Google

тоска, головокруженіе, наклонность къ обморокамъ. Больные испытываютъ непреодолимую наклонность къ убійству, самоубійству, кражѣ, поджогу, пьянству, половымъ излишествамъ, чаще же всего къ сумасброднымъ поступкамъ, но у нихъ никогда не бываетъ приступовъ бѣшенства.

Затѣмъ слѣдуютъ психопатіи, присоединяющіяся къ другимъ нервнымъ болѣзнямъ, такъ напр. припадки эпилепсіи или истеріи иногда замѣняются бредомъ.

Вслѣдъ за психопатіями, которыя составляютъ переходную форму къ неврозамъ, идутъ различные виды настоящаго помѣшательства, которое перестало быть рѣдкою болѣзнью. Оно постепенно ростетъ въ числѣ, подобно самоубійствамъ, такъ что въ Западной Европѣ одинъ помѣшанный приходится уже на 400—500 жителей, а въ городахъ и промышленныхъ центрахъ и значительно больше. У насъ въ Россіи помѣшанныхъ едва ли меньше, чѣмъ въ Западной Европѣ.

Помѣшательство въ дѣтскомъ возрастѣ вообще весьма рѣдко; его время—начало половой зрѣлости; но въ послѣднее время, особенно между дѣтьми, обучающимися въ школахъ, случаи какъ самоубійствъ, такъ и помѣшательствъ сдѣлались болѣе часты, и самое помѣшательство принимаетъ характеръ тяжелой формы. *Женщины* заболѣваютъ преимущественно между 25—35 годами жизни; *мужчины* между 35—50; оба пола даютъ большой % заболѣваній при внѣбрачной жизни; съ наступленіемъ климактерическаго періода у женщинъ наклонность къ заболѣваніямъ возрастаетъ.

Причины развитія душевной болѣзни въ каждомъ частномъ случаѣ всегда болѣе или менѣе сложны. На первомъ планѣ стоитъ: 1) *наслѣдственное предрасположеніе*, имѣющее свой корень въ нервныхъ или въ душевныхъ болѣзняхъ ближайшихъ или болѣе отдаленныхъ предковъ, равнымъ образомъ въ пьянствѣ и истощающей или порочной жизни родителей. 2) Затѣмъ причины помѣшательства заключаются въ разнообразныхъ *болѣзняхъ*, которыя производятъ малокровіе или упадокъ питанія, въ особенности же въ болѣзняхъ головного мозга и его оболочекъ, а также ушибы въ голову. 3) Далѣе

Digitized by Google

слѣдуютъ *неблагопріятныя* жизненныя условія, вызывающія человѣка на чрезмѣрный трудъ физическій или умственный, въ особенности сопряженный съ заботами, тревогами, несбыточными надеждами, и вообще рядъ условій, вынуждающихъ человѣка на *усиленное* умственное напряженіе. Наконецъ 4) *неправильная жизнь* и излишества.

Необходимо замѣтить, что условія, ведущія къ помѣшательству, обыкновенно дѣйствуютъ задолго раньше, чѣмъ разовьется болѣзнь.

Прежде всего *предшествуютъ* перемѣны въ характерѣ, проявляющіяся главнымъ образомъ въ формѣ измѣненій чувства, ненормально веселаго или мрачнаго настроенія, въ формѣ особенной раздражительности, подозрительности, апатіи, суетливости. Весьма многіе задолго до помѣшательства сознаютъ, что могутъ заболѣть, и выражаютъ свои опасенія.

Вполнѣ развившаяся душевная болѣзнь обыкновенно *продолжается* нѣсколько мѣсяцевъ, приблизительно отъ 5—12 и болѣе, въ рѣдкихъ случаяхъ болѣзнь имѣетъ болѣе краткую продолжительность, послѣ чего переходитъ въ выздоровленіе или становится хронической, или переходитъ въ неизлѣчимое состояніе.

Крафтъ-Эбингъ предлагаетъ слѣдующую *классификацію* душевныхъ болѣзней:

1) *Психоневрозы*: а) меланхолія, б) манія и какъ одинъ изъ исходовъ этихъ болѣзней вторичное слабоуміе въ формѣ безсмыслія и безумія (Dementia).

2) Состояніе *психическаго вырожденія* (наслѣдственныя формы): а) резонирующее помѣшательство, б) нравственное, в) первичное сумасшествіе, г) эпилептическое, истерическое, ипохондрическое помѣшательство, д) періодическое.

3) *Болѣзни мозга* съ психическимъ разстройствомъ: а) прогрессивный параличъ, б) сифилисъ мозга, в) хроническій алкоголизмъ, г) старческое слабоуміе, д) острый бредъ.

4) *Психическія болѣзни развитія*: а) идіотизмъ, б) кретинизмъ.

Меланхолія характеризуется постояннымъ мрачнымъ на-

Digitized by Google

строеніемъ и упадкомъ духа, безучастіемъ ко внѣшнему міру, сосредоточеніемъ на мрачныхъ идеяхъ бреда, пассивностію въ отношеніи движеній и проявленій воли, доходящей иногда до полной остановки идей и полной неподвижности. Однимъ изъ нервыхъ признаковъ болѣзни является тоска; обыкновенно больные оставляютъ свои обычныя занятія, считая себя неспособными продолжать ихъ.

Манія характеризуется вполнѣ противоположными проявленіями, т.-е. возвышеннымъ самочувствіемъ, постоянно веселымъ настроеніемъ духа, быстрымъ теченіемъ идей, имѣющихъ характеръ болѣзненнаго величія. Больные обыкновенно оставляютъ свои обычныя занятія, считая ихъ слишкомъ мелкими и незначительными для себя.

Легчайшія формы этого состоянія, въ особенности не сопровождающіяся установившимися идеями бреда, носятъ названіе *маніакальной экзальтаціи*. Болѣе серіозная форма характеризуется быстрой смѣной идей съ преобладаніемъ сильныхъ энергическихъ двигательныхъ актовъ и называется *неистовствомъ*. Эти больные многорѣчивы и неподвижны.

Какъ особенный видъ маніи, слѣдуетъ принять *переходящую манію*. Это состояніе крайняго буйства, соединенное съ сильными галлюцинаціями, длящееся лишь нѣсколько часовъ.

Обѣ формы болѣзни, т.-е. меланхолія и манія, могутъ перейти въ хроническое состояніе, выражаясь тѣми же признаками, какъ и въ остромъ состояніи, съ меньшею только интенсивностію болѣзненнаго настроенія духа; или же та и другая форма могутъ перейти въ неизлѣчимое состояніе слабоумія съ явными признаками равнодушія, упадка памяти и распаденія идей.

Резонирующее помѣшательство (folie raisonnante) характеризуется относительнымъ сохраненіемъ или относительной неповрежденностью способности правильнаго сужденія и умозаключенія при существованіи болѣе или менѣе глубокаго разстройства въ сферѣ *наклонностей* и *стремленій*, при чемъ всѣ дѣйствія больного вытекаютъ изъ этого разстроеннаго источника, не сдерживаясь ни разсудкомъ, ни логикой.

Digitized by Google

Нравственное помѣшательство характеризуется отсутствіемъ или слабымъ природнымъ развитіемъ нравственныхъ чувствъ, холодностью сердца и вытекающими отсюда болѣзненно-безумными поступками и дѣйствіями при *отсутствіи* идей бреда.

Первичное сумасшествіе характеризуется сложнымъ и разнообразнымъ бредомъ и идеями величія или преслѣдованія (delire de persécution), но безъ рѣзкихъ измѣненій въ настроеніи духа, т.-е. безъ мрачнаго или веселаго его настроенія, безъ потери вѣры въ свои силы и энергію. Эти больные говорятъ о преслѣдованіи, заговорахъ, магнетизированіи, которому они подвергаются и т. п.; склонны заводить тяжбы. Такъ какъ настроеніе духа ихъ не представляетъ явныхъ ненормальностей, и они сохраняютъ самообладаніе, то о такихъ больныхъ врачи говорятъ, что они не сумасшедшіе, а только заговариваются, хотя на дѣлѣ это одна изъ серьезныхъ формъ помѣшательства.

Эпилептическое помѣшательство имѣетъ важное практическое значеніе. Эпилепсія у большей части лицъ, подверженныхъ ей, вызываетъ болѣзненное измѣненіе характера, обнаруживающееся то упадкомъ умственныхъ силъ, то чрезмѣрною раздражительностью, то наклонностью къ импульсивнымъ актамъ. Всѣ эти качества дѣлаютъ эпилептика склоннымъ, при извѣстныхъ внѣшнихъ условіяхъ, къ тяжкимъ насильственнымъ дѣйствіямъ. Далѣе, у страдающихъ эпилепсіей могутъ по временамъ появляться такъ называемые эквивалентные приступы, т.-е. внезапно наступающіе, взамѣнъ судорогъ, припадки сильнаго возбужденія съ живыми галлюцинаціями, которыхъ больные большею частію сами впослѣдствіи не могутъ припомнить. Эти состоянія дѣлаютъ эпилептика однимъ изъ самыхъ *опасныхъ* помѣшанныхъ. Кратковременное, нѣсколько часовъ или дней продолжающееся состояніе буйнаго помѣшательства, или такъ называемой *проходящей маніи,* чаще всего является на эпилептической почвѣ.

Истерическое и ипохондрическое помѣшательства представляютъ собою рядъ симптомовъ, свойственныхъ истеріи и ипо-

Digitized by Google

хондріи, съ преобладаніемъ *психическихъ* измѣненій, свойственныхъ этимъ неврозамъ.

Періодическое помѣшательство характеризуется періодическимъ возвратомъ припадковъ болѣзни съ промежутками болѣе или менѣе продолжительными, совершенно здороваго состоянія. Эта форма даетъ чрезвычайно дурной прогнозъ. Одинъ изъ видовъ его представляетъ такъ называемое *циркулярное помѣшательство* (folie circulaire, folie à double forme), характеризующееся періодической смѣной болѣзненно-мрачнаго, подавленнаго и возбужденнаго или веселаго состоянія.

Общій прогрессивный параличъ есть болѣзнь, вызываемая хроническимъ интерстиціальнымъ воспаленіемъ мозга и характеризуется присутствіемъ паретическихъ судорожныхъ явленій въ сферѣ произвольныхъ движеній, въ томъ числѣ въ сферѣ рѣчевыхъ движеній, ослабленіемъ умственныхъ силъ и присутствіемъ *безумныхъ идей величія*. Эти больные говорятъ о милліонахъ, золотѣ, брилліантахъ и т. п.

Алкоголизмъ. Неумѣренное употребленіе алкоголя вызываетъ явленія остраго отравленія, т. е. опьяненія съ общеизвѣстными психическими измѣненіями. Продолжительное же употребленіе алкоголя вызываетъ хроническую болѣзнь, называемую алкоголизмомъ, и характеризующуюся въ психической сферѣ упадкомъ нравственныхъ чувствъ, эгоизмомъ и ослабленіемъ всѣхъ вообще психическихъ функцій, а при дальнѣйшемъ теченіи упадкомъ памяти, слабостью воли рядомъ съ разстройствами въ физическомъ состояніи. Окончательно алкоголизмъ можетъ перейти въ совершенное слабоуміе и прогрессивный параличъ. На почвѣ алкоголизма появляются слѣдующія состоянія, имѣющія практическое значеніе: a) *Запойный бредъ* (delirium alcoholicum) съ буйствомъ и устрашающими галлюцинаціями, видѣніемъ змѣй, лягушекъ и различныхъ животныхъ съ *движущимися и мѣняющими свою форму* и величину галлюцинаторными образами и соотвѣтственными этому обманами въ сферѣ другихъ органовъ чувствъ. Запойный бредъ является, то въ болѣе легкой, не лихорадочной формѣ, то въ болѣе тяжелой лихорадочной; d) *delirium tremens* болѣе тяжелая форма запойнаго бреда, соединенная съ дрожаніемъ мышцъ.

Digitized by Google

Старческое слабоуміе есть болѣзнь, вызываемая атрофіей мозга, большею частью на почвѣ атероматознаго измѣненія сосудовъ. Со стороны психической оно характеризуется упадкомъ умственныхъ силъ до степени ребяческаго состоянія.

Острый бредъ (Delirium acutum) тяжелая болѣзнь, большею частью оканчивающаяся смертію и протекающая при явленіяхъ сильнаго возбужденія съ бредомъ. Она развивается, вѣроятно, на почвѣ острыхъ мозговыхъ гиперемій съ послѣдовательнымъ состояніемъ отека. Болѣзнь протекаетъ большею частію при повышенной температурѣ съ неправильнымъ типомъ.

Идіотизмъ и кретинизмъ — болѣзненныя состоянія, основанныя на пріостановкѣ или болѣзненномъ направленіи въ развитіи мозга, или, наконецъ, на болѣзни мозга и его оболочекъ. Различаютъ нѣсколько степеней идіотизма, изъ коихъ болѣе важныя формы сопровождаются отсутствіемъ или весьма слабымъ развитіемъ рѣчи. *Кретинизмъ* же есть только видъ идіотизма, сопровождающійся болѣе или менѣе рѣзко выраженными признаками физической дегенераціи (неправильнымъ ростомъ, уродливымъ сформированіемъ частей тѣла и пр.).

Въ начальныхъ стадіяхъ болѣзни, когда появляются первые признаки измѣненія характера, необходимо: 1) прекращеніе обыкновенныхъ занятій; 2) устраненіе ослабляющихъ вліяній; 3) назначеніе укрѣпляющей діэты; 4) забота о правильномъ совершеніи выдѣленій, особенно относительно запоровъ; 5) обращеніе особеннаго вниманія на общее состояніе черепномозговыхъ отправленій, въ особенности на сонъ и устраненіе всякихъ разстройствъ мозгового кровообращенія.

Когда болѣзнь уже развилась, самымъ важнымъ является вопросъ о правильной обстановкѣ и систематическомъ лѣченіи. Въ этомъ отношеніи первое и важное условіе составляетъ изъятіе больного изъ его обычной обстановки и помѣщеніе его въ заведеніе, устроенное для лѣченія душевно-больныхъ или же на частную квартиру, но со всѣми требованіями спеціальной лѣчебницы. Пока больной не помѣщенъ въ заведеніе, необходимо имѣть въ виду: въ формахъ алкогольныхъ и съ мрачнымъ настроеніемъ духа возможность самоубійства, а въ формахъ съ

Digitized by Google

возбужденнымъ, повышеннымъ настроеніемъ духа—возможность безумной растраты имущества или заключеніе неправильныхъ и раззорительныхъ юридическихъ сдѣлокъ.

При лѣченіи надо соображаться съ причиною болѣзни.

Душевныя болѣзни, не состоящія въ связи съ органическими разстройствами, и не происходящія отъ поврежденій или ранъ головы, излѣчиваются у мужчины *S.*, у женщины *C.*, съ прибавленіемъ для обоихъ *A.* или *F.* и *Verm.*

Мужчинѣ назначаютъ *S.* 1 (1-й или 2-й ст.), или *S.* 2 (2-й ст.), или *F.* 1 (2-й или 3-й ст.), или *S.* 1. (2-й ст.) × × *F.* 1 (3-й ст.). Будутъ пробовать послѣдовательно, въ продолженіе 4 или 6 недѣль, эти четыре лѣченія, и остановятся на томъ изъ нихъ, которое лучше дѣйствуетъ. Противъ ипохондріи у мужчины хорошо дѣйствуетъ *S.* 2. Потомъ даютъ *F.* 1, чтобы уничтожить разстройства пищеваренія или печени. Если больной сангвиникъ или лимфатико-сангвиникъ, то нужно дать нѣсколько чайныхъ ложекъ въ день *A.* 1 или *A.* 3 изъ 2-го или 3-го ст.

Женщинѣ, если причина ея болѣзни заключается въ разстройствѣ регулъ или вообще въ неправильности половой сферы—назначаютъ утр. и веч. по 2 сух. кр. *S.* 1, въ продолженіи дня *A.* 1 или *A.* 3 (средняя доза) попер. съ *C.* 1 (2-й ст.) и на область сердца мазь *A.* 2. При всякой другой причинѣ *C.* 1 (2—3-й ст.) попер. съ *S.* 1 или съ *A.* 1 или *F.* 1, сообразуясь съ тѣлосложеніемъ, кровообращеніемъ или болѣзнею печени, которая можетъ при этомъ быть. Черезъ нѣкоторое время *S.* 1 и *C.* 1 можно замѣнить *S.* 2 и *C.* 2. Въ упорн. случаяхъ даютъ, какъ мужчинѣ, такъ и женщинѣ *Verm.* въ сух. круп. или изъ 1-го или 2-го ст.

Дыханіе. Мы дышемъ для того, чтобы доставить крови необходимое для жизни вещество, находящееся въ атмосферномъ воздухѣ, именно *кислородъ*, и въ то же время удалить изъ крови вредный газъ, *угольную кислоту.* То и другое достигается *дыханіемъ.* Оно производится такъ, что мы попеременно то расширяемъ, то съуживаемъ нашу грудь. При расширеніи (поднятіи) грудной клѣтки, въ полость его входитъ воздухъ, это—

Digitized by Google

вдыханіе (инспирація). Воздухъ здѣсь втягивается въ два губчатые органа, изъ которыхъ одинъ лежитъ въ правой, другой въ лѣвой половинѣ грудной полости; эти то, принимающіе въ себя воздухъ, органы, называются *легкими*.

Вонючее выдыханіе. Постоянный дурной запахъ выдыханія происходитъ не изъ желудка, но изъ внутренности легкихъ, изъ накопившагося въ нихъ испорченнаго воздуха, при болѣе серьезныхъ болѣзняхъ. Но дурной запахъ изо-рта можетъ обусловливаться и нечистымъ содержаніемъ рта или испорченными зубами.

Лѣченіе должно быть причинное.

Железы. Железами называются тѣ органы человѣческаго тѣла, которые, представляя разнообразную форму и величину, выдѣляютъ изъ крови извѣстную жидкость и выводятъ ее особыми каналами на наружную, покрытую кожею, поверхность тѣла, или во внутреннюю, покрытую слизистою оболочкою полость. Эти жидкости или какъ совершенно негодныя тотчасъ же удаляются изъ организма (выдѣленія), или же служатъ для какой-либо особой цѣли (отдѣленія). Что касается до строенія железъ, то они большею частію суть очень богатые сосудами, мягкіе органы, составленные изъ многихъ отдѣловъ и пересѣкаемые древовидными или изогнутыми трубочками, состоящими въ связи съ выводными протоками и окруженные снаружи плотною кожею. По своему обилію сосудами железы очень легко подвергаются болѣзнямъ; но въ большихъ железахъ болѣзнь рѣдко поражаетъ весь органъ и обыкновенно ограничивается небольшою частію железы.

Болѣзнь железъ выражается круглою или продолговатою, твердою безболѣзненною и неокрашенною опухолью.

Противъ всякой опухоли железъ вн. *S*. 1, которое въ случаѣ неуспѣха замѣняютъ *C*. 1 и во всякомъ случаѣ къ основанію опухоли и на 6 гл. точ. *Эл. Кр*. Въ упорн. случаѣ вн. *C*. 5 (1-й ст.) × *A*. 1 (2-й ст.); ван., мазь, прим. *C*. 5 и *S*. 5. Компр. *Эл. Бѣл*. На соотв. нер. *Эл. Кр.* × *Желт*. Вн. и нар. *S*. 5, *V*. × *S*. 5.

Слюнная железа. Въ полость рта открываются выводные

Digitized by Google

протоки такъ называемыхъ *слюнныхъ железъ*, отдѣленіе которыхъ, смѣшиваясь съ отдѣленіемъ слизистыхъ железокъ, образуютъ *слюну*. Слюнныхъ железъ на каждой сторонѣ по *три*, *двѣ околоушныхъ*, *двѣ подчелюстныхъ* и *двѣ подъязычныхъ*.

Околоушная железа помѣщается около уха, впереди отъ него; вверху заходитъ подъ скуловую дугу, а снизу за уголъ нижней челюсти.

Воспаленіе околоушной железы, свинка, заушница. Симптомы: красная и болящая опухоль, боль иногда распространяется въ шею и въ ухо и сопровождается лихорадкою, головною болью и стѣсненіемъ въ головѣ, которую иногда невозможно поворачивать. *A.* 1 × *C.* 1 (3-й и 2-й ст.), *S.* 1 три раза въ день по 2—5 круп. При жарѣ — *F.* 1 (2-й ст.). На опухоль—мазь *S.* 5, при нагноеніи—*C.* 5.

Ракъ околоушной железы является какъ осложненіе рака языка или гортани. Железа опухаетъ, затѣмъ становится очень твердой съ фіолетовой окраской кожи, потомъ начинается нагноеніе и тогда образуется множество маленькихъ выпуклыхъ опухолей, подверженныхъ кровотеченію и они сопровождаются узлами по пути окружающихъ мускуловъ. Слѣдуетъ опасаться *паралича* лицевого нерва, какъ важнаго осложненія.

Для лѣченія см. Ракъ.

Подчелюстная железа лежитъ непосредственно позади края передней части нижней челюсти, покрываясь поверхностною шейною фасціей. *Подъязычная железа* лежитъ подъ языкомъ, покрываясь слизистою оболочкою полости рта. Отдѣляемая этими железами жидкость — образуетъ со слизью полости рта *слюну*, которая дѣйствуетъ на пищу двоякимъ образомъ: механически — размачиваетъ и размягчаетъ пищу и химически — весьма важною своею составною частію — *птіалиномъ*, извлекаетъ изъ пищи крахмальныя вещества, растворяетъ ихъ и превращаетъ сначала въ декстринъ, затѣмъ въ сахаръ, который уже всасывается въ кровь.

Опухоль подчелюстныхъ и подъязычныхъ железъ лѣчится точно также, какъ и заушница.

Железа брыжжейки. Въ брыжжейкѣ (см. Брюхо) заложено

Digitized by Google

множество собственныхъ железъ отъ горошины до боба величиною, принадлежащихъ къ роду лимфатическихъ железъ потому, что имѣютъ съ ними строеніе совершенно одинаковое.

Воспаленіе брыжжевчныхъ железъ: вн. *A.* 1 × *C.* 2 × *F.* 1 (высш. разведенія съ постепеннымъ переходомъ къ нисшимъ). Утр. и веч. 2—3 круп. *F.* 2, и 3 раза въ день по 5 круп. *L.* Согрѣвающіе компрессы на животъ при *A.* 2, *C*, 5, *S.* 5 и мазь *F.* 2, въ подреберья утр. и веч.

Бугорчатка брыжжевчныхъ железъ лѣчится точно также.

Воспаленіе и образованіе бугорковъ въ брыжевчныхъ железахъ, дѣтская болѣзнь отъ 5 до 10 лѣтъ. Симптомы: блѣдность, поносъ, вздутость брюха, твердая опухоль около пупка или въ бокахъ, кашель, ночной потъ, чистый языкъ, худоба, атрофія членовъ, грусть, частый плачъ и пр. Лѣченіе то же. Ср. Кишечный каналъ, болѣзни кишекъ.

Лимфатическія железы отъ коноплянаго зерна до горошины и болѣе, распространены по всему тѣлу какъ подъ кожею, такъ и въ глубинѣ, на пути лимфатическихъ сосудовъ. При воспаленіи лимфатическихъ железъ вн. *L.* или *S.* 1 × *F.* 1 (1-й ст.), при нагноеніи *C.* 1 (1-й ст.). Въ упорн. случаѣ по 1 кр. *C.* 5 черезъ часъ, или натощакъ въ одинъ пріемъ 10 кр. *C.* 5. Ван. *C.* 5. На соотвѣт. нер. *Эл. Кр.* × *Жел.* Прим. *C.* 5, *Эл. Бѣл.* или *S.* 1.

Миндалевидныя железы, правая и лѣвая, лежатъ позади въ полости рта (по сторонамъ зѣва) между нёбными дугами. Онѣ отдѣляютъ много скользкой слизи, облегчающей проглатываніе кусковъ пищи. Эти железы часто, большею частію вслѣдствіе простуды, поражаются воспаленіемъ, сильно припухаютъ, дѣлаютъ глотаніе болѣзненнымъ или совершенно невозможнымъ и даже затрудняютъ дыханіе. Такое состояніе называется *жабою* (см. стр. 218).

Зобъ или *опухоль щитовидной железы*. Эта железа расположена на передней сторонѣ шеи, прилегая къ нижней части гортани и дыхательному горлу. Эта опухоль рѣдко сопровождается чувствительнымъ разстройствомъ и только при весьма значительномъ увеличеніи объема можетъ причинить затрудненіе ды-

Digitized by Google

ханія давленіемъ на горло. Лѣчится лѣкарствами, указанными выше противъ болѣзни железъ вообще, а затѣмъ *Эл. Кр.* попер. съ *Желт.* вокругъ основанія зоба и еще *Эл. Бѣл.* въ компр. Мазь изъ *Capc.* 5. Мазь изъ *Scrof.* 5.

Въ упорн. и давнихъ случаяхъ: *A* 3 × *C.* 3 (средн. доза) или *A.* 1 × *C.* 5 (съ 3-го ст. до усиленнаго 1-го разведенія); 3 раза въ день *C.* 5 или *L.* Утр. и веч. втирать мази *C.* 3 или мазь зелен. или синюю.

Грудныя железы. См. Половые органы, женскія груди.

Поджелудочная железа. См. Желудокъ.

Предстательная железа. См. Половые органы, мужскіе.

Излѣченія: Ж. 30 л. имѣла 6 л. зобъ, предполагалась операція. Вылѣчена въ 6 мѣс. *S.* 5 попер. съ *C.* 1 (2-й ст.). На зобъ мазь изъ тѣхъ же лѣкарствъ попер. (*C.*).

М. 26 л. имѣлъ зобъ, затруднявшій дыханіе. Вылѣченъ вн. *C.* 1 (1-й ст.) и кругомъ зоба компр. изъ *Эл. Кр.* 3 раза въ день (*C.*).

Д. 16 л. страдала заушницей. Вылѣчена въ 1 мѣс. тѣми же средствами, какъ предъидущая болѣзнь (*C.*).

Желудокъ лежитъ поперегъ и болѣе влѣво, на верхней части живота, какъ разъ подъ грудобрюшной преградой и сердцемъ, имѣетъ видъ овально изогнутаго мѣшка. Лѣвая, болѣе широкая часть его (слѣпой мѣшокъ) простирается далеко влѣво подъ ребра и прилегаетъ здѣсь къ селезенкѣ. Правая, болѣе узкая часть, подходитъ вправо подъ печень. Желудокъ имѣетъ два отверстія: одно на верхнемъ краѣ, ведетъ въ пищепроводъ и называется *входомъ* въ желудокъ: другое на правомъ концѣ желудка, соединяетъ желудокъ съ кишками (съ 12-ти перстной) и называется *выходомъ*.

Стѣнки желудка на своей внутренней поверхности одѣты *слизистой оболочкой*, въ ткани которой заключено множество цилиндрическихъ железокъ, которыя выдѣляютъ *желудочный сокъ*, обладающій пищеварительнымъ веществомъ (пепсиномъ) и дѣйствующій на пищу химически. Кромѣ этихъ железокъ у входа и выхода желудка находится еще *люберкюновы железки*, которыя отдѣляютъ прозрачную *желудочную слизь*; эта слизь

Digitized by Google

дѣйствуетъ на пищу механически, способствуя ея обволакиванію и размягченію для облегченія прохожденія ея по кишкамъ. Позади желудка лежитъ поперечно *поджелудочная железа*, противъ перваго поясничнаго позвонка, между горизонтальными вѣтвями 12-ти перстной кишки; позади ея лежатъ большіе кровеносные сосуды. Она имѣетъ удлиненную форму, на подобіе собачьяго языка, правый ея конецъ уширяется въ 12-ти перстную кишку, а лѣвый — въ селезенку. Ткань этой железы состоитъ изъ гроздевидныхъ долекъ и пузырьковъ, отъ которыхъ начинаются маленькіе канальцы, собирающіеся въ одинъ большой каналъ. Этотъ послѣдній изливаетъ сокъ поджелудочной железы (*панкреатическій*) въ заднюю стѣнку 12-ти перстной кишки. Этотъ сокъ обладаетъ свойствомъ: 1) раздроблять жиры, т. е. превращать ихъ въ эмульсію, какъ желчь; 2) способствовать превращенію нерастворимыхъ бѣлковыхъ веществъ въ растворимые пептоны, какъ желудочный сокъ и 3) извлекать крахмалистыя вещества изъ пищи, превращая ихъ въ сахаръ, какъ слюна.

Чѣмъ болѣе желудокъ наполняется, тѣмъ болѣе поворачивается онъ около своей оси впередъ, такъ что наконецъ верхній его край обращается назадъ, а нижній впередъ. При этомъ брюшная стѣнка нѣсколько выпячивается, и одежда въ этомъ мѣстѣ становится тѣсною. При *рвотѣ* мышечная оболочка желудка дѣлаетъ движенія въ обратномъ направленіи, т. е. отъ выхода ко входу; въ то же время грудобрюшная преграда и мышцы брюшной стѣнки сокращаются и давятъ на желудокъ, вслѣдствіе чего содержимое его принуждается войти чрезъ пищепроводъ и ротъ. При *отрыжкѣ* совершенно какъ при рвотѣ, только безъ всякихъ усилій, выгоняется воздухъ изъ желудка въ ротъ.

Продуктъ желудочнаго пищеваренія — *пищевая кашица* (chymus) есть смѣсь уже переваренныхъ, полупереваренныхъ и непереваренныхъ частей пищи, слюны, слизи, желудочнаго сока, клѣточекъ эпителія. Изъ содержащихся въ желудкѣ жидкихъ веществъ, часть всасывается кровеносными сосудами въ воротную вену, по которой идетъ въ печень, а другая часть всасывается лимфатическими сосудами въ грудной протокъ.

Digitized by Google

Газы, иногда весьма обильные въ желудкѣ, состоятъ или изъ проглоченнаго атмосфернаго воздуха и угольной кислоты, или же развиваются при разложеніи пищи (угольная кислота и водородъ).

Болѣзни желудка.

Острый катарръ желудка. Симптомы у взрослыхъ: сильная боль подъ ложечкой, то глухая давящая, то сверлящая раздирающая; тоска, сильная жажда, постоянная тошнота, часто бываетъ рвота зеленовато-желтою жидкостью; языкъ бѣлый, а по краямъ рѣзко красный, дурной запахъ изо рта частый пульсъ до 100 ударовъ въ минуту. Кожа горячая и сухая, безсонница, сильный запоръ; область желудка, а иногда и весь животъ вздуты газами, причиняющія рѣжущія боли, которыя облегчаются по выходѣ вонючихъ газовъ. Иногда на губахъ у больныхъ высыпаютъ лишайные пузырьки. *Эл. Кр.* съ *Желт.* къ сплет. и симп. нерв. *S.* 1 изъ 1-го ст. Въ упорн. случаѣ *S.* 5 (1-й ст.). На надбрюшіе компр. *Эл. Бѣл.* По 1 кр. *C.* 5 черезъ $^1/_2$ часа.

Въ трудныхъ случаяхъ бываетъ большая или меньшая степень лихорадки, сонъ безпокойный, иногда легкій бредъ, усталость и неспособность къ занятіямъ, тяжесть головы, отсутствіе аппетита, языкъ обложенъ желтоватой слизью, моча съ осадкомъ, запоръ; а если катарръ распространяется на кишки, то появляется поносъ съ водянистыми, зеленью окрашенными испражненіями. Это состояніе называется *гастрическою лихорадкою*, которую въ первые дни трудно бываетъ отличить отъ начинающагося тифа. *F.* изъ 2-го ст., на подвзд. компр. изъ *F.* 1 или *F.* 2. Въ упорн. случаѣ: *Эл. Бѣл.* на темя 10 капель и на 6 гл. точ. Вн. *C.* 5. или *S.* 1; на подвзд. мазь или прим. *C.* 5. Мазь на животъ *A.* 2.

Діэта: впредь до улучшенія лучше всего совершенно воздерживаться отъ всякой пищи и ограничиваться маленькими глоточками холодной воды или глотаніемъ маленькихъ кусочковъ льда. На слѣдующій день можно давать небольшія количества жидкой пищи и 3 раза въ день передъ кушаньемъ по

Digitized by Google

1—5 круп. *S.* 1. Къ обычной же пищѣ перейти лишь постепенно.

Симптомы *у дѣтей* различны, смотря по ихъ возрасту: у дѣтей *отъ 5—6 лѣтъ* симптомы болѣзни тѣ же, что и у взрослыхъ; у дѣтей же *младшаго возраста* болѣзнь начинается обыкновенно сильною лихорадкою, которая длится дня два, и рвотою непріятнаго запаха непереваренною пищею, иногда слизью, чаще запоръ. *Грудныхъ дѣтей* мучитъ жажда, которую ложно принимаютъ за аппетитъ, они безпокойны, стонутъ, плачутъ, иногда судороги и бредъ. Всѣ эти явленія исчезаютъ въ 2—3 дня при правильномъ лѣченіи, которое указано выше для взрослыхъ, но въ дозахъ для дѣтей: См. выше стр. 86).

Хроническій катарръ желудка. Симптомы: непріятное чувство давленія и полноты въ области желудка, увеличивающееся послѣ принятія пищи; вздутость надбрюшной полости отъ наполненія желудка газами, которые по временамъ извергаются *отрыжкою,* часто она бываетъ кислая и острая и вызываетъ *изжогу.* Иногда рвота слизистыми нитевидными массами, въ другихъ случаяхъ настоящею слизью (у пьяницъ по утрамъ); слабый аппетитъ, въ другихъ случаяхъ сильное чувство голода, сопровождаемое изнеможеніемъ—*волчій голодъ.* Языкъ густо обложенъ, вкусъ приторный и кислый; запахъ изо рта болѣе или менѣе вонючій; угнетенное расположеніе духа: моча измѣняется въ количествѣ, осадкѣ и составѣ. Болѣзнь можетъ продолжаться недѣли, мѣсяцы и годы и повести къ *хроническимъ язвамъ желудка*, а если она происходитъ отъ механическихъ разстройствъ—къ *желудочнымъ кровотеченіямъ.* Вн. *S*: 1 × *C.* 1 (1-ый ст.). На 6 гл. точ. *Эл. Кр.* попер. съ *Желт.* Въ упорн. случаѣ: *C.* 5, или *S.* 5, или *A.* 2 (1-й ст.). На подвзд. мазь или прим. *F.* 2 или *C.* 5. На надбрюш. мазь или прим. *C.* 5; *Эл. Бѣл.* въ ван. и на 6 гл. точ. Избѣгать погрѣшностей въ діэтѣ и чрезмѣрнаго обремененія желудка пищей. Кушать можно все то, что переносится желудкомъ. Въ большинствѣ случаевъ вредны сладости, мучныя блюда, свѣжеиспеченный хлѣбъ, жареное въ маслѣ

Digitized by Google

мясо, картофель. Наоборотъ же полезны обыкновенно: тушеное въ собственномъ соку мясо, сырыя или вареныя яйца, молоко, кефиръ, кумысъ, вареные плоды, нѣжные овощи. Спиртные напитки, равно какъ крѣпкій чай и кофе вредны.

Круглая язва желудка. Наблюдается часто (находятъ въ 7,5% трупахъ). Боли усиливаются отъ давленія и не измѣняются отъ электрическаго тока. Измѣненное положеніе больного измѣняетъ силу болей. Онѣ наступаютъ черезъ 1—2 часа послѣ ѣды. Важна для діагноза боль около пупка и на спинѣ близъ верхнихъ поясничныхъ позвонковъ. Кровавая рвота въ $^1/_3$ случаевъ. Испражненія содержатъ иногда измѣненную кровь. Сопровождается очень часто хроническимъ катарромъ желудка. Тѣ же почти симптомы при *круглой язвѣ 12-ти перстной кишки.* Боли не измѣняются при различныхъ положеніяхъ субъекта. Мѣсто боли правое подреберье. Наступаетъ черезъ 3—4 часа послѣ ѣды. Если кровавой рвоты нѣтъ, то испражненія содержатъ кровь: *C.* 1 × *A.* 2 черезъ часъ по одной круп. сух. и передъ каждой пищей *S.* 1. отъ 1 до 5 круп. Утр. и веч. на область живота—мазь *C.* 5, въ надбрюшье—мазь *F.* 2. Каждую недѣлю количество крупинокъ *C.* 1 и *A.* 2 постепенно увеличивать до 10 круп. на пріемъ. Разведенія обыкновенно не такъ хорошо переносятся, какъ сухія круп.

Всякая пища при язвѣ желудка вызываетъ рвоту. Только *самое свѣжее сливочное мороженное* оказывается незамѣнимымъ. Оно дѣйствуетъ холодомъ, успокаивая боли, которыя у такихъ больныхъ сопровождаютъ актъ пищеваренія. Позже черезъ 1—2 мѣсяца, больные постепенно усвоиваютъ и болѣе разнообразную пищу, которая однако должна быть постоянно легкой. Послѣ выздоровленія, иногда спустя годъ, состояніе здоровья вдругъ нарушается, больной чувствуетъ вдругъ сердцебіеніе, приливъ къ головѣ и ощущеніе своеобразной теплоты въ области живота; это предвѣщаетъ новый приступъ кровавой рвоты. Больной въ такомъ случаѣ долженъ лечь въ постель и принимать *A.* 1 × *C.* 1 (3-й, 2-ой ст.) и 3 раза въ день *Эл. Анж.* по 5—10 капель въ рюмкѣ воды.

Ракъ желудка развивается чаще всего между 45—60 го-

Digitized by Google

дами жизни. Видъ больныхъ неудовлетворителенъ. Прощупывается опухоль, она неподвижна при выдыхательныхъ движеніяхъ, но передвигается при ощупываніи. Боли усиливаются отъ давленія и не измѣняются отъ электрическаго тока. Рвота въ видѣ кофейной гущи наблюдается наиболѣе часто при ракѣ выходныхъ частей желудка и можетъ отсутствовать при ракѣ малой кривизны. Опуханіе надключичныхъ железъ. Нельзя отличить ракъ привратника отъ рака 12-ти-перстной кишки.

Распознаваніе рака желудка основывается на слѣдующихъ четырехъ основныхъ признакахъ, совокупность которыхъ дѣлаетъ его несомнѣннымъ: 1) *наличность опухоли желудка;* 2) *рвота шоколаднаго цвѣта, массами*; 3) *раковое истощеніе*, и 4) *отсутствіе соляной кислоты въ желудочномъ сокѣ*; если послѣ нѣсколькихъ изслѣдованій желудочнаго сока въ немъ отсутствуетъ соляная кислота, то съ большою вѣроятностію можно предположить ракъ. Болѣзнь никогда не длится болѣе двухъ лѣтъ. Для лѣченія см. *Ракъ*.

Спазмъ или нервная боль желудка, кардіальгія происходитъ только отъ ненормальнаго раздраженія его нервовъ, но не отъ органическихъ измѣненій ткани, и выражается появленіемъ припадковъ сильнѣйшей боли даже при пустотѣ желудка, съ послѣдующею затѣмъ совершенно безболѣзненною паузою, причемъ боль уменьшается отъ сильнаго давленія на подложечную ямку. Приступъ продолжается отъ нѣсколькихъ минутъ до $^1/_2$ часа, послѣ чего боль мало-по-малу уменьшается, оставляя послѣ себя большое ослабленіе, или боль вдругъ смѣняется пустою или водянистою отрыжкою, рвотою, легкимъ потомъ или испражненіемъ красноватой мочи. 10 круп. *S.* 1 быстро унимаютъ боль. *Эл. Кр.* и *Желт.* къ зат., симп. и сплет. нерв. Потомъ *S.* 1 изъ 2-го ст. Въ упорн. случаѣ: на подвзд. мазь, прим. *F.* 2 или *C.* 5, мазь на животъ *S.* 1 и лѣкарства противъ гастрической лихорадки. См. выше.

Диспепсія, разстройство и слабость желудка. Подъ именемъ диспепсіи разумѣется разстройство собственно самаго процесса пищеваренія. Диспепсія бываетъ *желудочная* и *кишечная*. Первая характеризуется болью въ наджелудочной

Digitized by Google

области—подъ ложечкой, появляющейся вскорѣ послѣ принятія пищи, и эта боль облегчается отъ легкаго давленія и усиливается отъ сильнаго давленія. *Кишечная диспепсія* можетъ обнаружиться одна или существовать вмѣстѣ съ желудочною, и характеризуется мѣстною болью, которая появляется гораздо позже, чѣмъ предъидущая; боль сначала острая, затѣмъ обостряется, иногда холодный потъ и ослабленіе, бурчаніе, вонючіе газы, фекальныя массы непереваренныя, жидкія или твердыя, запоръ смѣняется легкимъ поносомъ. Въ обоихъ случаяхъ пустая отрыжка, непріятный вкусъ, клейкость и сухость рта, незначительное отдѣленіе слюны въ видѣ бѣлой пѣны, рвота и тонкій налетъ на серединѣ языка, нисходящій къ самому его кончику. Диспепсія, въ большинствѣ случаевъ, сопровождаетъ всякое невропатическое состояніе.

У грудныхъ дѣтей диспепсія происходитъ, если ребенку даютъ пищу недоброкачественную или трудноваримую, и диспепсія у нихъ характеризуется цвѣтомъ испражненій, которыя изъ желтыхъ дѣлаютъ зелеными съ кислымъ запахомъ, затѣмъ колики и боли живота, которыя обнаруживаются вскрикиваніями и характерными сученіями ножекъ, бываетъ и рвота, которая встрѣчается впрочемъ и при катаррѣ желудка и другихъ болѣзняхъ дѣтскаго возраста. *Другая форма* диспепсіи у дѣтей характеризуется бѣлыми испражненіями, вѣрнѣе сѣроватыми, очень похожими на глину, иногда съ рѣзкимъ гнилостнымъ запахомъ. При этой формѣ, въ противоположность первой, испражненія задерживаются и крайне рѣдко наблюдаются поносныя испражненія.

Лѣченіе. Вн. 3—4 сух. круп. *S.* 1 или *S. G.*, затѣмъ то или другое изъ 1-го ст. Въ упорномъ случаѣ *C.* 1 или *C.* 3 × *A.* 1, или *A.* 3; 1—2 раза въ день *Verm.* по 3—5 круп.; вн. *Эл. Бѣл.*; на подвздош. мазь *F.* 2 и на 6 гл. точ. *Эл. Кр.* одно или попер. съ *Эл. Желт.*, мазь *C.* 5 на животъ. Ванны *S.* 5, *C.* 5. Дѣтямъ тѣ же вн. лѣкарства, но въ дѣтскихъ дозахъ (стр. 86).

Слабость желудка лѣчится какъ острый катарръ желудка.

Воспаленіе пищепровода выражается въ особенности болью,

Digitized by Google

постепенно усиливающейся, иногда внезапной и очень сильной и во всякомъ случаѣ нестерпимой при глотаніи. Эта боль можетъ распространяться въ гортань, надбрюшіе и между плечами. Иногда она сопровождается сухостію. Иногда, при сокращеніи желудка, содержащаяся въ немъ пища выбрасывается ртомъ и черезъ ноздри; къ этой рвотѣ можетъ присоединиться жажда, болѣе или менѣе сильная, горловой кашель (хриплый) и икота. Вн. *С.* 1 (1—2-й ст.) въ частыхъ пріемахъ; при приливѣ или сангвинич. темп. даютъ немного *А.* 2 (2-й ст.); при лихорадкѣ *F.* 1 (2—3-й ст.). На симп. и сплет. нерв. *Эл. Кр.* и мазь *S.* 5.

Хронич. воспаленіе пищепровода встрѣчается иногда вмѣстѣ съ разстройствомъ пищеваренія, какъ первые симптомы рака желудка или пищепровода. Въ этомъ случаѣ является *съуженіе пищепровода*, которое распознается потому, что проходъ пищи задерживается; она проглатывается только на половину, но чаще всего пища, послѣ пріема, почти сейчасъ выбрасывается обратно. Для лѣченія см. *Ракъ*.

Спазмы пищепровода выражаются внезапною трудностію глотанія пищи, при чемъ проглоченная пища не всегда немедленно выбрасывается обратно, и при этомъ болѣзненное ощущеніе посторонняго тѣла. Причины: нервный темпераментъ, истерика, нѣкоторыя болѣзни легкихъ, гортани, матки, желудка, воспаленіе, съуженіе или параличъ пищепровода. Лѣченіе должно быть направлено противъ производящей причины, а во время спазма втираніе *Эл. Бѣл.* и вн. сухія кр. *S.* 1.

Воспаленіе желудка и кишекъ представляетъ соединенные симптомы этихъ двухъ болѣзней. Со стороны желудка наблюдается: тошнота, рвота желчью, болѣе или менѣе повторяющаяся, жажда, боль подъ ложечкой, и со стороны кишекъ: колики, боль живота, поносъ. Для лѣченія см. *катарръ и спазмъ желудка*.

Излѣченія: М. 43 л. страдалъ 2 года язвою въ желудкѣ, рвало отъ всего, даже отъ воды, жестокая боль, худоба, безсонница, слабость, потеря аппетита. Вылѣченъ совершенно въ 2 мѣсяца *S.* 1 поперем. съ *С.* 1 (1-й ст. (*С.*).

Digitized by Google

М. 40 л. болѣл. хронич. катарромъ желудка и кишекъ отъ отравленія аллопат. лѣкарствами, ничего не переваривалъ, рвота отъ ложки воды или молока, большая слабость, по опредѣленію докторовъ могъ прожить не болѣе 1 мѣсяца. Отъ приложенія *Эл. Бѣл.* на темя и симп. нерв., 10 сухихъ круп. *S.* 1 на языкъ три раза въ день, *A.* 1 (1-й ст.) попер. съ *S.* 1. (2-й ст.) и ван. *C.* 5. Выздоровѣлъ въ 2 недѣли *(C.)*.

— Ж. 30 л., страдала кардіальгіей съ болью въ надбрюшной области, въ спинѣ и въ груди. Вн. *S.* 1 × *A.* 1 (2-й ст.), на 6 гл. точекъ *Эл. Кр.* × *Желт.* и отъ нѣсколькихъ подкожныхъ вспрыскиваній *Эл. Желт.* боль въ подбрюшіи прошла, но въ спинѣ и въ груди боли прошли отъ *Эл. Бѣл.* и мази *F.* 2. Черезъ 8 дней образовалась желтуха, которая прошла вмѣстѣ съ прочими симптомами отъ *F.* 1 (2-й ст.) и на подвзд. мазь *F.* 2 (*C.*).

Число излѣченій другихъ болѣзней желудка, кромѣ раков. язвъ, весьма значительно (*C.*).

Заиканіе есть разстройство координаціи движеній мышечнаго аппарата, дѣйствующаго во время рѣчи. При этомъ спазмѣ участвуютъ мышцы языка, зѣва, губъ, глотки и гортани, и причина болѣзни лежитъ или на пути утолщенія блуждающихъ нервовъ, или въ центрѣ ихъ происхожденія въ продолговатомъ мозгу.

Сперва приложить наружно къ больш. и мал. подъяз. нер. *Эл. Кр.*, котор. иногда одно достаточно; въ случаѣ неуспѣха дать вн. *S.* 1 или *A.* 1.×*S.* 1.

Заиканіе отъ рожденія было вылѣчено у дѣв. 24 л. такимъ же образомъ. Въ упорн. случаѣ: полоск. водою съ *Эл. Кр.* или *Бѣл.*, *Эл. Кр.*×*Желт.* на подъяз. нер., въ особенности къ малымъ, на тѣ же нерв. мазь *C.* 5 и *A.* 2. Ван. *C.* 5 или *A.* 2.

Заноза. Она производитъ иногда очень сильное раздраженіе кожи. Вн. *S.* 1 и погрузить палецъ съ занозой въ теплый стаканъ воды съ 25 каплями *Эл. Кр.*, продержать полчаса, и тогда занозу легче удалить.

Запоръ происходитъ большею частію въ толстой кишкѣ, и выражается тѣмъ, что больные съ трудомъ испражняются твердымъ, сухимъ, комковатымъ каломъ. Противъ недавняго

Digitized by Google

запора вн. взрослому 5—10 круп. *S. las.* въ $^1/_2$ рюмкѣ воды, или вн. изъ 1-го стак. лифматику *S.* 1, сангвинику *A.* 1, выпить залпомъ на тощакъ и на ночь, ложась спать, по одному стакану. Другимъ болѣе помогаетъ *V.* 1 утр. и веч. по 2 сух. кр.

При упорномъ, привычномъ запорѣ, сопровождающемся завалами въ кишечникѣ (*копростазъ*), этого лѣченія не достаточно. Въ такихъ случаяхъ слабительныя средства не приносятъ существенной пользы, въ большинствѣ же случаевъ даже вредны. Цѣлесообразно и даже необходимо начать лѣченіе ежедневными теплыми водяными клистирами, которые надо примѣнять съ выдержкой и настойчивостью въ теченіе нѣсколькихъ недѣль и, въ трудныхъ случаяхъ, даже мѣсяцевъ. Количество воды для клистира должно быть такое, какое только переносится больнымъ. Въ началѣ полезно бываетъ повторить клистиръ непосредственно 2 и даже 3 раза, если дѣйствіе недостаточно. Только въ очень застарѣлыхъ случаяхъ приходится время отъ времени прибѣгать еще къ пріему внутрь столовой ложки прованскаго масла или сдѣлать клистиръ изъ чистаго деревяннаго или коноплянаго масла, вмѣсто воды, особенно у лицъ, страдающихъ геморроемъ.

Изъ лѣкарствъ примѣняются тѣ, которыя показаны общимъ состояніемъ организма, главнымъ образомъ его тѣлосложеніемъ. Во всякомъ случаѣ давать 3 раза въ день 5 круп. *S.* 2 или *L.*, при сильной же боли въ животѣ—10—20 круп. *S.* 1 въ чайной ложкѣ хорошаго коньяку. Каждый вечеръ на ночь—согрѣвающій компрессъ вокругъ живота и поясницы изъ раствора 10 круп. *A.* 2 и *C.* 5 въ стаканѣ воды. Особенно полезны эти компрессы у дѣтей, страдающихъ привычнымъ запоромъ. Позднѣе втирать въ животъ утромъ и вечеромъ мазь красную (съ *S.* 5), что слѣдуетъ дѣлать втеченіе продолжительнаго времени. Въ подреберья—мазь *F.* 2.

Противъ упорныхъ запоровъ рекомендуется *Graines de Lin* (льняное сѣмя съ анисомъ), отъ 1 до 3 стол. ложекъ въ день съ водою, а также хлѣбъ съ пшеничными отрубями, называемый *Graham-brod* (хлѣбъ Грагама), который можно найти въ

Digitized by Google

булочныхъ большихъ городовъ. Хлѣбъ этотъ, если его употреблять ежедневно не въ слишкомъ малыхъ количествахъ, способствуетъ у страдающихъ привычнымъ запоромъ, и безъ дальнѣйшихъ вспомогательныхъ средствъ, правильному испражненію на низъ (*С*).

Застой крови. Когда загораживается путь крови, текущей отъ сердца къ органу и возвращеніе ея обратно къ сердцу, она останавливается, измѣняется въ своемъ цвѣтѣ, дѣлается неспособной къ питанію тканей и выдѣляетъ изъ себя жидкость, помѣщающуюся между тканями органа, что называется *отекомъ*. При застоѣ крови мы имѣемъ: затрудненное движеніе крови въ пораженномъ мѣстѣ или органѣ, или даже полную остановку ея, измѣненіе цвѣта крови—изъ ярко- въ темнокрасный, отчего и ткани, въ которыхъ находится такая кровь, кажутся синими, и выступленіе изъ крови жидкости, отекъ. Когда препятствіе для движенія крови къ сердцу устраняется, всѣ явленія застоя проходятъ. Вн. *А.* 1 (1-й или 2-й ст.), на сердце и пораженный органъ *Эл. Анж.*, мазь или прим. *А.* 2. Ванны *А.* 2.

Золотуха. Характерные ея признаки: крайняя бѣлизна и тонкость кожи, особенно—лица, тонкіе, шелковистые волосы; длинныя блестящія рѣсницы; влажные, зачастую голубые глаза съ большими зрачками; кожа своеобразно раздражается отъ малѣйшей причины; золотушныя дѣти очень подвержены ознобленіямъ. Кромѣ того *сыпи*, изъ которыхъ самая частая и характерная есть такъ называемая *Eczema impetiginosum* (*Экзема гнойничковая*), которая протекаетъ слѣд. образомъ: на волосистой части головы, на лицѣ, на рукахъ или ногахъ появляется плоскій прыщикъ, средина котораго желтовато-бѣлая, окружность же болѣе или менѣе яркаго краснаго цвѣта; середина является бѣлой потому, что подъ тонкой пленкой ея собирается гной; пленка эта лопается или сама, или расчесывается, и тогда получается круглая гноящаяся язвочка, очень упорная къ заживленію. Такихъ прыщиковъ можетъ быть много, причемъ отдѣляющійся изъ нихъ гной можетъ засыхать въ болѣе или менѣе толстыя корки, подъ

Digitized by Google

которыми продолжается нагноеніе. Для лѣченія этой сыпи см. *Экзема*. *Другой*, уже болѣе характерный признакъ золотухи—это *опуханіе лимфатическихъ железъ*. При болѣе или менѣе развитой золотухѣ можно найти вездѣ опухшія железы, но преимущественно *около угла нижней челюсти*, гдѣ иногда образуются цѣлые пакеты ихъ, затѣмъ у середины нижней челюсти, подъ угломъ подбородка, вдоль шеи и въ пахѣ ребенка. При внимательномъ осмотрѣ можно замѣтить, что *грудь ребенка покрыта густой сѣтью синихъ жилокъ*—признакъ часто фатальнаго опуханія железъ, заложенныхъ въ груди, такъ назыв. бронхіальныхъ, и что *животъ несоразмѣрно вздутъ*—признакъ опуханія брыжжеечныхъ железъ, что также представляетъ свою опасность. *Третій* характерный признакъ—это *наклонность къ катарральному воспаленію всѣхъ слизистыхъ оболочекъ безъ исключенія*, упорство этихъ катарровъ и наклонность ихъ возобновляться при всякомъ малѣйшемъ поводѣ, если даже они, повидимому, и излѣчены. Слизистая оболочка носа чаще всего поражается; образующійся *насморкъ* не проходитъ по цѣлымъ мѣсяцамъ; затѣмъ также часто появляется *катарръ средняго уха*. Гнойное истеченіе изъ носа или уха обладаетъ, притомъ, сильно раздражающими свойствами, вслѣдствіе чего на верхней губѣ, щекахъ и шеѣ развиваются иногда сыпи, тоже очень упорныя. Слизистая оболочка *кишекъ* поражается также нерѣдко, развиваются *упорные поносы*, въ теченіе которыхъ незамѣтно появляется опуханіе *брыжжеечныхъ железъ*, наконецъ *у дѣвочекъ* часто развиваются *бѣли*. Но самыя печальныя послѣдствія представляетъ *катарръ бронховъ*. Незначительная *царапина*, *порѣзъ*, который зажилъ бы у здороваго ребенка черезъ 1—2 дня, у золотушнаго превращается въ болячку, гноится безконечно. Ушибъ у золотушнаго вызываетъ нарывъ, иногда даже большой; *ушибы кости* или *сустава* могутъ обусловить костоѣду и золотушныя воспаленія суставовъ.

Противъ золотухи главное лѣкарство — *S.* 1 или *S.* 2; вспомогательными служатъ: *A.* 1, 2, 3, *V.*, *C.* 1, 4 и 5 вн. и наружно; всѣ пять жидкостей; на подвзд. мазь, компр. *F.* 2,

Digitized by Google

С. 5. Лѣченіе сыпи, железъ и прочихъ золотушныхъ болѣзней означено въ каталогѣ въ алфавитномъ порядкѣ.

Зубы. Это важнѣйшія орудія для жеванія. У взрослаго человѣка 32 зуба, въ каждой челюсти по 16. На каждомъ зубѣ отличаютъ: *корень*, сидящій въ полости кости, *шейку*, окруженную деснами, и *вѣнчикъ*, свободно выдающійся въ полость рта. Тѣ 20 зубовъ (8 рѣзцовъ, 4 клыка и 8 коренныхъ), которые выростаютъ у ребенка, начиная съ 6 мѣсяцевъ до 2 лѣтъ жизни, называются *молочными*. Твердый покровъ бѣлаго, гладкаго вѣнчика называется *зубною эмалью*. Внутри зуба находится полость, входъ въ которую лежитъ на верхушкѣ края. Въ полости содержится мягкая масса; въ нее изъ челюсти направляются кровеносные сосуды и нервы, отъ которыхъ зависитъ питаніе и чувствительность зуба.

Порча зубовъ зависитъ главнымъ образомъ отъ микроскопически малыхъ животныхъ и грибковъ, зародыши которыхъ, попавъ въ ротъ изъ воздуха, чрезвычайно легко развиваются въ гніющихъ остаткахъ мясной пищи. Послѣ ѣды мясо почти всегда остается между зубами и въ пустыхъ зубахъ; если оно загніетъ, то производитъ дурной запахъ изо рта.

Для сбереженія зубовъ въ хорошемъ состояніи, нужно каждое утро и всякій разъ послѣ ѣды полоскать ротъ водою, чтобы удалить частички пищи, которыя могли остаться на зубахъ или завязнутъ между ними. Надобно также чистить не только зубы, но и десны мягкою щеткою. Такое треніе укрѣпляетъ десны, и въ нихъ тогда крѣпче держатся зубы. Для предупрежденія зубовъ отъ гніенія и для остановленія начинающагося гніенія полезно полосканіе изъ 20 кр. *С.* 4 на стаканъ воды. Полезны также: *С.* 1, *С.* 2 и *С.* 5.

Для сохраненія зубовъ можно пользоваться еще зубнымъ порошкомъ слѣдующаго состава: 30—50 круп. *С.* 4, $^1/_2$ унціи мелкаго порошка фіалковаго корня (*Radix Iridis florentinae*) и $^1/_4$ унціи *жженной магнезіи*—все вмѣстѣ растереть хорошенько.

Digitized by Google

Болѣзни зубовъ.

Зубная боль бываетъ съ флюсомъ или безъ онаго. Лѣчится различно: 1) полоск. съ чайн. ложкою *Эл. Бѣл.*, или *Эл. Анж.* или *Кр.* на $^1/_2$ стак. воды; въ упорн. случаѣ попер. одно послѣ другого; 2) Изъ одной изъ этихъ жидкостей компрессы на виски и подъ ухо со стороны больного зуба; 3) полоск. изъ 20 кр. *C.* 10 на $^1/_2$ стак. воды быстро унимаетъ зубную боль у беременныхъ; 4) втираніе въ десну раствора 5 кр. *V.* въ ложкѣ виннаго спирта; 5) тампонъ изъ ваты съ *Эл. Зел.* въ пустой зубъ; 6) вн. *S.* 1 (1-й ст.); 7) при сильномъ приливѣ, краснотѣ лица, опухшихъ глазахъ, съ опухолью или безъ оной, лучше вн. *A.* 1 (3-й ст.), полоск. съ *Эл. Анж.*, вн. 5 капель *Эл. Анж.* и нар. *Эл. Анж.*

Зубная невралгія. Вн. *V.* (3-й ст.) и полоск. *S.* 1, *S.* 5, *A.* 1, *C.* 1 и *C.* 5.

Обнаженіе зубовъ отъ десенъ. Лимфатику *S.* 1, сангвинику *A.* 1 × *C.* 5; полосканіе *A.* 2 и *C.* 5.

Прорѣзываніе зубовъ у дѣтей сопровождается лихорадкою, поносомъ, запоромъ, рвотою, кашлемъ, конвульсіями, безсонницей и проч. Противъ этихъ разстройствъ даютъ ребенку каждые два часа по 1 сух. кр. *S.* 1 и втираютъ ему въ челюсть мазь *C.* 5, а кормилицѣ вн. *S.* 1 (1-й ст.); если *S.* 1 не помогаетъ, то кромѣ того давать ребенку каждый вечеръ 1 сух. кр. *A.* 3 и въ теченіе дня нѣсколько чайныхъ ложекъ *F.* 1 (3-й ст.). Поносъ, слюнотеченіе, нервное разстройство и запоръ лѣчатся такимъ же образомъ, но въ особенности сухими кр. *S.* 1 или *Verm.* 1. Послѣднее оказалось полезнымъ, когда легкимъ конвульсіямъ предшествуютъ сухой кашель и часто недержаніе мочи во время сна. Во время конвульсій или при ихъ предвѣстникѣ—пурпуровое лицо—давать реб. сухіе кр. *S.* 1 или *A.* 1 × *S.* 1 (3-й ст.) и на всю голову прим. *A.* 2 × *S.* 5; въ промежуткахъ же между конвульсіями давать реб. *S.* 1 (2-й ст.) и на всю голову частыя прим. *C.* 5. При этомъ предупреждать запоры и если они существуютъ, то ста-

Digitized by Google

вить клистиры изъ тепловатой воды. При трудномъ прорѣзываніи зубовъ смазывать ежедневно утр. и веч. десны *Эл. Бѣл.*, а наружно въ область челюсти мазь *С.* 5.

Зубная фистула. Вн. и нар. въ полоск. *С.* 5 (50 кр. на стакан. воды) съ *Эл. Зел.*; вн.: *А.* 3 × *С.* 4 (3-й, 2-й ст.).

Костоѣда зубовъ. Лѣчится, какъ ракъ. См. *Ракъ.*

Изжога происходитъ отъ разныхъ причинъ и сопровождаетъ многія болѣзни, преимущественно—желудка, кишечнаго канала и печени, бываетъ также при беременности. Изжога обусловливается избыткомъ кислотъ или щелочей въ желудкѣ, а также раздраженіемъ нервовъ желудка. Вн. *S.* 1 или *F.* 1. Въ упорн. случаѣ *С.* 1 (1-й ст.). На 6 гл. точ. *Эл. Бѣл.* или *Анж.* или *Эл. Кр.* × *Эл. Желт.*

Икота есть спазмъ грудобрюшной преграды. При воспалительной лихорадкѣ она указываетъ, до извѣстной степени, на воспаленіе кишекъ, а при нервной лихорадкѣ—на ея злокачественность; при тяжкихъ болѣзняхъ икота ведетъ къ крайнему упадку силъ и близкому смертельному исходу; икота отъ опьяненія, сухой пищи или холода не имѣетъ серьезнаго значенія и проходитъ отъ 2 сух. кр. *S.* 1. Точно также икота не имѣетъ большого значенія у дѣтей, если происходитъ отъ простуды или пученія живота.

Инфлуенца—болѣзнь эпидемическая, есть ничто иное какъ гриппъ (См. эту болѣзнь). Развивается во всякое время года, во всѣхъ климатахъ, при всякой температурѣ и при всѣхъ возможныхъ атмосферическихъ условіяхъ. Вообще начало гриппа болѣе бурное, чѣмъ то, которое наблюдается при простомъ бронхитѣ. Чрезмѣрная разбитость и сильная головная боль, голосъ хриплый, насморкъ мучительный и боль въ бронхахъ; кашель упорный приступами, сначала сухой, но позже со слизистой мокротой; лихорадка мѣняется, смотря по обстоятельствамъ; къ вечеру температура часто повышается; ночи очень безпокойныя и трудныя. Иногда обнаруживаются катарральныя явленія со стороны пищеварительныхъ органовъ, а также и разстройства нервной системы. Черезъ нѣсколько дней, обыкновенно отъ 8 до 10, симптомы ослабѣваютъ и больной выздоравливаетъ.

Digitized by Google

Предсказаніе въ большинствѣ случаевъ благопріятное; впрочемъ, у людей старыхъ или ослабленныхъ хроническими болѣзнями, инфлуенца иногда имѣетъ гибельный исходъ. Вообще замѣчено, что всѣ хронич. болѣзни внутр. органовъ, какъ-то: *легкихъ* (бронхитъ, эмфизема, чахотка, особенно начальная ея форма), *сердца* (пороки клапановъ, перикардитъ, (ожирѣніе), *желудочно-кишечнаго канала* (хрон. катарръ, нервная боль) ракъ и другія, подъ вліяніемъ инфлуенцы значительно обостряются, и такая болѣзнь, какъ чахотка, получаетъ толчекъ къ быстрому прогрессированію, послѣ чего нерѣдко принимаетъ скоротечный характеръ. Вн. 10 сухихъ круп. *Scrof. Giap.* всякій день, или для взрослыхъ изъ 1-го ст., а дѣтямъ изъ 2-го ст. Въ этихъ же дозахъ это лѣкарство употребляется и какъ предохранительное средство противъ эпидеміи инфлуенцы. Этимъ лѣченіемъ излѣчиваются лихорадка и всѣ симптомы болѣзни въ теченіе 2—3 дней, не оставляя послѣ себя слабости.

При осложненіи и смотря по тѣлосложенію употребленіе внутрь *Ang.* и разныхъ другихъ лѣкарствъ представляется необходимымъ (ср. *Гриппъ*).

У нѣкоторыхъ субъектовъ, страдавшихъ къ значительной степени инфлуенцой, отъ которой совершенно не вылѣчились, обнаруживалась болѣзнь *Нона* (Nona). Эта болѣзнь наблюдалась въ 1889 и 1890 гг. въ Италіи, Австріи и на югѣ Франціи. Она выражается тѣмъ, что больныхъ одолѣваетъ спячка, постоянное желаніе спать, наконецъ является летаргія, оканчивающаяся смертію. Вн. *Srof. Giap.* въ растворѣ и сухихъ круп. съ ѣдою, какъ и противъ инфлуенцы; кромѣ того при слабости, отсутствіи аппетита, недостаткѣ энергіи, спячкѣ— *Эл. Кр.* 2 раза въ день вн. по 6 капель и нар. на темя 10 капель и къ зат., перенос., вискамъ и сплет. нервовъ.

Ипохондрія заключается въ раздраженіи нервовъ, преимущественно тѣхъ, которые управляютъ пищевареніемъ, и почти всегда находится въ связи съ хрон. катарромъ желудка. Подъ вліяніемъ этого раздраженія больной становится мрачнымъ, подозрительнымъ, раздражительнымъ; *онъ преувеличиваетъ* бо-

Digitized by Google

лѣзнь, которою страдаетъ, или *воображаетъ*, что онъ страдаетъ другими болѣзнями, которыхъ вовсе у него нѣтъ; онъ подвергается *слабости*, *безсонницѣ*, иногда *сердцебіенію*, *спазмамъ* и даже *галлюцинаціямъ*. Этотъ неврозъ чаще встрѣчается у взрослыхъ и у мужчинъ, чѣмъ у стариковъ и у женщинъ. По большей части ипохондрія происходитъ у мужчинъ отъ болѣзни желудка и печени, которая сопровождается иногда упорными запорами, которые нужно преодолѣть. (См. *Запоръ*). У женщинъ же она является какъ симптомъ нервной болѣзни или истерики. А потому и лѣченіе различно: *мужчинамъ* вн. утр. и веч. по 5 сух. круп. *S*. 1 и въ теченіе дня *S*. 1 × *F*. 1 (2-й ст.) и на подвзд. мазь *F*. 2; а *женщинамъ* вн. утр. и веч. на 5 сух. круп. *S*. 1 и въ теченіе дня *C*. 2 × *S*. 2 (2-й ст.) и на подвзд. мазь *F*. 2.

Въ болѣе упорныхъ случаяхъ: *A*. 1 × *C*. 1, × *F*. 1 (3-й ст.) и 3 раза въ день по 5 круп. *S*. 1 передъ пищей. Прилож. *Эл. Кр.* у мужчинъ, *Эл. Анж.* или *Эл. Бѣл.* у женщинъ къ гл. нервн. точкѣ 11, на весь спинной хребетъ до т. 22, на тт. 5, 6, 7. Ежедневныя умѣренныя движенія на чистомъ воздухѣ. Для мужчинъ полезно пиленіе дровъ, въ теченіе часа въ день. Болѣзнь эта вполнѣ излѣчима, если не имѣется неизлѣчимыхъ органическихъ страданій, какъ, напримѣръ, порокъ сердца.

Истерика. Болѣзнь нервная, свойственна женщинѣ. Ея симптомы физическіе или моральные, всѣ нервнаго свойства, можно иногда принять за симптомы сумашествія, и они настолько разнообразны, что можно объ нихъ написать цѣлую книгу. Болѣзнь чаще неполная, чѣмъ вполнѣ развившаяся, выражается измѣненіемъ характера, нервностію, мѣстными спазмами въ органахъ наиболѣе слабыхъ. При полномъ развитіи болѣзни, она обыкновенно начинается безпокойствомъ, судорогами, сердцебіеніемъ, спазмами, удушьемъ; замѣтное измѣненіе характера, грезы, странныя сновидѣнія; къ этому вскорѣ присоединяются чувство сжатія подъ ложечкой или въ глоткѣ, и въ особенности ощущеніе шара, который яко бы застрялъ въ глоткѣ или поднимается изъ нижней части живота и

Digitized by Google

останавливается въ глоткѣ; къ удушью, производимому этимъ шаромъ, иногда присоединяется пронзительная боль въ темени съ конвульсивными движеніями, но безъ полной потери сознанія и чувствительности. Больныя много плачутъ, кричатъ, потягиваются, моча свѣтлая и обильная, все это предвѣщаетъ конецъ припадка, послѣ котораго остается боль въ головѣ или въ другихъ частяхъ тѣла.

Распознаваніе истерики основывается на многочисленности, подвижности и скоротечности ея симптомовъ. Истерическій шаръ есть признакъ болѣзни. Истерика отличается отъ эпилепсіи по свойству конвульсивныхъ движеній, которыя вовсе не измѣняютъ мускуловъ лица, и по отсутствію пѣны изо рта.

Вообще истерика вызывается душевными волненіями, сильными неудачами, грустью, чтеніемъ нѣкоторыхъ книгъ и слушаніемъ нѣкоторыхъ разсказовъ у субъектовъ отъ роду впечатлительныхъ, также неправильнымъ изнѣживающимъ воспитаніемъ, онанизмомъ.

Эта болѣзнь, свойственная женщинѣ, очень часто наблюдается въ связи съ болѣзнями матки или яичниковъ. Въ такихъ случаяхъ часто удается прекратить истерическій припадокъ прижатіемъ яичниковой области той стороны, которая у больной внѣ припадка чувствительна; это прижатіе слѣдуетъ продолжать нѣсколько минутъ. Вн. *S.* 1 (3-й ст.), въ упорн. случаѣ *C.* 1 или *C.* 2 × *A.* 3 въ такой же дозѣ. Къ сплет. нерв. *Эл. Анж.* Если *S.*, *C.* и *A.* 3 не дѣйствуютъ, то даютъ утр. и веч. по 2 сух. кр. *A.* 1. Кромѣ того, оказалось полезнымъ *Verm.* 1 (3-й ст.) по 4 ст. ложки въ день, также растворъ одной капли *Эл. Желт.* въ стаканѣ воды, который принимаютъ утр. и веч. по стол. ложкѣ. Истерическіе припадки были мгновенно остановлены компрессами на подвзд. *Эл. Кр.* Въ случаяхъ съ крайне сильнымъ нервнымъ возбужденіемъ доза даже изъ 3 стак. (особенно—*A.*) является еще возбуждающей; поэтому приходится прибѣгать къ еще болѣе высокому разведенію, къ 4-му и къ 5-му стакану.

Излѣченія. Сильный припадокъ истерики у молод. дѣв., у которой онъ обыкновенно продолжался болѣе 4 час. времени,

Digitized by Google

былъ остановленъ въ 5 мин. отъ прил. *Эл. Кр.* къ зат., виск., лбу, сплет. нер. и вн. 20 кр. *S.* 1. Вылѣчена въ 3 мѣс. вн. и нар. *A.* 1, *C.* 1 и *S.* 1 (*C*).

Число излѣченій истерики, противъ которой употреблялись разныя лѣкарства и не одинаковымъ способомъ, весьма значительно (*C*).

Каталепсія принадлежитъ къ разряду нервныхъ болѣзней. Безсудорожное онѣмѣніе, при которомъ всѣ члены внезапно дѣлаются неподвижными и больной остается въ томъ же положеніи, въ которомъ находился въ моментъ наступленія припадка и члены его принимаютъ то положеніе, которое имъ даютъ. Самый приступъ наступаетъ вдругъ и продолжается по большей части нѣсколько минутъ, рѣдко нѣсколько часовъ или дней сряду; послѣ него больной пробуждается, зѣваетъ, вздыхаетъ походитъ на человѣка, проснувшагося отъ глубокаго сна. Сознаніе не во всѣхъ случаяхъ теряется.

Отъ приложенія *Эл. Кр.* къ зат. и симп. нер., онѣмѣніе это проходитъ въ 5 минутъ; если не дѣйствуетъ, то мужчинѣ *S.* 1 (2—3-й ст.), женщинѣ *C.* 1 (2-й ст.)×*A.* 3 (3-й ст.).

Катарръ. Такъ назыв. легкія степени воспаленія слизистыхъ оболочекъ, вызывающія болѣе или менѣе сильное выдѣленіе слизи послѣдними. Катаррамъ подвергаются всѣ части тѣла, выстланныя слизистой оболочкой: органы дыхательные, пищеварительные, мочевые, половые и пр. Всѣ эти болѣзни изложены при органахъ, которые они сопровождаютъ.

Кашель можетъ быть явленіемъ, сопровождающимъ разныя острыя и хроническія болѣзни Здѣсь идетъ рѣчь только о томъ кашлѣ, который, въ видѣ простого катарра дыхательныхъ путей, обыкновенно вмѣстѣ съ насморкомъ, является самостоятельною болѣзнію вслѣдствіе простуды. Часто бываетъ достаточно принять 3 сухихъ кр. *P.* 3 три раза въ день. Въ упорн. случаѣ *P. 1*, *P.* 2 или *C.* 1, попер. съ *A.* 1 (2-й ст.). Полоск. съ *Эл. Бѣл.*

Неоднократно простой кашель съ насморкомъ проходилъ отъ стакана горячей воды съ сахаромъ, въ которомъ растворена 1 кр. *S.* 1 и влита чайная ложка раствора *P.* 1 изъ 1-го или 2-го ст. Выпить надо въ 3 или 4 пріема теплымъ.

Digitized by Google

Если простой кашель или острый насморкъ не пройдутъ отъ *Р.* 1 изъ 1-го ст. у взрослыхъ и изъ 2-го ст. у дѣтей, тогда взрослымъ даютъ *Р.* 4, а дѣтямъ *Р.* 3, въ тѣхъ же дозахъ.

Простой кашель, въ особенности сухой съ щекотаніемъ въ горлѣ, преимущественно у сангвиниковъ, очень часто проходитъ отъ внутр. пріемовъ *Эл. Анж.*, утромъ 5 капель и вечеромъ 10 капель на кускѣ сахара. На другой день возобновить пріемъ, если кашель прошелъ не совсѣмъ.

Сравнить: *Гортань и ея болѣзни*, *Гриппъ*, *Коклюшъ*, *Легкія и ихъ болѣзни*.

Кишечный каналъ. Пищевая кашица изъ желудка (см. *Желудокъ*) попадаетъ въ *кишечный каналъ*. Это перепончатый каналъ, выполняющій брюшную полость, со стѣнкой такого же строенія, какъ стѣнки желудка, а также червеобразно сокращающійся. Верхній болѣе длинный и узкій отдѣлъ кишечнаго канала называется *тонкими кишками*. Длина ихъ отъ 12 до 20 футовъ и они раздѣляются на 3, нерѣдко разграниченныя части. Самая верхняя, соединенная со входомъ желудка, есть *12-ти-перстная кишка*, имѣющая длину 12 поперечныхъ пальцевъ; на внутренней поверхности ея имѣется отверстіе, черезъ которое въ нее входитъ желчь (изъ печени) и панкреатическій сокъ (изъ поджелудочной железы), для смѣшенія съ пищевой кашицей. Остальныя двѣ части тонкихъ кишекъ суть *тощая и подвздошная*, въ которыхъ происходитъ главнымъ образомъ всасываніе пищевого сока лимфатическими сосудами.

Толстыя кишки составляютъ нижній, болѣе широкій отдѣлъ кишечнаго канала длиною въ 5—6 футовъ; онѣ лежатъ въ брюшной и тазовой полостяхъ, вокругъ тонкихъ кишекъ. Толстыя кишки распадаются также на 3 отдѣла, именно: *слѣпую кишку*, лежащую въ животѣ, внизу на правой сторонѣ подъ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ тонкая кишка соединяется съ толстою. Слѣпая кишка представляетъ мѣшокъ, замкнутый внизу, гдѣ съ нимъ соединяется еще полый, тонкій *червеобразный отростокъ*. Кверху слѣпая кишка переходитъ въ *ободочную*. Эта

Digitized by Google

поднимается сначала какъ *восходящая* ободочная кишка въ правой сторонѣ брюшной полости, подъ печенью поворачивается влѣво и идетъ поперекъ живота, подъ желудкомъ, между ними и тонкими кишками, подъ названіемъ поперечной ободочной кишки. Достигнувъ селезенки (влѣво вверху живота), ободочная кишка вторично загибается, именно книзу, чтобы по лѣвой сторонѣ живота спуститься какъ *нисходящая* ободочная, въ полость таза. Для вступленія въ тазъ ободочная кишка дѣлаетъ *S—образную кривизну* и тогда уже переходитъ въ *прямую кишку*. Прямая кишка есть послѣдній отдѣлъ всего кишечнаго канала; открывается наружу *выходнымъ заднепроходнымъ отверстіемъ*. Она лежитъ въ задней стѣнкѣ тазовой полости за мочевымъ пузыремъ; кровеносные ея сосуды называются *геморроидальными*. Тамъ, гдѣ тонкія кишки впадаютъ въ толстыя (т. е., справа внизу, въ животѣ на границѣ между слѣпой и восходящей ободочной кишкой), вокругъ выходного отверстія тонкихъ кишекъ, имѣется мышечная кольцеобразная заслонка. Она препятствуетъ обратному выхожденію пищевой кашицы изъ толстыхъ кишекъ въ тонкія.

Болѣзни кишекъ.

Катарральное воспаленіе слизистой оболочки кишекъ. Катарръ рѣдко поражаетъ кишечный каналъ на всемъ его протяженіи. Всего чаще онъ встрѣчается въ толстой кишкѣ, менѣе часто въ подвздошной, а всего рѣже въ тощей и 12-ти перстной. Симптомы: въ началѣ слабая лихорадка, болѣзненныя натуги, тупая или колющая боль около пупка, часто распространяющаяся; слизистыя испражненія, жженіе въ заднемъ проходѣ, урчаніе, головная боль, тошнота, рвота, слабость, поносъ смѣняется запоромъ. Симптомы хронич. воспаленія: обильная слизь и цилиндрическія клѣтки въ зловонныхъ испражненіяхъ; боль, полнота и давленіе въ нижней части живота, жажда, поносъ смѣняется запоромъ; языкъ обложенный, красный, истощеніе, слабость, вялость.

Вн. отъ 2 до 6 сухихъ кр. *S*. 1 и на 6 гл. точ. *Эл. К*.

Digitized by Google

Въ упорн. случаѣ: *A.* 1 × *C.* 1 × *F.* 1, клистиры *C.* 5, на животъ *Эл. Бѣл.*; по 1 кр. *C.* 5 черезъ часъ или ½ часа. Съ пищею 10 сухихъ кр. *S.* 2 или С. 5. Очень быстро унимаетъ боль втираніе въ животъ мази изъ смѣси С. 5 и *A.* 2 въ равныхъ частяхъ съ вазелиномъ, съ добавл. *Эл. Зел.*

Діэта должна быть очень легкая и не обильная: куриный бульонъ съ сухаремъ, слизистые супы, съ саго, овсяной или ячменной крупой; для утоленія жажды—вода съ краснымъ виномъ. При вздутіи живота не давать фруктовъ, сладостей и мучныхъ кушаній. Животъ содержать въ теплѣ.

Дѣти поражаются острымъ и хронич. катарромъ кишекъ. Симптомы остраго воспаленія: обильныя водянистыя испражненія у малолѣтнихъ дѣтей цвѣта зеленоватаго, а у болѣе взрослыхъ—буроватаго, *сильная жажда* и *уменьшеніе количества мочи*, которая темна и съ коричневымъ осадкомъ. При хронической формѣ поносы смѣняются запорами; испражненія сильно вонючи, часто слизистыя, а иногда съ кровью вслѣдствіе надрыва оболочки прямой кишки, что не имѣетъ особаго значенія. Вн. каждые полчаса, смотря по возрасту ребенка, отъ 1 до 3 сух. кр. *S. G.*, на животъ согрѣв. компр. *C.* 5. Если черезъ 24 часа нѣтъ улучшенія, тогда вн. *S.* 1 (2—3-й ст.) и каждые полчаса по 1 сух. кр. *F.* 1. Если при этомъ есть рвота и жаръ, что̀ означаетъ осложненіе болѣзни катарромъ желудка, тогда вн. *S.* 1 × *F.* 1 (2—3-й ст.) и на подвзд. согрѣв. компр. *F.* 2 × *C.* 5. Пищу давать самую легкую, также молоко, если оно хорошо переносится. Груднымъ дѣтямъ по возможности лишь грудное молоко.

Съуженіе, ущемленіе кишекъ. Симптомы: особенная форма запора. При прочихъ формахъ запора часто испражняются каловыми массами въ видѣ колбасы изумительной толщины; напротивъ при съуженіяхъ кишки, особенно если они имѣютъ мѣсто въ нижней ея части, калъ, часто представляется весьма малаго калибра, и состоитъ изъ цилиндриковъ едва въ палецъ толщиною, или изъ небольшихъ кругловатыхъ массъ, похожихъ на овечій калъ. Въ началѣ болѣзни—вздутіе живота и періодическія колики, а при дальнѣйшемъ теченіи животъ посте

Digitized by Google

пенно болѣе и болѣе раздувается; періодически появляются сильныя боли, съ жиленіемъ въ ногѣ потугъ, которое больные обыкновенно называютъ судорогами; затѣмъ тошнота и рвота массою бураго, нечистаго цвѣта, запахъ отъ которой постепенно все болѣе приближается къ запаху кала.

Врачъ призывается обыкновенно лишь тогда, когда уже появились колика и рвота. Слабительныя средства тутъ совершенно неумѣстны и могутъ лишь ухудшить положеніе больного.

Если силы больного еще не очень ослаблены, то сдѣлать горячую ванну, а противъ жажды и рвоты давать глотать маленькіе кусочки льда съ 2—5 каплями *Эл. Бѣл.* и каждый часъ 2—5 круп. *A.* 3 × съ 5—10 круп. *S.* 1 × 2 круп. *C.* 5 и утр. и веч. по 2 круп. *F.* 1. Кажд. 2 часа прилож. *Эл. Кр.* или *Эл. Кр.* × *Эл. Желт.* на гл. точки 5, 6, 7 и компрессъ на животъ изъ *Эл. Бѣл.*, а надъ нимъ горячіе компрессы изъ *A.* 2, *C.* 5 и *F.* 2 по 15 круп. на 2 стак. воды. Два раза въ день высокіе клистиры изъ теплой воды, которыми иной разъ еще удается сдѣлать кишечникъ проходимымъ при закрытіи его. Пищи не давать никакой, кромѣ очень маленькихъ количествъ молока или бульона, черезъ $^1/_4$—$^1/_2$ час. по чайной ложечкѣ. При закрытіи или ущемленія кишекъ можетъ спасти больного удачно и во время сдѣланная операція.

Бугорчатость кишекъ и брыжжеечныхъ железъ, дѣтская болѣзнь отъ 6 до 10 лѣтъ (Ср. *Железы*). Симптомы: огромный животъ, ощущаются опухоли, расположенныя всегда около пупка, безболѣзненныя при ощупываніи, болѣе или менѣе большія, неровныя, подвижныя или неподвижныя. Поносъ смѣняется запоромъ, кашель, ночной потъ. Худоба всего тѣла и преимущественно нижнихъ конечностей; чрезмѣрное увеличеніе объема живота, который вздутъ, безболѣзненъ при давленіи или атрофированъ (плоскій), подъ покровомъ его замѣчаютъ изгибы кишекъ или узлы, чувствительные на ощупь; грусть частый плачъ, изнуряющая лихорадка по вечерамъ и истощеніе. У взрослыхъ эта болѣзнь присоединяется къ легочной бугорчаткѣ. Вн. *C.* 1 (2—3 ст.) × *A.* 1 (2—3 ст.). Каждый

Digitized by Google

разъ съ пищею 5 сух. кр. *S.* 5. При лихорадкѣ и потѣніи *F.* 1 (2—3 ст.), на подвзд. *F.* 2, на животъ мазь *C.* 5.

Въ упорн. случаяхъ: *A.* 3 × *C.* 5 (3—2 ст.) × *V.* (1 ст.), 3 раза въ день *S. G.* по 5 круп., каждый вечеръ 5—10 круп. *Verm.* Ванны и компрессы изъ *A.* 2, *C.* 5, *V.* Діэта: отвары изъ крупъ, мясной бульонъ, бѣлые поджаренные сухари; бѣлое мясо, яйца и прочія легкія и удобоваримыя кушанья. Не допускаются: вино, пиво, молоко и фрукты. Пахтанье и стерилизованное молоко можно давать. Болѣзнь эта вообще—трудноизлѣчимая.

Круглая язва 12-ти-перстной кишки. См. *Круглая язва желудка.*

Ракъ кишекъ имѣетъ мѣсто исключительно въ толстой кишкѣ и преимущественно въ нижнемъ ея отдѣлѣ, въ кривизнѣ и въ прямой кишкѣ, и его невозможно распознавать съ достовѣрностію. Появляются тупыя перемежающіяся боли на ограниченномъ мѣстѣ живота; постоянный запоръ, который по временамъ бываетъ упорный, или вмѣсто запора неудержимый поносъ; боли усиливаются, онѣ иногда появляются въ области крестцовой кости, распространяются на спину и бедра; животъ раздувается, появляется тошнота и другіе припадки съуженія кишекъ. Въ другихъ случаяхъ вмѣстѣ съ постепенно возрастающимъ запоромъ и тупыми болями въ животѣ, очень скоро появляются быстрый упадокъ силъ, значительная исхудалость, грязный цвѣтъ кожи. Эти припадки указываютъ на раковое свойство съуженія. Если худоба усиливается и истончившіеся брюшные покровы позволяютъ замѣтить въ нижнихъ областяхъ живота нервную, бугристую, твердую, умѣренно болящую, сначала большею частью подвижную опухоль, то распознаваніе не подлежитъ никакому сомнѣнію. Для лѣченія см. *Ракъ.*

Ракъ задняго прохода. Симптомы: трудность испражняться, слизь и кровь въ испражненіяхъ, ослабленіе способности сокращенія прямой кишки, при чемъ истекаетъ кровянисто слизистая жидкость; рукою прощупывается плотное новообразованіе. Для лѣченія См. *Ракъ.*

Digitized by Google

Геморрой есть расширеніе венъ слизистой оболочки прямой кишки, сопровождаемое колющими, рѣжущими, жгучими, зудящими или стрѣляющими болями, также запорами, болью въ спинѣ, поясницѣ и въ нижней части спины; при этомъ приливы крови, головная боль, иногда жаръ, сильныя колики; частые, безплодные позывы на низъ. Гемор. шишки могутъ появиться отдѣльно или группами на подобіе виноградного грозда; они могутъ кровоточить или оставаться налитыми кровью, синими и болѣзненными. Если они кровоточатъ, то это *открытый геморрой*, если нѣтъ, то это *закрытый геморрой, внутренній* или *внѣшній*, смотря по ихъ положенію.

Избѣгать операціи, черезъ которую можетъ произойти внезапный переходъ прилива крови къ другимъ внутр. органамъ, и иногда послѣ операціи болѣзнь возвращается въ болѣе тяжелой формѣ.

Такъ называемый *слизистый геморрой* состоитъ въ испражненіи слизистаго катарральнаго отдѣленія, которое выводится отчасти съ каломъ, отчасти же выжимается по временамъ изъ прямой кишки безъ примѣси кала. Эта слизь острая, смрадная, пачкаетъ бѣлье и разъѣдаетъ близлежащія части.

Въ заднепроходной кишкѣ и половыхъ органахъ чувствуется невыносимый зудъ, образуется струпъ, происходятъ запоры и жгучія, сильныя боли при испражненіи. Слизистый геморрой иногда осложняется періодическими кровотеченіями, а также и глистами, аскаридами.

Геморрой есть только слѣдствіе и придатокъ другой болѣзни, и можетъ быть вылѣченъ только уничтоженіемъ производящей его причины. Всякая болѣзнь, нарушающая правильность кровообращенія, можетъ произвести геморрой. Главныя изъ такихъ причинъ: нѣкоторыя органическія страданія сердца, печени и легкихъ, хроническія растройства пищеваренія и брюшныхъ органовъ вообще.

Геморрой вообще лѣчится *Скроф.*, а открытый *Анж.*, или обоими попеременно; въ упорныхъ случаяхъ то и другое попеременно съ *Канч.* (начинать съ первыхъ нумеровъ).

Если обыкновенная доза *Анж.* увеличиваетъ кровотеченіе, то принимать среднюю или слабую дозу.

Digitized by Google

Кромѣ того, при боли въ напряженныхъ шишкахъ нар. прим или мазь изъ *А.* 2 или *С.* 5, поясныя, лучше прохладныя, чѣмъ теплыя полуванны съ 50 кр. *А.* 2; при зудѣ въ промежности и въ окружности задняго прохода—прим. или мазь изъ *S.* 5.

Въ случаяхъ упорныхъ, сопровождающихся упорнымъ запоромъ, надо начать лѣченіе съ устраненія послѣдняго (см. *Запоръ*). Внутрь: *А.* 2 × *С.* 2 (1 ст. съ постепен. усиленіемъ дозы) и 3 раза въ день по 5 круп. *L.* (при слизист. геморроѣ—*S. G.*). Утр. и веч. вводить въ задній проходъ *зеленый суппозиторій*. При кровоточащемъ геморроѣ примочки къ заднему проходу изъ *Эл. Анж.*; при кровотеченіи — каждыя 10—30 минутъ по 1—10 кап. *Эл. Анж.* внутрь, а въ задній проходъ *суппозиторій синій* утр. и веч.

Діэта—строгая: ничего спиртнаго, ни кофе, ни крѣпкаго чаю! Пища—легкая, но питательная. Полнокровнымъ больше подходитъ растительная пища.

Нервныя болѣзни кишекъ, колика, энтералгія. Симптомы: боль распространяется въ животѣ отъ пупка, приступами, смѣняясь промежутками покоя; боль бываетъ рвущая, рѣжущая, давящая, всего чаще вьющаяся и щиплющая, которая начинается и сопровождается особеннымъ болѣзненнымъ ощущеніемъ: безпокойство; руки, щеки и ноги холодныя; лицо напряжено; пульсъ малый и твердый; вздутые и вытянутые брюшные покровы напряжены; часто бываетъ тошнота, рвота, боль при мочеиспусканіи и натугѣ; чаще бываетъ запоръ, чѣмъ незадержанное или усиленное испражненіе на низъ. Такой приступъ продолжается отъ нѣсколькихъ минутъ до нѣсколькихъ часовъ, включая послабленія, и прекращается вдругъ, съ чувствомъ крайняго благосостоянія.

Вн. отъ 2 до 6 сухихъ кр. *S.* 1 быстро дѣйствуютъ, и на больныя мѣста *Эл. Кр.* Въ упорномъ случаѣ: *S.* 1 × *F.* 1 (2-й ст.), или по 1 кр. *S.* 1 черезъ часъ или $^1/_2$ часа; на подвздошье *F.* 2—*мазь.*

Рвота каломъ, сильныя и опасныя колики. Симптомы: болѣзненная опухоль въ правомъ боку, цилиндрическая, доходящая до нижнихъ реберъ (см. *сдуженіе*, *ущемленіе кишекъ*).

Digitized by Google

Выпаденіе прямой кишки, отвислость задняго прохода. Вн. *C.* 1. Въ упорн. случаѣ: *C.* 5 (1-й ст.), ван., мазь, прим. *C.* 5. Клистиры *C.* 1, *C.* 5. Предупреждать запоры (см. *Запоръ*).

Фистулы въ заднемъ проходѣ. Вн. и нар. *S.* 1 одно, или попер. съ *C.* 1. Въ упорн. случаѣ: ван., мазь, прим. *C.* 5, мазь *A.* 2, компр. *Эл. Бѣл.*

Бурчаніе кишекъ. Лѣчится какъ нервныя болѣзни кишекъ.

Ослабленіе кишекъ. Точно также.

Полипы въ кишкахъ. Вн. *S.* 1 попер. съ *C.* 1. Въ упорн. случаѣ: *C.* 5 (1-й ст.), ван. *C.* 5, *A.* 2 и *S.* 5. На поясн. по обѣимъ сторонамъ спины и на 6 гл. точ. *Эл. Кр.* × *Желт.*

Излѣченія. Ж. 44 л. отъ воспаленія слизистой оболочки кишекъ была вылѣчена въ 6 дней вн. *F.* 1 (1-й ст.), 3 раза въ день по 4 сух. кр. *S.* 1 и на подвзд. прям. *F.* 2 (*C*).

Авторъ этой книги, не довѣряя аллопатіи съ юныхъ лѣтъ своихъ, многіе годы лѣчился безуспѣшно гомеопатіей отъ геморроя. Но не видя пользы и отъ гомеопатіи, и будучи притомъ измученъ и истощенъ болѣзнью, онъ, вопреки своихъ убѣжденій, обратился въ Петербургѣ за совѣтомъ къ тремъ аллопатическимъ, такъ называемымъ, знаменитостямъ. Эти *ученые* признали болѣзнь его за неизлѣчимую, посовѣтовали ему сдѣлать операцію, а въ противномъ случаѣ предсказали съ полною самоувѣренностью, что у него образуется непремѣнно *антоновъ огонь*. Но онъ презрительно отнесся и къ ихъ совѣту, и къ ихъ предсказанію, и началъ лѣчиться Электро-Гомеопатіей по брошюрѣ Берара, единственной книжкѣ, существовавшей въ то время (1876 г.). Начавъ свое лѣченіе, онъ на четвертый день замѣтилъ значительное улучшеніе, постепенно продолжавшееся, и тогда онъ вошелъ въ переписку съ гр. Маттеи, который сообщалъ ему совѣты относительно лѣченія его болѣзни. Продолжая свое лѣченіе весьма настойчиво и съ большимъ терпѣніемъ лѣкарствами, указанными выше противъ геморроя, онъ черезъ два года совершенно вылѣчился отъ болѣзни, которую три *профессора* медицины и хирургіи признали за неизлѣчимую и угрожающую антоновымъ огнемъ.

Число излѣченій геморроя и разныхъ болѣзней кишекъ весьма значительно (*C*).

М. 45 л., д-ръ медицины, аллопатъ, лѣчился въ клиникѣ, въ Спб., отъ хрон. воспал. кишекъ и сахарной болѣзни, былъ тамъ признанъ неизлѣчимымъ. Лѣченіе началось 25 декабря

Digitized by Google

1887 г. вн. *A.* 3, *F.* 1, С. 5 и *S.* 5, нар., *A.* 2, *C.* 5, *F.* 2 и *Эл. Анж.* и вылѣченъ въ 2 мѣсяца (С.).

Совѣтъ черезъ корреспонденцію въ Костромской губ. По діагнозу врачей М. 48 л. страдалъ 8 л. хрон. воспал. кишекъ съ изъязвленіями толстой кишки; много лѣчился аллопатіей безуспѣшно. Лѣченіе начато въ августѣ 1889 г. вн. *A.* 3, С. 1, *F.* 1 и *S.* 1 нар. *A.* 2, С. 1, *S.* 1 и *F.* 2 и вылѣченъ въ 2 мѣсяца (С.).

Кожа. Наше тѣло снаружи и внутри покрыто оболочкой. Снаружи на внѣшней поверхности тѣла, этою оболочкою служитъ *кожа.* Внутри же, т. е. въ тѣхъ полостяхъ, куда ведутъ *естественныя отверстія* (ротъ, носъ и т. д.) стѣнки этихъ полостей одѣты *слизистою оболочкой.* У самыхъ отверстій этихъ (напримѣръ на губахъ) кожа безъ перерыва переходитъ въ слизистую оболочку.

Наружная кожа во многихъ отношеніяхъ важный органъ. Во 1-хъ, она защищаетъ тѣло отъ множества насилій, поврежденій (давленія, толчковъ) и отъ вреднаго вліянія окружающей среды (влажности, холода, жара). Во вторыхъ, чрезъ кожу постоянно выдѣляются изъ крови лишнія, ненужныя вещества, и въ особенности вода въ жидкой и газообразной формѣ, какъ *потъ и кожное испареніе*, вслѣдствіе чего кровь очищается. Газообразное выдѣленіе происходитъ безпрерывно и имѣетъ еще большую важность, чѣмъ жидкое—потъ. За то снаружи внутрь жидкія и газообразныя вещества съ трудомъ проникаютъ чрезъ кожу, такъ какъ она покрыта *кожицей*, и кромѣ того смазана на поверхности *кожнымъ саломъ.* Въ 3-хъ, кожа служитъ главнымъ мѣстомъ осязанія. Одними мѣстами кожи мы осязаемъ лучше, чѣмъ другими, и это зависитъ отъ того, много ли или мало содержитъ въ себѣ извѣстное мѣсто кожи *осязательныхъ тѣлецъ.* Этими именно тѣльцами, въ которыхъ оканчиваются нервы ощущенія, мы осязаемъ. Наиболѣе тонкимъ осязаніемъ обладаютъ концы пальцевъ и губы, наименѣе тонкимъ—кожа спины. Наконецъ, кожа служитъ почвой, на которой ростутъ волосы и ногти. Главные элементы состава кожи суть: эпителій, волокнистая и жировая соединительная ткань (*подкожная клѣтчатка*) съ примѣсью упругихъ волоконъ,

Digitized by Google

гладкія мышечныя волокна, сосуды и нервы, кромѣ того въ ней находятся корни волосъ и железы.

Болѣзни кожи бываютъ острыя и хроническія.

1. *Острыя болѣзни кожи.*

Чирей, вередъ (*фурункулъ*) есть твердая болящая опухоль, имѣющая довольно острую, красную верхушку, средина его становится желтоватой, вскрывается и черезъ это отверстіе выходитъ мало по малу гной, подъ конецъ въ видѣ комка омертвѣлой ткани, называемаго стержнемъ, послѣ чего чирей заживаетъ. Нар. мазь или пластырь *С.* 5. Созрѣваніе нарыва ускоряется горячими припарками изъ раствора *С.* 5, *А.* 2 (по 10 круп. на стак. воды); также держаніе надъ паромъ. Если появляются въ одно время нѣсколько чирьевъ на тѣлѣ, то вн. *А.* 1 × *S.* 5 (1—2-й ст.). Въ упорн. случаѣ вн. и нар. *С.* 1 или *С.* 2 × *А.* 2. Ван. *С.* 5. Къ соотвѣт. нер. *Эл. Кр.* × *Желт.* Чирья содержатъ въ себѣ жизнеспособные микробы, и больной, расчесывая чирья, самъ себя заражаетъ. Противъ предрасположенія къ чирьямъ (фурункулозъ) давать 3 раза въ день по 1 каплѣ *Эл. Зел.*

Простой карбункулъ. Онъ цвѣта синяго, даже чернаго въ своей верхушкѣ. Опухоль очень болѣзненная. Часто образуется на затылкѣ, верхней части спины и на лбу. Когда карбункулъ нагноится, то вскрывается нѣсколькими отверстіями, изъ которыхъ сочится гной съ сукровицею. Вн. утр. и веч. 5 кр. *L.* въ теченіе дня *А.* 1 × *С.* 1 (1-й ст.). Пластырь или мазь *С.* 5 съ *Эл. Зел.* Для окончанія лѣченія долго принимать *А.* 2 (1-й ст.). Въ упорномъ случаѣ по 2 круп. сух. кажд. 2 часа попеременно *А.* 2 × *С.* 2, какъ промежуточныя лѣкарства. Горячія припарки, какъ указано при вередѣ.

Это же лѣченіе употребляется и противъ **Сибирской язвы** (*злокачеств. карбункулъ*). Симптомы: сначала показывается блѣднокрасноватое пятнышко, быстро превращающееся въ узелокъ, имѣющій уже значительное возвышеніе надъ поверхностью кожи, очень болѣзненный. На верхушкѣ этого узелка

Digitized by Google

образуется пузырекъ, который лопается и образуетъ черную язву съ гангренознымъ характеромъ. Болѣзнь очень заразительная, можетъ причинить смерть въ нѣсколько часовъ, сопровождается сильнымъ жаромъ, и по временамъ потрясающимъ ознобомъ, бредомъ и спячкою. При этой болѣзни *A.* 1 × *C.* 1 (1-ый ст. до усиленн. 1 разведенія) и *S.* 1 три раза въ день по 5 круп. сухими. При высокой лихорадкѣ необходимо давать еще *F.* 1 (2-й или 1-й ст.). Компрессъ съ *Эл. Зел.*, поверхъ него—часто смѣняемые горячіе компрессы изъ раствора 30 круп. *A.* 2 и *C.* 5 въ стак. воды.—*Эл. Кр.* × *Эл. Жел.* на главн. нервн. точки.

Нарывы на кожѣ образуются вслѣдствіе ограниченнаго воспаленія клѣтчатки, развиваются быстро или очень медленно. Въ первомъ случаѣ называются горячими, а во второмъ холодными.

Горячій нарывъ (Абсцессъ, флегмона) выражается опухолью, чувствомъ жара, болью при давленіи и впослѣдствіи измѣненіемъ цвѣта наружн. покрововъ. Кожа на нарывѣ, по причинѣ застоя крови, принимаетъ темно-красный цвѣтъ; больной въ немъ ощущаетъ какъ бы біеніе. При обширныхъ нарывахъ бываетъ лихорадка съ ознобомъ и жаромъ. Причины: ушибы, давленіе, застой крови и т. п. Утр. и веч. по 5 кр. *S.* 1 въ теченіе дня *A.* 1 × *C.* 1 × *F.* 1 (2-й ст.), пластырь или мазь *C.* 5; при нагноеніи приложить тонкую тряпочку съ *Эл. Зел.* и поверхъ нея согрѣвающіе компрессы изъ раствора *A.* 2 и *C.* 5, по 15 круп. на стак. воды.

Холодный нарывъ развивается очень медленно, чаще всего въ подкожной клѣтчаткѣ. Хронич. опухоль лимфатическихъ железъ часто оканчивается образованіемъ холоднаго нарыва. Объемъ холоднаго нарыва гораздо больше горячаго, стѣнки его не натянуты и мягки. Жидкость, содержащаяся въ полости его, представляется не однородною, содержитъ бѣловатые, не прозрачные хлопья, плавающіе въ вязкой, непрозрачной, тягучей жидкости, которая отвратительно воняетъ. Эта болѣзнь случается въ молодости у лимфатиковъ, но также встрѣчается у людей взрослыхъ, и, протекая хронически, сильно истощаетъ

Digitized by Google

больныхъ. Лѣчится *S.* 1 или *S.* 5 (1—2-й ст.); при переходѣ въ нагноеніе утр. и веч. по 5 кр. *S.* 1 и въ теченіе дня *C.* 1 (1-й ст.),мазь и ван. *C.* 5. Вскрытіе холоднаго нарыва представляется необходимымъ, и оно должно быть произведено оперативнымъ путемъ.

Ссадины, пролежни появляются на поясницѣ въ трудныхъ болѣзняхъ, въ особенности у людей исхудалыхъ. Ихъ смазываютъ мазями *C.* 5 × *A.* 2. Случайныя ссадины лѣчатся какъ порѣзы.

Ожогъ. Различаютъ 3 степени ожога. *Первая степень:* краснота и припуханіе кожи съ болью, иногда съ появленіемъ маленькихъ пузырьковъ, которые скоро высыхаютъ. *Вторая степень*—образованіе пузырей, содержащихъ прозрачную или нѣсколько окрашенную сыворотку. *Третья степень* — болѣе глубокое разрушеніе кожи съ образованіемъ темноватой толстой коры съ нагноеніемъ. При надлежащемъ лѣченіи ожогъ первой степени проходитъ скоро и безслѣдно, точно такъ же и вторая степень. Ожоги же третьей степени заживаютъ медленно съ образованіемъ болѣе или менѣе глубокихъ рубцовъ. Ожоги, поражающіе болѣе чѣмъ третью часть поверхности тѣла, кончаются часто смертью въ 48 часовъ. Но и нагноенія послѣ менѣе сильныхъ ожоговъ могутъ сдѣлаться опасными вслѣдствіе зараженія крови (сравни: *Антоновъ огонь*).

Лѣченіе. Послѣдствія ожога первой степени устраняются прилож. на тонкой тряпочкѣ *Эл. Кр.* или *Эл. Бѣл.*, поверхъ которой кладется компрессъ изъ раствора *S.* 2 и *A.* 2. При значительной краснотѣ кожи внутрь—*A.* 1 × *S.* 1.

При второй степени ожога — съ помощью прокола иглой опорожнить образовавшіеся пузыри, затѣмъ положить тряпочку пропитанную растительнымъ масломъ, въ двухъ унціяхъ котораго растереть 20 круп. *C.* 5 съ прибавленіемъ 20 кап. *Эл. Зел.* Внутрь—тѣ же лѣкарства, что при первой степени; если имѣется лихорадка, то прибавить еще *F.* 1 (2-й ст.). Не допускать воздуха къ ранамъ. Въ промежуточное время давать еще 3 раза въ день по 1 кап. *Эл. Зел.* внутрь.

Третья степень ожога требуетъ того же самого лѣченія,

Digitized by Google

что и вторая степень, только *Эл. Бѣл.* и *Эл. Зел.* слѣдуетъ примѣнять въ большихъ количествахъ (ср. *язвы*, *гангрены*, *антоновъ огонь*).

Ознобленіе, *отмороженіе* происходитъ вслѣдствіе дѣйствія мороза на кожу. Оно бываетъ *поверхностное*, когда на кожѣ являются бѣлыя, твердыя, нѣсколько возвышающіяся надъ поверхностію кожи, пятна или же кожа принимаетъ синеватый оттѣнокъ вслѣдствіе застоя крови. Въ легкихъ случаяхъ при бѣлой поверхности кожи — мазь *S.* 5 съ *Эл. Кр.*, при синевѣ кожи—мазь *A.* 2 съ *Эл. Анж.*

При болѣе сильной степени ознобленія: *A.* 1 × *C.* 2 (2-й ст.), прилож. *Эл. Зел.* 3—4 раза въ день и покрыть тонкимъ слоемъ ваты.

При очень сильной степени усиленное 1-е разведеніе *S.* 1 черезъ 10—15 мин. по чайн. ложкѣ, образовавшіяся язвы и омертвѣнія лѣчить соотвѣтствующимъ образомъ (см. эти статьи, также—*Антоновъ огонь*).

Болѣе *сильная степень*, когда образуются волдыри и наконецъ *сильнѣйшая*, когда образуются омертвѣнія не только кожи, но и подкожной клѣтчатки, мускуловъ и даже костей.

2. Хроническія болѣзни кожи.

Сыпи. Такъ какъ всѣ сыпи лѣчатся Скрофолозо и его одноименными, главными лѣкарствами противъ всѣхъ болѣзней кожи, то было бы излишне здѣсь приводить всѣ разнообразные виды хроническихъ сыпей, которыя по большей части почти никогда не сопровождаются лихорадкою. Но для распознаванія мы приводимъ ихъ названія и признаки. Противъ слѣдующихъ 13-ти видовъ накожныхъ болѣзней употребляется слѣдующее общее лѣченіе: вн. въ слабыхъ дозахъ *S.* 1; если оно недостаточно, то *S.* 5, часто попер. съ *A.* 1, и въ упорн. случаѣ попер. съ *F.* 1 или съ *C.* 1 или *C.* 5 (1-й ст.). На 6 гл. точ. *Эл. Кр.* × *Эл. Желт.*, ван., мазь, прим. *C.* 5 или *S.* 5 и *A.* 2. На подвзд. *F.* 2 или *C.* 5, но вообще гораздо дѣйствительнѣе ван. *C.* 5. Для окончанія лѣченія сухія кр. *S.* 1.

Эритема (*Erythema*) состоитъ изъ красныхъ пятенъ

Digitized by Google

разныхъ величинъ и количествъ, разнообразно распространенныхъ, представляя окраску отъ нѣжно-краснаго до ярко-краснаго цвѣта. У дѣтей эта сыпь похожа на скарлатину, и отличается отъ послѣдней тѣмъ, что сопровождается потѣніемъ, котораго не бываетъ при скарлатинѣ.

Пузырьки (*Herpes*). Эта болѣзнь состоитъ изъ большаго или меньшаго количества пузырьковъ, сгруппированныхъ на *лицѣ*, ртѣ, *крайней плоти*, шеѣ или на другихъ частяхъ тѣла. Мѣста, на которыхъ они сидятъ красны и воспаляются, ощущается боль или жженіе, а въ промежуткахъ между ними кожа на одну или двѣ линіи остается невоспаленною. Эти пузырьки сперва прозрачные, потомъ мутнѣютъ или краснѣютъ отъ примѣси крови, бываютъ неопредѣленной величины, иногда доходятъ до мелкаго гороха. Наконецъ они лопаются и образуютъ желтоватый или буроватый струпъ.

Почесуха (*Prurigo*). Мелкіе пузырьки, твердые, одного цвѣта съ тѣломъ, какъ просо, или еще меньше, немного красные, отдѣляющіеся въ видѣ бѣлой пыли или отрубей, неровно расположенные на лицѣ, шеѣ, спинѣ, въ конечностяхъ, часто съ сильнѣйшимъ зудомъ. Эта сыпь поражаетъ иногда грудныхъ дѣтей. Кожа сдирается ногтями, вслѣдствіе чего происходятъ небольшія кровоизліянія; излившаяся кровь засыхаетъ въ видѣ коры.

Вередообразная сыпь (*Ecthyma*); это большіе гнойные пузыри величиною съ копѣйку, которые высыхаютъ въ толстыя кожи, по удаленіи корки, остаются глубокія язвы, и заживленіе наступаетъ послѣ того, какъ происходитъ потеря вещества въ кожѣ и образуется бѣлый, немножко углубленный рубецъ, покрытый тонкою кожицею. Происходитъ большею частію отъ сифилиса. Если причиною сифилисъ, то, кромѣ того лѣченія, вн. и нар. *V*.

Пузырная сыпь (*Pemphigus*) появляется въ видѣ круглыхъ и овальныхъ пузырей величиною до лѣсного и даже грецкаго орѣха, которые или переполнены свѣтлою жидкостью, похожею на мясной отваръ, или же представляются спавшимися. Иногда вся кожица приподнята какъ бы при ожогѣ и вся по-

Digitized by Google

верхность кожи представляется какъ бы содранною. Иногда сопровождается лихорадкою.

Лишай (*Lichen*). Узелки, характеризующіе лишай, бываютъ величиною почти въ просяное зерно и обыкновенно нѣсколько красны, но иногда имѣютъ нормальный цвѣтъ или даже болѣе блѣдны, чѣмъ окружающая ткань. Они бываютъ изолированные, сгруппированные или распространяются на большія пространства, производятъ умѣренный зудъ и при легкихъ степеняхъ болѣзни существуютъ короткое время. При трудныхъ формахъ лишая, появленіе узелковъ иногда сопровождается лихорадкою и разстройствомъ общаго состоянія, узелки бываютъ плотно скучены, имѣютъ красное основаніе, далѣе представляютъ сильную красноту и производятъ сильный зудъ и жженіе.

Мокнущій лишай, *Экзема* (*Eczema*), представляетъ хроническое воспаленіе пузырьковъ, превращающихся въ довольно большія мокнущія поверхности. Иногда содержимое этихъ пузырьковъ, высыхая, образуетъ корни и производитъ сильный зудъ. Вн. *V.* × *S.* 5 (3-й ст.). Въ упорномъ случаѣ: вн. и нар. *L.*

Чешуйчатый лишай, *Псоріазъ* (*Psoriasis*).

Здѣсь пораженное мѣсто кожи иногда равномѣрно утолщается, твердѣетъ, растрескивается и покрывается сухими чешуйками кожицы въ видѣ кучекъ, блестящихъ какъ серебро (на разгибательныхъ сторонахъ конечностей) и въ видѣ маленькихъ синеватаго цвѣта кучекъ (на сгибательной сторонѣ конечностей) поражаетъ всегда ладони и подошвы и не зудитъ. Причина часто—сифилисъ.

Отрубевидный лишай, *Питиріазъ* (*Pityriasis*).

Здѣсь происходитъ разращеніе и отслаиваніе большого количества мелкихъ бѣлыхъ чешуекъ эпидермиса, особенно на головѣ, а у кахетическихъ субъектовъ на всей поверхности кожи, при чемъ цвѣтъ кожи измѣняется.

Гнойно-пузырчатый лишай (*Impetigo*) сопровождается ощущеніемъ зуда и потребностью царапать, и образуется изъ мелкихъ пустулъ, тѣсно сидящихъ или разбросанныхъ на

Digitized by Google

красномъ основаніи или появляются желтыя или зеленоватыя корки; иногда легкая лихорадка и разстройство общаго состоянія; чаще бываетъ *на щекахъ*, *губахъ*, *носу и на покрытой волосами части головы*, иногда на туловищѣ и конечностяхъ. Черезъ нѣсколько дней или раньше пустулы лопаются и выдѣляютъ свое содержимое въ видѣ желтой и темно-зеленой корки, подъ которой продолжаетъ выдѣляться гноевидная жидкость, утолщая кору.

Парша (*Favus*). Хроническая сыпь, поражающая исключительно волосистую кожу, рѣдко прочія мѣста тѣла съ чешуею или струпомъ, сгруппированная или изолированная.

Чесотка (*Scabies*) появляется въ видѣ узелковъ, пузырьковъ и пустулъ, наполненныхъ мутно-водянистою жидкостью, въ центрѣ которыхъ находится животный паразитъ, чесоточный клещъ. На первыхъ порахъ, чесотка появляется между пальцами, а впослѣдствіи переходитъ на верхнія и нижнія конечности и половые органы. Почти всегда прыщики сливаются между собою и образуются струпья, достигающіе значительной величины; болѣзнь сопровождается невыносимымъ зудомъ и весьма заразительна.

Рупія (*Rupia*)—видъ пузырной сыпи. Большіе пузыри, содержимое которыхъ гнойно, мутно и засыхая изъ него образуются толстыя слоистыя корки, которыя, отдѣляясь, даютъ мѣсто образованію болѣзненной сыпи, отдѣляющей вонючій гной.

Зудъ состоитъ въ томъ, что кожа, не будучи воспаленной и не имѣя сыпи, находится въ раздраженномъ состояніи. Вн. *S.* 1 (1-й ст.) съ обмываніями и ван. *S.* 5, также мазь изъ смѣси *S.* 2 и *A.* 2 въ равныхъ частяхъ, растворенныхъ въ *Эл. Бѣл.*, на вазелинѣ.

Разъѣдающій лишай, волчанка (*Lupus*), проявляется въ видѣ маленькихъ красноватыхъ узелковъ *на лицѣ*, чаще всего *на носу*, рѣже на другихъ мѣстахъ, которые немного шелушатся на поверхности, или дѣлаются бугристыми, или изъязвляются. Волчанка принадлежитъ къ злокачественнымъ образо-

Digitized by Google

ваніямъ кожи, разрушаетъ ея ткань и оставляетъ за собою блестящіе, стягивающіе рубцы.

Главныя средства *S.* 1 попер. съ *C.* 1 и *F.* 1, въ случаѣ упорства прибавляютъ *A.* 1 или *V.* На 6 гл. точ. подгл. надгл. нерв., переносицу, темя и лобъ *Эл. Кр.* и ван. *C.* 1 или *S.* 5 или *C.* 5 или *L.* Частыя прим. *C.* 1 × *C.* 5.

Такъ какъ лѣченіе волчанки можетъ продлиться 2—3 года, то черезъ нѣсколько мѣсяцевъ *S.* 1 нужно замѣнить *S.* 3, потомъ *S.* 5, а *C.* 1 замѣнить *C.* 2, потомъ *C.* 4, 5 и *L.* Подъ конецъ лѣченія, когда кожа очистится, чтобы уничтожить красноту и возстановить кожу, прикладывать на нее *Эл. Анж.* попер. съ прим. *S.* 1.

Во время лѣченія можно употреблять *S.* 1 или *A.* 1 въ сухихъ круп. 2 или 3 раза въ день, а прочія лѣкарства въ растворѣ.

Рожа (*Erysipelas*) является въ видѣ обширной припухлой красноты на кожѣ. На ощупь пораженная кожа тѣстовата и горяча. Иногда образуются на этой опухоли пузыри, наполненные свѣтлою, прозрачною жидкостью. Эта болѣзнь сопровождается сильнымъ лихорадочнымъ состояніемъ съ бредомъ и спячкою, бывающею почти всегда при рожѣ лица, съ котораго она переходитъ на голову, шею и даже грудь. Вн. сообразно съ темпераментомъ *S.* 1 или *A.* 1 и на соотвѣт. нер. *Эл. Кр.* или *Эл. Анж.* При рожѣ на лицѣ прикладывать *Эл. Желт.*—на 6 гл. точ., къ подглаз. и надглаз. нерв., отъ приложенія которой и внутрь *S.* 1 × *F.* 1 краснота, опухоль, боль, лихорадка и прочіе симптомы проходятъ быстро.

Рожа проходитъ иногда отъ однихъ часто повторяемыхъ приложеній *Эл. Кр.* или *Анж.*, а вн. *S. G.* (1-й ст.).

Примочки изъ 20 кр. *S.* 1 на кожу, при рожѣ на лицѣ, въ нѣсколько дней вылѣчили ее.

Угри (*Acne*) появляются на *лицѣ*, шеѣ, груди и спинѣ въ видѣ небольшихъ узелковъ, имѣющихъ на своей верхушкѣ черную точку. При выдавливаніи изъ этого узелка выходитъ бѣлая, густая масса. Проходятъ и скоро вновь появляются, въ особенности у женщинъ при регулахъ. Лѣченіе иногда

Digitized by Google

довольно продолжительное. *A.* 1 попер. съ *S.* 1. Въ упорн. случаѣ: мази, обмыванія *L.*, *C*, 5, *S.* 1, *A.* 2 или *S.* 5, мѣняя ихъ ежедневно.

Мозоли (*Clavi*) представляютъ небольшія, но очень твердыя и толстыя утолщенія, которыя вдавливаются сапогами или башмаками въ нижній слой кожи и производятъ мѣстную атрофію послѣдняго. Мозоль бываетъ разлитая и клиновидная и болѣзненна при давленіи. Вн. *S.* 1 и мазь *S.* 1 или *C.* 5, на свиномъ салѣ съ воскомъ, въ равныхъ частяхъ стопленныхъ.

Бородавки (*Verrucae vulgares*) происходятъ вслѣдствіе удлиненія небольшого числа кожныхъ сосочковъ, соединяющихся въ видѣ кишки. Они бываютъ покрыты очень толстымъ и твердымъ слоемъ кожицы. Если каждый изъ сосочковъ, изъ которыхъ состоитъ бородавка, одѣтъ порознь этимъ слоемъ кожицы, то бородавка представляется расщипленною и волокнистою. Вн. и нар. *S.* 1, *C.* 1, *S.* 5 и *A.* 1.

Кондиломы (*Candilomata*) отличаются отъ обыкновенныхъ бородавокъ тѣмъ, что они не только представляютъ удлиненіе сосочковъ, но въ то же время пускаютъ отъ себя боковые отростки, и тѣмъ, что покрываются менѣе толстымъ и твердымъ слоемъ кожицы. Ихъ два рода: *острые* и *широкіе*. Первые встрѣчаются на слизистыхъ оболочкахъ мочеиспускательнаго канала и влагалища, и также на такихъ мѣстахъ кожи, которые орошаются бленоррейнымъ отдѣленіемъ мочеиспускательнаго канала и влагалища. Они обыкновенно имѣютъ видъ тутовой ягоды или цвѣтной капусты, если же подвергаются давленію съ боковъ, то походятъ на пѣтушиный гребешокъ. *Широкіе*—имѣютъ строеніе очень сходное съ острыми и большую наклонность къ поверхностному изъязвленію. Они чаще всего сидятъ на половыхъ губахъ, *на мошонкѣ* и между пальцами ногъ. Они зависятъ отъ общаго зараженія. Внутрь *S.* 1, *C.* 5 и *A.* 1. Если они венерическіе *V* (См. *Сифилисъ*).

Слоновая болѣзнь (*Elephantiasis arabum*) начинается явленіями рожистаго воспаленія кожи, явленіями воспаленія лимфатическихъ сосудовъ или венъ. По прошествіи воспаленія,

Digitized by Google

припухшая часть тѣла остается умѣренно припухшею и представляется мягкою, тѣстообразною. Послѣдующіе приступы воспаленія принимаютъ такое же теченіе какъ и первый, и оставляютъ еще большую припухлость страдающаго члена (деревянную твердость). Внѣ воспалительныхъ приступовъ больные не чувствуютъ боли въ припухшихъ частяхъ. Всего чаще мѣстомъ болѣзни бываетъ голень, иногда верхнія конечности, или мошонка, половой членъ, половыя губы. Подвижность пораженныхъ конечностей сильно разстраивается.

Главныя лѣкарства противъ этой болѣзни для вн. и нар. употребленія это *C.* 1, 2, 3, 4, 5 и 6, *L.*, *S.* 1 и 5, которыя мѣняютъ ежедневно, но въ продолженіе всего лѣченія ихъ даютъ попер. съ *A.* 1, 2 и 3. Такимъ образомъ утр. и веч. по 10 кр. *S.* 1, въ теченіе дня *C.* 1 (2-й ст.) × *A.* 1 (3-й ст.), прим. ванмази А. 2, *C.* 1, *C.* 5 и *S.* 5, мѣняя ихъ точно также каждый день. Это лѣченіе до сего времени представлялось наиболѣе дѣйствительнымъ, и оно употребляется и противъ **проказы** (*Elephantiasis Graecorum*), которая характеризуется образованіемъ настоящихъ узловъ и бугровъ. Первое ихъ начало образованія обозначается появленіями гиперемическихъ пятенъ, которыя все болѣе и болѣе набухаютъ и могутъ развиться въ узлы величиною до волошскаго орѣха; узлы эти частію одиночные, частію сгруппированы. Въ дальнѣйшемъ теченіи узлы блѣднѣютъ и вмѣстѣ съ тѣмъ становятся болѣе мягкими. Самое обыкновенное мѣсто этой болѣзни это кожа лица, носа, ушей и рукъ, рѣже подкожная клѣтчатка и паренхима внутр. органовъ.

Язвы. Распаденіе ткани вслѣдствіе нагноенія назыв. язвою тогда, когда въ ней стремленіе къ разрушенію преобладаетъ надъ наклонностію къ заживленію. *Язвы* бываютъ *простыя*, когда онѣ не осложняются ни мѣстными, ни общими болѣзнями и происходятъ вслѣдствіе ушиба, тренія и давленія, порѣза, обжога, отмороженія и вскрытія нарыва, и *осложненныя* — когда мѣстный процессъ разрушенія ткани обусловливается болѣзненнымъ состояніемъ всего организма, какъ то: цынгою, сифилисомъ, золотухою, ломотою и ракомъ.

Digitized by Google

Язвы простыя. Для лѣченія см. *Нарывы.*

Язвы затвердѣлыя, фистуловыя, зубчатыя, раковыя или *подозрительно-раковыя.* Для лѣченія см. *Ракъ.*

Язвы разъѣдающія, венерическія или *подозрительно венерическія.* Для лѣченія см. *Сифилисъ.*

Язвы варикозныя. Для лѣченія см. *Расширеніе венъ.*

Язвы цынготныя. Для лѣченія см. *Цынга.*

Язвы золотушныя лѣчатся также, какъ цынготныя, но полосканія не употребляются, если язвъ нѣтъ во рту.

Наросты. Ср. *Кондиломы.* Если наросты венерическіе, см. *Сифилисъ.* Противъ обыкновенныхъ наростовъ вн. и нар. *А.* 1, 2, 3. Въ упорн. случаѣ: *S.* 1, *C.* 5 (1-й ст.), мазь или прим. *C.* 5 или *S.* 1 или *A.* 2, ван. *S.* 5.

Пятна печеночныя на кожѣ. Вн. *F.* 1 (2-й стак.), и на подвзд. мазь или прим. *F.* 2.

Пятна на лицѣ цвѣта винныхъ дрожжей. Прим. на лицо изъ *A.* 2 попер. съ *Эл. Анж.*, вн. *A.* 1 или *A.* 2 (1-й стак.).

Себоррея. Сущность ея заключается въ усиленномъ отдѣленіи кожными сальными железами ихъ содержимаго—сала. Она бываетъ *мѣстная* и *общая. Мѣстная* чаще всего встрѣчается: 1) *на всей волосистой части головы* въ видѣ сухихъ сѣроватыхъ чешуекъ, которыя отпадаютъ сами собою или при чесаніи гребнемъ, щеткою и т. д. Въ публикѣ эти чешуйки называютъ *перхотью.* Подъ вліяніемъ долгаго существованія себорреи образуется *плѣшивость.* 2) *На лицѣ и бровяхъ* въ формѣ маслянистаго слоя; 3) *На половыхъ органахъ*—у мужчинъ кругомъ головки, у женщинъ между большими и малыми губами, и у обоихъ половъ въ этихъ мѣстахъ производитъ воспалительныя явленія и 4) въ *области пупка* у обоихъ половъ, во всѣхъ возрастахъ, производитъ зудъ и жженіе. *Общая себоррея* очень рѣдко наблюдается у *взрослыхъ*, большею частію послѣ изнурительныхъ болѣзней. У *новорожденныхъ* она образуетъ сыровидную смазку, которая иногда покрываетъ все тѣло. Такія дѣти большею частію умираютъ спустя нѣсколько дней послѣ рожденія отъ истощенія.

Теченіе себорреи различно, предсказаніе благопріятнѣе при

Digitized by Google

мѣстной себорреѣ, чѣмъ при общей. Вн. *V.* × *S.* 1 (1-й ст.), въ упорн. случаѣ *A.* 1 × *C.* 1; нар. *S.* 5 и *C.* 5 въ прим., обмывваннахъ и втираніяхъ со спиртомъ.

Измѣненія. М. 65 л. болѣлъ 2 года экземой на обѣихъ рукахъ, отъ зуда не могъ спать, былъ признанъ неизлѣчимымъ. Вылѣченъ въ 3 мѣсяца *V.*, *S.* 5 и *C.* 5 (3-й и 4-й ст.) вн. и нар., тѣ же лѣкарства въ прим., ван. и мазяхъ (*C.*).

Совѣтъ черезъ корреспонденцію—М. 71 г. имѣлъ экзему на всемъ тѣлѣ, былъ признанъ неизлѣчимымъ. Вылѣченъ въ 6 мѣс. вн. *V.* (2-й ст.) съ 1 ч. л. *S.* 1 (2-й ст.) по ½ ст. въ день. На 6 гл. точ. *Эл. Кр.* (*C.*).

— Грудной реб. 10 мѣс. страдалъ экземой на всемъ тѣлѣ Вылѣченъ въ 1 мѣс. Матера *S.* 5 (1-й ст.), реб. 3 чайн. ложки въ день *S.* 5 (3-й ст.) и на 6 гл. точ. *Эл. Кр.* (*C.*).

Ж. 40 л. страдала волчанкой на лицѣ, признана неизлѣчимою. Вылѣчена въ 7 мѣс. вн. *V.* (3-й ст. × *C.* 5 (3-й ст.) и по 4 чайн. лож. въ день *S.* 5 (3-й ст.). Нар. прим. *V.* и на 6 гл. точ. *Эл. Кр.* (*C.*).

— Д. 20 л. имѣла паршу на головѣ. Вылѣчена въ 3 мѣс. *S.* 1 вн. и нар. въ прим. (*C.*).

Рожа на ногѣ съ начинающимся антоновымъ огнемъ у ж. 65 лѣтъ, была вылѣчена въ 2 мѣс. прим. изъ *A.* 2 и вн. *S.* 5 (3-й ст.), на подвзд. *F.* 2 (*C.*).

Экзема на всемъ тѣлѣ у пожилыхъ людей были неоднократно вылѣчены въ 4 и 6 мѣс. *V.* (2-й ст.) съ 1 чайн. л. *S.* 5 (2-й ст.) по ⅓ стак. въ день; вн. и нар. мазь *C.* 5 (15 кр. на унцію вазелина). Точно также экзема вылѣчивается *L.* (1-й ст.) и мазью *L.* (*C.*).

Нѣсколько разъ отмороженіе было вылѣчено мазью *A.* 1 на вазелинѣ съ воскомъ и съ *Эл. Анж.* или *Бѣл.* На ночь эту мазь кладутъ на больное мѣсто, надѣваютъ перчатки или чулки. На другой день отмороженіе уменьшается, и въ 2—3 дня проходитъ (*C.*).

— М. 15 л. страдалъ около года проказой на правой ногѣ: пальцы на ногѣ укорочены и разъѣдены золотушною язвою. Вылѣченъ въ 5 мѣс. Вн. и нар. *S.* 1 × *C.* 1, ван. *C.* 5 и компр. *Эл. Зел.* (*C.*).

Коклюшъ. Этой болѣзни подвергаются большею частію только дѣти между 2 и 7 годами, иногда послѣ кори, скарлатины и вѣтряной оспы. Первое время существуетъ насморкъ и сле-

Digitized by Google

зотеченіе, щекотаніе въ горлѣ; дитя немного кашляетъ и извергаетъ слизистыя массы; но по этимъ признакамъ еще нельзя судить о коклюшѣ. Черезъ 2—3 недѣли такого состоянія мало по малу появляется жесточайшій кашель, состоящій изъ быстро слѣдующихъ одинъ за другимъ кашлевыхъ толчковъ, при чемъ дитя, кажется, вотъ-вотъ задохнется. Послѣ такихъ сильныхъ кашлевыхъ движеній, онъ дѣлаетъ быстрое свистящее судорожное вдыханіе, послѣ чего слѣдуетъ новый приступъ кашля, но уже не такой сильный. Во время приступовъ лицо синѣетъ и глаза выпучены. Припадокъ обыкновенно оканчивается изверженіемъ вязкой слизи или мокроты, иногда и рвотою слизью и даже пищею, послѣ чего дитя быстро приходитъ въ себя и беззаботно играетъ до новаго приступа, который обыкновенно наступаетъ черезъ каждые $^1/_4$ — $^1/_2$ часа. По ночамъ приступы сильнѣе и повторяются чаще. Во многихъ случаяхъ начинается сильною катарральною лихорадкою.

Здоровыя дѣти могутъ легко заразиться во время совмѣстныхъ игръ съ коклюшнымъ больнымъ; какъ дыханіе его, такъ и мокрота его заразительны.

Эта болѣзнь у дѣтей съ яркимъ цвѣтомъ лица и губъ, расположенныхъ къ запору и поносу, а также къ лихорадкѣ, воспаленіямъ и проч. всегда вылѣчивается *A.* 1 или 3 (3-й ст.), а у дѣтей блѣдныхъ и анемичныхъ вылѣчивается *S.* 2 (2—3 ст.). Въ томъ и другомъ случаѣ полезно давать каждый часъ по 1 сух. кр. *P.* 1, а утромъ и вечеромъ по 2—3 сух. круп. *Verm.* Какъ вспомогательное на область сердца мазь *A.* 2, на 6 гл. точ. *Эм. Анж.* и пребываніе ребенка на чистомъ воздухѣ. Этими способами было достигнуто наибольшее число излѣченій коклюша.

Въ упорн. случяяхъ: *A.* 1 × *C.* 1 × *F.* 1 и черезъ 2—3 часа поперем. по 1 — 2 круп. *P.* 3 и *P.* 4. Кромѣ того 2—3 раза въ день и послѣ каждой рвоты по 2—5 круп. *S.* 1 или *Antimal di mare.* Чѣмъ дольше продолжается коклюшъ, тѣмъ болѣ низкія разведенія давать: вм. 3-го ст.—2-ой, вм. 2-го—1-й ст Обтираніе всего тѣла 1 — 2 раза въ день растворомъ *A.* 2 *C.* 2, *P.* 2 по 10 — 15 круп. въ смѣси по полстакана воды

Digitized by Google

спирта и съ добавлен. къ послѣдней 1 чайн. лож. *Эл. Бѣл.* или *Эл. Анж.*

Колики въ правомъ подреберьи указываютъ на страданіе печени или желчныхъ путей; въ лѣвомъ подреберьи—на круглую язву, ракъ или нервную боль желудка; около пупка—на глисты, воспаленіе въ тощихъ или поперечной ободошной кишкахъ; въ подбрюшной лѣвой сторонѣ—на воспаленіе слѣпой кишки и соединительной ткани въ ея окружности; пронизывающія колики въ задній проходъ и промежность—на воспаленіе соединительной ткани въ окружности прямой кишки и геморрой; около 2-го и 3-го брюшныхъ позвонковъ—на страданія въ почкахъ; переходящія съ мѣста на мѣсто колики—на вѣтры въ животѣ; наконецъ при нервной боли кишекъ происходятъ колики въ различныхъ мѣстахъ живота. Лѣченіе см. въ соотвѣтствующемъ мѣстѣ.

Колотье въ бокахъ указываетъ на пораженіе подреберной плевы; колотье въ селезеночной области—на страданіе селезенки; пронизывающее колотье спереди кзади сквозь грудь—на бугорчатку легкихъ; самостоятельное колотье въ различныхъ частяхъ тѣла, когда оно составляетъ единственное болѣзненное явленіе—на ревматическое пораженіе этихъ частей. Лѣченіе см. въ соотвѣтствующемъ мѣстѣ.

Конвульсивный смѣхъ. Вн. *S.* 1 (2-й ст.). На 6 гл. точ. *Эл. Кр.* попер. съ *Желт.* Ван. *С.* 5.

Кости. Твердый остовъ, составляющій опору нашего тѣла, заключающій въ своихъ полостяхъ важные органы и служащій для прикрѣпленія мягкихъ частей (въ особенности мышцъ) образуется 213 отдѣльными костями. Всѣ онѣ тѣсно соединены между собою, или плотно, или подвижно, и составляютъ такъ называемый *скелетъ*. Кости же туловища и головы образуютъ стѣнки полостей, въ которыхъ лежатъ, вполнѣ защищенные, необходимые для жизни аппараты (органы чувствъ, внутренности).

На очень многихъ мѣстахъ двѣ или нѣсколько костей соединены между собою плотными, но гибкими пучками, *связками*, такимъ образомъ, что могутъ болѣе или менѣе свободно

Digitized by Google

двигаться въ различныхъ направленіяхъ, т. е. образуютъ *сочлененіе* или *суставъ*. Отъ этихъ сочлененій костный остовъ нашего тѣла такъ подвиженъ во всѣхъ своихъ частяхъ, что мы можемъ при помощи мышцъ, прикрѣпленныхъ къ костямъ сообщать имъ различныя положенія и движенія.

Наружная поверхность кости одѣта весьма плотно сухожильною оболочкою, *надкостной плевой*. Питаніе кости совершается при посредствѣ этой плевы—черезъ нее входятъ въ кости кровеносные сосуды. Потому то при поврежденіяхъ или потерѣ надкостной плевы подлежащая кость можетъ не только заболѣть, но и совсѣмъ омертвѣть. При цѣлости же надкостной плевы, изъ нея можетъ вновь возстановиться утраченный кусокъ кости. Кость и надкостная плева въ здоровомъ состояніи почти нечувствительны; но когда онѣ заболѣваютъ (воспаляются), то болѣзнь можетъ сопровождаться весьма сильною болью.

Болѣзни костей.

При лѣченіи этихъ болѣзней, чтобы усилить дѣйствіе внутр. лѣкарствъ въ растворахъ, которыя здѣсь назначены, нужно принимать ежедневно отъ 10 до 16 кр. *S.* 1, *S.* 2 или *S.* 5, или *C.* 1, *C.* 4, *C.* 5, по 1 кр., въ промежуткѣ между растворами, или въ четыре пріема, или за завтракомъ и обѣдомъ, сообразуясь съ обстоятельствами, степенью и упорностію болѣзнью, съ темпераментомъ больного и его воспріимчивостью къ тому или другому лѣкарству. Если болѣзнь сопровождается лихорадкою, то принимаютъ *F.* 1 (1-й или 2-й ст.) попер. съ однимъ изъ лѣкарствъ въ растворѣ; на подвзд. мазь, компр. *F.* 2. На твердыя опухоли костей можно прикладывать пластыри (см. стр. 95) изъ тѣхъ же круп., которыя назначены для мази. Кромѣ того, сообразуясь съ болѣзнью, необходимо или движеніе, или безусловный покой, правильное положеніе перевязки, ванны и проч.

Воспаленіе надкостной плевы бываетъ самостоятельное или послѣдовательное. Въ 1-мъ случаѣ это происходитъ отъ механическихъ причинъ — ушиба, давленія и бываетъ въ острой

Digitized by Google

формѣ. Въ послѣднемъ случаѣ причиною бываетъ болѣзненное состояніе сосѣднихъ частей или всего организма, именно: воспаленіе соединительной ткани, золотуха, цынга и проч. Воспаленіе надкостной плевы по большей части бываетъ хроническое. Узнается по *твердой опухоли* большей или меньшей величины, которая ощупывается *на костяхъ*, очень болѣзненной при дотрогиваніи. При этомъ бываетъ общее лихорадочное состояніе. Вн. и нар. *S.* 1 или *S.* 2. На соотв. нер. *Эл. Бѣл.* попер. съ *Зел.* Въ упорномъ случаѣ вн. и нар. *S.* 5 × *C.* 4.

Воспаленіе вещества кости бываетъ скоротечное и хроническое, происходитъ отъ тѣхъ же причинъ и характеризуется тѣми же болѣзненными явленіями, какъ и воспаленіе надкостной плевы, и лѣчится тѣми же лѣкарствами.

Костоѣда есть язва кости, имѣющая наклонность къ разрушенію. Причиною бываетъ страданіе мягкихъ частей или надкостной плевы, покрывающихъ больное мѣсто. Скрытая костоѣда характеризуется язвами на мягкихъ частяхъ, имѣющими дряблые впалые края грязно-синяго цвѣта и отдѣляющими обильное количество жидкаго, вонючаго гноя, иногда съ примѣсью сукровицы. При изслѣдованіи зондомъ, эти язвы имѣютъ извилистые ходы и наконецъ зондъ упирается въ кость, имѣющую шероховатую поверхность. Изъ отверстій язвъ иногда торчатъ осколки мертвой кости, темно-бураго цвѣта, или же распавшаяся кость выдѣляется съ гноемъ въ видѣ крупинокъ. Во многихъ случаяхъ бываетъ лихорадка изнурительнаго характера. Вн. и нар. въ прим. или ванн. *C.*, преимущественно 1, 4 и 5, ихъ даютъ попеременно—одно въ растворѣ, другое въ сухомъ видѣ. Съ пищею сух. круп. *S.* 1 или 2 или 5. При надобности прибавляютъ *A.* также *V.* Дозы насколько возможно должны быть сильныя. Въ упорныхъ случаяхъ цѣлесообразно лѣченіе, указанное противъ рака. См. *Ракъ*.

Костоѣда зубовъ лѣчится точно также и полоск. изъ тѣхъ же лѣкарствъ, на челюсть мазь *C.* 5.

Костоѣда носовыхъ костей лѣчится точно также и втяги-

Digitized by Google

ваніемъ носомъ растворовъ *С.* 1 или *С.* 5, на носъ мазь *С.* 5.

Омертвѣніе костей происходитъ такимъ же образомъ, какъ и омертвѣніе мягкихъ частей, и часто составляетъ исходъ воспаленія, особенно надкостной плевы. Къ причинамъ относятся также: разрушеніе надкостной плевы отъ внѣшнихъ насилій, разрывы сосудовъ кости, сотрясенія. Болѣзнь начинается явленіями воспаленія надкостной плевы. При образованіи гноя и вскрытіи его чрезъ побагровѣвшую кожу на одномъ или нѣсколькихъ мѣстахъ, образуются свищевые ходы, наружныя отверстія которыхъ углублены, неподвижно связаны съ надкостною плевою и обыкновенно усажены багровыми, твердыми мясными сосочками; изъ нихъ отдѣляется густой, доброкачественный гной, окружность воспалена и нечувствительна къ давленію. Если омертвѣвшая кость обнажена, то она представляется грязно-сѣрою или темно-бурою, неровною, сухою, шероховатою и нечувствительною. При омертвѣніи глубокихъ частей кости, постепенно образуется костная сумка, заключающая гной и омертвѣвшую кость. Если гной развивается въ толщѣ кости или въ мозговой полости, то стѣнка кости поднимается, раздувается и представляетъ веретенообразную или неравномѣрную твердую опухоль, почти нечувствительную къ давленію. По вскрытіи гноя наружу, образуется язва. Лѣчится такъ же, какъ и костоѣда, и прим. изъ *Эл. Зел.* съ *С.* 5.

Рахитизмъ или *Англійская болѣзнь.* См. стр. 170.

Размягченіе костей свойственно взрослымъ, между 30 или 40 годами жизни, развивается медленно, отъ 6 до 10 лѣтъ. Женщины заболѣваютъ чаще, чѣмъ мужчины. Въ началѣ появляются боли, то тупыя, то раздирающія, кожа теряетъ свою эластичность, старообразный видъ лица, общее худѣніе. Боли по временамъ стихаютъ. Затѣмъ кости получаютъ способность сгибаться въ дугу, даже при посредственномъ на нихъ давленіи. Болѣзнь начинается прежде всего съ тазовыхъ костей, распространяется на позвонки и кости груди, позвоночный столбъ изгибается въ видѣ буквы *S*, получаются разнообраз-

Digitized by Google

ные изгибы и переломы реберъ. Для лѣченія см. *Англійская болѣзнь*, но чаще употреблять ванн. изъ *Сапс.* 5 и ванн. съ *Эл. Зел.*

Переломы костей случаются у совершенно здоровыхъ людей, вслѣдствіе дѣйствія силы на кость—ушиба, давленія, тяжести и паденія. Переломы бываютъ *простые* и *сложные*. Въ 1-мъ случаѣ кость переломана на двѣ части. Во 2-мъ—она раздроблена на нѣсколько частей. При этомъ бываютъ сильно повреждены и мягкія части, такъ что членъ, на мѣстѣ сложнаго перелома, подобенъ мѣшку, наполненному кашею, состоящею изъ раздавленныхъ мускуловъ и осколковъ кости. Кромѣ того, переломы раздѣляются на поперечные, косвенные и продольные. Послѣдніе называются надломами. Симптомы: несвойственная члену подвижность, хрустѣніе при движеніи члена, расхожденіе переломанныхъ концовъ кости, опухоль и боль на мѣстѣ перелома, впрочемъ, боль появляется спустя нѣкоторое время, когда начинаетъ развиваться воспалительный процессъ.

Лѣченіе переломовъ состоитъ въ приведеніи кости въ нормальное положеніе и утвержденіи въ этомъ положеніи до времени образованія костной мозоли; на мѣстѣ перелома накладывается повязка изъ лубковъ, а если ихъ нѣтъ, то переломленное мѣсто аккуратно укрѣпляется съ помощью дощечекъ. Затѣмъ больной переносится въ постель, которая должна быть хорошо приготовлена. Вн. *S.* 1 (1-й ст.) и компр. *Эл. Бѣл.* Для скорѣйшаго сростанія вн. *A.* 2 × *C.* 4.

Средній срокъ для образованія мозоли при переломахъ предполагается 60 дней, но не для всѣхъ костей онъ одинаковъ; на костяхъ пальцевъ 2 недѣли, на ребрахъ 3 недѣли, на ключицѣ 4 недѣли, на предплечьи 5 недѣль, на бедренной кости отъ 10 до 12 недѣль.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда можно примѣнить нар. средства ван., мазь, прим. *S.* 1, *C.* 5, *S.* 5. Компр. *Эл. Анж.* На 6 гл. поч. и соотвѣт. нер. *Эл. Кр.* × *Ж.* См. *Вывихъ.*

Переломъ челюстей и сложный переломъ лѣчатся тѣми же лѣкарствами. См. *Раны.*

Digitized by Google

Вывихъ есть смѣщеніе суставовъ, вслѣдствіе неправильныхъ движеній или дѣйствующей силы. Онъ бываетъ *полнымъ*, когда поверхности костей на столько удалены другъ отъ друга, что не прикасаются болѣе между собою ни въ одной точкѣ, и *неполнымъ*, когда поверхности костей соприкасаются въ нѣкоторыхъ точкахъ. Неправильная форма сустава и измѣненіе его направленія служатъ признаками вывиха, ощущается въ немъ слабая боль, вслѣдствіе растяженія и даже разрывовъ суставныхъ связокъ и сумокъ.

Должно вправить вывихъ посредствомъ цѣлесообразнаго вытягиванія члена или дѣйствія противоположнаго тому, отъ котораго произошелъ вывихъ, наложить повязку и не двигать членомъ 10 или 15 дней. Для неполныхъ вывиховъ этотъ срокъ короче. Вн. *S.* 1 или *A.* 1 (1-й ст.), въ упорномъ случаѣ попер. съ *C.* 1.

Боль прекращается быстро отъ частыхъ холодныхъ прим. изъ 20 кр. *L.* на стаканъ воды, къ которымъ каждый разъ прибавляютъ нѣсколько капель *Эл. Кр.* или *Желт.* Этой прим. прикладываютъ въ продолженіи 6—7 часовъ сряду, и въ теченіе перваго часа боль начинаетъ стихать. Или въ литрѣ воды растворяютъ 50 кр. *L.* съ 20 каплями *Эл. Кр.*, и въ этомъ растворѣ размѣшиваютъ обыкновенную глину, которую прикладываютъ въ видѣ припарокъ на больное мѣсто, которыя возобновляютъ каждыя два часа. На другой день боль совершенно проходитъ. Это приложеніе *L.* можетъ быть примѣнено къ переломамъ и ушибамъ. Если вывихъ легкій, то можно примѣнить массажъ поперемѣно съ компрес. *L.*, на другой день больной можетъ ходить свободно и безъ боли. Мазь *C.* 5 помогаетъ въ особенности послѣ воспалительнаго періода и замѣтно ускоряетъ выздоровленіе.

Излѣченія. Совѣтъ черезъ корреспонденцію. —М. 6 л. болѣлъ англійскою болѣзнію: искривленіе бедеръ, голеней, грудной клѣтки, худоба, блѣдность, старческое выраженіе. Вылѣченъ въ 8 мѣс. *S.* 1 и *C.* 1 въ средней довѣ; нар. мази и ванн. *S.* 5 и *Сапс.* 5 и на соотвѣт. нерв. *Эл. Кр.* попер. съ *Желт.* (С).

—М. 65 л., страдалъ хроническимъ воспаленіемъ надкост

Digitized by Google

ной плевы на подъемѣ правой ступни. Вылѣченъ *S.* 2 попер. съ *C.* 5, примочками изъ *S.* 5 и *C.* 5 и компр. *Эл. Кр.* (*C.*).

—Д. 16 л., болѣла 7 л. костоѣдою въ лѣвой рукѣ, которая была сведена, и твердою опухолью на шеѣ. Лѣчилась вн. и въ ван. *S.* 5, *C.* 4 и *A.* 1, и на соотвѣт. нерв. *Эл. Зел.* Черезъ мѣсяцъ могла играть на рояли, 18 мѣс. улучшеніе продолжалось, потеряна изъ виду. (*C.*).

—Д. 10 л., имѣла костоѣду на лѣвой рукѣ. Черезъ годъ вылѣчилась *S.* 5, *V.* и *C.* 5 внутрь, смѣшанныя изъ 1-го ст. Примочки и ванны изъ тѣхъ же лѣкарствъ. Прим. *Эл. Зел.* (*C.*).

—Ж. 40 л., страдала размягченіемъ и раздутостью костей съ сверлящею и рвущею болью въ костяхъ, уменьшавшеюся въ покоѣ, увеличивавшеюся при движеніи, иногда лихорадка, походка невѣрная и шаткая, искривленіе членовъ и туловища. Вылѣчилась въ одинъ годъ вн. *S.* 5 и *C.* 4 (средняя доза), и нар. тѣ же лѣкарства въ прим., мазяхъ и ван. На соотвѣт. нер. *Эл. Зел.* (*C.*).

Кровь текущая черезъ сердце и кровеносные сосуды нашего тѣла, то-есть чрезъ артеріи, волосные сосуды и вены, представляетъ, пока находится въ живомъ организмѣ, красную, нѣсколько вязкую, слабо-клейкую жидкость, солено-сладковатаго вкуса и температуры въ 30° по Р. Въ артеріяхъ кровь красная (алая), въ венахъ темнѣе (синевато-красная). Что *кровь въ артеріяхъ краснѣе* и лучше, чѣмъ въ венахъ, происходитъ отъ того, что въ первыхъ она содержитъ большое количество кислорода, воспринятаго ею въ легкихъ изъ вдохнутаго воздуха. *Въ венахъ же кровь темнѣе* и притомъ бѣднѣе питательными составными началами потому, что, проникая по волоснымъ сосудамъ и отдавая тканямъ свои питательныя начала и кислородъ, она въ то же время во всѣхъ частяхъ тѣла принимала употребленныя и сдѣлавшіяся негодными составныя части тканей и угольную кислоту. Кислородъ же придаетъ крови болѣе красный цвѣтъ, а угольная кислота—болѣе темный, синевато-красный. (См. сосудистая система).

Всѣ болѣзни крови происходятъ или отъ изобилія количества и разжиженія, или отъ недостатка и медленности кровообращенія.

Болѣзни, происходящія отъ недостатка и медленности

Digitized by Google

кровообращенія, суть: гиперемія или переполненіе печени кровью, воспаленіе легкихъ, болѣзни сердца, недостаточность его заслонокъ, расширеніе венъ, анемія, блѣдная немочь и проч., которыя лѣчатся обыкновенно изъ 1-го стак. или въ средней дозѣ *Ang.* или *Ang.* попер. съ *Scrof.*, иногда однимъ *Scrof.* (напр. при анеміи и блѣдной немочи). Иногда прибавляютъ *Canc.* Эти болѣзни означены здѣсь въ алфавитномъ порядкѣ.

Прибавленіе *Canc.* или даже его преобладаніе при лѣченіи болѣзней этой послѣдней категоріи объясняется тѣмъ, что недостатокъ или медленность кровообращенія есть существенный результатъ обнаружившейся испорченности лимфы.

Болѣзни крови.

Полнокровіе встрѣчается у людей средняго возраста и причиною бываетъ бездѣятельный, сидячій образъ жизни при хорошемъ питаніи организма. Симптомы: тяжесть и боль головы, шумъ въ ушахъ и сонливость; тяжелый сонъ, исполненный грезъ; пробужденіе продолжительное, часто бываетъ сердцебіеніе и стѣсненіе дыханія. Вн. *А.* 1 (3-й или 2-й ст.). На сердце прим. *А.* 1. Въ упорн. случаѣ: вн. *А.* 2 (3-й ст.). На всю голову, лицо и сердце мазь, прим. *А.* 2. На соотв. нер. *Эл. Анж.*

Анемія, малокровіе. Подъ этимъ именемъ до сихъ поръ смѣшивали двѣ противоположныя болѣзни, а именно:

1) *Анемія*, при которой количество крови безусловно уменьшено, разстройство, встрѣчающееся только у лимфатиковъ, и выражается: блѣдностію кожи и слизистыхъ оболочекъ губъ и вѣкъ, раздражительностію, усталостію, большою слабостію, сонливостію и уныніемъ, при движеніяхъ одышка и сердцебіеніе; чувство холода въ тѣлѣ; конечности всегда холодныя и подвержены онѣмѣнію и чувству ползанія мурашекъ. У женщинъ же, кромѣ того, недостаточность регулъ или совершенное ихъ прекращеніе, что и называется блѣдною немочью (см. ниже), и

2) *Анемія*, при которой масса крови остается та же, но въ крови содержится меньше кровяныхъ тѣлецъ и бѣлка и

Digitized by Google

относительно больше воды, разстройство, встрѣчающееся только у лимфатико-сангвиниковъ, а у женщинъ выражается обильными регулами и часто возвращающимися.

Въ первомъ случаѣ излѣченіе всегда достигалось *S.* 1; рѣдко съ прибавленіемъ *C.* 1, и у женщинъ регулы становились нормальными по мѣрѣ того какъ аппетитъ, пищевареніе, сонъ и силы возстановлялись.

Во второмъ случаѣ *A.* 1 должно быть употреблено съ *S.* 1 или 2 въ пропорціи $^1/_4$ или $^1/_2$ ст. въ день, и можно здѣсь примѣнить мазь или прим. на сердце *A.* 2 и иногда ван. *A.* 2.

Въ упорн. случ. при преобладаніи лимфатическаго тѣлосложенія: *A.* 3×*S.*5 (2 ст.) и 3 раза въ день по 5 круп. *S.* 5. У женщинъ: то же, только вмѣсто *S.* 5 давать *C.* 5: Кромѣ того утр. и веч. по 2 круп. *V.*

При малокровіи послѣ истощающихъ болѣзней давать 4 раза въ день по чайн. лож. *S.* 1 (1-е усилен. развед.), а утр. и веч. по 3 круп. *A.* 3 и 2 раза въ день передъ ѣдой по 5 круп. *L.*

При преобладаніи сангвинич. тѣлосложенія: *A.* 1 × *C.* 1 и 3 раза въ день по 5 круп. *L.* съ одной каплей *Эл. Анж.* При сердцебіеніи—смазываніе области сердца 2—3 каплями *Эл. Анж.*

Малокровнымъ груднымъ младенцамъ давать утр. и веч. по 1 круп. *A.* 3 и 2 раза въ день по 1 круп. *S.* 1.

Блѣдная немочь свойственна преимущественно молодымъ дѣвушкамъ. Происходитъ отъ дурного питанія организма, онанизма, постояннаго горя, безнадежной любви, тоски по родинѣ и вообще отъ сильныхъ душевныхъ волненій. Симптомы: блѣдный цвѣтъ лица, переходящій въ зеленоватый, блѣдность губъ, десенъ и слизистой оболочки вѣкъ: малый пульсъ, кожа на ощупь холодная и довольно вялая, унылый видъ, сердцебіеніе при малѣйшемъ возбужденіи, лѣность, сонливость, тревожный сонъ, прерываемый страшными сновидѣніями. Регулы неправильны, по большей части они появляются въ большіе промежутки времени, а иногда замѣняются отдѣленіемъ бѣлей. Иногда страданіе кардіальгіей и диспепсіей и въ послѣднемъ случаѣ является извращенный аппетитъ. Если послѣ нѣсколькихъ

Digitized by Google

изслѣдованій мочи, въ ней окажется *щавелевокислая известь*, то присутствіе ея считается самымъ раннимъ признакомъ бугорчатки легкихъ, хотя бы и не существовало никакихъ признаковъ послѣдней.

Лѣченіе. При преобладаніи лимфатизма *S.* 1×*A.* 3 (2-й, 1-й ст. до средней дозы); въ упорн. случ. вмѣсто *S.* 1, давать *C.* 1; 3 раза въ день по 5 круп. *L.* передъ ѣдой и *F.* 1 веч. 2 круп. У сангвиниковъ: *A.* 1 × *C.* 1 × *F.* 1 (2-й, 1-й ст.) и 2 раза въ день попеременно *S.* 5 и *A.* 3 по 3 круп. При обильныхъ регулахъ 3 раза въ день по 2—3 капли *Эл. Анж.* внутрь. Лимфатикамъ частыя ванны вредны. Во всякомъ случаѣ избѣгать употребленія кофе, пива и вообще спиртныхъ напитковъ. Пища болѣе легкая, но питательная, преимущественно молоко, яйца, мясо и растительная.

Случаевъ излѣченій указанными лѣкарствами анеміи и блѣдной немочи очень много. Только въ рѣдкихъ случаяхъ приходилось примѣнять одно или два средства изъ числа назначенныхъ въ упорныхъ случаяхъ. Общее улучшеніе здоровья обыкновенно замѣчалось въ первый мѣсяцъ лѣченія, а выздоровленіе достигалось различно отъ 1 до 12 мѣсяцевъ (С).

Кровавый натужной поносъ, дизентерія состоитъ въ воспаленіи слизистой оболочки толстой кишки, начиная отъ той части, которая называется слѣпой кишкой и до прямой. Онъ отличается чрезвычайно частыми испражненіями (отъ 10 до 20 разъ въ теченіе 24 часовъ) слизистыхъ, кровянистыхъ веществъ съ обрывками плевы (эпителія или тонкой кожицы съ внутренней поверхности кишекъ), большею частію безъ кала при сильной натугѣ, рѣзи въ животѣ и сильномъ жженіи въ заднемъ проходѣ. Обыкновенно дизентерія сопровождается сильными лихорадочными явленіями, языкъ сухой, какъ бы покрытый сажею; обнаруживается большею частію лѣтомъ и осенью и нерѣдко господствуетъ эпидемически.

Въ этой опасной болѣзни различаютъ нѣсколько формъ напр. *дизентерію печеночную*, осложненную воспаленіемъ печени; *дизентерію желчную*, въ которой преобладаютъ желчные

Digitized by Google

симптомы—желтый языкъ, горькій вкусъ, тошнота, зеленоватая рвота и пр.; *дизентерію безпорядочную въ кризисахъ*, при которой наблюдается постоянный бредъ, чрезвычайное волненіе, трясеніе членовъ съ судорогами въ сухожиліяхъ и состояніе оцѣпенѣнія и тупоумія, и наконецъ дизентерію *адинамическую, разслабляющую*, которая характеризуется значительнымъ уменьшеніемъ силъ; языкъ черный, сухой, который покрытъ и точно также и зубы черноватымъ или сѣроватымъ налетомъ и животъ вздувается.

Когда дизентерія оканчивается смертію, то пульсъ становится неправильнымъ, неосязаемымъ, черты лица измѣняются, животъ вздувается, испражненія учащаются и ихъ зловоніе усиливается; съ того времени худѣніе прогрессируетъ и больной изнемогаетъ отъ кишечнаго кровотеченія или отъ воспаленія брюшины.

Простая дизентерія почти всегда излѣчима, но этого нельзя сказать о дизентеріи эпидемической, которая иногда имѣетъ характеръ тифа. Первые приступы дизентеріи проходятъ отъ 10 сух. кр. *S.* 1 или *S. G.* или отъ 10 кр. *F.* 1 въ смѣси съ 10 кр. *S.* 1 или *C.* 1. Этотъ пріемъ повторяютъ при надобности. Если черезъ нѣсколько часовъ нѣтъ улучшенія, то *S.* 1 (1-й ст.) × *F.* 1 (2—3-й ст.) въ особенности при лихорадкѣ и симптомахъ желчныхъ. При появленіи крови въ испражненіяхъ *A.* 1 (3-й ст.) × *S.* 1 (2-й ст.), и каждый часъ по 1 сух. кр. *S.* 1. Если желчные симптомы преобладаютъ, и испражненія съ кровью, то *A.* 1 (2-й ст.) × *F.* 1 (3-й ст.) и каждый часъ по 1 сух. кр. *S.* 1. Если, несмотря на это, болѣзнь усиливается и переходитъ въ періодъ адинамическій, тогда даютъ *F.* 1 (3-й ст.) × *C.* 1 (2—3 ст.) одно послѣ другаго въ очень частыхъ и малыхъ пріемахъ, каждый часъ по 1 сух. кр. *S.* 1; на ночь 5 сух. кр. *Verm.* и клистиры *C.* 5. Во всѣхъ случаяхъ надо втирать мази въ животъ *C.* 5 и въ подвзд. *F.* 2. Какъ только начинается выздоровленіе, то діэту нужно продолжать нѣкоторое время и лѣченіе оканчивается *S.* 1.

Въ упорн. случ. дѣлать разъ въ два дня промываніе ки-

Digitized by Google

шечника (клистиръ) тепловатой водой. При сильномъ жиленіи 1—2 раза въ день клистиръ изъ полустакана жидкаго отвара крахмала съ 2—5 каплями *Эл. Бѣл.* или *Эл. Зел.*, также суппозиторіи—бѣл. или зелен. Вн. *A.* 3 × *Dom-Fin* или *C.* 6 × *F.* 1 (3-й, 2-й ст.) и черезъ 2 часа по 1 круп. *A.* 3 × *Dom-Fin.*

Кровотеченіе. Истеченіе крови изъ сосудовъ, которые ее содержатъ, можетъ имѣть мѣсто безъ разрыва ихъ стѣнокъ или съ разрывомъ ихъ. Всякая возбуждающая причина можетъ вызвать кровотеченіе. Если кровотеченіе происходитъ отъ прилива крови къ органу, то оно *активное*, и оно должно быть остановлено, когда оно чрезвычайно сильное, ибо угрожаетъ здоровью. Если кровотеченіе происходитъ отъ общей слабости, то оно *пассивное*, и встрѣчается у людей ослабленныхъ продолжительною болѣзнію или частыми выдѣленіями крови, и наконецъ еще въ нѣкоторыхъ золотушныхъ и изнурительныхъ болѣзняхъ, какъ напр. скорбутъ, анемія и др. Въ этихъ случаяхъ тоническая діэта должна сопровождать лѣченіе (см. *золотуха).* Если *кровь* вытекаетъ *изъ артерій*, то она алая и идетъ неровно, толчками; если она *изъ венъ*, то она темнокрасная и течетъ ровной *струей*; кровь *капиллярныхъ сосудовъ* вытекаетъ медленно и широко. Активное кровотеченіе останавливается осторожно *A.* 1 (2—3 ст.), втираніями и вн. *Эл. Анж.*, примочками и ваннами *A.* 2. Противъ пассивнаго кровотеченія назначается въ особенности *S.* 1 (1 или 2-й ст.) съ небольшимъ количествомъ *A.* 1.

Кровотеченіе изъ разныхъ органовъ. См. въ своемъ мѣстѣ (по алфавитному указателю).

Легкія. Основаніемъ всего дыхательнаго аппарата служитъ прежде всего *грудная клѣтка.* Она образуетъ верхнюю часть туловища и составляется: сзади 12-ю грудными позвонками и задними концами 12-ти паръ реберъ, съ боковъ ребрами, спереди грудной костью и эластическими реберными хрящами. Полость внутри грудной клѣтки (*грудная полость*) можетъ расширяться и съуживаться подниманіемъ и опусканіемъ реберъ, помощью *дыхательныхъ мышцъ*, прикрѣпленныхъ къ грудной

Digitized by Google

клѣткѣ. Кромѣ того, чрезвычайно важную роль въ расширеніи и съуживаніи грудной клѣтки играетъ *грудобрюшная преграда* (діафрагма): мясистая перегородка, протянутая поперекъ между грудной и брюшной полостями, составляющая, слѣдовательно, дно для одной и крышку для другой. Въ покойномъ состояніи грудобрюшная преграда представляетъ сводъ, вдающійся въ грудную полость; при сокращеніи своемъ она уплощается, опускаясь изъ грудной полости по направленію къ брюшной. Отъ этого грудная полость расширяется, а брюшная съуживается. Обыкновенное спокойное дыханіе производится преимущественно грудобрюшной преградой. При вдыханіи всегда работаютъ мышцы и особенно грудобрюшная преграда; для вдыханія же, при обыкновенныхъ условіяхъ, достаточно только ослабленія вдыхательныхъ мышцъ и опусканія эластической грудной стѣнки, поднятой вслѣдствіе вдыханія; при этомъ грудобрюшная преграда поднимается опять вверхъ.

Внутри грудной полости расположено, какъ въ правой, такъ и въ лѣвой ея половинѣ, по одному *легкому*; въ срединѣ между ними лежитъ *сердце*. Каждое легкое одѣто тонкимъ, перепончатымъ, гладкимъ покровомъ, сывороточною оболочкою, *плеврой*; часть оболочки, выстилающая внутреннюю поверхность реберъ, называется *подреберной плевой*.

Плевра отъ легкаго заворачивается на грудную стѣнку и грудобрюшную преграду и плотно сростается съ ними, такъ что вся плевра представляетъ мѣшокъ, который только одною частью своею одѣваетъ легкія. Полость мѣшка плевры иногда служитъ мѣстомъ для накопленія жидкости (*грудная водянка*). Форма легкаго коническая; тупая, закругленная верхушка лежитъ вверху грудной клѣтки, за первыми ребрами; широкое основаніе покоится внизу, на грудобрюшной преградѣ. Правое легкое короче и шире; двумя надрѣзами оно дѣлится на 3 доли (верхнюю, среднюю и нижнюю); лѣвое легкое болѣе длинное и узкое, имѣетъ только одинъ надрѣзъ, раздѣляющій его на двѣ доли (верхнюю и нижнюю). Эти большія доли, въ свою очередь дѣлятся на мелкія дольки, состоящія изъ еще меньшихъ, гроздовидно скученныхъ; всѣ эти доли и дольки связываются

Digitized by Google

между собою соединительною тканью.—*Ткань* легкихъ очень мягка, рыхла, губчата. Она состоитъ почти сплошь изъ продолговато-круглыхъ пузырьковъ, которые во время жизни, при здоровомъ состояніи легкихъ наполнены атмосфернымъ воздухомъ и окружены густою сѣтью волосныхъ сосудовъ. Эти пузырьки назыв. *легочными пузырьками* или *ячейками*; число ихъ доходитъ до 1,800 милліоновъ.

Въ легочныхъ пузырькахъ происходитъ обмѣнъ кислорода и угольной кислоты, т.-е. самый существенный актъ дыхательнаго процесса.

Пути, по которымъ идетъ атмосферный воздухъ въ легочные пузырьки и обратно, т.-е. такъ назыв. *воздушные пути*, тянутся, начиная съ полости рта, носа и зѣва, чрезъ гортань, дыхательное горло и его развѣтвленія внизъ, къ легкимъ. Въ верхнихъ, болѣе широкихъ изъ этихъ путей (особенно же въ носовой полости) воспринятый нами воздухъ согрѣвается и очищается отъ содержащихся въ немъ негодныхъ и вредныхъ примѣсей, которыя и осаждаются на покрывающей стѣнкѣ этихъ сосудовъ, слизи. *Гортань* — органъ голоса, образуетъ верхнюю часть дыхательнаго горла и состоитъ изъ хрящеватыхъ пластинокъ и колецъ (см. *Гортань*). *Дыхательное горло* представляетъ постоянно открытый каналъ, который можетъ укорачиваться и удлиняться, дѣлаться шире и уже, благодаря своимъ эластическимъ стѣнкамъ, содержащимъ мышечныя волокна. Оно начинается съ средины или у нижняго края гортани, опускаясь внизъ впереди пищепровода въ грудную полость и здѣсь на высотѣ 3 грудного позвонка, раздѣляется на двѣ вѣтви, правую и лѣву. Каждая изъ этихъ двухъ вѣтвей направляется къ легкому своей стороны и здѣсь развѣтвляется древовидно на все болѣе тонкіе канальцы (*бронхи*); наконецъ, самые тонкіе изъ этихъ канальцевъ оканчиваются слѣпыми, пузырьчатыми мѣшечками—воздушными или легочными пузырьками. Пузырьки эти сидятъ группами на концахъ тончайшихъ бронховъ, подобно ягодамъ виноградной кисти.

Число *дыханій* бываетъ различно, смотря по возрасту, полу, тѣлосложенію и занятіямъ. Взрослые дышатъ въ минуту

Digitized by Google

отъ 12 до 20 разъ, юноши отъ 20 до 24 разъ, отроки 24 раза, а младенцы до 40 разъ.

Вдыханіе претерпѣваетъ своеобразныя *измѣненія*: при зѣвотѣ, вздохѣ, всхлипываніи, пыхтѣніи, обнюхиваніи, сосаніи и хлебаніи; *выдыханіе*—при кашлѣ, чиханіи, откашливаніи, придыханіи, сморканіи, плачѣ и смѣхѣ.

При лѣченіи всѣхъ легочныхъ болѣзней для больного необходимы: 1) чистый воздухъ, 2) упражненіе въ легочной гимнастикѣ, 3) соблюденіе чистоты тѣла и 4) исключительно легкая пища.

Бугорчатая легочная чахотка. Иногда первымъ явленіемъ болѣзни бываетъ отхаркиваніе свѣжей пѣнистой крови. Мѣстныя явленія раньше всего наблюдаются въ области верхушекъ. Они наблюдаются при постукиваніи *притупленіемъ* тона, а при выслушиваніи *бронхіальнымъ дыханіемъ* и *звучными мелкопузырчатыми хрипами*, если уже началось размягченіе творожистыхъ гнѣздъ и образованіе кавернъ. При этомъ общее истощеніе, дыхательные шумы ослаблены, кожа тонка, блѣдна, шея длинная, грудная клѣтка плоская и вытянутая въ длину, надключичныя ямки ясно выражены, грудныя мышцы плохо развиты, пальцы въ видѣ барабанныхъ палокъ, когтеобразные почти, мѣстный румянецъ на щекахъ; на кожѣ шеи и груди свѣтло-бурыя пятна и пузырьки поросянки; обильные ночные поты, истощающая лихорадка (утр. + 36 — 37°, а веч. + 39—40° Ц.), ослабленная дѣятельность сердца, потеря аппетита, рвота, поносъ, нервныя разстройства. Кашель въ первомъ періодѣ сухой и во второмъ влажный. Мокрота въ первомъ періодѣ слизистая, а во второмъ—гнойная и содержитъ въ себѣ продукты размягченія творожистыхъ гнѣздъ, эластическія волокна и, что всего важнѣе, туберкулезныя бациллы.

Чахоточный заражаетъ только мокротой. Бываютъ осложненія: воспаленіемъ легкихъ, плевритомъ, перикардитомъ, болѣзнію печени, почекъ, женскихъ половыхъ органовъ, яичекъ, полости рта и общая просовидная бугорчатка.

Скоротечная чахотка продолжается всего только отъ 4 до

Digitized by Google

6 недѣль, а *хроническая* около 7 лѣтъ послѣ появленія первыхъ измѣненій въ легкихъ.

Предсказаніе при чахоткѣ неблагопріятное въ особенности въ молодомъ возрастѣ при наслѣдственной чахоткѣ. Выздоровленіе возможно лишь въ начальной степени чахотки до образованія кавернъ въ легкихъ.

Когда мокрота еще только бѣлая, при отсутствіи стѣсненія дыханія и сердцебіенія, тогда вн. *A.* 1 × *S.* 1 × *P.* 1 (2-й ст.) и мазь *P.* 3 на грудь и между лопатками. Во второмъ періодѣ (кровохарканіе, гнойная мокрота, удушье, ночные поты) вн. *A.* 1 (3-й ст.) × *C.* 1 × *P.* 2 (2-й ст.), на область сердца мазь *A.* 2, на грудь и между лопатками мазь *C.* 5, на подвзд. мазь *F.* 2. При сильномъ потѣніи вн. сух. круп. *F.* 1. При отсутствіи аппетита, общей слабости или разстройствѣ желудка вн. сух. круп. *S. G.* или *S.* 1.

Если при лѣченіи увеличится отдѣленіе гнойной мокроты, надо ослабить дозу *C.* 1; если увеличится одышка, сердцебіеніе, кровохарканіе или изнурительная лихорадка, надо ослабить *A.* 1, и если усилится кашель, ослабить *P.*

Въ упорн. случаѣ противъ чахотки съ воспаленіемъ легкаго и отдѣленіемъ зеленой мокроты: *P.* 2 (2-й ст.) × *C.* 5 (1-й ст.) или *S.* 1 или *S.* 2 (1-й ст.). Ван. *C.* 5. Мазь *C.* 4. На 6 гл. точ. *Эл. Бѣл.* При кровохарканіи мазь, прим. на грудь и сердце *A.* 2. Ван. *A.* 2. На подвзд. *F.* 2.

Діэта: возможно больше коровьяго молока (также кефиръ, кумысъ), особенно парного, побольше коровьяго масла; мясо— пожирнѣе, если таковое переносится хорошо; яйца въ смятку, каша и проч. легкія кушанья. Заботиться о постоянномъ свѣжемъ воздухѣ и о надлежащей чистотѣ тѣла, причемъ остерегаться простуды. Ваннъ частыхъ вообще избѣгать, цѣлесообразно же утр. и веч. растирать тѣло растворомъ изъ *A.* 2, *C.* 5 и *P.* 2 по 10 круп. на 1 унцъ воды и 3 унціи виннаго спирта.

Грудная водянка. Зависитъ отъ органическаго страданія сердца и большихъ сосудовъ (самая частая форма болѣзни) или отъ остраго воспаленія легкихъ или плевры. Если причина бо

Digitized by Google

лѣзни органическое страданіе сердца, то симптомы слѣдующіе: затруднительное дыханіе, усиливающееся при лежаніи на спинѣ, сердцебіеніе, блѣдный и багровый цвѣтъ лица, внезапное пробужденіе отъ сна, скудное мочеотдѣленіе; отекъ вѣкъ, ногъ и лодыжекъ; при отекахъ лодыжекъ и ногъ дыханіе еще болѣе затруднено, больному трудно лежать и онъ чувствуетъ себя сносно только въ полусидячемъ положеніи, наконецъ дыханіе становится до того стѣсненнымъ, что больному приходится спать въ креслѣ. При грудной водянкѣ, зависящей отъ воспаленія легкихъ или плевры, сердцебіеніе и другіе симптомы со стороны сердца отсутствуютъ; выдающимся симптомомъ является сильное затрудненіе дыханія. Исходъ обыкновенно бываетъ неблагопріятный, такъ какъ водянка является въ осложненной формѣ.

Вообще, лѣчится *S.* 1; если она происходитъ отъ неправильнаго кровообращенія или болѣзни сердца, то *A.* 1; если отъ болѣзни бронхъ, то *P.* 1; если отъ болѣзни легкихъ, то *C.* 1 или *C.* 1 × *S.* 1. Или *S.* 1 × *C.* 1. и *P.* 1. На 6 гл. точ. *Эл. Кр.* попер. съ *Желт.* Всѣ лѣкарства даются въ самыхъ слабыхъ дозахъ.

Въ упорн. случ. *A.* 1 × *C.* 2 × *F.* 2 (1-й ст.) и согрѣвкомпрессы на больную часть изъ раствора *P.* 2, *C.* 5 и *F.* 2 по 10 круп. и 1 чайн. лож. *Эл. Бѣл.* по стак. воды. У сангвиниковъ—вм. *Эл. Б.* брать *Эл. Анж.*, при сильной слабости—*Эл. Кр.* вмѣсто *Бѣл.* Вн. еще 3 раза въ день *C.* 5 съ 1 каплей *Эл. Зел.*, какъ промежуточное средство.

Острое воспаленіе легкихъ часто начинается сильнымъ ознобомъ, за которымъ вскорѣ слѣдуетъ жаръ, давящая и колющая боль при дыханіи и кашлѣ во всей груди или только на одной сторонѣ; затрудненное, учащенное дыханіе; кашель въ началѣ сухой, потомъ съ слизистымъ ржаваго цвѣта или кровянистымъ изверженіемъ; ускоренный, полный пульсъ (100 и болѣе ударовъ въ минуту), головокруженіе или головная боль, жажда, красная моча, чрезвычайная слабость и потребность лежать на спинѣ. Впрочемъ, не всѣ эти припадки необходимо обнаруживаются при воспаленіи легкихъ; нѣкоторые изъ нихъ могутъ

Digitized by Google

быть очень слабы, другіе могутъ и совсѣмъ не быть, такъ что только физическое изслѣдованіе посредствомъ выслушиванія груди, можетъ повести къ точному опредѣленію болѣзни. Признаками начинающагося воспаленія легкихъ служатъ: затрудненное движеніе грудной клѣтки надъ воспаленнымъ мѣстомъ; короткій, глухой, тимпаническій звукъ при постукиваніи; при выслушиваніи скрипучее, свистящее и шумное дыханіе и мелкопузырчатые хрипы. На щекахъ у больного яркій, рѣзко ограниченный, румянецъ. Одинъ изъ симптомовъ, который не наблюдается ни при одной грудной болѣзни — это опухоль одной или обѣихъ (вообще лѣвой) яремныхъ венъ на шеѣ. Причиною болѣзни бываетъ простуда. По большей части поражается одно легкое, а иногда и оба; послѣдняя форма весьма тяжелая. Болѣзнь становится внѣ опасности, какъ только мокрота будетъ болѣе обильная, болѣе жидкая, кашель болѣе частый, когда давленіе уменьшается и когда кожа остается влажною.

Сперва, когда только одна лихорадка даетъ предполагать какое-либо воспаленіе, то пробуютъ ее прервать *F.* 1 (2—3 ст.) и на подвзд. *F.* 2. См. *Лихорадка.* Если воспаленіе легкихъ уже образовалось, то *A.* 1 (2—3 ст.) × *S.* 1 (1—2-й ст.), по чайн. ложкѣ въ частыхъ пріемахъ; при кашлѣ къ нимъ прибавляютъ *P.* 1 (2-й ст.), и всѣ три даются поочередно. Частыя приложенія *Эл. Кр.* или *Эл. Анж.* на 6 гл. точ. быстро прекращаютъ боль и воспаленіе. При остромъ воспаленіи боль въ груди проходитъ отъ втиранія въ грудь и между лопатками мази *P.* 3 съ *Эл. Б.* на свиномъ салѣ или вазелинѣ, а хроническія боли въ груди проходятъ отъ мази *C.* 5. При сильной лихорадкѣ нужно вечеромъ давать *F.* 1 (3-й ст.) и на подвзд. *F.* 2. Оканчиваютъ лѣченіе *S.* 1.

Сравнительно труднѣе распознаваніе и лѣченіе *остраго воспаленія легкихъ у маленькихъ дѣтей*: единственнымъ признакомъ, которымъ можно руководствоваться въ этомъ случаѣ, это упорная высокая температура и учащеніе дыханія, несоразмѣрное съ пульсомъ; если частота пульса не достигаетъ болѣе 110—130 ударовъ въ минуту, и дыханіе учащается до 40—50

Digitized by Google

въ минуту, и кромѣ того сонливость, бредъ и если при этомъ ребенокъ сильно и часто кашляетъ, то надо опасаться, что у него развивается воспаленіе легкихъ. Лѣченіе тоже, что и для взрослыхъ, но лѣкарства даются въ болѣе слабыхъ дозахъ, на подреб. согрѣв. компр. *F.* 2.

Хроническое воспаленіе легкихъ бываетъ послѣдствіемъ крупознаго воспаленія легкихъ, припадки котораго могутъ быть настолько легки, что въ свое время на него не обращаютъ должнаго вниманія. Симптомы: постоянный кашель, причемъ мокрота отдѣляется съ трудомъ; постоянная лихорадка, ожесточающаяся къ вечеру; сильный потъ по ночамъ; тупая боль въ груди или въ подреберьяхъ; постоянная общая слабость; при выслушиваніи заглушенные дыхательные шумы, вслѣдствіе неразрѣшившагося выпота. Перкуторный звукъ на этомъ мѣстѣ притупленный. Больные съ каждымъ днемъ худѣютъ. Болѣзнь эта можетъ перейти въ бугорчатую легочную чахотку (см. стр. 287). Лѣчится какъ острое воспаленіе легкихъ; въ упорн. случаяхъ лѣченіе такое, какъ при чахоткѣ. (См. стр. 288).

Воспаленіе плевры, плевритъ начинается ознобомъ, сопровождаемымъ сильнымъ жаромъ до 39° Ц. и сухимъ кашлемъ, иногда постояннымъ, въ другихъ случаяхъ очень рѣдкимъ; сухость во рту и жажда, горячее дыханіе, твердый пульсъ, задержанное дыханіе отъ колотья, ощущаемаго въ нижней части одного изъ боковъ, на которомъ больной лежитъ, не мѣняя своего положенія. Если бываетъ мокрота, то она обыкновенно въ видѣ слюны, пѣнистая, бѣловатая, очень рѣдко окрашена кровью. При выслушиваніи больной стороны слышенъ шумъ тренія плевры, похожій на шумъ тренія новаго опойка или юфты (*сухой плевритъ*). Въ нѣкоторыхъ случаяхъ это воспаленіе сопровождается изліяніемъ жидкости въ полость плевры. Это изліяніе, въ особенности если оно значительно, отодвигая легкое назадъ, производитъ тѣмъ очень сильное давленіе.

Иногда бываетъ, что вслѣдствіе простуды, простой бронхитъ сопровождается острою ревматическою болью (мышечный ревматизмъ, боль въ боку) и кашлемъ, представляя симптомы, по-

Digitized by Google

добные плевриту. Въ этомъ случаѣ легко отличить ревматическую боль отъ плеврита тѣмъ, что первая препятствуетъ скорѣе движенію, чѣмъ дыханію, и давленіе болѣзненно, чего не бываетъ, если боль происходитъ отъ воспаленія плевры. При накопленіи жидкости въ полости плевры (*жидкій плевритъ*) замѣчается, что плечо на больной сторонѣ опущено ниже здороваго, межреберные промежутки сглаживаются на больной сторонѣ груди, которая кромѣ того представляетъ нѣкоторую выпуклость. Дыханіе затрудняется и можетъ дойти до степени сильной одышки.

Лѣченіе. При сухомъ плевритѣ вн. черезъ 15 — 30 мин. *A.* 1 × *P.* 1 × *F.* 1 (3-й, 2-й ст.) и черезъ 3 часа по 2 круп. *F.* 1 и 3 раза въ день, передъ пищей, по 5 круп. *S.* 1. На больную сторону груди согрѣв. компрессы изъ раствора 10 круп. *A.* 2 и по 20 круп. *C.* 5 и *F.* 2 и 1 ч. л. *Эл. Бѣл.* на $^1/_2$ стакана воды. Впредь до выздоровленія больной долженъ лежать въ постели.—При *жидкомъ плевритѣ*: *A.* 1 × *C.* 2 × *F.* 2 (1-й ст.) и упомянутые выше согрѣв. компрессы, только не съ *Эл. Бѣл.*, а съ *Эл. Кр.* Если плевритъ гнойный, на что указываетъ изнурительная лихорадка, то внутрь: *A.* 1 × *C.* 1 × *F.* 1 (3—2—1-й ст. до усиленн. 1-го разведенія), 3 раза въ день—*C.* 5 по 5 круп. съ 1 капл. *Эл. Зел.* Противъ мучительнаго кашля при плевритѣ: кажд. 2—3 часа по 2—3 круп. *P.* 1 или *P.* 3 въ столов. ложкѣ горячей воды.

Кровохарканіе и кровотеченіе изъ легкихъ и дыхательныхъ вѣтвей. Кровотеченіе изъ дыхательныхъ вѣтвей и легкихъ обнаруживается отхаркиваніемъ большаго или меньшаго количества ярко-красной крови (извергаемая рвотою кровь—изъ желудка — темнаго, чернаго цвѣта), трескучимъ хрипомъ въ груди, и часто бываютъ предвѣстники: сухой кашель, стѣсненіе дыханія, иногда сердцебіеніе, подступленіе какъ бы кипятку къ горлу и т. п. Послѣдствіемъ можетъ быть легочный ударъ, который почти всегда оканчивается смертью. Вн. *A.* 1 (3-й ст.) × *P.* 1 (2-й ст.), × *C.* 1 (2-й ст.), прим. на область сердца и на весь лѣвый бокъ груди изъ 20 кр. *A.* 2 съ *Эл. Анж.* Если кровохарканіе обильное, то уже съ начала давать

Digitized by Google

внутрь *Эл. Анж.* по 10 кап. чер. кажд. 10—20 мин. до остановки кровотеченія. Кромѣ того кажд. часъ по 1 — 3 круп. *Р.* 1 сух. Больной долженъ соблюдать полный тѣлесный и душевный покой, не принимать горячей пищи, а лишь охлажденную. Глотать кусочки льда или брать по чайной ложкѣ охлажденную на льду воду. Не пить кофе, вина, пива и вообще ничего спиртнаго.

Бронхитъ (воспаленіе вѣтвей дыхательнаго горла) бываетъ:

1. *Острый*—симптомы: лихорадка, насморкъ, головная боль, кашель сухой и мучительный; въ началѣ мокрота слизистая, прозрачная, пѣнистая и очень вязкая, трудно отхаркиваемая. Затѣмъ мокрота становится жиже, менѣе прозрачной, принимаетъ характеръ слизисто-гнойный и легче отхаркивается; охриплость. Болѣзнь проходитъ въ нѣсколько дней.

2. *Хроническій*—вылѣчивается труднѣе. Симптомы: отсутствіе лихорадки, мокрота жидкая, прозрачная или слизисто-гнойная или чисто гнойная или гнилостная, вонючая, отдѣляется въ большомъ количествѣ и откашливается довольно легко; охриплость сопровождается часто астмой, см. стр. 172). При хрон. бронхитѣ пребываніе въ долинѣ лучше, чѣмъ на высокихъ горахъ.

3. *Капиллярный*—встрѣчается въ старческомъ и дѣтскомъ возрастахъ, и заключается въ воспаленіи слизистой оболочки мелкихъ бронховъ. Симптомы: лихорадка (+38,5—30° Ц.); кашель частый, короткій и сухой; одышка съ ціанозомъ (синюхой); число дыханій до 80 въ минуту; больной *«ловитъ»* воздухъ; вдыханіе сопровождается стономъ; пульсъ до 180 въ минуту; при выслушиваніи слышны средне-и мелкопузырчатые хрипы. Теченіе болѣзни острое и она часто (особенно у стариковъ) кончается смертію отъ задушенія.

Острый бронхитъ у дѣтей. Симптомы: лихорадка + 38,5—39,5° Ц., которая длится нѣсколько дней; общее недомоганіе. Надо замѣтить, что дѣти до 7—8 лѣтъ и даже 13 лѣтъ не умѣютъ отхаркивать мокроту и проглатываютъ ее, а очень маленькія дѣти не умѣютъ даже откашливать мокроту, которая, застаиваясь въ бронхахъ, вызываетъ при дыханіи хрипѣніе;

Digitized by Google

при выслушиваніи слышны сухіе, свистящіе и влажные пузырчатые хрипы.

Противъ остраго бронхита у взрослыхъ и дѣтей: сперва прервать лихорадку *F.* 1 (2—3-й ст.) и на повзд. мазь *F.* 2; при появленіи кашля вн. *P.* 1 или *P.* 3 (1—2-й ст.) × съ *F.* 1 и уменьшая дозу *P.* до 3-го или 4-го стак. при усиленіи кашля. При кровянистой мокротѣ принять 6 чайн. ложекъ въ день *A.* 1 (3-й ст.); на грудь мазь *P.* 3 или *C.* 5; на 6 гл. т. *Эл. Кр.* или *Анж.* По окончаніи воспалит. состоянія продолжаютъ давать *P.* 1 × *S.* 1 (2-й ст.). Лѣченіе заканчивается однимъ *S.* 1. *Противъ хрон. бронхита* вн. *S.* 1 или *A.* 1 × *P.* 1 и *C.* 1 (2-й ст.) и тѣ же нар. средства. Противъ *капиллярнаго бронхита* вн. *A.* 1 (3-й ст.) × *P.* 1 (2-й ст.); на тощакъ вн. 5 кап. *Эл. Анж.*; между пріемами три раза въ день по 5 сух. кр. *P.* 1; на область сердца мазь *A.* 2 и предъид. нар. средства; при лихорадкѣ вн. *F.* 1 (2—3-й ст.), на подвзд. мазь *F.* 2. Въ упорн. случ. — другіе номера *A. S. C.*, также *P.* 2 и 3. Ср. *Гриппъ*.

Большое число излѣченій было достигнуто: начинающейся чахотки *P.* 2 попер. съ *C.* 4 (2-й ст.) и на грудь мазь *C.* 4; воспаленія легкихъ *F.* 1 (3-й ст.), нар. *F.* 2, мазь *C.* 4 и *P.* 1 попер. съ *S.* 1 (2-й ст.); кровохарканія *A.* 1 (3-й ст.) и на сердце прим. *A.* 1 и бронхита *P.* 3 попер. съ *S.* 5 (2-й ст.); на грудь *C.* 4. Во всѣхъ случаяхъ на 6 гл. точ. *Эл. Кр.* или *Анж.* (*C*).

Совѣтъ черезъ корреспонденцію.—М. 55 л. страдалъ 13 л. хроническимъ воспаленіемъ легкихъ, осложнявшимся хрон. воспаленіемъ селезенки. Вылѣченъ въ 4 мѣс. вн. *A.* 1 × *C.* 1 × *F.* 2, за завтракомъ и обѣдомъ по 5 сухихъ кр. *C.* 3 и *F.* 1. На подвзд. мазь *F.* 2, на грудь и между лопатками мазь изъ 20 кр. *C.* 5, растворенныхъ въ 40 капляхъ *Эл. Б.* и смѣшанныя съ унціею свиного сала, 3 раза въ день. Этому же лѣченію уступили нѣсколько другихъ хронич. катарровъ, воспаленій легкихъ и бронхитовъ (*C*).

— М. 14 л. заболѣлъ острымъ воспаленіемъ обоихъ легкихъ Лѣчился 3 нед. безуспѣшно аллопатіей. Признанъ двумя докторами безнадежнымъ. Темпер. тѣла 41,8, давящая и колющая боль при дыханіи и кашлѣ во всей груди, затрудненное дыханіе, кашель сухой, пульсъ 125: скрипучее, свистящее и шумное дыханіе при выслушиваніи въ обоихъ легкихъ спереди и

Digitized by Google

сзади. Назначено 23 февраля 1885 г. вн. *F.* 1 (3-й ст.) по ч. л. кажд. 5 мин.; на подвзд. согрѣв. компр. *F.* 2 (15 кр. на ст.) на грудь и между лопатками втир. мази *P.* 3 (20 кр.) съ *Эл. Анж.* на унц. свин. сала. Черезъ 5 час больной могъ заснуть. На другой день темпер. 39°, пульсъ 105, боль въ груди уменьшилась, дыханіе свободнѣе: назначено продолжать нар. лѣкарства и вн. *F.* 1 × *S.* 1 (3-й ст.), по 2 кр. *P.* 3 при сухомъ кашлѣ и 2 раза въ д. по 2 кр. *S.* 1. Черезъ 2 дня за тѣмъ вн. *F.* 1 × *P.* 3 × *S.* 1 (2-й ст.) и сух. кр. *P.* 3 и S. 1. Послѣ того черезъ 10 дн. ван. *F.* 2 × *S.* 1 (60 кр. на ван.) по 1 разу въ нед. Къ 20 марта 1885 г. совершенно выздоровѣлъ, и съ 22 марта началъ выходить ежедневно гулять. Для окончанія лѣченія назначено *S.* 1. Во все время лѣченія больного, тѣ же два доктора-аллопата слѣдили за ходомъ болѣзни, и признали фактъ ея излѣченія Электро-Гомеопатіей (*С.*).

Легочная гимнастика. Д-ръ Нимейеръ ее рекомендуетъ для развитія и укрѣпленія легкихъ вообще и для лѣченія разныхъ болѣзней дыхательныхъ органовъ, какъ то коклюша, астмы, воспаленія легкихъ, плеврита, кровохарканія, эмфиземы, бугорчатки, крупа, кашля сухого и мокротнаго. Эта гимнастика заключается въ послѣдовательномъ разъ 20 другъ за другомъ полномъ вдыханіи и удерживаніи выдыханія. Это производятъ въ три пріема: *первый*—руки книзу, ладонями внутрь; *второй*—руки держатся вверхъ вытянутыми и *третій*—сложить руки за затылкомъ. *При каждомъ изъ этихъ трехъ пріемовъ* нужно медленно и спокойно вбирать въ себя свѣжій, чистый воздухъ передъ открытымъ окномъ, въ саду или на балконѣ, *задерживать дыханіе какъ можно дольше* и быстрымъ порывомъ выдыхать. Во время сеанса надо быть не стянутымъ въ груди и животѣ и одѣться по сезону.

Въ періодѣ выздоровленія отъ плеврита или воспаленія легкихъ надо упражняться въ *одностороннемъ глубокомъ вдыханіи*. Для этого здоровая сторона груди обхватывается рукой, и такимъ образомъ останавливается въ своей дѣятельности, выздоравливающая сторона напротивъ провѣтривается при поднятіи руки кверху и заворачиваніи ея на голову. Если пренебречь этимъ упражненіемъ, то сторона, пострадавшая отъ воспаленія, можетъ ввалиться и даже искривиться на задней

Digitized by Google

поверхности; у дѣтей послѣ плеврита такимъ путемъ часто образуются искривленія позвоночнаго столба.

Въ легочной гимнастикѣ надо упражняться ежедневно, не взирая на погоду.

Летаргія. Употребляютъ одно изъ *Scrof.* или одно изъ *Ang.* смотря по темпераменту и на 6 гл. точ., подглаз. и надгл. нерв. соотвѣтствующую Эл.-Гом. жидкость.

Лихорадка. При лихорадкѣ появляются извѣстныя нервныя явленія, именно: *ознобъ и сильное чувство нездоровья.* Кромѣ того бываютъ измѣненія *въ пульсѣ, въ органахъ пищеваренія и отдѣленіяхъ.*

Самые важные припадки доставляютъ наблюденіе надъ *пульсомъ* и надъ *температурою кожи.*

При лихорадкѣ пульсъ бываетъ частый. (См. изслѣдованіе пульса стр. 136).

Повышеніе температуры тѣла при лихорадкѣ составляетъ необходимое ея явленіе. Безъ увеличенія температуры не бываетъ лихорадки; и если жаръ объективно не доказанъ, то ознобъ, недомоганіе, жажда, сухость кожи, учащенное сердцебіеніе не считаются лихорадочными явленіями.

О способѣ измѣренія и значенія разныхъ градусовъ температуры тѣла сказано на стр. 135. Здѣсь же присовокупимъ, что

1) *Колебанія температуры у больныхъ,* при которыхъ ихъ жизнь можетъ продолжаться, находится между 35 и 41,8° Цельз. (28 и 33,4° Реом.).

Высшая, какая только до сихъ поръ наблюдалась *степень температуры,* при которой жизнь еще сохраняется, есть 41,75° Ц. (31,4° Р.), наименьшая 33,5° Ц. (26,8° Р.).

3) *Температура отъ 40 до 41,25°* Ц. (32—33° Р.) *ведетъ больныхъ къ погибели* въ теченіе нѣсколькихъ недѣль, если только она впродолженіи долгаго времени остается равномѣрною. Въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ можетъ оставаться безвредно одна и та же величина вечерней температуры, если только она сопровождается значительными утренними послабленіями. Во всякомъ случаѣ больной при этомъ сильно худѣетъ. Небольшіе приступы лихорадки, появляющіеся только послѣ обѣда или по

Digitized by Google

вечерамъ, мало истощаютъ больного, или развѣ только въ теченіе очень продолжительнаго времени.

Лихорадка оканчивается или мгновенно, съ возвращеніемъ къ нормѣ, или же паденіемъ температуры ниже нормальнаго: *переломъ—кризисъ*, которымъ и прекращается лихорадка; или же температура повышается до самой смерти; или же лихорадка оканчивается постепеннымъ пониженіемъ температуры—*скрытый переломъ—лизисъ*.

Нужно различать лихорадку какъ симптомъ многихъ болѣзней отъ лихорадокъ въ собственномъ смыслѣ этого слова, которыя образуютъ отдѣльный классъ важныхъ болѣзней. Въ первомъ случаѣ нужно опредѣлить болѣзнь, вызвавшую лихорадку и направить лѣченіе противъ главной болѣзни, не заботясь о лихорадкѣ, которая будетъ сопровождать главную болѣзнь до совершеннаго ея излѣченія, но стараться о нѣкоторомъ ослабленіи лихорадки.

Лихорадки подраздѣляются на *перемежающіяся*, *сыпныя* и *воспалительныя* (*тифозныя*).

1. Перемежающіяся лихорадки (Малярія).

Простая перемежающаяся лихорадка это та, которая неминуемо появляется въ тотъ же день или въ тѣ же часы. Состоитъ изъ трехъ послѣдовательныхъ, одна въ другую, смѣнъ: озноба, жара и пота. Впрочемъ, иногда жаръ и ознобъ попеременны или существуютъ одновременно, тогда какъ потъ можетъ быть обильный или нѣтъ, теплый или холодный. Ознобъ можетъ быть сильный или ограничиться простою дрожью. Въ первомъ періодѣ больной щелкаетъ зубами и стонетъ, глаза впадаютъ, его голосъ дрожащій; моча рѣдкая, головная боль, давленіе, частая рвота желчью, пульсъ измѣняющійся и тѣло покрывается синими пятнами. Въ періодѣ жара головная боль усиливается, тогда какъ жажда слабѣетъ, по мѣрѣ уменьшенія давленія, лицо краснѣетъ, моча становится красной, жгучей. Затѣмъ слѣдуетъ потъ, который уничтожаетъ всѣ симптомы первыхъ двухъ періодовъ, послѣ чего больной чувствуетъ себя

Digitized by Google

нѣкоторое время относительно хорошо, но слабъ. Если эти пароксизмы часто возобновляются, кожа принимаетъ желтоватый оттѣнокъ вслѣдствіе болѣзни селезенки, которая при этомъ развивается.

Если пароксизмы повторяются всякій день въ тотъ-же часъ, то лихорадка каждодневная; если черезъ день, то двухдневная и т. д.

Встрѣчаются перемежающіяся лихорадки, при которыхъ пароксизмы неполны; такіе назыв. неправильными.

Необходимо присовокупить, что простая перемежающаяся лихорадка существуетъ какъ симптомъ при другихъ болѣзняхъ: легочная чахотка, хронич. плевритъ, бленоррагія, воспаленіе кишекъ и пр., или же сопровождаетъ значительное нагноеніе.

Злокачественная перемежающаяся лихорадка та, при которой симптомы настолько опасны и теченіе быстро, что она оканчивается смертью при первыхъ пароксизмахъ. То мертвенный цвѣтъ лица, сильный ознобъ, неутолимая жажда, и холодное дыханіе, то, напротивъ, потъ чрезвычайно усиливается. Иногда вдругъ появляются: спячка, бредъ, судороги, нервные припадки, эпилепсія, столбнякъ (у дѣтей), обмороки. Въ другихъ случаяхъ первый періодъ сопровождается жестокою болью въ области сердца, въ желудкѣ, въ животѣ. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ существуютъ обильныя испражненія, часто повторяющіяся, подобныя тѣмъ, которыя наблюдаются при холерѣ или при дизентеріи. Болѣзнь, предоставленная сама себѣ, оканчивается смертью при одномъ изъ первыхъ пароксизмовъ.

Малярія часто влечетъ за собою сильное общее истощеніе (кахексію) организма.

Лѣченіе. При простой перемеж. лихорадкѣ: каждые полчаса 2—5 круп. *S. G.* или по стол. лож. *S. G.* × *S.* 1 и 3 раза въ день по 5 круп. *S.* 1 передъ кушаньемъ. Утр. и веч. втирать въ подреберья мазь *F.* 2. При признакахъ пораженія печени (желтоватая окраска бѣлковъ глазъ, а тѣмъ болѣе—кожи): *S.* 5×*F.* 1 (3, 2-й ст.) и 3 раза въ день по 5 круп. *S.* 1.

Въ періодѣ выздоровленія, также въ упорныхъ случаяхъ давать, какъ промежуточное лѣкарство, *A.* 3 каждые 2 часа по 1—3 круп. сухими, одно это или поперем. съ *C.* 4.

Digitized by Google

Дѣтямъ: кажд. часъ по 1 круп. *S. G.*, а утр. и веч. по 1 круп. *A.* 3. Также *S.* 5 × *F.* 1.

При злокачественной маляріи и при малярійной кахексіи: *A.* 3 × *F.* 1 (или *F.* 2) въ высшихъ разведеніяхъ (отъ 6 до 3 ст.) въ томъ случаѣ, если нервная система очень возбужденная; наоборотъ, въ низкихъ (2, 1-й ст. и до 1 усилен. развед.) при упадкѣ реакціи организма, т. е. общемъ упадкѣ силъ. При нервныхъ боляхъ мѣстныя или общія теплыя ванны съ *F.* 2 и высокія разведенія, также прилож. *Эл. Б.*, *Эл. Кр.* × *Эл. Желт.* или *Эл. Анж.* × *Эл. Зел.* Растираніе всего тѣла водноспиртнымъ растворомъ *F.* 2 и *Эл. Б.*; 3 раза въ день передъ кушаньемъ по 5 круп. *S.* 5, а утр. и веч. по 1—3 круп. *A.* 3 сухими.

При лихорадкѣ вообще аппетитъ отсутствуетъ, малѣйшее обремененіе желудка ее усиливаетъ, а потому пища должна быть легкая и сообразоваться со степенью лихорадки. Жажда утоляется водою, липовымъ цвѣтомъ или бузиною пополамъ съ молокомъ. При ознобѣ и при начинающемся потѣ пить теплое и понемногу, тогда какъ при жарѣ пить свѣжую воду и въ достаточномъ количествѣ. Пить черный кофе противъ рвоты при ознобѣ. Остерегаться сырости и находиться въ умѣренной, но сухой температурѣ; не кушать фруктовъ и рыбы.

Совѣтъ черезъ корреспонденцію.—Ж. 25 л., страдала долгое время перемежающеюся лихорадкой, которая не проходила отъ *F.* 1 вн. и нар. *F.* 2. Вылѣчена въ недѣлю: вн. *F.* 2 (2-й ст.), каждый часъ по 1 сух. круп. *F.* 1 и ван. *F.* 2 (С).

Случаи излѣченій перемежающихся лихорадокъ недавнихъ, застарѣлыхъ и упорныхъ безчисленны (С).

II. Сыпныя лихорадки.

Это тѣ лихорадки, при теченіи которыхъ кожа покрывается характеристическою сыпью. Какъ только сыпь разовьется, лихорадка обыкновенно проходитъ.

Самая важная предосторожность состоитъ въ предохраненіи больного отъ холода и дѣйствія холоднаго воздуха, иначе сыпь

Digitized by Google

можетъ быстро скрыться и произвести большія разстройства, напр. глазъ, груди или головнаго мозга.

Лимфатики, а самое большое субъекты смѣшаннаго темперамента единственные, которые подвержены сыпнымъ лихорадкамъ, лѣченіе которыхъ чрезъ это значительно упрощается.

1. *Корь.* Предвѣстники появляются за 8—13 дней до появленія сыпи. Ребенка начинаетъ знобить, у него является сухой, раздражительный кашель. Уже въ первые 12—24 часа, особенно къ вечеру, жаръ доходитъ иногда до 40°. Признаки: на мягкомъ нёбѣ появляются многочисленныя красныя точки. Насморкъ съ чиханьемъ и водянистыми выдѣленіями изъ носа; давящія боли во лбу; глаза краснѣютъ и слезятся, а по причинѣ свѣтобоязни вѣки смыкаются, нерѣдко грубый и пустой кашель. Вмѣстѣ съ этими явленіями больной чувствуетъ общее недомоганіе, теряетъ аппетитъ, появляется головная боль и безпокойный сонъ. Затѣмъ выступаетъ сыпь. Сыпь начинается сперва на вискахъ, подбородкѣ, лицѣ, на шеѣ и черезъ сутки полторы покрываетъ все тѣло, оставляя нетронутыми лишь нѣкоторыя мѣста кожи. Сыпь состоитъ изъ красныхъ, рѣзко ограниченныхъ пятенъ величиною въ чечевицу, или изъ мелкихъ красныхъ точекъ. Пятна или сидятъ отдѣльно, или сливаются вмѣстѣ, образуя полулунныя фигуры. Затѣмъ наступаетъ шелушеніе, въ видѣ мелкихъ отрубевидныхъ чешуекъ. Отъ появленія сыпи до полнаго выздоровленія проходитъ около 14 дней. Болѣзнь эта весьма заразительна уже тогда, когда существуетъ несильный насморкъ и слезотеченіе. Носовые платки больныхъ должно тщательно оберегать отъ прикосновенія къ нимъ здоровыхъ дѣтей. Сперва прервать лихорадку вн. *F. 1* (2—3-й ст.), на подвзд. *F.* 2 въ компр. Если черезъ 24 часа нѣтъ улучшенія или очень мало и корь уже образовалась, тогда вн. *S.* 1 (1-й ст.), не много *F.* 1 (2—3-й ст.) и на подвзд. *F.* 2. При сильной лихорадкѣ, спячкѣ, бредѣ или конвульсіяхъ—на голову большія прим. *C. 5* (15 кр.), мѣнять ихъ каждыя 5 минутъ и вн. каждые полчаса по 5 сух. кр. *S. 1.* Затѣмъ *S. 1* въ средней дозѣ по чайной ложкѣ черезъ 5 минутъ. Время отъ времени, но не часто, одну чайн. л.

Digitized by Google

F. 1 изъ 3-го ст. На зат., перенос., виски и подошвы ногъ *Эл. Кр.* На темя *Эл. Бѣл.*

При малѣйшемъ улучшеніи давать *S.* 1 (1-й ст.), чтобы оно не препятствовало образованію сыпи, и продолжать его не только до излѣченія, но еще въ продолженіи 2—3 недѣль, до совершеннаго прекращенія кашля. Тоже *S.* 1, съ помощію *Эл. Кр.*, уничтожаетъ послѣдствіе кори со стороны глазъ, груди или ушей. Если оно не дѣйствуетъ, то его замѣняютъ *S.* 5. Скрывшаяся сыпь вызывается и вылѣчивается однимъ *S.* 1.

Кромѣ скрывшейся сыпи могутъ оказаться еще слѣдующія осложненія: конвульсіи у очень маленькихъ дѣтей, воспаленіе легкихъ, легочная бугорчатка, язвы во рту съ нагноеніемъ, поносъ, заболѣваніе глазъ и ушей.

— Грудной ребенокъ 2 мѣсяцевъ заболѣлъ корью, сыпь выступила на нижнихъ конечностяхъ. Вылѣченъ въ 2 недѣли. Кормилицѣ вн. *S.* 1, *F.* 1 и *C.* 1 (1-й ст.), мазь на сыпь изъ 10 кр. *S.* 1 или 5 на унцію вазелина, ребенку на 6 гл. точ. *Эл. Анж.* (*C.*).

2. *Скарлатина.* Предвѣстники: рѣзкій приступъ озноба, за которымъ слѣдуетъ жаръ (39,5—40,5°) и учащеніе пульса до 120 ударовъ въ минуту. Въ то же время появляется сильная головная боль, потеря аппетита, особенно *рвота*; языкъ обложенъ; иногда бредъ и конвульсіи; *боли въ горлѣ*, *краснота зѣва*, *затрудненное глотаніе.* Предвѣстники эти продолжаются 1—3 дня, послѣ чего наступаетъ высыпаніе. *Сыпь* появляется сперва на шеѣ и верхней части груди въ видѣ плоскихъ, большихъ ярко-красныхъ пятенъ. Они распространяются на слегка *опухшее* лицо, по всему тѣлу и на сочлененія въ особенности на яхъ сгибательныя поверхности. Съ перваго взгляда пятна кажутся гладкими, но при внимательномъ осмотрѣ на нихъ можно замѣтить множество остро-выдающихся прыщиковъ. *Кожа имѣетъ такой видъ, какъ будто по ней провели полосами малиновымъ сокомъ*; *она очень жгуча и суха.* Жажда сильная, больной пьетъ много, а мочи выдѣляется мало и очень

Digitized by Google

краснаго цвѣта. Языкъ усѣянъ красными крапинками—*малиновый языкъ*. Когда сыпь *цвѣтетъ* (около 3—4 дней), всѣ вышепоименованные припадки очень сильны. Затѣмъ въ продолженіи 8—20 дней происходитъ шелушеніе, послѣ чего больной выздоравливаетъ, но *склоненъ къ простудѣ*. Болѣзнь длится около мѣсяца и чрезвычайно заразительна. Скарлатина распознается отъ кори тѣмъ, что при образованіи ея не существуютъ ни слезотеченіе, ни насморкъ, ни кашель, какъ при кори; кромѣ того, скарлатина сопровождается почти всегда довольно сильною болью въ горлѣ, внутренность рта ярко-красная, тогда какъ корь рѣдко сопровождается горловою болью и внутренность рта не представляетъ этого ярко-краснаго цвѣта; наконецъ высыпаніе при кори неправильно ни по своей формѣ, ни по своему цвѣту, тогда какъ при скарлатинѣ высыпаніе происходитъ правильными точками и цвѣта болѣе ярко-краснаго, чѣмъ при кори. Излишне говорить, что если сыпь при скарлатинѣ образовалась малиноваго цвѣта, то ошибка невозможна.

Скарлатина нерѣдко осложняется воспаленіемъ легкихъ и оболочекъ мозга, дифтеритическимъ пораженіемъ горла, воспаленіемъ железъ и средняго уха, чаще всего воспаленіемъ почекъ. Послѣднее является на 3—4 недѣлѣ болѣзни и весьма важно заблаговременное распознаніе его; для этой цѣли слѣдуетъ въ эту пору болѣзни ежедневно кипятить въ спеціальной пробиркѣ или въ столовой ложкѣ мочу. Пока моча при кипяченіи чиста, то почки здоровы, если же въ ней является муть, не исчезающая отъ прибавленія 1—2 капель уксусной эссенціи, то это бѣлокъ, указывающій на воспаленіе почекъ. Осложненія лѣчить соотвѣтствующимъ образомъ.

Какъ предохранительное средство во время скарлатинной эпидеміи вн. 4 раза въ день по 4 сух. кр. *S.* 1, также *S.* 1 изъ 1-го ст.

При нормальномъ теченіи болѣзни сперва прервать лихорадку вн. *F.* 1 (2—3-й ст.), на подвзд. мазь, компр: *F.* 2 (10—15 кр. на ст. воды или унцію вазелина). Если не поможетъ и предполагаютъ какую нибудь сыпную лихорадку, то

Digitized by Google

какъ и во всѣхъ подобныхъ случаяхъ, вн. *S.* 1 (1-й ст.) × *A.* 1 (2-й ст.) × *F.* 1 (2—3-й ст.) по $^1/_2$ ст. въ день каждаго и на подвзд. *F.* 2. Если образовалась сыпь и болѣзнь опредѣлилась, то $^1/_4$ ст. въ день *F.* 1 (1-й ст.) × $^3/_4$ ст. въ день *S.* 1 изъ 1-го ст., на подвзд. *F.* 2. При сильной лихорадкѣ *F.* 1 давать изъ 2-го или 3-го ст. Затѣмъ, какъ только начнется шелушеніе и лихорадка пройдетъ, то *S.* 1 изъ 1-го ст., утр. и веч. по 4 сух. кр. *S.* 1. Если преобладаютъ желудочныя разстройства: позывъ на рвоту, бѣлый языкъ, отсутствіе аппетита, безсонница, недостаточный сонъ и пр., то въ день по $^1/_2$ ст. *S.* 1 (1-й ст.) × *F.* 1 (1-й, 2-й ст.), мазь на подвзд. *F.* 2, къ симп. нер. *Эл. Кр.* или *Анж.*

Если горловая боль усиливается, объемъ миндалевидныхъ железъ увеличивается и лимфатическія железы на шеѣ тверды, то прибавляютъ полосканіе изъ 20 кр. *S.* 5 и мазь на шею изъ 20 кр. *S.* 5. Когда затвердѣніе лимфатическихъ железъ на шеѣ образуется быстро, тогда принимать *S.* 1 въ средней дозѣ или изъ 2-го ст., но обращать вниманіе, чтобы черезъ эту слабую дозу не скрылась сыпь. Когда железы нагнаиваются, то *S.* 1 замѣняютъ *C.* 1 изъ 1-го ст.

Только черезъ мѣсяцъ по выздоровленіи больной можетъ безъ опасности для товарищей войти въ ихъ общество.

Измѣненіе. Скарлатина у дѣв. вылѣчена *F.* 1 (средняя доза), лихорадка черезъ сутки совершенно прекратилась, но *F.* давали еще два дня, затѣмъ его замѣнили *S.* 5 (2 кр. на литръ воды), которое она принимала 10 дней. Шелушеніе было неправильно: кожица отдѣлялась въ видѣ ремней шириною въ нѣсколько сантиметровъ.

3. *Оспа* (Variola). Предвѣстники ея: лихорадка, желудочныя разстройства (рвота) и недомоганіе большею частію за 3—4 дня; боль въ поясницѣ и спинѣ или боль подъ ложечкой, ощущеніе растягиванія и ломоты въ суставахъ. Болѣзнь начинается сильнымъ ознобомъ, сильною головною болью, головокруженіемъ, состояніемъ оглушенія, наклонностію къ обморокамъ, ночью бредомъ.

Черезъ 2—3 дня показывается *сыпь*, и лихорадка ис-

Digitized by Google

чезаетъ. Настоящая оспенная сыпь [1])—*ярко-краснаго цвѣта* и состоитъ изъ разсѣянныхъ или густо сидящихъ узелковъ или пятенъ, едва выдающихся. Появляясь *на лицѣ*, она мало помалу расходится по другимъ частямъ тѣла. Черезъ два дня узелки подымаются въ пузырьки съ вдавленіемъ по срединѣ. Въ теченіе 9—11 дней они нагнаиваются, затѣмъ подсыхаютъ, превращаются въ струпья буроватаго цвѣта и спадаютъ. Этимъ болѣзнь заканчивается; она протекаетъ въ 3—4 недѣли.

Ухаживающіе за больнымъ должны какъ можно дальше быть отъ здоровыхъ дѣтей. Дыханіе, выдѣленія и бѣлье больныхъ очень заразительны. Для уничтоженія заразительности употреблять дезинфекціонную жидкость, мыло и порошокъ Джейса или растворъ марганцовокислаго кали.

Оспа можетъ осложняться кровью или скарлатиной, вслѣдствіе чего теченіе болѣзни будетъ ненормальное. Чрезмѣрное размноженіе пустулъ можетъ повлечь за собою сильное воспаленіе гортани или гнойное воспаленіе глазъ. Кровотеченія (осложненіе довольно частое) могутъ показаться начиная со втораго дня, иногда черезъ кожу, иногда естественнымъ путемъ.

Какъ послѣдствія оспы встрѣчаются воспаленія: легкихъ, бронховъ, плевры, околосердечной сумки, почекъ, рта, ушей (иногда гнойное) и крупъ; гораздо рѣже антоновъ огонь и водяная.

При подсыханіи пустулы могутъ исчезнуть вдругъ, и если это исчезновеніе сопровождается ознобомъ, оцѣпенѣніемъ, бредомъ, поносомъ, или же языкъ будетъ черный, сухой, скорченный, то это указываетъ на большую опасность вслѣдствіе гнойнаго всасыванія.

Лѣченіе при нормальномъ теченіи болѣзни. Пока болѣзнь не опредѣлилась, давать противъ лихорадки *F.* 1 (1-й—2-й ст.), на подвзд. мазь *F.* 2, также *S.* 1 (1-й ст.). При появ-

---

[1]) Слѣдуетъ замѣтить, что еще раньше показывается такъ наз. *предвѣщательная сыпь.* Она имѣетъ видъ укусовъ блохи и занимаетъ отдѣльныя мѣста: нижнюю половину живота, внутреннюю поверхность бедра, подошвы, вокругъ задняго прохода.

Digitized by Google

ленія сыпи, при нагноеніи, а также если представляется надобность уничтожить опасные симптомы, являющіеся при подсыханіи пустулъ,—вн. по $^1/_3$ ст. въ день *A.* 1 (2-й ст.) × *S.* 1 × *C.* 1 (1-й ст.), утр. и веч. по 10 сух. кр. *S.* 1, на подвзд. мазь *F.* 2 и нѣсколько чайн. ложекъ *F.* 1 изъ 3-го ст. При образованіи пустулъ: *A.* 3 × *C.* 5 × *F.* 1 и 3 раза въ день по 5 круп. сух. *S.* 1.

Пустулы можно обмывать губкою, смоченною въ тепловатомъ растворѣ *C.* 5.

Ненормальное теченіе. Если оспа осложняется корью или скарлатиною, то назначается то же самое лѣченіе; противъ же поноса—мазь на животъ или клистиры *C.* 5 (15 кр.). При кровотеченіи изо рта, носа, задняго прохода, мочевого канала, или же если сами пустулы наполнились кровью, то вн. $^1/_4$ ст. въ день *A.* 1 (2—3-й ст.) × *C.* 1 × *F.* 1 изъ 1-го ст. по $^1/_2$ ст. въ день каждаго, одно послѣ другаго по чайн. ложкѣ, на подвзд. *F.* 2.

Противъ упорной лихорадки ван. *F.* 2; при сильной головной боли съ бредомъ—на голову прим. *C.* 5 и сверху пузырь со льдомъ; при пораженіи полости рта и зѣва и трудномъ глотаніи полосканіе *S.* 5 × *C.* 5.

По наблюденіямъ Шведскихъ врачей *лучи солнечнаго свѣта* являются главною причиною образованія *яминъ на лицѣ* оспенныхъ больныхъ. Для предупрежденія образованія этихъ яминъ въ Швеціи *завѣшиваютъ всѣ окна* въ комнатѣ больного *красными занавѣсками;* при такой предосторожности на лицѣ больного не останется никакихъ оспенныхъ слѣдовъ.

Противъ болѣзней, точно опредѣленныхъ, которыя осложняютъ оспу, или слѣдуютъ за нею, назначается лѣченіе имъ соотвѣтствующее. Кашель лѣчится *S.* 1 если только онъ не сопровождается потомъ, прогрессивною худобою, зеленою мокротою и болью въ груди (см. *легочная чахотка*).

Больного можно пустить въ общество товарищей только послѣ третьяго купанья, когда отъ струпьевъ не остается ни малѣйшаго слѣда.

4. *Крапивная сыпь* (*Urticaria*) сопровождается иногда ли-

Digitized by Google

хорадкою; если лихорадка существуетъ, больной жалуется на боль въ желудкѣ. Сыпь появляется на туловищѣ, лицѣ и конечностяхъ въ видѣ волдырей, величиною отъ чечевичнаго зерна до ладони. Окружность волдырей красная, а въ центрѣ они болѣе свѣтлы, причиняютъ зудъ и жженіе. Обыкновенно эта сыпь продолжается только нѣсколько часовъ, появляется неправильно, то въ одномъ мѣстѣ, то въ другомъ, затѣмъ исчезаетъ и остается на кожѣ чешуйчатый знакъ, съ исчезновеніемъ сыпи усиливаются желудочныя разстройства. Иногда болѣзнь продолжается 7—9 дней. При лихорадкѣ *F.* 1 (2-й ст.) × *S.* 1 (1-й ст.); если лихорадка прекратилась, то *S.* 1 (1-й ст.) и утр. и веч. по 4 сух. кр. *S.* 1.

5. *Пятнистая* или *стекловидная сыпь (Roseola).* Вначалѣ часто лихорадка или недомоганіе; затѣмъ появляется сыпь, состоящая изъ неправильныхъ круглыхъ пятенъ блѣдно-розовыхъ или цвѣта краснаго болѣе или менѣе темнаго, принимающихъ форму кольца, въ центрѣ котораго кожа остается не тронутою. Эти пятна шире, но въ меньшемъ количествѣ, чѣмъ при кори: они существуютъ не болѣе 24 часовъ, образуются только на одной части или по всему тѣлу, сопровождаются зудомъ въ кожѣ, и часто легкою болью въ горлѣ, что доказываетъ, что они образуются на слизистой оболочкѣ пищепровода.

Многіе доктора признаютъ эту сыпь за эритему или корь. Вн. при недомоганіи, но безъ лихорадки *S.* 1 (1-й ст.), который продолжать принимать день или два послѣ прекращенія сыпи; при лихорадкѣ *F.* 1 (3-й ст.)., на подвзд. *F.* 2, при появленіи сыпи *S.* 1 (1-й ст.) × *F.* 1 (3-й ст.) × *A.* 1 (2-й ст.).

6. *Сыпная лихорадка, просообразная сыпь* (Miliaria) состоитъ изъ очень маленькихъ возвышенностей, какъ просяное зерно на красномъ пятнѣ, существуетъ самостоятельно, или же осложняетъ прочія сыпныя лихорадки, въ особенности скарлатину. Она бываетъ у женщинъ во время родовъ, но безъ потѣнія. Быстро проходитъ отъ *S.* 1 (1-й ст.).

7. *Краснуха* отличается отъ кори тѣмъ, что лихорадочное состояніе при ней никогда не бываетъ выше 38° Ц.; кашель

Digitized by Google

бываетъ, но незначительный; насморкъ, воспаленіе глазъ, всегда сопровождающіе корь, здѣсь отсутствуютъ, наконецъ самая сыпь держится очень короткое время—день, самое большое два дня. У нея есть свой своеобразный запахъ, схожій съ запахомъ рыбы. Вн. *S.* 1 (1-й ст.) × *F.* 1 (3-й ст.).

8. *Вѣтряная оспа.* Послѣ небольшого и непродолжительнаго лихорадочнаго состоянія появляются по тѣлу разсѣянные водянистые пузырьки, которые быстро подсыхаютъ отъ *S.* 1 × *F.* 1 (1-й ст.).

III. Тифозная лихорадка (Тифъ).

Болѣзнь начинается вдругъ или имѣетъ періодъ предвѣстниковъ. Въ послѣднемъ случаѣ болѣзнь обнаруживается головною болью, разбитостію, грустное выраженіе лица, трудность мыслить и соображать, усталость, недомоганіе, боль въ членахъ, сильная слабость, потеря аппетита; иногда кровотеченіе изъ носа, колики и поносъ. Если болѣзнь начинается вдругъ, то появляется сильная дрожь, жажда, нѣсколько жидкихъ испражненій и боль въ животѣ.

Тифозная лихорадка представляетъ три различныхъ періода, и кромѣ того бываютъ разновидности.

Первый періодъ. Головная боль значительно усиливается; бываютъ кошмары (давленіе во снѣ), галлюцинаціи, помраченіе, головокруженіе, кровотеченіе изъ носа, шумъ въ ушахъ, значительная слабость, слабость памяти, равнодушіе, бредъ, упорная спячка, постепенно усиливающаяся, изъ которой трудно вывести больного. Черты лица измѣняются, выражаютъ упадокъ силъ, грусть; тупой взглядъ; полное отсутствіе аппетита; языкъ бѣлый, сухой и прилипаетъ къ пальцу при дотрагиваніи; затѣмъ слѣдуетъ запоръ или поносъ; зеленоватыя рвоты и воспаленіе селезенки. Животъ при давленіи натянутъ, немного вздутъ, болѣзненъ въ особенности у пупка и въ правомъ боку, въ которомъ замѣчается бурчаніе или переливаніе жидкости. Почти у всѣхъ больныхъ появляются на животѣ или на груди съ 6-го на 10-й день круглыя розовыя пятна,

Digitized by Google

приблизительно въ два миллиметра въ діаметрѣ, которыя мгновенно исчезаютъ отъ давленія пальцемъ.

Второй періодъ. Черезъ 8 дней головная боль слабѣетъ, но прочіе симптомы усиливаются; оцѣпенѣніе удваивается, взглядъ пристальный, неподвижный; шумъ въ ушахъ переходитъ въ глухоту; бредъ то легкій, то неистовый со спячкою, въ особенности ночью; слабость усиливается; зрѣніе мутное; испражненія черныя, вонючія, непроизвольныя, иногда съ кровью; зубы сухіе покрытые точно такъ же, какъ и губы и ноздри, налетомъ сѣрымъ, темнымъ или чернымъ; языкъ скорченъ, то красный, покрытъ корою, то истрескавшійся, то черноватый, толстый, дрожащій, больной съ трудомъ его высовываетъ. Изслѣдованіе языка показываетъ красноту, воспаленіе, разрывы, нагноеніе, сгущеніе и пятна, что производитъ измѣненіе голоса и трудное глотаніе. Моча рѣдкая и темная; кожа горячая, сухая; члены дрожатъ и даже бываютъ конвульсіи. Иногда образуется струпъ на сочлененіяхъ.

Третій періодъ. Видоизмѣненіе болѣзни въ этомъ періодѣ предвѣщаетъ исходъ благопріятный или гибельный. Если всѣ симптомы второго періода усиливаются, черты лица измѣняются, выраженіе лица мертвенное, рѣчь непонятная, затрудненное дыханіе и спячка усиливаются, то опасность очевидна. Но чтобы не допустить до такого состоянія, нужно немедленно примѣнить электро-гомеопатію, которая отстранитъ опасность и ускоритъ выздоровленіе. Отъ примѣненія ея бредъ замѣняется тихимъ и спокойнымъ сномъ, языкъ очищается, становится влажнымъ, лихорадка проходитъ, животъ уменьшается въ объемѣ и больной можетъ удерживаться отъ непроизвольныхъ испражненій.

Существуютъ пять главныхъ разновидностей въ этой болѣзни.

Скрытая форма или *тифоидъ*, при чемъ лихорадка незначительна, но сопровождается общею слабостію, оцѣпенѣніемъ, спячкою, бредомъ, языкъ сухъ, покрытъ корою, небольшой поносъ и проч. Но всѣ эти симптомы слабо выражены.

Форма желчная. Горькій вкусъ, желтизна лица, желчныя

Digitized by Google

испражненія и рвоты, языкъ покрытъ желтымъ и грязнымъ налетомъ.

Форма воспалительная. Здѣсь лихорадка представляетъ выдающійся симптомъ: сильный жаръ, сухость кожи, сильная головная боль, сильная жажда, болѣзненные члены, головокруженіе (помраченіе сознанія), моча скудная и красная. Эта форма, а также и предъидущая легко переходятъ въ тифоидъ разслабляющій.

Форма разслабляющая. Ей предшествуетъ одна изъ двухъ формъ и сопровождается: спячкой, бредомъ, полнымъ упадкомъ силъ, вонючими испражненіями, холодѣніемъ конечностей; губы и языкъ темные или черные, раны на поверхности тѣла и кровотеченіе изъ носа или изъ задняго прохода.

Послѣдняя форма—нервная горячка. При ней преобладаютъ бредъ, судороги, вздрагиванія членовъ и проч. Температура значительно повышена, но лицо и руки слегка холодны. Пульсъ весьма ускоренный, то умѣренный и съ двойнымъ ударомъ, то малый; увеличенный потъ, моча и испражненія непроизвольныя.

Тифозная лихорадка можетъ осложняться прободеніемъ кишекъ, воспаленіемъ мозга, брюшины, желудка, легкихъ, мускуловъ, ушей, околоушной железы и пр.; также рожей, скарлатиной, корью, крапивною сыпью и антоновымъ огнемъ.

Лѣченіе. Прежде всего приводимъ общее лѣченіе для болѣе легкихъ формъ тифа. Для болѣе же тяжелыхъ тифозныхъ заболѣваній и вполнѣ выраженныхъ лѣченіе приводится ниже.

Простой тифъ, безъ симптомовъ разслабляющихъ, лѣчится вн. *F.* 1 (2-й или 3-й ст.), на подвзд. мазь *F.* 2, попер. съ мазью *C.* 5, на 6 гл. точекъ *Эл. Кр.*, на животъ мазь *C.* 5.

Какъ только лихорадка пройдетъ, наступитъ выздоровленіе, и больной будетъ жаловаться на одну слабость, то вн. *S.* 1 изъ 1-го ст. и три стол. ложки въ день раствора изъ 50 круп. *S.* 1 на литръ краснаго вина. Сангвиникамъ и лимфатико-сангвиникамъ по $^1/_2$ ст. въ день *S.* 1 (1-й ст.) × *A.* 1 (2-й ст.).

Черезъ день или два аппетитъ возвращается въ такой степени, что прежнее отсутствіе аппетита переходитъ въ обжорство, и силы день ото дня возстановляются.

Digitized by Google

Множество излѣченій было достигнуто этимъ простымъ способомъ, который приводитъ къ благопріятному исходу тифа, если представилась возможность его прервать въ самомъ его началѣ.

При желтизнѣ лица, желчныхъ испражненіяхъ и рвотѣ, горькомъ вкусѣ, желтомъ и грязномъ налетѣ на языкѣ вн. *F.* 1 (2-й ст.), на подвзд. мазь *F.* 2, которыя продолжать еще нѣкоторое время послѣ прекращенія лихорадки.

По прекращеніи всѣхъ лихорадочныхъ явленій продолжать вн. *F.* 1 (2-й ст.) × *S.* 1 (1-й ст.) въ продолженіи мѣсяца; и лѣченіе заканчивается *S.* 1 изъ 1-го ст.

Если, несмотря на то, что болѣзнь была прервана въ началѣ, тифъ усиливается и являются разслабляющіе симптомы (что весьма рѣдко), то все-таки лѣченіе Электро-Гомеопатіей побѣждаетъ болѣзнь въ большинствѣ случаевъ. Но тогда даютъ *F.* 1 изъ 3-го ст. въ малыхъ и частыхъ пріемахъ, на подвзд. *F.* 2.

Но какъ только губы почернѣютъ, образуется нагноеніе, лицо приметъ видъ мертвенный, дыханіе станетъ вонючее и явятся непроизвольныя испражненія, тогда вн. 5 сух. круп. *Verm.*, $^1/_2$ ст. въ день *C.* 1 изъ 2-го ст. × $^2/_3$ ст. въ день *F.* 1 изъ 3-го ст., на подвзд. мазь *F.* 2 и на животъ мазь *C.* 5.

Если появится кровотеченіе изъ носа или изъ задняго прохода, тогда вн. утр. и веч. по 3 сух. кр. *Verm.* и *C.* 1 (2-й ст.) × *F.* 1 и *A.* 1 (3-й ст.) по $^1/_3$ ст. каждаго лѣкарства въ день по чайной ложкѣ черезъ 5 минутъ, одно послѣ второго и третьяго попеременно. Наружно предъидущія средства.

Противъ утомительнаго кашля вн. каждый часъ по 1 сух. кр. *P.* 1 попер. съ растворами тѣхъ же лѣкарствъ.

Противъ сыпи въ заднемъ проходѣ, на локтяхъ и прочихъ мѣстахъ мазь изъ 20 кр. *C.* 5 на унцію свѣчного сала, растопленнаго на легкомъ огнѣ. Иногда послѣ тифа у лимфатиковъ образуется заушница, а у сангвиниковъ и лимфатико-сангвиниковъ является безпрерывное образованіе чирьевъ. Заушница лѣчится *C.* 1 (средняя доза) и мазью *C.* 5 (20 кр.), и лѣченіе заканчивается *S.* 1 изъ 1-го ст. Противъ чирьевъ *A.* 1 (2-й или 3-й ст.).

Digitized by Google

Если скроется сыпь, то вн. *S.* 1 (1-й ст.), или 2 круп *S.* 1 на стаканъ воды по чайной ложкѣ каждыя 5—10 мин. или каждые 2—3 часа по 20 сух. кр. *S.* 1, пока не подѣйствуетъ, а по появленіи сыпи *S.* 1 изъ 1-го ст.

Если скрывшаяся сыпь повліяетъ дурно на легкія или явится одышка, то на сплет. и симп. нер. *Эл. Кр.*

Противъ запора или поноса клистиры *C.* 5 (20 кр. на ст.), на животъ и подвзд. мазь *C.* 5; противъ бреда и спячки компр. *C.* 5 (20 кр.) на голову, которые чаще мѣнять, а на зат. и виски *Эл. Кр.*

Противъ появленія ложныхъ перепонокъ въ гортани, образующихъ какъ бы крупъ, кашель и хриплый голосъ вн. каждыя 5 мин. по 5 сух. кр. *S.* 1, полоск. изъ 1 чайн. ложки *Эл. Кр.* на стак. воды и компр. изъ *Эл. Кр.* безъ воды на шею отъ одного уха до другого.

При образованіи во рту афтъ—полоск. изъ 20 кр. *S.* 1 и вн. $^3/_4$ ст. *S.* 1 изъ 1-го ст. попер. съ $^1/_4$ ст. въ день *C.* 1 въ средней дозѣ; но если афты нагнаиваются, появляется вонючее дыханіе, или угрожаетъ антоновъ огонь, то вн. $^1/_4$ ст. въ день *S.* 1 (1-й ст.) попер. съ цѣлымъ стак. *C.* 1 въ средней дозѣ.

Противъ отека, который часто случается при выздоравливаніи вн. *S.* 1 (1-й ст.) или по $^1/_2$ ст. въ день *S.* 1 × *F.* 1 (1-й ст.); для лимфатико-сангвиниковъ по $^1/_2$ ст. въ день *S.* 1 (1-й ст.) × *A.* 1 (2-й ст.). Въ упорн. случаѣ *S.* 1 или *A.* 1 замѣняютъ *C.* 1 и ван. *C.* 5 попер. съ *A.* 2.

Когда *S.* 1 и *C.* 1 не произведутъ ожидаемаго дѣйствія, что случается очень рѣдко, то ихъ замѣняютъ *S.* 2, *C.* 2, *S.* 5, *C.* 5 и *L.*

Когда лихорадка не уступаетъ *F.* 1, то его замѣняютъ *F.* 2 (2-й ст.) и примѣняютъ клистиры *F.* 1 или *F.* 2.

При существованіи лихорадки пища должна быть легкая. Жажду можно утолять прохладительными лимонадами, но не кислыми. Больной не долженъ находиться при сильномъ освѣщеніи и сквозномъ вѣтрѣ, комната должна имѣть тепла +15° Р., чаще ее провѣтривать, дезинфекцировать и чаще перемѣнять больному всю постель. Внимательно слѣдить за выздоровле-

Digitized by Google

ніемъ и быть очень осторожнымъ съ пищей. Являющійся въ это время сильный голодъ не долженъ удовлетворяться вполнѣ втеченіе еще 3—4 недѣль, изъ опасенія возврата болѣзни. Мясной бульонъ, телятину и домашнюю птицу можно употреблять, если общее состояніе здоровья это допускаетъ. Моча должна служить руководителемъ, но только изслѣдованіе ночной мочи можетъ служить вѣрнымъ указаніемъ. Пока моча красная, соблюдать строгую діэту. Если моча становится блѣдной, слегка мутной съ незначительнымъ осадкомъ, то больному давать болѣе пищи. Но если блѣдная моча съ значительнымъ осадкомъ, то нужна умѣренность въ пищѣ.

Выздоровленіе становится вѣрнымъ, какъ только осадокъ въ мочѣ будетъ песчаный и начнетъ уменьшаться. Тогда больной можетъ употреблять жареное мясо, супы и для питья красное вино пополамъ съ водою.

Лѣченіе болѣе тяжелыхъ и рѣзко выраженныхъ тифозныхъ заболѣваній.

Такія заболѣванія отличаются явно-преобладающими признаками разстройства однихъ и другихъ органовъ, поэтому въ практическомъ отношеніи различаютъ тифъ брюшной, легочный, мозговой, сыпной и возвратный.

Брюшной тифъ: при общихъ тифозныхъ явленіяхъ выступаютъ особенно рѣзко брюшные симптомы, наприм. поносъ, вздутіе живота, наклонность къ образованію нарывовъ, пролежней, и кровотеченіямъ изъ кишекъ. Вн. *A.* 1 × *C.* 1 × *F.* 1 (3-й стак.) и черезъ 2 часа по 1 круп. *C.* 5 и 2—3 раза въ день съ пищей 2 круп. *S. G.* На животъ *Эл. Б.* и холодные, позднѣе—согрѣвающіе компрессы изъ *A.* 2 и *C.* 5 или *S.* 5.

При легочномъ тифѣ—осложненіе болѣзни угрожающими явленіями со стороны органовъ дыханія. Вн. *A.* 1 × *P.* 1 × *F.* 1 (3-й ст.) и черезъ каждые 2 часа 1—3 круп. *P.* 2 и съ каждымъ пріемомъ пищи 1—2 круп. *S. G.*

При мозговомъ тифѣ. Лицо красное, глаза имѣютъ особенно рѣзкій блескъ, бредъ необычайно сильный, больной пы-

Digitized by Google

тается все бѣжать и т. п. Внутрь: *A.* 1 × *C.* 1 × *F.* 1 (6-й, 5-й ст. или литровая доза, т. е. 1 круп. въ литрѣ воды) черезъ 15—10 мин. по чайн. лож. и кажд. 2 часа по 1 круп. *A.* 1. На голову холодные компрессы, смѣняемые черезъ кажд. 10—15 мин., изъ раствора 10 круп. *A.* 2 и по 20 круп. *S.* 5 и *C.* 5 и чайн. лож. *Эл. Б.* въ 4 стаканахъ воды. Нѣсколько разъ въ день съ пищей по 1 круп. *S.* 1 или *S. G.* съ 1 капл. *Эл. Анж.*

Сыпной тифъ въ Россіи, особенно въ голодные годы, очень частъ (*голодный тифъ*). Теченіе болѣзни очень тяжелое и часто кончается смертью. Бредъ сильный имѣется уже съ самаго начала и между 3 и 6 днями выступаетъ характерная сыпь по всему тѣлу.

Внутрь: *A.* 1 × *F.* 1 (3-й ст. до 1-го ст.), 3 раза въ день по 5 круп. *S.* 1 или *S. G.* Холодные компрессы на голову. При температурѣ 40° Ц. и выше общая тепловатая ванна съ 100 круп. *F.* 2.

Возвратный тифъ. Тифозныя явленія держатся 5—8 дней, затѣмъ быстро исчезаютъ, и является состояніе какъ бы выздоровленія, но спустя столько же дней является опять взрывъ болѣзни по прежнему, и такъ можетъ повториться 3—4 раза, но больной все болѣе ослабѣваетъ и въ одинъ изъ взрывовъ болѣзни можетъ и умереть. Внутрь давать *A.* 1 × *C.* 5 × *F.* 1 или *F.* 2 въ литровой дозѣ (1 круп. въ 4 стак. воды) или 3-й—2-й стак. и 3—4 раза въ день по 5 круп. *S.* 1 или *S. G.* Въ промежуточное между припадками время давать эти же лѣкарства, но изъ 1-го ст. или 1-го усиленнаго разведенія, а утромъ и веч. по 10—20 круп. *F.* 1 или *F.* 2 съ 20—50 капл. *Эл. Бѣл.* Діэта какъ выше сказано. Тепловатыя ванны изъ *F.* 2.

Лицо. Лицомъ называется та часть головы, которая лежитъ впереди, ниже черепа, и ограничивается кверху бровными дугами, книзу нижнею челюстью, съ боковъ ушами. Впрочемъ, неанатомически принято причислять къ лицу и лобъ. Костный остовъ лица образуется 14-ю лицевыми костями, изъ которыхъ 13 соединены между собою неподвижно, а 14-я ниж-

Digitized by Google

няя имѣетъ сочлененіе съ височными костями, какъ разъ передъ ушами. Въ этомъ нижнечелюстномъ сочлененіи нижнюю челюсть двигаютъ жевательныя мышцы. Костныя полости лица заключаютъ въ себѣ органы внѣшнихъ чувствъ, именно: *двѣ глазныя полости*—органъ зрѣнія, *носовую полость*—органъ обонянія, *полость рта*—органъ вкуса. Кромѣ того, полости рта и носа служатъ входомъ во вдыхательный и пищеварительный аппараты и выходомъ для аппаратовъ дыханія и рѣчи. Въ кожѣ и мышцахъ лица распространяются многочисленные нервы и сосуды. Личныя мышцы при помощи нервовъ находятся въ тѣсной связи съ головнымъ мозгомъ и управляютъ движеніями отверстій глазъ, рта, носа, ушей, подбородка, кожи, лба и темени.

Цвѣтъ лица и его показанія. *Ярко-красный* цвѣтъ лица указываетъ на приливъ крови въ головѣ или полнокровіе. *Блѣдный*, матовый, *мертвенно-блѣдный* у дѣвицъ—на блѣдную немочь. *Блѣдно-желтый*—болѣзнь кишекъ. *Темно-желтый*—желтуху, или на органическую болѣзнь печени. *Краснота лица* въ видѣ пятенъ, мѣстный румянецъ на щекахъ—на бугорчатку легкихъ. *Синебагровыя пятна* въ преклонномъ возрастѣ—на близость апоплексіи, вообще эти пятна указываютъ на гнилостное состояніе крови. *Синій* или *багровый цвѣтъ*—на органическій порокъ сердца. *Соломенно-желтый* (пергаметный)—на раковое худосочіе.

Болѣзни лица.

Невральгія тройничнаго нерва, личная боль (*Tic douloureux*). Симптомы: на области развѣтвленій одной изъ двухъ, рѣдко трехъ, вѣтвей тройничнаго нерва, являются въ видѣ припадка чрезвычайно сильныя боли, какъ бы пробѣгающія по нервнымъ развѣтвленіямъ съ быстротою молніи. Припадки эти бываютъ разной продолжительности; послѣ припадка бываетъ послабленіе болей или полная пауза. Причины: простуда лица, костные наросты, разбуханіе надкостной плевы, гніющіе зубы, опухоли на основаніи черепа или давящія на нервы,

Digitized by Google

малокровіе, блѣдная немочь, сифилисъ, истерика, перемежающаяся лихорадка. Если боль случайная, то легко проходитъ отъ компр. *Эл. Бѣл.* на темя и подъ ухо и вн. *S.* 1, въ противномъ случаѣ направить лѣченіе противъ производящей причины, выбравъ одно или два изъ слѣдующихъ: на лицо и въ ухо мазь *C.* 5, *S.* 5, *A.* 2 и вн. *A.* 1 или 3 × *C.* 4 × *F.* 1 3-й, 2-й ст.), или *V.*

Судорожное подергиваніе лицевыхъ мышцъ (*Tic convulsif*), судорожная мимика является слѣдствіемъ болѣзненной раздражительности лицевого нерва и бываетъ почти всегда одностороннимъ. Причина въ большинствѣ случаевъ—простуда или же оно является однимъ изъ явленій пляски св. Вита или истеріи или глистовъ. Въ послѣднихъ случаяхъ лѣченіе совпадаетъ съ лѣченіемъ основной болѣзни, когда же причина—простуда, то принять внутрь 10 круп. *S.* 1, а въ видѣ питья—*S.* 2 × *F.* 1 (3-й, 2-й ст.). Прилож. *Эл. Кр.* × *Эл. Желт.*; на больную сторону лица—компрессъ изъ *Эл. Бѣл.* У сангвиниковъ прибавить къ указаннымъ лѣкарствамъ еще *A.* 1 изъ 3-го ст.

Судорожное сжатіе челюстей. Вн. *S.* 1 (1-й ст.), на верхъ щеки, подлѣ уха *Эл. Кр.* или *Эл. Желт.*, или *Эл. Кр.* × *Жел.* Въ упорн. случаѣ на щеку компр. *Эл. Бѣл.* или мазь *C.* 5, *S.* 5. (ср. *Столбнякъ*).

Флюсъ есть воспаленное состояніе десны и часто всей щеки; причина—обыкновенно испорченный зубъ. Встрѣчается въ особенности у лимфатиковъ, вообще склонныхъ къ воспалительнымъ опухолямъ вслѣдствіе не столько прилива, сколько мѣстнаго застоя крови. Вн. *S.* 1 и на подгл. нерв. *Эл. Кр.* × *Бѣл.* Въ упорн. случаѣ на щеку прим., мазь *C.* 5, ван. *C.* 5, а внутрь *A* 3 × *C.* 2 (3—2-й ст.)., компрессъ изъ *Эл. Зел.* Полосканіе раствора *A.* 2, *C.* 5 или *C.* 4 по 10 круп. на стак. воды.

Веснушки желтаго или темнаго цвѣта небольшія возвышенія въ ячейкахъ кожной оболочки, кажется преимущественно происходятъ отъ вліянія солнечныхъ лучей, и потому находятся въ особенности на лицѣ, обыкновенно бываютъ лѣтомъ и проходятъ зимой.

Digitized by Google

Такъ какъ красильное вещество веснушекъ имѣетъ свое начало въ крови кожи и ею выдѣляется, то должно остерегаться всякаго прилива крови къ лицу. *А.* 1 или *А.* 2 (2-й ст.). Мазь, компр. и ван. изъ *А.* 2.

Также хорошо дѣйствуетъ жидкость *Acqua per la Pelle* (*Аква перъ ла Пелле*, что по русски означаетъ: *вода для кожи*). Эта жидкость есть превосходное косметическое средство, дѣлающее кожу мягкой и нѣжной. Способъ употребленія: *для обмываній*: 1 стол. ложку жидкости на стак. воды 1—2 раза въ недѣлю; *для ванны*: 3 стол. ложки жидкости.

Лобковая кость. Самый нижній отдѣлъ туловища и его точку опоры въ сидячемъ положеніи образуетъ *тазъ* (женскій тазъ шире мужского); къ нему же прикрѣпляются и ноги. Костный остовъ таза представляетъ кольцо, составленное изъ нѣсколькихъ костей; при отвѣсномъ положеніи тѣла передняя половина этого кольца покоится на головкахъ бедреныхъ костей, а заднею половиною поддерживается позвоночный столбъ. Кости задней тазовой стѣнки суть *крестецъ* и *копчикъ*; передняя и боковыя стѣнки образуются двумя (правою и лѣвою) *безъимянными костями*. На каждой безъимянной кости верхній отдѣлъ, имѣющій видъ лопаты, называется *подвздошной костью*, нижній — *сѣдалищной*, а передній — *лобковою костью*.

Сыпи и *полипы* въ области этой кости бываютъ только у женщинъ, причемъ срамныя губы очень толсты. Вн. *С.* 1 или *V.* (1-й ст.), наружно прим. *V.* Употребляются также лѣкарства, назначенныя противъ болѣзни железъ. См. *Железы*.

Ломъ въ различныхъ частяхъ тѣла, преимущественно въ костяхъ, бываетъ при простудѣ, сифилисѣ и ревматизмѣ; *ломота* въ пальцахъ ногъ—при подагрѣ. Лѣченіе надо направить противъ производящей причины.

Лунатизмъ. Это разстройство мозговыхъ функцій, характеризующееся извѣстнаго рода способностію повторять во время сна нѣкоторыя дѣйствія, кои усвоены привычкой, или же ходить и производить различныя движенія, безъ того, чтобы

Digitized by Google

осталось воспоминаніе послѣ пробужденія. Если имъ страдаетъ женщина: *C.* 1 или *C.* 5 × *F.* 1 (2-й ст.) Ван. *C.* 5. На подзвд. мазь или компр. *C.* 5 и *F.* 2, *Эл. Бѣл.* къ зат. и въ ван.

Если имъ страдаетъ мужчина: *S.* 1 или *S.* 5 × *F.* 1 (1-й ст.) и нар. тѣ же лѣкарства, которыя выше назначены для женщинъ.

Мнимая смерть, асфиксія. То, что въ обыкновенной жизни понимаютъ подъ мнимою смертью—есть многодневное обмираніе, которое влечетъ за собою опасность быть погребеннымъ за-живо. Поэтому если есть малѣйшая неувѣренность, то нужно отложить погребеніе до появленія признаковъ посмертнаго окоченѣнія и гніенія, которыя въ сущности суть единственные не обманчивые признаки наступившей смерти. Къ случаямъ мнимой смерти относятся: смерть отъ голода, паденія, задушенія, замерзанія, удара молніей, утопленіе и обморокъ. См. ниже: *Обморокъ*, *Пораженіе молніей* и *Утопленники.*

Мокрота или отхаркиваемая кашлемъ слизь, если она слизисто-гнойная или кровянистая, то указываетъ на большее или меньшее разрушеніе дыхательныхъ органовъ, клубковидная (въ видѣ сѣроватыхъ слизистыхъ катышковъ) бываетъ при хронич. катаррѣ гортани; особенно пѣнистая съ примѣсью крови—при воспаленіи плевры и гипереміи легкихъ; ржавая—при воспаленіи легкихъ; зловонная и гнойная—при гангренѣ и бугорчаткѣ легкихъ; вонючая и черная—при гангренѣ легкихъ: желтая и въ особенности если она горькая—при заболѣваніи печени.

Морская болѣзнь. Опытомъ дознано, что килевая качка гораздо труднѣе переносится, чѣмъ боковая качка, что на винтовыхъ судахъ морская болѣзнь значительнѣе, чѣмъ на парусныхъ и что во время качки горизонтальное положеніе, то есть лежачее въ кровати, утвержденной въ подвижной рамѣ (родъ люльки), ослабляетъ и иногда предупреждаетъ морскую болѣзнь. Примѣняется слѣдующее лѣченіе: за день или за нѣсколько дней до плаванія принимаютъ *S.* 1 × *F.* 1 (изъ 3 или 2-хъ ст.) и 3 раза въ день передъ кушаньемъ по 5 круп. *S.* 1. Если несмотря на это, болѣзнь на морѣ является, то

Digitized by Google

принимать отъ 10 до 20 сухихъ круп. S. 1 или *Anti-mal di mare*, которыя быстро прерываютъ тошноту и рвоту и предупреждаютъ возобновленіе ихъ; на нервн. пункты 5, 6, 7—*Эл. Кр.* (у сангв.—*Эл. Анж.*). Повторять это каждый разъ при появленіи припадка тошноты и рвоты. Кушать лишь легкую пищу, особенно слизистые супы, и не пить ничего спиртнаго; только бокалъ шампанскаго иной разъ благотворно дѣйствуетъ. Находиться все время нездоровья на палубѣ, даже въ плохую погоду. Тѣмъ субъектамъ, на которыхъ эти лѣкарства не дѣйствуютъ, назначаютъ *А.* 3 въ сухихъ крупинкахъ.

Мочевые органы. Эта система органовъ состоитъ изъ парныхъ, отдѣляющихъ мочу, органовъ—*почекъ*, съ выводящими ихъ протоками—*мочеточниками*, изъ полости, назначенной для собиранія мочи— *мочевого пузыря* и органа, выносящаго мочу наружу—*мочеиспускательнаго канала*.

Почки, правая и лѣвая, лежатъ, окруженныя жиромъ, у задней стѣнки брюшной полости, т.-е. позади кишекъ, одна направо, другая налѣво отъ позвоночнаго столба. Онѣ выводятъ изъ тѣла излишекъ воды и освобождаютъ кровь отъ *мочевины* и *мочевой кислоты*.

Къ верхнему концу почки прикѣплена *надпочечная железа*, снабженная множествомъ нервовъ.

Мочеточники представляютъ собою трубки съ гусиное перо; изъ той и другой почки они несутъ готовую мочу въ *мочевой пузырь*, въ который собирается моча, безпрерывно капающая изъ обоихъ мочеточниковъ. Мочевой пузырь имѣетъ видъ мѣшка, яицеобразной формы, величиною съ небольшой кулакъ, лежитъ позади лобковаго сочлененія, на промежности, сзади граничитъ у мужчинъ съ прямою кишкою, у женщинъ съ маткою, сзади и по бокамъ брюшиною.

Мочеиспускательный каналъ начинается спереди, изъ нижнихъ частей мочевого пузыря, представляя собою выводной протокъ послѣдняго. У мужчинъ и женщинъ, онъ различный.

Мужской мочеиспускательный каналъ, слегка изогнутъ, у взрослаго длиною въ 6—8 дюймовъ, помѣщается въ мужскомъ

Digitized by Google

половомъ членѣ, служа вмѣстѣ путемъ, по которому выдѣляется сѣмя; проходитъ чрезъ *предстательную железу* и вступаетъ прямо въ мужской членъ, гдѣ помѣщается въ бороздѣ между *двумя пещеристыми тѣлами мужскаго половаго члена*, открываясь наружу, на концѣ головки члена, щеловиднымъ отверстіемъ.

У женщинъ нѣтъ ни предстательной железы, ни тѣхъ пещеристыхъ тѣлъ, которыя помѣщены въ мужскомъ половомъ членѣ, поэтому *женскій мочеиспускательный каналъ* гораздо короче, но шире мужского, легко растягивается поперекъ, длиною до $1^1/_2$ дюйма. Наружное отверстіе женскаго мочеиспускательнаго канала открывается надъ входомъ во влагалище

Моча представляетъ свѣтлую, прозрачную, желтоватую жидкость съ особеннымъ запахомъ. У взрослаго человѣка выдѣляется въ сутки отъ 5 до 6 фун. мочи. Главныя ея составныя части—вода, мочевина и мочевая кислота. Нерѣдко моча бываетъ мутною, и въ ней являются осадки, которые въ большинствѣ случаевъ состоятъ изъ мочевой кислоты и мочекислыхъ солей, изъ извести и слизи. Иногда въ мочевомъ пузырѣ и почкахъ осадки сгущаются въ каменистыя массы и образуютъ мочевые камни (пузырные, почечные). При болѣзненныхъ состояніяхъ въ мочѣ могутъ показаться: кровь, желчь (при желтухѣ), бѣлокъ, сахаръ.

Моча *блѣдна* при малокровіи, блѣдной немочи, сахарномъ мочеизнуреніи, истерикѣ и въ періодѣ выздоравливанія отъ болѣзни; *красна* при лихорадочныхъ и воспалительныхъ болѣзняхъ; *темношафраннаго цвѣта* при примѣси желчи къ крови, и если эта окраска пачкаетъ бѣлье, то это указываетъ на желтуху; *густая и черная моча* при воспалительномъ или гнилостномъ состояніи, которое кончается гангреною; *кровянистая* при воспаленіи мочевого пузыря или почекъ; *присутствіе гноя* въ мочѣ—при внутреннемъ нагноеніи, присутствіе *слизи*—при мочевомъ камнѣ или при воспаленіи мочевого пузыря или шейки его. *У женщинъ* осадокъ въ мочѣ не всегда указываетъ на нездоровье; цвѣтъ мочи у нихъ обыкновенно свѣтлѣе.

Digitized by Google

Если моча *выходитъ непроизвольно*, то это болѣзнь параличнаго свойства. Если моча *испускается съ трудомъ, съ болью* или *съ задержаніемъ*, то это обнаруживаетъ заболѣваніе мѣстное (напр. съуженіе, стриктура) воспалительнаго или спазматическаго свойства. *Реакція* мочи должна быть кислою, что опредѣляется лакмусовою бумажкою синяго цвѣта, которая краснѣетъ отъ малѣйшей примѣси кислоты.

Отдѣленіе мочи у грудныхъ дѣтей, вслѣдствіе исключительно жидкой пищи, сравнительно весьма обильно. Въ первые мѣсяцы жизни дитя мочится отъ 12 до 24 разъ въ сутки при чемъ моча въ первые 5 мѣсяцевъ бываетъ безцвѣтною и не имѣетъ почти никакого запаха, съ 5-го же мѣсяца получаетъ болѣе желтый (однакожъ свѣтложелтый, лимонный) цвѣтъ и свой отличительный мочевой запахъ. Всякое уклоненіе отъ этого служитъ указаніемъ какого-либо болѣзненнаго состоянія.

Болѣзни мочевыхъ органовъ.

Воспаленіе почекъ бываетъ острое и хроническое. Первое начинается сильнымъ потрясающимъ ознобомъ, жаромъ, съ головною болью и сильною болью въ области почекъ. Эта боль ограниченная или распространяющаяся въ сосѣдніе органы, и преимущественно въ мочевой каналъ, мочевой пузырь, пахъ, ляшку, иногда болѣе острая въ нижней части живота, чѣмъ въ почкахъ, измѣняющаяся въ своей степени, усиливающаяся отъ движенія. Мочеотдѣленіе затруднено; моча горячая, имѣетъ примѣсь крови и цвѣтъ ея краснобурый; ощупываніе живота очень болѣзненно; иногда бываетъ тошнота и рвота.

Болѣзнь оканчивается или разрѣшеніемъ или нагноеніемъ. Въ послѣднемъ случаѣ почечный нарывъ выражается, послѣ разныхъ обманчивыхъ симптомовъ, непостоянною дрожью, болѣзненнымъ біеніемъ въ области почекъ, иногда опухолью въ соотвѣтствующей сторонѣ, мягкою, подвижною и наконецъ появленіемъ гноя въ мочѣ.

Если исходъ болѣзни смертельный, то ей предшествуютъ бредъ и спячка. Эта болѣзнь имѣетъ частыя осложненія.

Digitized by Google

При хронической формѣ боль тупая, жестокая въ области одной или обѣихъ почекъ, иногда очень сильная, увеличивающаяся отъ давленія болѣе или менѣе сильнаго поясницы или вслѣдствіе продолжительной ѣзды въ экипажѣ. Эта боль сопровождается частыми мочеиспусканіями въ маломъ количествѣ и нѣкоторыми диспепсическими разстройствами. Причины: ушибы, прохожденіе почечныхъ камней и простуда. Сперва прерываютъ лихорадку *F.* 1 (2—3-й ст.) на подвзд. *F.* 2, затѣмъ *A.* 1 × *S.* 1 (2—3-й ст.). При нарывѣ *C.* 1 (1-й ст.) × *A.* 1 (2—3-й ст.); на почки прим., мазь *C.* 5 × *A.* 2, *Эл. Кр.*; ван. *C.* 5, *S.* 5. Лѣченіе оканчивается *S.* 1 (1-й ст.). Болѣзнь тяжкая, но излѣчимая; если означенныя лѣкарства недостаточны, то ихъ замѣняютъ другими, смотря по явленіямъ, которыя нужно уничтожить.

Брайтова болѣзнь, бѣлковое мочеизнуреніе бываетъ въ двухъ формахъ: острой и хронической. Первая начинается лихорадкою и болью въ почкахъ. Нерѣдко бываетъ рвота; боль въ поясницѣ; постоянные позывы къ мочеиспусканію: моча содержитъ бѣлковину и отдѣляется по каплямъ съ болью или безъ оной, сперва красноватая, темнокоричневая или желтоватая, затѣмъ натуральнаго цвѣта, иногда мутная, пѣнистая, молочнаго цвѣта, черезъ 24 часа издаетъ запахъ говяжьяго бульона и на днѣ сосуда образуются темныя крупчатыя массы. Лицо, руки и ноги опухаютъ; затѣмъ лихорадочныя явленія стихаютъ и начинается брюшная водянка.

Хроническая форма протекаетъ безъ лихорадки и боль въ почкахъ рѣдко существуетъ; но за то позже являются трудное пищевареніе, уменьшеніе физической силы и увеличенное количество отдѣленія мочи противъ нормальнаго. Цвѣтъ мочи свѣтлѣе обыкновенной, она пѣнится, при подогрѣваніи значительно мутнѣетъ. Эта мутность означаетъ присутствіе большого количества бѣлка. При хронической формѣ брюшная водянка начинается рано; отекъ лица, ногъ, грудная водянка, уменьшеніе количества мочи, жировое перерожденіе ея эпителія—это предвѣстники смерти. Причины болѣзни: продолжительное дѣйствіе холода и сырости на кожу, чрезмѣрное употребленіе мочегон-

Digitized by Google

ныхъ средствъ и спиртныхъ напитковъ; также сырое жилье въ подвалахъ и работы на водѣ.

Лѣченіе острой формы. При первыхъ признакахъ заболѣванія вскипятить немного мочи въ соотвѣтствующей пробиркѣ или, за неимѣніемъ ея подъ рукою, въ столовой ложкѣ надъ спиртовой лампочкой, прибавивъ 2—3 капли уксусной эссенціи. Если въ мочѣ имѣется бѣлокъ, то при кипяченіи онъ выпадаетъ въ видѣ мути или хлопьевиднаго осадка. Діагнозъ Брайтовой болѣзни тогда несомнѣненъ. Больной долженъ быть немедленно положенъ въ постель и получать лишь молочную пищу, для питья также чистую или, еще лучше, углекислую воду. Разъ въ день теплая ванна съ послѣдующимъ укутываніемъ въ постели для вызова обильнаго пота. Запоръ устранять ежедневными тепловатыми клистирами. Внутрь: *A.* 3 × *S.* 6 (3—1-й ст.) и кажд. часъ по 1 круп. *S.* 1. При лихорадкѣ: *A.* 1 × *C.* 6 × *F.* 1 (3-й ст. до 1 усилен. развед.) и кажд. часъ по 1 круп. *C.* 6. При тошнотѣ: 5—10 круп. *S.* 1 или 1—5 круп. *Anti-mal di mare* съ 10—50 каплями *Эл. Бѣл.* При сильн. боли въ области почекъ, прилож. на п. 21 *Эл. Зел.* При выздоравливаніи: каждый часъ по 1—5 круп. *A.* 3 × *S.* 1.

Лѣченіе хронической формы брайт. бол. Больной долженъ оберегать себя отъ простуды и чрезмѣрныхъ трудовъ и не употреблять никакихъ спиртныхъ напитковъ. Умѣренное употребленіе кофе и чаю разрѣшается. Мясо употреблять лишь очень мало, овощей же и зелени наоборотъ побольше. Заботиться о ежедневномъ испражненіи на низъ (клистиры). Брать часто теплыя ванны. Обостреніе болѣзни лѣчить какъ острую форму (см. выше). Внутрь принимать: *A.* 3 × *C.* 6 × *F.* 1 (3-й ст. до 1 усилен. развед.); каждые 2 часа по 1—3 круп. *A.* 3 × *S.* 6 или *C.* 6 и 3 раза въ день по 5 круп. *S.* 1. При отекахъ: *A.* 3 × *C.* 2 × *F.* 1 (3—1-й ст. до 1 усилен. развед.), также въ сухихъ круп. Хронич. Брайтова болѣзнь, при достаточной выдержкѣ больного, можетъ быть излѣчена вполнѣ, но для этого могутъ потребоваться годы.

Почки блуждающія. Когда естественныя связки, поддерживающія почки, разслабляются, то происходитъ перемѣщені

Digitized by Google

этого органа, и тогда наблюдается опухоль въ животѣ подъ подреберьями, занимающая въ особенности правую сторону, рѣдко обѣ стороны, и *подвижность* этой опухоли составляетъ главный характеръ. Это перемѣщеніе можетъ быть полное или неполное, допускающее иногда черезъ давленіе почечной области констатировать пустоту, соотвѣтствующую перемѣстившейся почкѣ. Въ то же время къ не очень острой боли въ области почекъ, распространяющейся по длинѣ ногъ, присоединяются желудочныя растройства: тошнота, рвота, трудное пищевареніе; чувство слабости и недомоганія въ нижней части живота и наконецъ нервныя разстройства, истерика или ипохондрія. Этотъ недугъ въ особенности свойственъ женщинѣ. Вн. *S.* 1, нар. компр. на почки *S.* 5 × *Эл. Кр.* Послѣ установки почки на свое мѣсто и укрѣпленія ея бандажемъ, это лѣченіе укрѣпляетъ связки.

Почечные камни, даже большіе, не производятъ разстройствъ въ организмѣ. Въ другихъ случаяхъ симптомы сходны съ воспаленіемъ почекъ, или же въ мочѣ періодически появляется почечный песокъ, умѣренное раздраженіе мочевыхъ путей, или наконецъ является *почечная колика*, которая начинается, когда крупный камень задерживается въ мочеточникѣ при переходѣ изъ почечной лоханки въ мочевой пузырь, и начинаясь съ какого либо пункта мочеточниковъ, распространяется у мужчинъ до яичка соотвѣтственной стороны и сопровождается непрерывными позывами къ мочеиспусканію. Бываетъ также рвота, больной мечется въ постели, лицо покрывается потомъ, мочевой пузырь пустъ, при сильномъ жженіи въ каналѣ выдѣляется нѣсколько капель крови.

Противъ почечной колики вн. *A.* 2 × *S.* 6 (2-й ст.) въ частыхъ пріемахъ до прекращенія боли, на почки мазь *A.* 2. Или: *S.* 2 × *C.* 6 × *A.* 1 (3—2-й ст.) кажд. 5—10 мин. по чайн. лож. Иногда лучше дѣйствуютъ *S.* 6 × *C.* 6 или *C.* 1 противъ болей, тогда какъ *S.* 2 энергичнѣе дѣйствуетъ на раствореніе камней. Сидячія горячія ванны съ *S.* 5, *C.* 6 по 30 круп. и 1 ч. л. *Эл. Бѣл.*; повторять ванны, при надобности, кажд. 2 часа.

Digitized by Google

Воспаленіе или катарръ мочевого пузыря. Симптомы: *при острой формѣ*: тяжесть въ области пузыря, давленіе и боли, распространяющіяся на промежность и мочеиспускательный каналъ; безпрестанные позывы къ мочеиспусканію, которое бываетъ при этомъ болѣзненное. Моча содержитъ слизь и немного гноя, реакція же остается кислою; когда моча отстоится, то въ нижнемъ ея слоѣ образуется осадокъ въ видѣ легкаго облачка или нѣжно-волокнистаго свертка. Въ отдѣльныхъ случаяхъ бываетъ и лихорадочное состояніе.

Послѣ припадка коликъ, для предупрежденія возврата, давать внутрь: *S.* 2 × *A.* 2 (3—2-й ст.); при обиліи мочекислыхъ солей въ мочѣ: *L.* (3—1-й ст.) и 3 раза въ день по 5 круп. *S.* 1. Если бѣлки глазъ желтоваты, что указываетъ на участіе печени въ болѣзни, то вн. *S.* 2 × *A.* 2 × *F.* 1, на подвзд. мазь *F.* 2, тепл. ванны изъ *F.* 2 и *C.* 5. (Ср. *Камни мочевого пузыря*).

При хронической формѣ болѣзни самые существенные симптомы суть—чувство давленія въ области пузыря и отдѣленіе съ мочею массы похожей на студень, или же гноя; часто является умѣренный позывъ къ мочеиспусканію и растяженію мочевого пузыря вслѣдствіе застоя мочи, которая по большей части непріятно пахнетъ, мутнѣетъ и даже распространяетъ заразительную вонь. Причины: ушибъ промежности, трудные роды, введеніе хирург. инструментовъ или ѣдкихъ спринцованій, мочевые камни, стриктуры, старческій возрастъ, пьянство.

Воспаленіе мочев. пузыря вслѣдствіе триппера очень сходно съ обыкновеннымъ воспаленіемъ. Но въ первомъ случаѣ общіе припадки не такъ сильны, какъ при обыкновенномъ; но за то мѣстныя явленія очень рѣзки: позывы къ мочеиспусканію и испражненіямъ чрезвычайно часты и болѣзненны и часто бываютъ кровотеченія.

Приводимъ здѣсь отличительные признаки воспаленія мочевого пузыря (циститъ) у мужчинъ отъ воспаленія предстательн. железы (простатитъ):

Digitized by Google

Циститъ.	Простатитъ.
1. Позывы къ мочеиспусканію бываютъ очень часты черезъ 15, 10 и 5 минутъ.	1. Позывы къ мочеиспусканію бываютъ, но не столь часты.
2. При мочеиспусканіи моча выходитъ самопроизвольно и неудержимо.	2. Больные должны сильно жилиться, и то не всегда сразу выйдетъ вся моча.
3. При изслѣдованіи черезъ задній проходъ—предстательн. железа нормальна.	3. При изслѣдованіи — предстательная железа увеличена въ объемѣ и болѣзненна.
4. Давленіе на нижнюю часть живота, у лоннаго соединенія, вызываетъ боль.	4. Давленіе на нижнюю часть живота не вызываетъ боли.
5. Измѣненія въ мочѣ весьма значительны, и въ ней замѣчаются: кровь, слизь, гной и т. п.	5. Моча почти не измѣнена и не образуетъ осадка; кровотеченіе составляетъ исключеніе.
6. Лихорадка слабая.	6. Сильная лихорадка.
7. Запоръ—явленіе исключительное.	7. Запоръ—явленіе постоянное.

При острой формѣ и лихорад. состояніи вн. *F.* 1 × *S.* 6 (1-й ст.), на подвзд. *F.* 2, на промежн., лобк. кость и поясн. *Эл. Кр.* Согрѣвающіе или горяч. компрессы на область мочев. пузыря изъ *A.* 2, *S.* 6 или *C.* 5 по 15 круп. и 1—2 ч. л. *Эл. Бѣл.* на 2 ст. воды. Въ упорн. случ. вн. *A.* 2 × *C.* 6 или *C.* 10 или *C. T. B.* × *F.* 1 (3—2-й ст.). *Эл. Кр.* × *Эл. Желт.* на п. 22; утр. и веч. сидяч. ванна съ *A.* 2, *C.* 5 или *L.* по 15 круп. и 1—2 ч. л. *Эл. Бѣл.*

При *хронической формѣ*: Тѣ же лѣкарства, но въ болѣе сильн. разведеніяхъ. Кромѣ того 3 раза въ день по 1 каплѣ *Эл. Зел.* въ полустак. воды и по 5 круп. *S.* 1 и *S.* 6 съ пищей. Хронич. катарръ поддерживается часто увеличенной предстательн. железой.

Полипъ въ мочевомъ пузырѣ лѣчится точно также какъ катарръ, но съ прибавленіемъ *C.* 1 и *C.* 5. *Параличъ мочевого пузыря* встрѣчается при параплегіи, также какъ явленіе старческаго возраста и при сухотѣ спинного мозга. Бываетъ и вслѣдствіе механич. поврежденія (ударъ, паденіе) и у женщинъ во время родовъ. Мочевой пузырь не можетъ опорожняться какъ слѣдуетъ и происходитъ застой мочи или моча вытекаетъ непроизвольно по каплямъ. (Сравни *задержаніе*

Digitized by Google

мочи). *Лѣченіе:* у стариковъ—3 раза въ день *S.* 1 или *S.* 6 (сильн. развед.), *красн. мазь* на область мочевого пузыря и промежности. Во всѣхъ другихъ случаяхъ частыя сидячія теплыя ванны съ *A.* 2, *S.* 6 или *C.* 6. Прилож. на поясницу и вообще позвоноч. хребетъ (пп. 12—22) *Эл. Кр.* или *Эл. Кр.* × *Эл. Желт.* Внутрь: *A.* 2 или *A.* 1 × *S.* 6 или *C.* 6 (3-й ст. до 1 усилен. разведенія).

Недержаніе мочи по ночамъ свойственнно преимущественно дѣтямъ и скорѣе происходитъ отъ крѣпкаго сна, хотя можно полагать, что у нихъ есть и разслабленіе мускуловъ шейки мочевого пузыря. Лѣчится такъ же какъ катарръ моч. пузыря. Кромѣ того взрослымъ по 1 сухой кр. *C.* 5 черезъ $^1/_2$ часа.

Если недержаніе мочи у дѣтей происходитъ отъ глистовъ, то вн. *Verm.* (1-й ст.) и на ночь или утромъ 4 сухихъ кр. *Verm.*

Задержаніе мочи. Причины у мужчинъ: 1) старческая гипертрофія предстательной железы. Примѣненіе катетера въ этомъ случаѣ опасно. 2) Стриктуры. 3) Нервное задержаніе. 4) Вялость мочев. пузыря. 5) Судороги мочев. канала. 6) Неполный и полный параличъ мочев. пузыря. Причины у женщинъ: Загибъ или выпаденіе матки, родильный періодъ и послѣ прокола или удаленія большихъ опухолей брюшной полости. Лѣченіе направить противъ производящей причины и какъ при параличѣ мочев. пузыря (см. выше).

Судорога мочевого пузыря. Припадки спазматич. болей въ шейкѣ мочев. пузыря (въ промежности), мочерѣзъ чисто нервнаго характера. Причины: механич. поврежденія, кишечные завалы, глисты, истерія, острыя лѣкарственныя вещества, молодое пиво, онанизмъ. Моча отходитъ лишь каплями и съ сильной болью или вовсе задержана. *Лѣченіе*: горячія сидячія ванны съ *L.* или *A.* 2 и *C.* 6 съ *Эл. Бѣл.* или *Анж.* Лежать въ теплой постели. Горячіе компр. на обл. мочев. пуз. изъ раствора *A.* 2 и *C.* 5. Внутрь *A.* 1 × *C.* 1 × *F.* 1 (3—2-й ст.).

Камни мочевого пузыря. Величина ихъ бываетъ разнообразна: или въ видѣ мельчайшаго песка, иногда въ величину

Digitized by Google

яблока и даже дѣтской головки. По химическому составу они различны [1]). Нерѣдко эта болѣзнь переносится легко; въ другихъ случаяхъ мочеиспусканіе вдругъ прекращается и больной можетъ мочиться только измѣнивъ положеніе тѣла; ощущеніе больнымъ инороднаго тѣла въ пузырѣ; иногда въ мочѣ является примѣсь крови; мужчины жалуются на боль, ощущаемую ими особенно въ концѣ половаго органа, частый позывъ къ мочеиспусканію и т д. Разпознаваніе можетъ быть вѣрно только тогда, когда камни выходятъ съ мочей, или когда они могутъ быть ощупаны при изслѣдованіи катетеромъ. Вн. *S.* 6 или *C.* 6 противъ сопровождающаго камни катарра мочев. пузыря. Два растворенія камней въ мочев. пузырѣ: *C.* 1 или *S.* 2 (2—1-й ст.) или *C.* 1 въ началѣ болѣзни. *C.* другихъ номеровъ, напр. *C.* 5 въ дальнѣйшемъ періодѣ ея. Противъ припадковъ болей, вызываемыхъ камнями мочев. пузыря, лѣченіе такое же, какъ при почечныхъ камняхъ (см. выше).

Кровотеченіе изъ мочевого пузыря. Оно можетъ зависѣть отъ геморроя, Брайтовой болѣзни, полипа или рака мочев. пузыря, изъязвленія мочев. канала или предстат. железы, камня мочевого или почечнаго, какъ симптомъ цынги и дурное предзнаменованіе при кори, оспѣ, тифѣ и чумѣ. Лѣченіе направить противъ производящей причины.

Если кровь идетъ: 1) *изъ почки*, то она равномѣрно распредѣлена по всему количеству мочи; 2) если *изъ мочевого пузыря*, то она появляется въ концѣ мочеиспусканія или же около этого; и 3) если изъ мочевого канала, то она выдѣляется по каплямъ, чистая, безъ усилій, и когда больной начнетъ мочиться, то первая струя кровянистая, затѣмъ моча становится болѣе свѣтлой и вызываетъ боль въ каналѣ. Вн. *A* 1 (3-й ст.) × *S.* 1 (2-й ст.), спринц. и прим. на лобокъ *A.* 2. *Эл. Анж.* внутрь 5—10 кап. часто до остановки кровотеченія.

---

[1]) Если камень известковый, то онъ растворяется отъ лѣкарствъ графа Маттеи въ теченіе 20 или 30 дней; затѣмъ выходитъ съ мочею въ видѣ порошка. Но если онъ другого состава, то нужно болѣе времени; но онъ растворяется точно также, какъ и образовался, самъ собою.

Digitized by Google

Ракъ мочевого пузыря образуется вслѣдствіе рака матки или задняго прохода. Симптомы: упорный хронич. катарръ мочевого пузыря, частыя и обильныя кровотеченія, иногда задержаніе мочи и вскорѣ развивающееся раковое худосочіе. Наконецъ, всякое сомнѣніе исчезаетъ по микроскопическомъ изслѣдованіи отходящихъ съ мочею раковыхъ частичекъ. Для лѣченія см. *Ракъ*.

Съуженіе мочеиспускательнаго канала, стриктура. Причины: воспаленіе или спазмъ канала, трипперъ, введеніе катетеровъ, прохожденіе камней, частое давленіе канала, полипы, сифилисъ и т. п. Моча извергается тонкою струей то вверхъ, то вправо или влѣво съ перерывами, частый позывъ. При развитіи болѣзни изверженіе сѣмени при совокупленіи происходитъ каплями, иногда оно стекаетъ въ пузырь или сопровождается жестокою болью въ промежности. Вн. и нар. спринц., мази, бужи, ван., прим. *S.* 5, *C.* 5 или *V.*, на промеж. *Эл. Кр.*

Въ упорн. случ. *A.* 3 × *S.* 6 или *C.* 6 (3—1-й ст.), тепл. сидяч. ванны съ *A.* 2, *S.* 6, *C.* 6. Лѣченіе, особенно у лицъ чувствительныхъ, очень длительно, 3—6 мѣсяцевъ и болѣе.

Сахарное мочеизнуреніе начинается большею частію скрыто, бываетъ сильная жажда, усталость и диспепсія. Больной часто просыпается ночью вслѣдствіе позыва къ мочеиспусканію и отдѣляетъ большое количество мочи, которая прозрачна, желтовата и сильно пѣнится. Жажда и аппетитъ увеличиваются, сухость во рту. Въ мочѣ содержится 2—10% виноградного сахара. При этомъ половое безсиліе, худѣніе, по большей части костоѣда зубовъ; у мужчинъ ссадины на крайней плоти и на головкѣ, а у женщинъ ссадины въ окружности отверстія мочеиспускательнаго канала, нерѣдко легочная чахотка и образованіе карбункуловъ и чирьевъ съ наклонностію къ гангренѣ, и больной умираетъ отъ сильнѣйшаго истощенія.

Лѣченіе. Электро-Гомеопатія излѣчиваетъ сахарное мочеизнуреніе, если организмъ обладаетъ еще достаточной энергіей жизнедѣятельности. Внутрь: *A.* 1 × *C.* 6 × *F.* 1 или *F.* 2 (отъ 3 до 1-го ст. или усиленн. 1-го разведенія) и 3 раза въ день по 5 круп. *L.* сухими. На подвзд. мазь или компр. изъ *F.* 2.

Digitized by Google

Больной можетъ пить въ любомъ количествѣ свѣжую воду, съ прибавленіемъ небольшихъ количествъ краснаго вина или чистую; пива и другихъ спиртныхъ напитковъ избѣгать. Что касается діэты, то рекомендуется избѣгать мучнистыхъ и сахаристыхъ веществъ, но, какъ показываетъ опытъ, особенной строгости въ этомъ отношеніи не требуется. Слѣдуетъ избѣгать во всякомъ случаѣ всего кислаго. Очень важно пользоваться побольше свѣжимъ чистымъ воздухомъ, дѣлать достаточно моціона, оберегая себя, впрочемъ, отъ простуды. Осложненія болѣзни лѣчить соотвѣтствующимъ образомъ.

Излѣченія. М. 71 г. страдалъ отъ прохожденія почечныхъ камней. При аллоп. лѣченіи эти страданія продолжались болѣе недѣли. Черезъ 6 часовъ жестокая боль совершенно прекратилась отъ *A.* 2 × *S.* 6 (*C.*).

— М. 65 л. страдалъ камнями мочевого пузыря, выходившими величиною съ горошину. Черезъ 6 дней послѣ начала лѣченія *S.* 2 объемъ камней началъ постепенно уменьшаться и осадокъ былъ въ видѣ песка; лѣченіе продолжалось, и черезъ 6 мѣс. совершенно выздоровѣлъ (*C.*).

— Сахарное мочеизнуреніе было вылѣчено въ послѣднее время *L.* и *Эл. Анж.* вн. и нар.

— М. 55 л., страдалъ каменною болѣзнью, констатированною двумя хирургами: частый и неудержимый позывъ къ мочеиспусканію, боль въ концѣ ствола, въ мочѣ примѣсь крови, боль въ почкахъ. Лѣченіе началось 20 февраля 1883 г. Вн. *S.* 2, спринцов. *S.* 2 × *Эл. Анж.* съ водою, на лобк. кость, промеж. и пояс. *Эл. Кр.* 2 раза въ день; противъ боли въ концѣ ствола и примѣси крови въ мочѣ *A.* 3; противъ боли въ почкахъ пластырь *A.* 2 (12 кр. на унцію; отъ 20 кр. усиливалась боль). Мѣсяцъ спустя, послѣ видимаго улучшенія, назначено 2 раза въ д. по 5 сух. кр. *S.* 2 съ густою пищею. Къ 4 апрѣля моча свѣтлѣе, но ощущалась боль въ правой почкѣ и въ области мочев. пузыря; назначено *S.* 6 (1-й ст.) ¼ ст. × *S.* 2 (1-й ст.) ¾ ст. въ день, мазь *C.* 5 на животъ, промеж. и лобк. кость, на почки мазь *A.* 2 и *Эл. Кр.* 26 декабря 1883 г. было произведено двумя хирургами второе изслѣдованіе мочевого пузыря, въ два сеанса, и мочевого камня не оказалось. Во время лѣченія было произведено нѣсколько химическихъ анализовъ мочи, и изъ каждаго анализа было видно замѣтное улучшеніе здоровья (*C.*).

Совѣтъ черезъ корреспонденціи.—М. 22 л. отъ рожденія страдалъ съуженіемъ мочев. канала, признанъ неизлѣчимымъ

Digitized by Google

предполагалась операція. Вылѣченъ въ 4 мѣс. Вн. *S.* 5 × *C.* 5 по длинѣ канала мазь и вспрыск. *C.* 5. Къ поясн., лобк. кости и промежности *Эл. Кр.* × *Жел.* (*C.*).

М. 45 л., д-ръ медицины, аллопатъ, лѣчился въ Клиникѣ, въ Спб., отъ сахарной болѣзни и хронич. воспал. кишекъ, былъ тамъ признанъ неизлѣчимымъ. Лѣченіе началось 25 дек. 1887 года, вн. *A.* 3, *F.* 1, *C.* 5 и *S.* 5, нар. *A.* 2, *C.* 5, *F.* 2 и *Эл. Анж.*, и вылѣченъ въ 2 мѣс. (*C.*).

Мышцы. Мягкая, влажная, сочная, красная, волокнистая масса, лежащая почти непосредственно надъ наружными покровами и большею частію прикрѣпляющаяся къ костному остову нашего тѣла, назыв. мясомъ или мышцами. Вмѣстѣ съ костями, мышцы сообщаютъ человѣческому тѣлу его формы и округленность, и въ то же время служатъ для образованія большихъ полостей, въ которыхъ помѣщаются важные для жизни органы. Но главное назначеніе мышцъ — производить всѣ движенія нашего тѣла, слѣдовательно, не только движенія сочлененныхъ между собою частей скелета, но и всѣ тѣ, которыя происходятъ внутри нашего тѣла,—въ сосудахъ, каналахъ и внутренностяхъ. Нѣкоторыя изъ этихъ движеній, въ особенности тѣ, въ которыхъ принимаютъ участіе сочлененныя кости, мы можемъ производить по произволу, почему мышцы, служащія для такихъ движеній, которыхъ въ человѣческомъ тѣлѣ болѣе 500, называются *произвольными* (животными). На другія же движенія, особенно во внутренностяхъ, сосудахъ и каналахъ тѣла, наша воля не имѣетъ никакого вліянія, почему мышцы, производящія такія движенія, назыв. *непроизвольными* (растительными).

Постепенная атрофія или исхуданіе мышцъ есть исчезновеніе органовъ и ихъ частей. Вслѣдствіе чрезмѣрнаго напряженія, нерѣдко подъ вліяніемъ прирожденныхъ условій, развивается, преимущественно между 20—40 годами, исхуданіе отдѣльныхъ мышцъ или мышечныхъ группъ. Сначала уменьшаются жидкія части тканей, потомъ форменныя составныя ихъ части, отсюда твердость и сухость уменьшенныхъ органовъ, клѣтки уменьшаются, съеживаются или сплющиваются, содержимое клѣтокъ исчезаетъ и остаются плотныя образо-

Digitized by Google

ванія. Особенно часто подвергаются атрофіи мякишъ большого пальца руки, плечевыя и грудныя мышцы. Исхуданіе идетъ постепенно впередъ и наконецъ отъ мышцъ остается только волокнистая перепонка. Отправленія пораженной части сильно разстраиваются и наконецъ совершенно прекращаются. Разпознаваніе, кромѣ измѣненія формы, основывается еще и на характерномъ подергиваніи мышечныхъ волоконъ, при дуновеніи на мышцу. Болѣзнь обусловливается хроническимъ воспаленіемъ и разростаніемъ соединительной ткани, вслѣдствіе чего исчезаетъ самое мышечное вещество. Вн. *S.* 1 (1-й ст.); на 6 гл. точ. и въ особенности на соотвѣт. нер. *Эл. Кр.* одно или попер. съ *Желт.*, мазь и ван. *S.* 5. Въ упорн. случаѣ вн. (1-й ст.) и въ ван. и мазяхъ *C.* 5 или *A.* 2. По 1 круп. *G.* 5 черезъ часъ. На подвзд. мазь, прим. *F.* 2, *C.* 5.

Число излѣченій атрофіи весьма значительно.

Мышечный ревматизмъ. См. *Ревматизмъ.*

Наросты бываютъ весьма различнаго происхожденія, вида и теченія и подраздѣляются на наружные и внутренніе, смотря по мѣсту, гдѣ развиваются. Къ нимъ относятся: дикое мясо, бородавки, мозоли, родимыя пятна и пр. новообразованія. Лѣченіе указано въ своихъ мѣстахъ.

Нервная система. Нервную систему составляетъ *нервная ткань*, которая весьма распространена въ организмѣ, находится во всѣхъ органахъ, только въ ногтяхъ и волосахъ ея совершенно нѣтъ. Она управляетъ всѣми жизненными отправленіями организма, которыя раздѣляются на *животныя* и *растительныя*. Сообразно этому и вся нервная система раздѣляется на завѣдывающую отправленіями *животной жизни* или *черепно-спинную* и на завѣдующую отправленіями *растительной жизни*, *сочувственную* или *симпатическую*.

Каждая изъ этихъ двухъ нервныхъ системъ состоитъ изъ *центральной части* и *периферической*. *Центральныя части* представляютъ скопленіе нервной ткани, образующія въ черепно-спинной нервной системѣ *головной* и *спинной мозгъ*. Между многими нервными узлами, особенно на внутренностяхъ груди и живота, протягиваются сплетенія большого или мень-

Digitized by Google

шаго числа нервовъ, соединяющіяся со спинно-мозговыми нервами. Наибольшее изъ этихъ сплетеній назыв. *солнечнымъ* и лежитъ въ животѣ, тотчасъ позади желудка. Всѣ эти узлы и сплетенія называются также *узловатой* (гангліозной) или *симпатической нервной системой.*

Периферическую часть той и другой системы составляютъ нервныя нити, выходящія изъ центральныхъ частей и распространяющіяся подъ названіемъ нервовъ по всему тѣлу.

Черепной мозгъ служитъ исключительно мѣстомъ, гдѣ происходитъ *воспріятіе* всякаго рода ощущеній. Ощущенія эти не чувствуются всею массою мозга, но каждому различному ощущенію, равнымъ образомъ, каждой умственной способности соотвѣтствуетъ та или другая область мозга, имѣющая какое либо опредѣленное назначеніе. Нервы служатъ только проводниками различныхъ впечатлѣній, почему ихъ удобно можно сравнивать съ проволоками электрическаго телеграфа; а мозгъ съ аппаратомъ, гдѣ производится электричество. Всякое внѣшнее раздраженіе нервовъ передается въ мозгъ, сами же нервы не чувствуютъ этого раздраженія. Нервы или передаютъ въ мозгъ внѣшнія впечатлѣнія и называются *чувствительными*, или служатъ путями, по которымъ отражается полученное мозгомъ впечатлѣніе въ формѣ движенія, такіе называются *двигательными*. Первые развѣтвляются преимущественно въ кожѣ, вторые всегда въ мышцахъ.

Симпатическіе нервы управляютъ органами растительной жизни и развѣтвляются въ стѣнкахъ сосудовъ кишечнаго канала и пр. При раздраженіи этихъ нервовъ холодомъ, теплотою и т. п., сосуды съуживаются или расширяются. Дѣйствіе симпатическихъ нервовъ на кишечный каналъ состоитъ въ томъ, что они управляютъ его движеніемъ, совершающимся при пищевареніи.

Изъ основанія головного мозга, считая спереди назадъ, выходятъ по порядку слѣдующія 12 паръ нервовъ:

1-я пара. *Обонятельные нервы* направляются въ носовую полость, оканчиваясь въ слизистой оболочкѣ ея. Управляютъ обоняніемъ.

Digitized by Google

2-я пара. *Зрительные нервы* выходятъ изъ черепа въ глазницы и оканчиваются въ сѣтчатой оболочкѣ глазъ. Управляютъ зрѣніемъ.

3-я пара, *движущая глаза*; эти нервы направляются къ мышцамъ глазныхъ яблокъ и радужной оболочкѣ глазъ. Управляютъ движеніемъ глазъ кверху и книзу, кромѣ того при раздраженіи ихъ зрачекъ съуживается, при параличѣ расширяется.

4-я пара. *Блоковые нервы* оканчиваются въ верхней косой мышцѣ глазныхъ яблокъ. Управляютъ возведеніемъ глазъ кверху.

5-я пара. *Тройничные нервы* начинаются двумя корешками: *переднимъ двигательнымъ*, отъ котораго происходятъ двигательныя вѣтви, распространяющіяся преимущественно въ жевательныхъ мышцахъ и мышцахъ верхней части глотки, и *заднимъ чувствительнымъ*, образующимъ утолщеніе, отъ котораго происходятъ три вѣтви, распространяющіяся въ различныхъ областяхъ лица.

6-я пара. *Отводящіе нервы* оканчиваются въ наружной прямой мышцѣ глазъ. Управляютъ отведеніемъ глазъ кнаружи.

7-я пара. *Личные нервы*, прободая околоушную железу, развѣтвляются въ мышцахъ лица. Управляютъ движеніемъ лица (личной мимикой).

8-я пара. *Слуховые нервы* направляются къ слуховому лабиринту. Управляютъ слухомъ.

9-я пара. *Языкоглоточные нервы*, выходятъ изъ черепа, даютъ вѣточки, развѣтвляющіяся въ миндалевидныхъ железахъ и въ небныхъ дугахъ. Оканчиваются въ желобообразныхъ сосочкахъ языка, управляя здѣсь ощущеніемъ вкуса.

10-я пара. *Блуждающіе* или *легочно-желудочные нервы* начинаются позади предыдущей пары, выходятъ изъ черепа, отдѣляютъ соединительныя вѣтви къ 9 и 11 парамъ, на всемъ пути образуютъ соединительныя вѣтви съ симпатическими нервами органовъ грудной и брюшной полостей. Управляютъ движеніемъ и чувствительностію.

Digitized by Google

11-я пара. *Прибавочные Виллизіевы нервы* начинаются позади предыдущей пары и оканчиваются въ мышцахъ боковой и задней части шеи и въ мышцахъ гортани.

12-я пара. *Подъязычные нервы* начинаются отъ продолговатаго мозга, входятъ въ языкъ и оканчиваются здѣсь. Управляютъ движеніемъ языка.

Нервы спинного мозга проходятъ по всему его протяженію въ количествѣ 31 пары, а именно: 8 *шейныхъ* паръ, 12 *грудныхъ* или *спинныхъ*, 5 *брюшныхъ* или *поясничныхъ*, 5 *крестцовыхъ* и 1 *копчиковая*. Части тѣла, въ которыхъ распространяются нервы спинного мозга, суть главнымъ образомъ туловище съ его внутренностями и конечностями. Ощущенія и произвольныя движенія здѣсь происходятъ при участіи тѣхъ нервныхъ нитей, которыя доходятъ до головного мозга. Непроизвольныя же движенія во внутренностяхъ зависятъ отъ тѣхъ нитей, которыя начинаются въ спинномъ мозгу. Каждый нервъ спинного мозга начинается *двумя корешками — переднимъ*, содержащимъ двигательныя волокна, и *заднимъ*, содержащимъ чувствительныя волокна. Между сосѣдними нервами спинного мозга образуются соединенія посредствомъ вѣточекъ, называемыя *нервными сплетеніями*.

Нервы туловища получаются главнымъ образомъ отъ нервныхъ паръ, выходящихъ изъ спинного мозга и отъ образуемыхъ ими сплетеній.

Главные стволы *симпатическаго* или *сочувственнаго нерва*, которыхъ два, идутъ по правой и лѣвой боковымъ сторонамъ позвоночника, отъ перваго шейнаго позвонка до копчиковой кости, проникая изъ грудной полости въ брюшную черезъ діафрагму; они соединяютъ собою лежащіе по длинѣ ихъ въ различныхъ мѣстахъ нервные узлы или гангліи. Отъ стволовъ симпатическихъ нервовъ и ихъ ганглій идутъ многочисленныя вѣточки, соединяющіяся съ вѣтвями нервовъ спинного мозга и образующія сплетенія въ грудной и брюшной полости, снабжающія вѣтвями различные внутренніе органы: сердце, легкія, желудокъ, кишки и пр., равно стѣнки всѣхъ кровеносныхъ сосудовъ.

Digitized by Google

Нервовъ верхнихъ конечностей семь:

1) *Крыльцевый нервъ*, самый задній стволъ плечевого сплетенія, снабжаетъ вѣтвями мышцы и кожу задней поверхности плеча.

2) *Средній плечевой нервъ* на нижней части плеча выходитъ за предплечіе и вступаетъ на ладонь, снабжаетъ вѣтвями мышцы, сгибающія и поворачивающія внутрь и отчасти кожу передне-внутренней поверхности руки.

3) *Мышечно-кожный нервъ* направляется къ большому пальцу, гдѣ развѣтвляется въ кожѣ, на тыльной сторонѣ, снабжаетъ вѣтвями плечевыя мышцы и кожу лучевой стороны предплечія и большого пальца.

4) *Лучевой нервъ* выходитъ позади подкрыльцевой артеріи, снабжаетъ вѣтвями мышцы и кожу задне-наружной поверхности плеча.

5) *Локтевой нервъ* идетъ внизъ по внутренней сторонѣ плечевой артеріи, снабжаетъ вѣтвями мышцы предплечія и кожу тыльной поверхности ручной кисти.

6 и 7) *Внутренніе подкожные нервы, большой и малый*, идутъ по внутренней сторонѣ плеча, снабжая вѣтвями кожу внутренней поверхности плеча и предплечія.

Нервы пальцевъ преимущественно получаются изъ средняго плечевого, изъ лучевого и локтевого нервовъ.

Ладонные нервы пальцевъ идутъ по обѣимъ сторонамъ пальцевъ до самыхъ ихъ концовъ.

Нервы нижней конечности происходятъ отъ поясничнаго и сѣдалищнаго сплетенія. Изъ вѣтвей поясничнаго сплетенія самую значительную представляетъ *бедреный нервъ*, который идетъ къ тазу по наружной сторонѣ поясничной мышцы и выходитъ на бедро изъ подреберной дуги, снаружи отъ бедреныхъ сосудовъ, распадается въ верхней части бедра на три тонкія вѣтви, изъ коихъ одна снабжаетъ кожу передней поверхности бедра до колѣна, другая распространяется въ кожѣ внутренней поверхности бедра до колѣна и третья идетъ снаружи бедреной артеріи, спускается къ внутреннему краю стопы, и своими вѣтвями снабжаетъ кожу внутренней поверхности бедра и голени и наружной—большого пальца.

Digitized by Google

Изъ сѣдалищнаго сплетенія происходятъ: 1) *ягодичные нервы*, развѣтвляющіеся въ ягодичныхъ мышцахъ 2) *задній подкожный нервъ*, развѣтвляющійся въ кожѣ задней и верхней части внутренней поверхности бедра и 3) *сѣдалищный нервъ*, который выходитъ изъ таза на заднюю поверхность бедра и на его срединѣ, а иногда и выше, раздѣляется на *мало-и больше-берцовые нервы*.

Мало-берцовый нервъ идетъ позади наружныхъ мыщелковъ на заднюю поверхность мало-берцовой кости, снабжаетъ вѣточками двуглавую мышцу бедра и кожу задней поверхности голени, дѣлится на два нерва, которые выходятъ на переднюю поверхность голени, снабжаютъ мышцы и кожу передне-наружной стороны голени и оканчивается на тыльной поверхности стопы, въ пальцахъ.

Больше-берцовый нервъ идетъ въ подколѣнную ямку, спускается къ внутренней лодыжкѣ; позади ея переходитъ на подошву и оканчивается въ пальцахъ.

Оба берцовые нервы соединяются между собою *икрянымъ нервомъ*, который оканчивается на наружной сторонѣ тыльной поверхности стопы.

Нервы головы получаются изъ головныхъ нервныхъ паръ, о которыхъ сказано выше; но кромѣ того кожа ушной области и затылка снабжается *большимъ затылочнымъ нервомъ*, который развѣтвляется въ кожѣ, шеѣ и затылкѣ.

Нервныя болѣзни.

(См. выше *Законъ поляризаціи* и *Нервн. точки для прилож. Эл.-Гом. жидкостей*—стр. 107 и 109).

Разстройства въ двигательныхъ нервахъ выражаются въ судорогахъ и параличахъ (см. эти болѣзни); разстройства же чувствительныхъ нервовъ характеризуются потерею или болѣзненнымъ усиленіемъ воспріимчивости и чувствительности. Притупленіе чувствительности называется *анестезіей*, возвышенная же чувствительность *невралгіей*.

Нервныя боли, *невралгіи*, бываютъ скоропроходящаго, неправильнаго или періодическаго, рвущаго, тянущаго, летучаго

Digitized by Google

характера съ мѣстнымъ жаромъ во время страданія, или безъ него, но часто сопровождаются одновременно мѣстнымъ потомъ—чего никогда не бываетъ при воспалительныхъ боляхъ,—приступами жара безъ лихорадки или временной послабляющей лихорадкой въ умѣренной степени; безсонницею, угнетеннымъ состояніемъ духа, склонностью къ истерическимъ припадкамъ или фантастическимъ идеямъ; боли эти усиливаются, когда больной думаетъ о нихъ, и облегчаются, когда вниманіе больного отвлечено интересующими его предметами, или они усиливаются отъ прикосновенія и легкаго дотрогиванія и облегчаются отъ давленія, не сопровождаясь никакими измѣненіями аппетита и жажды; они характеризуются появленіемъ непроизвольныхъ движеній, какъ бы подергиваній, или ощущеніемъ пробѣганія дрожи по тѣлу, или дрожаніемъ въ отдѣльныхъ членахъ, въ послѣднемъ случаѣ часто безъ внѣшняго проявленія такого состоянія,—они характеризуются сильною безсонницею и чувствомъ разбитости съ послабляющей лихорадкой или безъ нея, своею прерывистостью или періодичностію, и тѣмъ, что будучи обыкновенно разсѣваемы усидчивымъ занятіемъ или упорнымъ превозмоганіемъ ихъ, они продолжаютъ возвращаться, не смотря на лѣченіе, не оказывая впрочемъ, въ теченіе извѣстнаго времени, вліянія на общее состояніе здоровья.

Къ наиболѣе частымъ невралгіямъ, которыя преимущественно наблюдаются въ сырое и холодное время года, относятся невралгіи: *зубная*, *личная*, *бедреная*, *мигрень* (онѣ описаны въ этой книгѣ въ своихъ мѣстахъ) и *межреберная*, которая заключается въ сильной боли въ межреберныхъ промежуткахъ. Боль исходитъ отъ позвоночнаго столба и оканчивается близъ грудной кости. Во время ожесточенныхъ пароксизмовъ затрудняется дыханіе, кашель и движеніе корпусомъ усиливаютъ боль. Эта невралгія чаще поражаетъ женщину, чѣмъ мужчину, по большей части появляется у людей малокровныхъ и особенно хлоротическихъ женщинъ, или какъ послѣдствіе грудныхъ болѣзней. (Ср. *Ревматизмъ мышцъ*).

По общему мнѣнію всѣхъ авторовъ, къ числу причинъ

Digitized by Google

главныхъ, случайныхъ или предрасполагающихъ къ невралгіямъ относятся низкая температура и сырое состояніе атмосферы.

При лѣченіи нужно прежде всего убѣдиться, самостоятельная ли это невралгія, или же она соединяется съ другою болѣзнію, общею или мѣстною.

Всякая случайная нервная боль, невралгія, если она въ головѣ, проходитъ отъ компр. *Эл. Б.*, а въ другихъ частяхъ тѣла отъ прилож. *Эл. Кр.* или *Анж.* Въ упорномъ случаѣ: обтираніе *V.* со спиртомъ; или ван., мази, прим. *C.* 5, *S.* 1, *A.* 2 или *S.* 5 или теплыя ванны для ногъ и рукъ съ 20 каплями *Эл. Кр.* на 4 литра воды. При перемежающейся невралгіи вн. *F.* 1 (1-й ст.) и въ сухихъ круп. съ пищею. При головной или личной невралгіи вн. *A.* 3, а во всѣхъ прочихъ случаяхъ *S.* 3 и *C.* 1. (Ср. *Головная боль*, *Мигрень*). Для избѣжанія возврата болѣзни и для уничтоженія предрасполагающей причины вн. *S.* 3 и *A.* 3.

Воспаленіе нервовъ заключается въ воспаленіи нервной оболочки, которая значительно утолщается и даже подвергается нагноенію. Причиною бываютъ ушибы и раны. Симптомы: жестокая боль по направленію нерва, который прощупывается въ видѣ толстаго шнурка, и при давленіи на него боль усиливается; въ членахъ, въ которыхъ проходятъ мелкіе вѣточки больного нерва, чувствуется тупая боль и онѣмѣніе. Лѣчится какъ невралгія.

Неврастенія, *общая невропатія* характеризуется непрерывною смѣсью чрезмѣрной возбужденности и истощенія, страданія и апатіи, спазмовъ и ослабленія, чрезмѣрной чувствительности и равнодушія, умственнаго возбужденія и полнѣйшаго безсилія мысли—потрясена вся спинно-мозговая система. Въ *головѣ* чувствуется пустота, тяжесть, круженіе, сопровождаемыя безсонницей, кошмарами, страшными сновидѣніями. *Органы чувствъ* разстроены: *глаза* теряютъ зоркость, не различаютъ цвѣтовъ, страдаютъ галлюцинаціями, боятся свѣта; *слухъ* разстроенъ разными ощущеніями звуковъ и шумовъ; *вкусъ* и *обоняніе* усилены и извращены; *кожа* становится на

Digitized by Google

столько чувствительной, что малѣйшее дуновеніе или прикосновеніе причиняютъ невыносимое ощущеніе. *Сердце* и *кровообращеніе* разстроены до того, что больному каждую минуту угрожаетъ сердцебіеніе или біеніе артерій, обмороки и припадки грудной жабы. *Дыханіе* то ускоряется, то замедляется спазмами. *Пищеварительные органы* разстроены. Что же касается невралгіи желудка, печени, почекъ и сердца, то ихъ не перечтешь. Къ этому еще присоединяются невралгіи половыхъ органовъ, боль сочлененій, раздраженіе спинного мозга. Характеръ становится мрачнымъ, раздражительнымъ, страннымъ; нравственное чувство то возбуждено, то подавлено; умственныя способности тупѣютъ. Всякое искусственное усиліе больныхъ влечетъ за собою еще болѣе значительное нервное ослабленіе. Страдающіе долгое время неврастеніей становятся малокровными и истощенными, и не смотря на это могутъ достигнуть преклоннаго возраста. У каждаго больного страдаетъ по преимуществу та или другая функція, тотъ или другой органъ. Отсюда многочисленныя градаціи этой болѣзни.

Не смотря на большое сходство неврастеніи съ душевными болѣзнями, психопатіями, она не имѣетъ съ послѣдними ничего общаго, но она является почвой для развитія самыхъ тяжелыхъ нервныхъ разстройствъ и даже умопомѣшательства, если ее оставлять безъ вниманія и лѣченія. Надо однако помнить, что за неврастенію не должна быть принята всякая преходящая нервная слабость, а лишь тѣ формы послѣдней, которыя являются болѣе длительными. Въ первоначальной стадіи своей неврастенія можетъ быть сравнительно легко и скоро излѣчена; въ случаяхъ же запущенныхъ излѣченіе также еще возможно, но для этого можетъ потребоваться значительно больше времени. Это относится особенно къ случаямъ *неврастеніи наслѣдственной*, въ отношеніи которой важнѣе всего *лѣченіе предупреждающее*. Въ этомъ смыслѣ женщина, коль скоро въ роду ея имѣются тяжелыя нервныя разстройства или она сама страдаетъ чѣмъ либо подобнымъ, должна во время каждой беременности принимать соотвѣтствующія лѣкарства въ опредѣленной послѣдовательности, а именно: въ

Digitized by Google

началѣ беременности въ первую недѣлю 3 раза въ день по 5 круп. *A.* 3, во вторую недѣлю—*C.* 1, въ третью—*F.* 1 и въ четвертую—*V.* Когда этотъ кругъ лѣченія оконченъ, начать его съизнова и такъ продолжать вплоть до разрѣшенія отъ беремени.

Если лѣченіе такое пропущено было, то лѣкарство давать ребенку, родившемуся съ наслѣдственными задатками болѣзни, втеченіе цѣлаго года, а именно въ первую недѣлю утр. и веч. по 1 круп. *A.* 3, во вторую—*C.* 1, въ третью—*F.* 1, въ четвертую—*V.* и 2 раза въ недѣлю тепловатая ванна изъ A. 2, *C.* 5, *F.* 2 и *V.* по 10 круп. на ванну.

Само собою разумѣется, что у дѣтей весьма важную предупреждающую роль играетъ правильное, раціональное воспитаніе, тѣлесное и душевное. Одной изъ самыхъ губительныхъ причинъ неврастеніи является онанизмъ.

Лѣкарственное лѣченіе уже имѣющейся неврастеніи даетъ тѣмъ лучшіе результаты, чѣмъ ранѣе оно предпринято, чѣмъ энергичнѣе устранены вызывающія причины (ср. *Онанизмъ*).

Въ началѣ болѣзни вн. 3 раза въ день по чайн. лож. 1-го усилен. разведенія *S.* 1 передъ ѣдой, кажд. веч. передъ отходомъ ко сну 2—5 круп. *Verm.* 1 и кажд. утро 1—3 круп. *F.* 1; въ нѣкоторыхъ случаяхъ еще 3 раза въ день послѣ ѣды 1—3 круп. *V.* На голову *Эл. Бѣл.*

Если болѣзнь успѣла уже значительно развиться, то давать *A.* 3 × *S.* 2 × *F.* 1 въ средней дозѣ и еще тѣ крупинки, которыя указаны выше для начала болѣзни. Устранять запоры.

При сильномъ развитіи болѣзни давать тѣ же *A.* 3 × *S.* 2 × *F.* 1, но изъ 3-го до 1-го стак., растираніе тѣла растворомъ *Эл. Кр.* Кромѣ того утромъ и вечеромъ сидячая ванна—либо тепловатая, продолжительностью 15 мин., либо прохладная—продолж. 5—15 минутъ,—съ прибавленіемъ 15 круп. *A.* 2 и 30 круп. *S.* 2, *L.* и *V.*

Послѣ ванны лечь на 10—15 мин. въ постель. Заботиться о правильномъ ежедневномъ испражненіи на низъ.

Діэта должна быть легкая, нераздражающая; избѣгать вся-

Digitized by Google

жихъ возбуждающихъ напитковъ, крѣпкаго чая, кофе, также спиртныхъ напитковъ.

Нервная одышка.—См. *Астма.*

Нижнія конечности, *ноги* органы стоянія и ходьбы, свѣшиваются съ боку таза, у взрослаго равняются почти половинѣ всей длины тѣла, прикрѣпляются къ туловищу и состоятъ каждая изъ нѣсколькихъ отдѣловъ, соединенныхъ между собою сочлененіями. Въ каждомъ отдѣлѣ отличаютъ двѣ поверхности переднюю и заднюю, и два края: наружный и внутренній. Каждая нога распадается на бедро, голень и стопу.

а) *Бедро,* простирающееся отъ бедренаго до колѣннаго сочлененія, имѣетъ только одну кость *бедреную,* окруженную сильными мышцами и вставленную своею головкою въ вертлужную впадину. Лежащая въ бедреномъ сочлененіи крѣпкая связка, приросшая однимъ концомъ къ головкѣ бедреной части (вертлуга), а другимъ къ вертлужной впадинѣ, служитъ къ ограниченію вращательнаго движенія бедра. На передней и задней его сторонахъ, между мышцами, начинающимися отъ таза (онѣ движутъ бедро и голень), пробѣгаютъ большіе нервы и сосуды.

б) *Колѣно,* съ *колѣнною полостію* внутри, образуется нижнимъ концомъ бедреной кости, верхнимъ концомъ большой берцовой и спереди *колѣнною чашкою.* Въ *подколѣнной ямѣ,* лежащей на задней сторонѣ колѣннаго сочлененія, проходятъ довольно большіе сосуды и нервы.

в) *Голень* идетъ отъ колѣннаго до стопнаго сочлененія и имѣетъ 2 кости, изъ коихъ болѣе толстая, лежащая на внутренней сторонѣ, соотвѣтственно большому персту, называется *большимъ берцомъ,* а болѣе тонкая, лежащая снаружи противъ малаго перста—*малымъ берцомъ.* Обѣ кости у стопнаго сочлененія имѣютъ по бугру или *мыщелку.* Сильныя мышцы на задней сторонѣ голени, образующія *икру* и дѣятельныя особенно при танцахъ, соединяются въ *Ахиллесово сухожиліе,* которое прикрѣпляется къ пяткѣ.

г) *Стопа съ подошвой* и *подъемомъ,* по строенію своему, очень сходна съ кистью. Она распадается на *заплюсневую* часть.

Digitized by Google

(съ 7-ю костями), *плюсневую* (съ 5-ю) и 5 *пальцевъ* (или перстовъ) съ ихъ сосудами. На подошвѣ лежатъ 2 артеріальныхъ дуги и довольно толстые нервы.

Болѣзни нижнихъ конечностей.

Бедреная боль, невралгія сѣдалищнаго нерва, поражаетъ почти всегда лишь одно бедро и обнаруживается отсутствіемъ свободныхъ отъ боли промежутковъ, боль по направленію сѣдалищнаго нерва имѣетъ постоянный характеръ, существуетъ боль въ спинѣ, поясницѣ и на мѣстѣ выхода сѣдалищнаго нерва изъ таза. Употребленіе Эл. Гом. жидкостей часто бываетъ достаточно, чтобы вылѣчиться. Сперва прикладываютъ къ бедр. нерв. и ко всѣмъ чувствительнымъ вѣтвямъ этого нерва *Эл. Кр.*, если недостаточно, то *Эл. Желт.*, одно, или попер. съ *Эл. Кр.* Если боль не проходитъ отъ *Эл.*, то втирать въ тѣ же мѣста мазь *A.* 2 и *C.* 5. Во всякомъ случаѣ вн. *S.* 1 и иногда *A.* 1. Въ упорн. случаѣ: *C.* 1 (2-й ст.), ван., мазь, прим. *S.* 1, *C.* 5, *S.* 5. Для сангвиника употребляютъ *Эл. Анж.*, ван., мазь, прим. *A.* 2. На сердце мазь, прим. *A.* 2.

Если бедрен. боль происходитъ отъ сифилиса, то вн. *V.* × *S.* 1, а иногда *A.* 2.

Во всѣхъ случаяхъ надо дать больной ногѣ спокойное положеніе. Въ упорныхъ случаяхъ—горячіе компр. изъ *A.* 2, *C.* 5 по 30 круп. въ двухъ стак. воды, часто смѣняемые, въ теченіе 1—2 часовъ, послѣ чего опять прилож. *Эл.* въ нервн. точкахъ бедреного нерва. Внутрь: *A.* 1 × *L.* × *F.* 1 (3—2-й ст.) у мужчинъ; у женщинъ же—*A.* 1 × *C.* 1 × *F.* 1 (3—2-й ст.).

Бѣлая болящая опухоль бедеръ (*Phlegmasia alba dolens*) у женщинъ, т. е. воспаленіе клѣтчатки при параметритѣ.

Эта болѣзнь встрѣчается у женщинъ послѣ первыхъ родовъ, бываетъ на одной изъ ногъ или на одной изъ рукъ. Опухоль мягкая, отечная, синевато-матовая, усѣянная красноватыми полосками по длинѣ сосудовъ (см. *Воспаленіе венъ*) или красными пятнами, и иногда черноватыми пузырьками. Эта болѣзнь распознается еще по боли, занимающей весь членъ или же

Digitized by Google

только путь сосудовъ, и по снурку твердому, узловатому, образуемому одною изъ венъ, которая могла сростись, или же всѣми венами конечности; на послѣдней могутъ образоваться нарывы, гангренозный струпъ, рожа и пр. Вн. *A.* 1 × *C.* 1 (2-й ст.) и нар. мазь *C.* 5 × *A.* 2.

Вывихъ бедра можетъ быть случайный, вслѣдствіе паденія, и тогда прибѣгаютъ къ хирургіи. Когда бедро будетъ вправлено, то примѣняютъ лѣченіе противъ вывиха костей.

Воспаленіе тазобедреннаго сустава, полное или ограниченное, развивается чаще всего на почвѣ золотухи. Начинается съ того, что ребенокъ начинаетъ прихрамывать, причемъ онъ жалуется на боль больше въ колѣнѣ, нежели въ бедреномъ суставѣ, что объясняется отраженностью бедреной боли. И дѣйствительно при ближайшемъ изслѣдованіи колѣно оказывается здоровымъ, движеніе же ноги (сгибаніе, поворачиваніе) вызываетъ сильную боль въ бедреномъ суставѣ. При самопроизвольныхъ же движеніяхъ вмѣстѣ съ суставомъ поворачивается или сгибается и тазъ. Если не захватить болѣзнь въ этомъ начальномъ періодѣ, то воспаленіе идетъ дальше, образуется опухоль, которая можетъ перейти въ нагноеніе съ разрушеніемъ кости (см. *Костоѣда*).

Лѣченіе. Болѣзнь эта требуетъ обыкновенно хирургическаго и лѣкарственнаго лѣченія. Первое въ начальномъ періодѣ заключается въ приданіи ногъ спокойнаго положенія и вытяженіи посредствомъ особыхъ приборовъ.

Лѣченіе очень упорно. Начинаютъ съ продолжительнаго употребленія *S.* 1 (1—2-й ст.), затѣмъ позже даютъ *S.* 2 (1—2-й ст.) съ компр., мазью и ван. *S.* 1 × *S.* 5 и съ пищею сух. кр. *S.* 1, что въ началѣ болѣзни бываетъ достаточно, чтобы уничтожить воспаленіе; если имѣется лихорадка, то прибавляютъ еще *A.* 1 (2-й ст.). Но если сочлененіе опухло, головка бедра двигается только по краю вертлужной впадины ноги, атрофируется и нарывъ неизбѣженъ, то, чтобы способствовать его вскрытію, даютъ утр. и веч. по 10 сух. кр. *C.* 4, въ продолженіи дня *S.* 1 × *C.* 1 (1-й ст.), компр. *C.* 1 × *C.* 5 и одну ванну въ день *C.* 5. Наружно *Эл. Бѣл.*

Digitized by Google

Въ упорн. случ. *А.* 3 × *С.* 3 (3—2-й ст.) или *С.* 4, С. 5. Компрессы изъ *Эл. Зел.* (Ср. *Костопда*).

Острое воспаленіе колѣннаго сустава является вслѣдствіе механическаго поврежденія, но также въ видѣ осложненія при нѣкоторыхъ остр. и хронич. болѣзняхъ, какъ тифъ, скарлатина, золотуха, трипперъ и проч. Чаще всего оно бываетъ при суставномъ ревматизмѣ. Воспаленіе это сопровождается общей лихорадкой. Колѣно опухаетъ и очень болѣзненно. Если болѣзнь запустить, то опухоль нагнаивается и прорывается наружу. *Лѣченіе*: спокойное и удобное положеніе больной ноги; впредь до полнаго выздоровленія больной не долженъ дѣлать никакихъ движеній. Вн. *А.* 1 × *С.* 1 или *С.* 2 (3—2-й ст.). Примочка изъ *Эл. Бѣл.*, надъ ней вначалѣ холодный, затѣмъ согрѣвающ. компрессъ изъ *А.* 2 и *С.* 5 по 20 круп. въ 2 стак. воды. Если горячо на ощупь, то, вм. *Эл. Бѣл.*, прил. *Эл. Анж.* Также 3 раза въ день по 5 круп. *S.* 1.

Бѣлая опухоль колѣна (*Tumor albus genu*), хронич. воспал. колѣна является вслѣдствіе остраго воспаленія этого сустава. Происхожденіе и теченіе такое же, какъ при воспаленіи тазобедренаго сустава. (См. выше).

Признаки, которыми бѣлая опухоль отличается отъ воспаленія сустава, кромѣ хроническаго теченія болѣзни, суть слѣдующіе: опухоль сустава значительно велика, имѣетъ круглую или веретенообразную форму, тверда. Очертанія сустава совершенно сглаживаются. Кожа, покрывающая суставъ, истончается, становится лоснящеюся и блѣдною. Весь органъ, на которомъ поражено сочлененіе, сильно худѣетъ. Почти всегда образуется сведеніе въ пораженномъ сочлененіи. Боли въ пораженномъ сочлененіи бываютъ незначительныя, когда болѣзнь уже приметъ хроническій характеръ. Въ то время, когда болѣзнь обостряется, боли бываютъ сильнѣе, появляется и общее лихорадочное состояніе.

Лѣченіе вообще то же, что при воспаленіи тазобедренаго сустава (см. выше). Въ упорн. случаѣ *А.* 2 × *С.* 5 (1-й ст.); черезъ часъ по 1 кр. *С.* 5; ван., мазь прим. *С.* 5, *S.* 1, *S.* 5. На соотвѣт. нер. *Эл. Б.* къ зат. и симп. нерв. *Эл. Кр.* × *Ж.* × *Анж.*

Digitized by Google

Мягкая опухоль на ногѣ, безболѣзненная, уступающая нажиманію пальца, происходящая часто отъ болѣзни сердца, скоро вылѣчивается слабыми дозами *A.* 1. Въ упорн. случаѣ *A.* 2, *C.* 2 (2-й ст.). Ван. *C.* 5, *A.* 2, мазь, прим. *A.* 2, къ зат. и симп. нер. *Эл. Анж.* На подвзд. мазь, прим. *F.* 2.

Излѣченія. М. 50 л. страдалъ неподвижностью ноги вслѣдствіе опухоли на ногѣ, образовавшейся отъ простуды. Опухоль была вылѣчена аллопатами, но нога не двигалась 30 лѣтъ. Вн. *S.* 1 и нар. обмываніе ноги растворомъ 20 кр. *S.* 1 на ст. воды, а потомъ растворомъ 20 капель *Эл. Б.* въ ст. воды. Вылѣченъ въ 3 мѣс. (С.).

— *Бедренная невралгія* у м. была вылѣчена неоднократно смѣсью *S.* 1, *A.* 1, *C.* 1 и *V.* (1-й ст.) и два раза 2 каплями *Эл. Б.* въ стаканъ воды по чайной л. черезъ ¼ ч. (С.).

— *Бѣлая опухоль колѣна*, существовавшая 11 лѣтъ у ж. 30 л., была вылѣчена въ 6 мѣс. вн. *S.* 1 (1-й ст.), нар. прим. *C.* 1 и компр. *Эл. Кр.* и *Бѣл.* (*C.*).

Носъ. Аппаратъ обонятельнаго чувства есть *носовая полость.* Она выстлана *слизистой оболочкой*, въ которой распространяются окончанія *обонятельнаго нерва.* Запахъ мы ощущаемъ только тогда, когда пахучее вещество попадаетъ въ носовую полость и приходитъ здѣсь въ соприкосновеніе съ влажной, слизистой оболочкой и обонятельнымъ нервомъ; этотъ послѣдній передаетъ свое раздраженіе головному мозгу, который воспринимаетъ обонятельное впечатлѣніе. Другія необонятельныя впечатлѣнія, происходящія иногда въ носовой полости, какъ напримѣръ щекотаніе, зудъ, жаръ и т. п., воспринимаются не обонятельнымъ, а чувствительными нервами.

Обонятельный аппаратъ раздѣляется на выдающійся на лицѣ *наружный носъ* и носовую полость или *внутренній носъ.* Наружный носъ, на которомъ различаютъ *корень* (переносье), *спинку, крылья* и *ноздри,* имѣетъ въ нижней своей части хрящевую основу, а въ верхней костную. Онъ служитъ отчасти для входа и выхода воздуха, отчасти для прикрытія собственно обонятельнаго органа и отстраненія отъ него вредныхъ вліяній извнѣ. Носовая слизистая оболочка очень богата нервами и

Digitized by Google

кровеносными сосудами; она часто подвергается воспаленію (насморку, катарру).

Обоняніе различается по двумъ главнымъ состояніямъ: 1) по недостатку или потерѣ обонянія, что можетъ быть приписано нервному разстройству, или насморку, или разстройству пищеваренія; и 2) по нормальному состоянію обонянія, какъ напр. ощущеніе гнилого запаха, зависящее или отъ мѣстной болѣзни язвеннаго или гнойнаго характера въ полости носа или нёба, или отъ склонности къ гнилостному зараженію крови или какъ расположеніе къ апоплексіи, или какъ напр. ощущеніе своеобразнаго запаха, не гнилостнаго, но могущаго быть очень непріятнымъ, что зависитъ отъ спазмодическаго пораженія нервнаго аппарата обонянія.

Болѣзни полости носа.

Опухоль носа, насморкъ. При начинающемся насморкѣ принимаютъ каждый часъ по 5 сух. круп. *F*. 1. При образовавшемся насморкѣ вн. *S*. 1 и на переносицу *Эл. Кр.* При сильномъ насморкѣ, обильномъ отдѣленіи слизи, головной боли, опухоли носа вн. *S*. 1 × *F*. 1 (1-й ст.), и, кромѣ приложенія къ переносицѣ *Эл. Кр.*, дѣлать пульверизаціи или втягиванія *Эл. Зел.* (одна чайная ложка на стаканъ соленой воды).

Хроническій насморкъ съ нагноеніемъ. Безпрестанное заложеніе носа, въ ноздряхъ струпъ съ истеченіями крови или гноя, какъ только струпъ оторвутъ; при сморканіи отдѣляется слизь цвѣта желтаго, зеленаго и вонючаго запаха. Если нагноеніе переходитъ на кости и хрящи носа, то образуется костоѣда; носъ опухаетъ, становится фіолетовымъ, и затѣмъ обезображивается совершенно. *S*. 1 побѣждало насморкъ въ высшей степени его развитія и даже при образованіи костоѣды. А потому его даютъ въ продолженіи нѣкотораго времени изъ 2-го ст. и въ пульверизаціяхъ или втягиваніяхъ, послѣ чего переходятъ къ *S*. 1 × *C*. 1 (2-й ст.), или *C*. 1 × *V*. (2-й ст.). Во всякомъ случаѣ частые компрес. на переносицу изъ *Эл. Зел.* и втягиванія или пульвериз. носомъ соленой воды съ

Digitized by Google

C. 5 × *S.* 1. Введеніе въ носъ *зеленыхъ бужей* или мазь *C.* 5 съ *Эл. Зел.* Хронич. насморкъ бываетъ особенно часто при золотухѣ (см. эту).

Кровотеченіе изъ носа быстро останавливается отъ компресса и втягиванія *A.* 2 съ *Эл. Анж.* и отъ приложенія послѣдняго на переносицу, и вн. *A.* 1 (3-й ст.). Если кровотеченіе бываетъ часто, то нужно распознать причину, или оно бываетъ отъ прилива крови къ мозгу или вслѣдствіе общаго ослабленія. Въ первомъ случаѣ кровотеченіе будетъ активное и даютъ *A.* 1 (2 - 3-й ст.), прим. *A.* 2 съ *Эл. Анж.* Во второмъ случаѣ оно будетъ пассивное и требуетъ въ особенности *S.* 1 (1—2-й ст.) и немного *A.* 1. Въ послѣднемъ случаѣ питательная пища необходима.

Полипы, губчатые нарывы на носовой слизистой оболочкѣ Вн. *A.* 2 × *C.* 1 или *C.* 5 × *S.* 5 или *V.* × *A.* 2; втягиванія или пульверизаціи изъ тѣхъ же лѣкарствъ. Въ упорн. случаѣ *A.* 1 × *C.* 3 (3 — 2-й ст.). Спринцов. или втягиваніе раствора *L.* и *C.* 5 по 10 круп. и *Эл. Зел.* 20 капель на стак. воды; при кровотеченіи — раствора 10 круп. *A.* 2 и 20 кап. *Эл. Анж.* на стак. воды. 3 раза въ день внутрь по 1 каплѣ *Эл. Зел.* въ столов. л. воды, какъ промежуточн. лѣкарство. Каждый вечеръ вводить въ носъ *зеленый бужъ*.

Потеря обонянія или его притупленіе. Вн. *S.* 1 на перенос. утромъ и вечеромъ *Эл. Кр.* Въ упорн. случаѣ на перенос. мази, прим. *C.* 5 и *A.* 2. Втягиваніе или пульв. *S.* 1.

Измѣненія. М. 11 л. страдалъ съ рожденія своего вонючимъ нагноеніемъ носа съ потерею обонянія. Вылѣченъ въ 1 годъ вн. *S.* 1, *A.* 2 и *C.* 4 попер. изъ 1-го ст. Мазь и втягив. *C.* 4. На перенос. *Эл. Кр.* × *Желт.*

М. 36 л. имѣлъ полипъ въ носу 4 г. сряду, предполагалась операція. Вылѣченъ въ 1 годъ: вн. *A.* 2 × *C.* 4, пульверизація носа изъ тѣхъ же лѣкарствъ и *Эл. Анж.* на 6 гл. точ. подглаз. и надглаз. нерв. (*C.*).

Нѣмота вслѣдствіе ушиба, паденія и другихъ случайностей почти всегда вылѣчивалась однимъ *Эл.* Выборъ *Эл.* зависитъ отъ темперамента больного. Вн. одно изъ слѣд.: *S.* 1, *C.* 1, *A.* 2, (1-й ст.). На всю голову мазь *C.* 5, *S.* 1 и *Эл. Бѣл.* Вн. *C.* 5

Digitized by Google

На 6 гл. точ. и подъяз. нерв. *Эл. Кр.* × *Желт.* На подвзд. мазь, прим. *F.* 2, *C.* 5.

Затруднительное произношеніе неоднократно вылѣчивалось однимъ *Эл. Кр.* или попер. съ *Желт.* Вн. предыдущія лѣкарства.

Излѣченіе. М. 20 л. съ 7 л. оглохъ и онѣмѣлъ вслѣдствіе испуга. Въ Іюнѣ 1897 г. было назначено вн. *A.* 1 × *S.* 1 (1-й ст.) и втирать спиртъ *C.* 5 во всю голову и въ подъяз. нервы. Черезъ 2½ мѣс. такого лѣченія слухъ у него возвратился и онъ началъ говорить, но съ трудомъ. Было назначено продолжать это лѣченіе, и кромѣ того на подъяз. нервы *Эл. Кр.* (*C.*).

Обморокъ состоитъ во временномъ прекращеніи дѣятельности головного мозга,—отъ минутнаго омраченія мысли, дурноты въ головѣ, съ пошатываніемъ, до совершеннаго безчувствія, неподвижности, холодѣнія тѣла, прекращенія біенія жилъ и едва замѣтнаго дыханія. По силѣ и продолжительности припадка различаютъ: 1) *Слабый обморокъ*—головокруженіе, потемнѣніе въ глазахъ, дурнота, причемъ сознаніе не теряется. 2) *Глубокій обморокъ*—сознаніе пропадаетъ совершенно, дыханіе и пульсъ едва замѣтны; послѣ припадка—большая слабость, блѣдность, очень дурное самочувствіе; 3) *Мнимую смерть*—перерывъ всякихъ проявленій жизни, остановка дыханія, отсутствіе пульса, словомъ — состояніе, очень похожее на смерть, но отъ послѣдней отличается только отсутствіемъ окоченѣнія и гніенія.

Причинами такихъ состояній могутъ служить необычайныя нервныя или душевныя волненія, дурныя испаренія, испорченный воздухъ, рѣзкіе запахи, отравленія ядами, утопаніе и проч. (Ср. *Пораженіе молніей*, *Утопленники*, *Отравленія*).

Впавшему въ глубокій обморокъ прежде всего нужно освободить шею, грудь и поясъ, чтобы ничто не стѣсняло дыханія, потомъ брызгать въ лицо холодною водою (мелкими брызгами), тереть подошвы щеткою. Полнокровныхъ при этомъ надобно класть такъ, чтобы голова была приподнята высоко; малокровныхъ, наоборотъ, пониже. Надо позаботиться о томъ, чтобы больной дышалъ чистымъ, свѣжимъ воздухомъ. Слѣдуетъ пы-

Digitized by Google

таться вливать ему въ ротъ понемногу свѣжей воды, дать понюхать уксусу, нашатырнаго или камфорнаго спирту; въ трудныхъ же случаяхъ обморока и мнимой смерти необходимо произвести *искусственное дыханіе*, цѣль котораго та, чтобы заставить воздухъ входить въ легкія и выходить изъ нихъ. Оно производится различными способами; проще всего поступаютъ такъ: обмершаго кладутъ лицомъ внизъ, подъ грудь подкладываютъ свернутое платье и немного надавливаютъ на спину; этимъ воздухъ выдавливается (выдыханіе); потомъ тѣло берутъ за плечо и медленно поворачиваютъ на бокъ и на спину; благодаря этому грудь расширяется и воздухъ входитъ въ легкія (вдыханіе), а вслѣдъ за этимъ снова поворачиваютъ лицомъ внизъ; это повторяютъ разъ до 15-ти въ минуту. Другой способъ: обмершаго кладутъ на спину въ нѣсколько наклонномъ положеніи, потомъ кто-нибудь становится въ головахъ его, беретъ его руки повыше локтей и равномѣрно отводитъ отъ дѣла, разводитъ и поднимаетъ ихъ, доводитъ локти до висковъ и слегка потягиваетъ ихъ на себя (это вдыханіе), потомъ локти приводятъ опять тѣмъ же путемъ равномѣрно къ бокамъ груди и прижимаютъ крѣпко къ грудной клѣткѣ (выдыханіе). Это повторяется до 15-ти разъ въ минуту; при чемъ выдыханію можно помогать легкимъ надавливаніемъ на животъ руками, а вдыханію—вытягиваніемъ ногъ.

На языкъ положить 10 круп. *S.* 1. Если обморокъ продолжается, повторить эту дозу. На нервн. точки 11, 12, 5, 6, 7, *Эл. Кр.* На сердце холодн. примочки изъ *А.* 2 и *Эл. Анж.* При склонности къ частымъ обморокамъ давать 3 раза въ день по чайн. лож. *S.* 1 усиленнаго разведенія. Причину обморока устранить или лѣчить.

Онанизмъ, рукоблудіе, т.-е. такое извращеніе полового влеченія, при которомъ половыя части раздражаются для изверженія сѣмени не естественнымъ совокупленіемъ, а треніемъ руками. Это совершается обыкновенно только тайно, наединѣ. Онанизмъ бываетъ у обоихъ половъ и почти во всѣхъ возрастахъ, но особенно въ юношескомъ, между 13 и 17 годами, и если скоро отъ него не отстанутъ, то теряются уже въ юности

Digitized by Google

силы. У дѣвочекъ потребность растирать половыя части руками или объ что либо твердое является часто вслѣдствіе скопленія въ этихъ частяхъ маленькихъ глистовъ (острицъ). У женщинъ рукоблудіе ведетъ къ бѣшенству матки, нимфоманіи. (См. эту).

У обоихъ половъ онанизмъ ведетъ къ общему нервно-мозговому и тѣлесному разстройству, питаніе организма падаетъ, развиваются малокровіе и слабость.

Лѣченіе. Послѣдствія рукоблудія, если оно во время не было оставлено, часто очень трудно поддаются лѣченію. Поэтому необычайно важны мѣры предупрежденія развитія этого пагубнаго порока. Уже съ самаго ранняго возраста мальчиковъ и дѣвочекъ надо слѣдить за тѣмъ, чтобы они не трогали руками своихъ половыхъ органовъ; если имѣются причины, вынуждающія ихъ къ этому (зудъ вслѣдствіе нечистаго содержанія или глистовъ—у дѣвочекъ), то таковыя должны быть устраняемы. Надо пріучать дѣтей спать такъ, чтобы руки лежали близко къ головѣ, а не къ половымъ частямъ. Постель должна быть не слишкомъ мягкая, а одѣяло не слишкомъ теплое. Держать дѣтей подальше отъ всего, что можетъ вызывать сладострастныя фантазіи. Дѣвочки не должны садиться верхомъ на качалки, спускаться верхомъ по периламъ лѣстницы и т. п. Проснувшись утромъ со сна, дѣти должны немедленно оставлять свои постели, а не валяться въ нихъ понапрасну. Если они слишкомъ долго остаются въ отхожихъ мѣстахъ, то это должно казаться подозрительнымъ и заставить выяснить причину. Слѣдуетъ ихъ оберегать отъ знакомства съ нравственно испорченными дѣтьми. Правильное вообще воспитаніе служитъ самымъ лучшимъ предупреждающимъ средствомъ. Тѣлесныя упражненія на чистомъ воздухѣ, купанья, обмыванія тѣла холодной водой, нераздражающая пища.

Юноши и дѣвицы должны быть возможно раньше освѣдомлены о пагубности онанизма, и это есть лучшее средство для предотвращенія возможности развитія у нихъ этого порока или для оставленія его, если онъ уже имѣется.

Противъ послѣдствій онанизма должны быть приняты слѣдующія мѣры. Прежде всего, въ отношеніи діэты: пища должна

Digitized by Google

быть легкая и не раздражающая, безъ пряностей, преимущественно молочная и растительная; мяса употреблять лишь въ самыхъ малыхъ количествахъ; безусловно же избѣгать возбуждающихъ напитковъ—водки, винъ, пива, кофе. Ужинать не позднѣе, какъ часа за три до отхода ко сну, и не ложиться спать съ неопорожненнымъ предварительно мочевымъ пузыремъ. Если въ теченіе дня не было испражненія на низъ, то вечеромъ передъ сномъ поставить опорожняющій клистиръ изъ двухъ-трехъ стакановъ тепловатой воды. Не спать на спинѣ или животѣ, а въ одномъ изъ боковыхъ положеній тѣла. Послѣднія мѣры очень важны для предупрежденія ночныхъ возбужденій и поллюцій.

Противъ послѣдствій онанизма вн. *S.* 1 (1-й ст.) или 3 раза въ день по 5 круп. *S.* 1 сух. На главн. нервн. точки *Эл. Кр.* При разстройствѣ кровообращенія прибавить *A.* 1 (3—2-й ст.), на сердце мазь *A.* 2, прохладн. ванны съ *S.* 1 и *A.* 2.

Въ упорн. случ. *C.* 1 и *C.* 5 вн. и нар., также другіе номера Скрофолозо.

Онѣмѣніе членовъ можетъ служить указаніемъ на скрытую подагру, или быть чисто нервнаго свойства и поверхностнымъ или произойти отъ временной остановки кровообращенія въ членахъ, когда нѣтъ ни сведенія, ни окоченѣлости, или можетъ быть послѣдствіемъ спазма и въ этомъ случаѣ будетъ сведеніе и окоченѣлость. Лѣченіе должно направить противъ причины.

Опухоли состоятъ обыкновенно изъ стержня, содержащаго сосуды образуемаго соединительною, рѣже слизистою тканью, выстилаемаго эпителіемъ. Такія опухоли называются *сосочковыми*, онѣ бываютъ *плотныя* (обыкновенно бородавки и кондиломы) и *мягкія*, которыя встрѣчаются въ мочевомъ пузырѣ, рукавѣ матки, особенно во влагалищной ея части (наросты въ видѣ цвѣтной капусты), въ желудкѣ и кишечномъ каналѣ, на внутренней твердой и мягкой оболочкахъ мозга.

Опухоли бываютъ *доброкачественныя*, т. е. не опасныя для жизни, а лишь неудобныя или безобразящія человѣка (какъ, наприм., жировики или мѣшетчатыя опухоли—атеромы—на головѣ), или же *злокачественныя* (какъ ракъ, волчанка,

Digitized by Google

саркома), ведущія къ смерти, если во время не принять соотвѣтствующихъ мѣръ. Опухолью называютъ часто разнаго рода опуханія, напримѣръ—железъ, суставовъ и проч.

Опухоли, состоящія изъ закрытаго фибрознаго мѣшка, эпителія, выстилающаго его и содержимаго, составляющаго продуктъ эпителія и самаго мѣшка, называются *кистами* или *мѣшетчатыми* опухолями. Онѣ встрѣчаются довольно часто во всѣхъ органахъ. Наибольшую важность имѣютъ кисты яичниковъ, почекъ и кожи.

Число кистъ бываетъ различно; отъ одной или нѣсколькихъ до безчисленнаго множества ихъ въ одномъ органѣ, величиною отъ микроскопически малыхъ до такихъ огромныхъ размѣровъ, что выполняютъ собою всю брюшную полость. Кисты бываютъ почти всегда круглыми или кругловатыми.

Распознаваніе внутреннихъ кистъ довольно трудно, исключая, когда онѣ размножаются въ одномъ мѣстѣ, затѣмъ спаиваются вмѣстѣ и принимаютъ размѣры болѣе или менѣе обширные. Онѣ образуются медленно и не представляютъ никакихъ предвѣстниковъ своего существованія, пока не примутъ размѣра настолько большого, что начинаютъ давить окружающіе ихъ органы, и тогда производятъ болѣе или менѣе опасныя разстройства въ отправленіяхъ.

Наружныя кисты, при самомъ началѣ своего образованія скоро вылѣчиваются *S.* 1 вн. и нар. въ мази. Но если онѣ застарѣлыя или внутреннія, тогда вн. *C.* 1 и нар. *C.* 5 въ ван. и въ мази на кисту, въ томъ мѣстѣ, гдѣ она чувствительна. *Эл. Кр.* на 6 гл. точ. и въ компр. на выпуклость. Когда киста не поддается *S.* и *C.* тогда даютъ *S.* 1 × *A.* 1. Также употребляютъ средства, назначенныя противъ рака. См. *Ракъ*.

Мягкая опухоль, безъ боли, сохраняющая отпечатокъ пальца (*отекъ*), съ слабостію, жаждою, поносомъ, остановкою отдѣленія мочи, вполнѣ или частію, вслѣдствіе простуды, лихорадки перемежающейся, катарральной или сыпной, худосочія, болѣзни сердца или почекъ.

Главное средство *S.* 1 въ слабыхъ дозахъ, которое даютъ

Digitized by Google

смотря по обстоятельствамъ, попер. съ *F.* 1, или *A.* 1, а въ упорномъ случаѣ съ *C.* 2, ван. *A.* 2, *C.* 5, *S.* 1. На 6 гл. точ. *Эл. Кр.* × *Ж.* При опухоли въ подреберьяхъ *F.* 1 (2-й ст.), на подвзд. мазь, прим. *F.* 1, *F.* 2, *C.* 5 и компр. *Эл. Б.* Ван. *C.* 5. Лѣчить основную болѣзнь.

Бѣлая опухоль колѣна см. выше: *Нижнія конечности.*

Лѣченіе опухолей разныхъ органовъ указано въ Каталогѣ, въ своихъ мѣстахъ.

Излѣченія. Ж. 30 лѣтъ имѣла мягкія опухоли по всему тѣлу вслѣдствіе водянки околосердечной сумки. Вылѣчена *A.* 1 × *S.* 1 (3-й ст.) и на подвзд. прим. *S.* 1 (*C.*).

— Мягкая опухоль вслѣдствіе болѣзни сердца съ размягченіемъ костей вылѣчена въ мѣс. вн. *A.* 1 × *S.* 1, на сердце прим. А. 2, на опухоль прим. *S.* 1 × С. 5 и ван. *S.* 1 × С. 5.

Опьяненіе и пьянство, алкоголизмъ. Неумѣренное употребленіе алкоголя вызываетъ явленія остраго отравленія, то-есть опьяненіе, а продолжительное употребленіе его производитъ хронич. болѣзнь, назыв. *алкоголизмомъ*, и на почвѣ его появляется *запойный бредъ* или *бѣлая горячка* (симптомы см. выше стр. 226).

Противъ опьяненія давать 10—20 круп. *S.* 1. Привычное пьянство излѣчивается лишь въ томъ случаѣ, если пьющій имѣетъ серьезное желаніе и твердую рѣшимость избавиться отъ этого своего порока. Но никогда не слѣдуетъ согласиться на постепенное отъученіе отъ пьянства, такъ какъ успѣшный результатъ можетъ получиться только при полномъ воздержаніи отъ спиртныхъ напитковъ. Вн. *A.* 3 × *C.* 5 × *F.* 1 (начать съ 4-го ст. и постепенно, черезъ каждые 10 дней, переходить ко 2 и 1 ст.). Кромѣ того 3 раза въ день по 5 круп. *S.* 1, и при каждомъ случаѣ болѣе сильнаго ощущенія потребности къ водкѣ принять 10 круп. *S.* 1 съ 10 каплями *Эл. Бѣл.*

Противъ *запоя*, т. е. періодическаго пьянства, давать во время трезвыхъ промежутковъ: утромъ 5 круп. *A.* 3, днемъ— 5 круп. *S.* 1 или *S. G.* и веч. 5 круп. *F.* 1.

При появленіи потребности въ выпивкѣ брать черезъ 1—2

Digitized by Google

часа поперем. 10—20 круп. *S.* 1 и *F.* 1, съ 5 капл. *Эл. Анж.* или *Эл. Бѣл.* и 3 раза въ день передъ кушаньемъ 5—10 круп. *C.* 10. Часто позывъ къ водкѣ устраняется, если кажд. 10—30 мин. брать 15—30 кап. *Эл. Бѣл.* въ рюмкѣ воды и 3 раза въ день прилож. *Эл. Кр.* на точки 5, 6 и 7.

До безчувствія напившемуся положить на языкъ 20 круп. *S.* 1.

При *бѣлой горячкѣ* обильные клистиры; на голову — *Эл. Бѣл.*, холодн. компрессы; на языкъ 10—20 круп. *S.* 1. Если больной послѣднія выплевываетъ, то растереть ихъ съ 10—20 капл. *Эл. Бѣл.* и влить въ ротъ, повторяя это кажд. 1—2 часа до успокоенія. Цѣлесообразно давать каждые 2 часа по 20 капель хорошаго коньяка или очищенной водки. Противъ остающейся послѣ припадка слабости 3 раза въ день по чайн. л. 1-го усиленнаго разведенія *S.* 1. Если больной заснетъ, то отнюдь не будить его, такъ какъ сонъ для него самое благодѣтельное.

Ослабленіе и упадокъ силъ. Ослабленіе—это то состояніе, при которомъ силы уменьшаются; не должно смѣшивать слабость, которая можетъ быть присуща человѣку, съ ослабленіемъ, которое всегда указываетъ на измѣненіе въ отправленіи функцій.

Упадокъ силъ, разслабленіе и разстройство здоровья вслѣдствіе лихорадки выражается худобою, блѣдностію, искаженіемъ лица, глазами безъ выраженія, сухою кожею или покрытою потомъ, на лицѣ, въ особенности на носу, ушахъ и лбу, уменьшенною температурою (35,6°—35,7° Ц. и ниже); слабымъ, беззвучнымъ голосомъ; малымъ или неощутительнымъ, иногда перемежающимся пульсомъ. То и другое лѣчится одинаково. Вн. сообразно съ темпераментомъ *S.* 1 или *A.* 1 или *S. G.* (1-й ст.), тѣ же круп. съ пищею. Ван. *S.* 5, *A.* 2. На 6 гл. точ., ко всѣмъ нерв. головы и по обѣимъ сторонамъ позвон. столба *Эл. А.* или *Кр.* На темя *Эл. Б.* или *Кр.*

Точно также лѣчится: *ослабленіе руки вслѣдствіе перелома*, *ослабленіе зрѣнія*, *памяти*, *слуха*, *желудка*, *кишекъ*, *колѣнъ*, *всего тѣла* и пр., но при этомъ Эл.-Гомеоп. жидкости нужно прикладывать на соотвѣт. нервы.

Digitized by Google

Къ причинамъ ослабляющимъ память, по мнѣнію д-ра Солье, относятся употребленіе табака и морфія и отравленіе опіумомъ, гашишомъ, хлоромъ и окисью углерода (угаромъ).

Отвращеніе ребенка отъ груди, если оно не происходитъ отъ афтъ или молочницы (ср. эти болѣзни), то даютъ матери или кормилицѣ вн. *S.* 1 (1-й ст.), а ребенку на подвзд. мазь или прим. *C.* 5 и вн. *S.* 1 (3-й ст.) нѣсколько чайныхъ ложекъ въ день.

Отравленія. Болѣзни, происходящія отъ поступленія *какого бы то ни было яда* въ наше тѣло, называются болѣзнями отъ *отравленія*.

Ядомъ называется каждое вещество, которое, будучи принято внутрь или приложено къ поверхности человѣческаго тѣла, и при томъ въ самомъ маломъ количествѣ, измѣняетъ здоровье или разрушаетъ жизнь. Совокупность явленій, производимыхъ ядовитымъ веществомъ, называется *отравленіемъ*.

Всякаго рода отравленія и его послѣдствія лѣчатся *S.* 1 въ сильныхъ дозахъ отъ 15 до 40 сух. кр., повторяя такіе пріемы каждые 15 или 30 минутъ, сообразно степени отравленія, до перваго облегченія; затѣмъ эти пріемы принимаютъ рѣже и постепенно переходятъ къ дозѣ *S.* 1 изъ 1-го ст. На 6 гл. точ. *Эл. Б.* или *Кр.* попер. съ *Желт.* Ванны *S.* 1, *A.* 2, *S.* 5. По 1 кр. *C.* 5 черезъ полчаса.

При *отравленіи кислотами* то же лѣченіе, причемъ *S.* 1 растворяютъ въ тепломъ молокѣ, которое пьютъ въ большомъ количествѣ, а потомъ ванны изъ *C.* 5. Если отравленіе было медленное и таковое уже перешло въ кровь, то *S.* 1 принимать по 20 сухихъ круп., сообразно со степенью болѣзни, потомъ *C.* 1 (1-й ст.) или по 1 кр. *C.* 5 черезъ $^1/_2$ часа.

При отравленіи *грибами* или другими ядовитыми растительными веществами, еще не извергнутыми, вызвать немедленно рвоту всѣми возможными способами или теплою водою съ *S.* 1, которое нейтрализуетъ ядъ. При этомъ имѣть въ виду, что *при отравленіяхъ фосфоромъ* и *шпанскими мушками* нельзя назначать молока и никакихъ жирныхъ веществъ, а при отравленіи *мышьякомъ* нельзя давать никакихъ щелочей, а *рвотныхъ*

Digitized by Google

не употребляютъ при отравленіи кислотами и ѣдкими щелочами (щелокъ, поташъ и пр.).

При *отравленіи карболовой кислотой* даютъ по возможности скоро выпить уксусъ, разведенный пополамъ водою, и потомъ промываютъ желудокъ. На кожу и слизистую оболочку, обожженную карболовою кислотою, прикладываютъ прим. *S.* 1 и *Эл. Бѣл.*

Параличъ. Подъ параличемъ понимается полная потеря произвольнаго движенія или значительное нарушеніе его; иногда съ нимъ находится въ связи и потеря чувствительности (анэстезія), или очень рѣдко поражается одна чувствительность. Обыкновенно параличъ поражаетъ только нѣкоторыя мышцы тѣла, но можетъ сосредоточиться въ мочевомъ пузырѣ, желудкѣ, кишкахъ или сердцѣ.

Виды. Параличъ является *общимъ*, когда онъ распространяется почти на всѣ произвольныя мышцы тѣла. Онъ будетъ *частнымъ*, когда: 1) ограничивается верхнею или нижнею половиною тѣла (чаще послѣднею), тогда онъ называется *параплегіею* (Paraplegia); 2) поражая одну боковую половину тѣла, одну руку и ногу, тогда онъ называется *гемиплегіею* (Hemiplegia); 3) поражая мышцы руки, напр. при *свинцовомъ параличѣ*; 4) поражая мышцы одной стороны лица—*лицевой параличъ*; 5) поражая только мышцы верхняго вѣка, тогда, онъ назыв. *ptosis*. Иногда поражается только чувство осязанія — это *анэстезія;* въ другихъ случаяхъ утрачивается чувство боли, такъ что больной не ощущаетъ ни уколовъ, ни щипковъ — это *аналгезія*. Потеря или нарушеніе *зрѣнія* можетъ произойти отъ паралича зрительнаго нерва; нарушеніе обонянія— отъ паралича обонятельнаго нерва; тугость слуха - отъ паралича слухового нерва. *Параличъ языка* образуется обыкновенно при одностороннемъ параличѣ, но никогда не бываетъ самостоятельнымъ страданіемъ.

Практически цѣлесообразнѣе дѣлить параличи на 1) *мозговые параличи* (*церебральные*), происходящіе отъ разстройствъ въ головномъ мозгу, 2) параличи *спинальные*—вслѣдствіе разстройствъ въ спинномъ мозгу и 3) *периферическіе параличи* вслѣд-

Digitized by Google

ствіе непосредственнаго измѣненія въ отдѣльныхъ нервахъ отъ поврежденія, сдавливанія опухолью и т. п. или простуды, часто также послѣ дифтерита. *Церебральный параличъ* (*гемиплегія*) является чаще всего вслѣдствіе кровоизліянія въ вещество мозга (см. *Апоплексія—Мозговой ударъ*). Параличъ этотъ—односторонній (гемиплегія), въ то же время перекрестный: на одной сторонѣ поражается рука и нога, на другой—лицо. Параличъ этотъ можетъ быть также вслѣдствіе закупорки мозгового сосуда, что чаще всего бываетъ при порокѣ сердца, или отъ размягченія мозга. Если параличъ вызванъ изліяніемъ крови въ мозгъ, то мышцы тверды и очень окоченѣлы, при этой формѣ зрачки расширены и бываетъ косоглазіе; умственныя способности нѣсколько нарушены; склонность къ плачу и смѣху; раздражительность. Если больной ходитъ съ помощью палки, онъ закидываетъ больную ногу впередъ и кнаружи, но нога падаетъ вслѣдствіе своей тяжести, а больная рука держится прижатою къ тѣлу, и слегка согнутою, равно какъ и запястье и пальцы. Продолжительность жизни послѣ апоплексіи неопредѣлена; если паціентъ переживаетъ первый ударъ, то за нимъ всегда слѣдуютъ другіе. Иногда два и даже три удара паралича бываютъ на одной и той же половинѣ тѣла. Улучшеніе, если оно появляется, начинается съ ногъ, а въ неизлѣчимыхъ случаяхъ члены худѣютъ, дѣлаются дряблыми и всегда холодны.

Вн. *A.* 1 × *C.* 1 (3—2-й ст.), утр. и веч. по 5 круп. *A.* 3, днемъ 5—10 круп. *S.* 1 передъ кушаньемъ; у больныхъ нервно-ослабленныхъ вм. *S.* 1 лучше—*L.* по 5 круп. 2—3 раза въ день передъ кушаньемъ. Втираніе въ тѣло, 1—2 раза въ день, спиртно-воднымъ растворомъ *A.* 2, *S.* 5, *C.* 5 и *Эл. Бѣл.*, предварительно прилож. на гл. нервн. точки *Эл. Кр.* × *Эл. Желт.*, при параличѣ языка также на точки 9 и 13. Теплыя ванны, 1—2 раза въ недѣлю, съ *A.* 2, *S.* 5 и *C.* 5.

Спинальный параличъ, параплегія. Этотъ видъ паралича поражаетъ обѣ руки или обѣ руки и ноги вмѣстѣ, но чаще поражаетъ обѣ ноги; начинается незамѣтно и постепенно, съ онѣмѣніемъ и зудомъ, при чемъ слабость все увеличивается,

Digitized by Google

пока вполнѣ не утратится способность движенія и чувствительность. Параличъ можетъ достигнуть этого періода въ нѣсколько дней или недѣль; часто наблюдается наклонность оступаться, спотыкаться и иногда падать при ходьбѣ; общее ощущеніе неувѣренности; невозможность ходить въ потьмахъ или безъ палки или костылей; больной не можетъ стоять съ закрытыми глазами, и наконецъ при полномъ параличѣ больной совсѣмъ прикованъ къ мѣсту. Парализованные члены подвержены подергиваніямъ, вздрагиваніямъ, что́ часто нарушаетъ сонъ. *Боли въ спинѣ* и *членахъ*, ощущенія холода или жженія и онѣмѣнія, покалыванія булавками или иголками. Запоръ бываетъ почти всегда. *Мочевой пузырь и прямая кишка* могутъ быть поражены параличемъ. Моча задерживается или вытекаетъ по каплямъ, содержитъ гной и слизь, издаетъ аміачный запахъ вслѣдствіе застоя, вызываетъ раздраженіе, имѣетъ щелочную реакцію вмѣсто кислой и содержитъ въ избыткѣ фосфаты.

Причины. Поврежденіе спинного мозга, костоѣда позвонковъ, воспаленіе спинного мозга и его оболочекъ, приливы крови или кровоизліяніе по пути спинного мозга, невоспалительное размягченіе его или опухоли, давящія на спинной мозгъ и проч. Мужчины чаще подвергаются этой формѣ паралича, чѣмъ женщины.

При лѣченіи нужно соображаться съ причиною и тѣлосложеніемъ больного, такъ: лимфатику, вн. *S.* 1 или 2 (1-й, 2-й или 3-й ст.), на соотв. нерв. *Эл. Кр.*; сангвинику, а равно если параличъ вслѣдствіе прилива крови, то тоже лѣченіе, что и противъ гемиплегіи. Въ случаѣ сомнѣнія причины или тѣлосложенія вн. *A.* 1 × *S.* 1. Боль въ спинѣ и членахъ проходитъ отъ частыхъ растираній ихъ растворомъ изъ 10 кр. *L.* въ стол. ложкѣ воды, смѣшанной въ равныхъ частяхъ съ чистымъ виннымъ спиртомъ; кругомъ всей таліи согрѣвающій компрессъ *A.* 2, *C.* 5, *F.* 2. Въ упорн. случ. лѣченіе, какъ при гемиплегіи. Ср. *Болѣзни позвоночнаго столба.*

Периферическій параличъ. Устранить причину, если таковая извѣстна. Вообще же вн. лѣчится, какъ гемиплегія, наружно

Digitized by Google

прилож. вначалѣ *Эл. Анж.*, затѣмъ *Эл. Зел.* съ *А.* 2 и *С.* 5. Мѣстныя и общія теплыя ванны съ тѣми же крупинками или *L.*

Лицевой параличъ—см. *Лицо.*

Дѣтскій параличъ (*Paralysis infantum*) встрѣчается у дѣтей 2—5 лѣтняго возраста, чаще всего въ лѣтніе мѣсяцы и имѣетъ какъ бы инфекціонный характеръ, начинаясь повышенной температурой тѣла, и часто съ подергиваніями въ мышцахъ. Въ дальнѣйшемъ теченіи мышцы становятся вялыми и исхудалыми. Чаще всего поражаются ноги.

Если болѣзнь захватить на первыхъ же порахъ, то она легко излѣчивается. Прежде всего заботиться надо о ежедневномъ испражненіи на низъ. Вн. *А.* 3 × *S.* 5 × *F.* 1 (3—2-й ст.) и 3 раза въ день чайн. л. раствора 1—5 капель *Эл. Зел.* въ стак. воды.

Наружно втирать въ позвоночникъ мазь *А.* 2 или *С.* 5. Ежедневно или 3 раза въ недѣлю тепл. ванна съ 30—50 круп. *А.* 2, *S.* 5 и *С.* 5 и 2 ч. л. *Эл. Бѣл.*

Параличное дрожаніе конечностей, иногда и головы. *Дрожаніе* (*Tremor*), особенно рукъ, встрѣчается часто у стариковъ. Оно излѣчивается или значительно уменьшается втираніемъ *Эл. Кр.*, въ руки и спинной хребетъ, особенно если больной вн. еще принимать будетъ 3 раза въ день 1 ч. л. крѣпкаго раствора *S.* 1. Общее дрожаніе конечностей выражается сильнѣе и оно серьезнѣе, чѣмъ упомянутое дрожаніе рукъ; оно состоитъ въ непроизвольныхъ ритмическихъ движеніяхъ и продолжается безпрерывно, пока больной находится въ покоѣ; прекращается же каждый разъ, какъ только онъ предприметъ движеніе произвольное. Дрожаніе бываетъ такъ сильно, что имѣетъ видъ трясенія всего тѣла. Въ начальныхъ стадіяхъ болѣзни больной спокоенъ по крайней мѣрѣ во снѣ, въ дальнѣйшихъ же трясеніе это вообще уже не прекращается, мучая и истощая больного все болѣе, пока смерть не является его избавительницей.

Лѣченіе. Полный тѣлесный и душевный покой, тепловатыя ванны или обмыванія съ *Эл. Бѣл.* или *Эл. Кр.*, 3 раза въ день по чайн. л. крѣпк. развед. *S.* 1. Возможно лучшее пи-

Digitized by Google

таніе, свѣжій воздухъ. Кромѣ того лѣченіе, сообразное съ состояніемъ организма вообще и отдѣльныхъ органовъ.

Излѣченія. Совѣтъ черезъ корреспонденцію въ г. Новочеркасскъ. М. 47 л. вслѣдствіе сифилиса страдалъ нѣсколько лѣтъ параличемъ обѣихъ ногъ, ощущалъ чувство ползанія мурашекъ въ ногахъ и какъ бы обручъ вокругъ живота и спины, вечеромъ эта боль усиливалась, боль въ пальцахъ, слабость памяти, головокруженіе, безсонница, слабый аппетитъ, блѣдность лица, губъ и десенъ, ходилъ на костыляхъ. По мнѣнію врачей, у него болѣзнь головного и спинного мозга и неизлѣчимъ. Назначено 22 марта 1888 г. вн. *А.* 1 × *S.* 1 (1-й ст.), съ пищею сух. кр. *S.* 5; прим. *А.* 2 на сердце и голову и прочія нар. средства, указанныя противъ параплегіи. Черезъ три мѣс. послѣ этого лѣченія больной могъ ходить безъ костылей и посторонней помощи и прибылъ въ С.-Петербургъ для окончанія лѣченія, гдѣ лѣченіе было нѣсколько измѣнено, и черезъ двѣ недѣли совершенно выздоровѣлъ. (*С.*).

Параличъ и атрофія руки отъ плеча до локтя у реб. 3 л. Невозможность движенія. Вылѣченъ въ 1 годъ *S.* 1 на 6 гл. точ. и плеч. нер. *Эл. Кр.* × *Ж.* и ван. *S.* 1 (*С.*).

— У м. 55 л. параплегія вылѣчена въ 2 мѣс. однимъ *S.* 1 (*С.*).

— Нервный параличъ правой ноги, у ж. 30 л., съ чувствомъ ползанія мурашекъ въ рукахъ и ногахъ. Вылѣчилась въ 8 мѣс. вн. *А.* 1 попер. съ *S.* 1 ван. и прим. на ногу *А.* 2. Затѣмъ вн. и нар. въ ван. и прим. *А.* 1 попер. съ *S.* 5 (*С.*).

— М. 57 л. два года страдалъ параплегіей правой стороны; правая рука неподвижна и нечувствительна, кисть руки сжата, пальцы не раздвигаются; ноги дѣлали кой-какія движенія, но не могли поддерживать больного, который ходилъ съ посторонней помощью; ротъ искривленъ, точно также и языкъ, рѣчь непонятная. Вн. *S.* 1 (2-й ст.), за обѣдомъ 8 кр. *S.* 1. Обтираніе спины, конечностей и ложечки *Эл. Кр.* пополамъ со спиртомъ; на голову и подъязв. нерв. *Эл. Бѣл.* Черезъ 5 дней больной могъ больною рукою распиливать дрова, а черезъ мѣс. совершенно выздоровѣлъ (*С.*).

— У ж. 30 л. вслѣдствіе остраго ревматизма сочлененій лѣвое плечо и лѣвая рука были совершенно парализованы. При осмотрѣ атрофія мышцъ, рука на повязкѣ и неподвижна. Лѣчилась 10 мѣс. въ больницѣ безъ всякой пользы. Вн. *S.* 1 (2-й ст.), нар. *Эл. Кр.* На 3-й день замѣтное улучшеніе и черезъ 6 нед. выздоровѣла (*С.*).

Digitized by Google

Печень есть самый большой органъ брюшной полости, лежащій вверху на правой сторонѣ живота подъ послѣдними ребрами, какъ разъ подъ грудобрюшной преградой и вправо отъ желудка. Она состоитъ изъ плотной (впрочемъ легко разрываемой) буро-красной массы, имѣетъ продолговато-четыреугольную форму съ округленными краями и вѣситъ отъ 4 до 6 фунтовъ. Подъ микроскопомъ видно, что ткань печени состоитъ изъ множества кучекъ (островковъ), клѣточекъ, такъ наз. *печеночныхъ клѣточекъ*. Въ нихъ происходитъ главная дѣятельность печени—приготовленіе *желчи*. Матеріалъ для этого печеночныя клѣточки получаютъ изъ крови, именно той, которая приносится *воротною веной* (изъ селезенки, поджелудочной железы, желудка и кишечнаго канала). Эта темная кровь содержитъ очень много негодныхъ уже для питанія веществъ, особенно отжившія красныя кровяныя тѣльца, и эти-то вещества служатъ для образованія желчи. Печень вырабатываетъ желчи около 1000 граммъ въ сутки.

Приготовленная въ печеночныхъ клѣточкахъ желчь выходитъ въ прилегающія къ нимъ трубочки (*желчные канальцы*), подвигается отсюда постепенно въ большіе канальцы и наконецъ на нижней поверхности печени достигаетъ *желчнаго протока*, по которому и уносится изъ печени отчасти прямо въ 12-ти-перстную кишку, отчасти по вѣтви желчнаго протока (пузырному протоку) въ *желчный пузырь*. Въ этомъ пузырѣ, какъ въ резервуарѣ, часть желчи остается нѣкоторое время, пока не перейдетъ въ кишки. Если приподнять печень такъ, чтобы можно было видѣть ея нижнюю нѣсколько вогнутую поверхность, то по срединѣ этой послѣдней оказывается глубокая поперечная борозда, *ворота печени*, здѣсь выходятъ воротная вена и печеночная артерія съ нервами, и выходятъ желчный протокъ и лимфатическіе сосуды. Направо отъ воротъ приращенъ къ печени желчный пузырь, находящійся, какъ уже сказано, въ связи съ желчнымъ протокомъ.

Желчь представляетъ густую, горькую жидкость измѣнчиваго цвѣта, то желтаго, то бураго, то зеленаго или зеленовато-чернаго.

Digitized by Google

Селезенка помѣщается въ лѣвомъ подреберьи (между 9 и 11 ребр.), имѣетъ форму продольно-овальную, сплюснутаго тѣла, величиною въ кулакъ. По своему строенію она представляетъ большое сходство съ лимфатическими железами, и потому принадлежитъ къ органамъ кровотворенія. *Наружная ея поверхность* выпуклая, прилегаетъ къ вогнутости грудобрюшной преграды, *внутренняя*—въ средней части вогнута, обращена ко дну желудка и хвосту поджелудочной железы; по этой поверхности проходятъ селезеночные кровеносные сосуды и нервы. Въ физіологическомъ отношеніи ей приписывается: 1) образованіе бѣлыхъ кровяныхъ шариковъ, 2) превращеніе бѣлыхъ въ красные и 3) разрушеніе отжившихъ красныхъ кровяныхъ шариковъ.

Болѣзни печени и селезенки.

Болѣзни печени появляются въ большинствѣ случаевъ незамѣтно и часто становятся явными лишь тогда, когда онѣ достигли значительной степени. Онѣ сопровождаются болѣе или менѣе чувствительными разстройствами общаго состоянія организма, особенно пищеварительныхъ органовъ. Извѣстно вліяніе болѣзней печени на душевное состояніе человѣка, выражающееся въ меланхолическомъ или ипохондрическомъ настроеніи.

Функціональныя разстройства печени понижаютъ нормальную теплоту тѣла, и больной становится очень чувствительнымъ къ перемѣнамъ температуры; являются головокруженіе, головная боль и нервная раздражительность. Вслѣдствіе недостаточности и недоброкачественности желчи, вырабатываемой печенью, жиры плохо перевариваются, больной худѣетъ, страдаетъ запорами и вздутіемъ живота газами.

Функціональныя разстройства печени могутъ быть первичныя или послѣдовательныя. Въ первомъ случаѣ они происходятъ отъ діэтетическихъ погрѣшностей, когда больной питается слишкомъ обильной и жирной и слишкомъ сахаристой пищей и пьетъ много пива, при недостаточномъ движеніи на чистомъ воздухѣ. Во второмъ случаѣ причиной могутъ быть заболѣванія желудка и кишечника, малярія, болѣзни сердца и легкихъ.

Digitized by Google

При болѣзняхъ печени *діэта* играетъ важную роль. Пища должна быть легкая и питательная, молоко, пахтанье, нежирное мясо, нѣжные овощи и проч. Избѣгать надо всего трудно-переваримаго, особенно мало употреблять мучнаго. Спиртные напитки и кофе должны быть строго избѣгаемы. Больной долженъ заботиться о ежедневномъ испражненіи на низъ, если надо—съ помощью клистировъ.

При первыхъ признакахъ заболѣванія печени принимать *F.* 1 (2—1-й ст.) и на подвзд. мазь *F.* 2, и 3 раза въ день по 5 круп. *S.* 1. Въ упорн. случ. къ *F.* 1 прибавить *A.* 3 × *C.* 1,

При болѣзняхъ печени въ большинствѣ случаевъ страдаетъ и *селезенка,* такъ какъ эти два органа солидарны и лѣчатся одними и тѣми же лѣкарствами. Симптомы болѣзней печени: желтое окрашиваніе кожи, моча густая, желтая или красноватая, рѣдкая; испражненія сѣроватыя, желтоватыя или глинистыя; боль въ правомъ подвздошьи или подъ ложечкою, горизонтально распространяющаяся до позвоночнаго столба и выходящая къ правому плечу и по длинѣ всей шеи съ тяжестью въ правомъ боку, иногда желчныя рвоты и проч.

Почти всегда болѣзни печени и селезенки распространяются на желудокъ или на кишки, въ особенности при воспаленіи и производятъ боль въ желудкѣ, которая, вмѣсто того, чтобы утихнуть отъ *Scrof.*, какъ обыкновенныя желудочныя боли, напротивъ того, усиливаются отъ *Scrof.* и ему не поддаются. Это упорство опредѣляетъ дѣйствительную причину болѣзни.

Когда рядомъ съ предъидущими симптомами обнаруживаются головокруженіе, расширеніе венъ, геморрой, неправильное сердцебіеніе, боль или опухоль въ лѣвомъ боку, иногда затруднительное дыханіе, опухоль нижнихъ конечностей и пр., то это признакъ страданія сердца, и тогда обѣ болѣзни лѣчатся одновременно *A.* 2 × *F.* 1 (2-й ст.). На область сердца мазь *A.* 2 и *Эл. Анж.* Ван. изъ *A.* 2. На подвзд. мазь *F.* 2.

Желтуха въ большинствѣ случаевъ характеризуется болѣе или менѣе значительнымъ окрашиваніемъ кожи и бѣлковъ глазъ, и зависитъ отъ препятствій, встрѣчаемыхъ желчью при проходѣ въ желчные канальцы. Это происходитъ, когда избы-

Digitized by Google

токъ желчи въ печени проходитъ чрезъ лимфатическіе сосуды и вены, въ массу крови; тогда желчь разлагается, теряетъ свою кислоту и сохраняетъ только свое красящее начало. При этомъ моча становится густою, желтою и красноватою и отдѣляется въ незначительномъ количествѣ, и испражненія имѣютъ цвѣтъ сѣрый, пепельный и глинистый. Желтуха можетъ образоваться случайно, и въ этомъ случаѣ она не опасна и непродолжительна, если вскорѣ дадутъ вн. *F.* 1 (1—2-й ст.); на печень мазь или компр. *F.* 2 × *C.* 5. Для окончанія лѣченія вн. *S.* 1 (1-й ст) × *F.* 1 (2-й ст.) и тѣ же нар. лѣкарства. Въ упорн. случ. *A.* 3 × *C.* 10 (3—2-й ст.) и 3 раза въ день по 5 круп. *F.* 1 съ 5—10 капл. *Эл. Бѣл.* Новорожденнымъ, страдающимъ желтухой, *A.* 3 × *F.* 1 × *V.* (3—2-й ст.) и ежедневно ванна съ 10 круп. *A.* 2, *F.* 2 и *V.*

Катарральная желтуха присоединяется наиболѣе часто къ желудочному и кишечному катарру. Сильная желтуха, наступающая очень рано. Печень увеличена въ объемѣ, поверхность ея гладкая, селезенка не увеличена. Обезцвѣтеніе испражненій, темная моча, содержащая желчные пигменты. Длится 2—3 недѣли. Лѣчится *S.* 1 × *F.* 1 (2—1-й ст.), въ подреб. мазь *F.* 2. Въ упорн. случ. *A.* 3 × *S.* 5 или *C.* 1 × *F.* 1 (3—1-й ст.) и 3 раза въ день по 5 круп. *S.* 1 съ 5—10 капл. *Эл. Бѣл.* Въ запущенныхъ случаяхъ *Эл. Зел.* вмѣсто *Эл. Бѣл.*

Циррозъ печени, зернистость печени. Эта болѣзнь бываетъ острая и хроническая, и происходитъ отъ пьянства. Сначала брюшная водянка, затѣмъ общіе отеки. Въ 1-мъ періодѣ—увеличеніе печени, во 2-мъ—ея уменьшеніе (ссыханіе), начинающееся съ лѣвой доли. Селезенка увеличена въ 77% почти постоянно. При пальпаціи печень негладкая. Моча богата пигментомъ. Рѣзкій контрастъ между исхуданіемъ больного и громаднымъ животомъ. На его кожѣ расширенныя вены. Кожа становится сухою, морщинистою, желтоватою или землистою; при этомъ желудочныя разстройства, легкій поносъ, отрыжка, рвота, диспепсія. Иногда желтуха. Вн. *F.* 1 × *C.* 5 или *A.* 3 × *C.* 1 (2—1-й ст.) до усиленнаго 1-го разведенія и 3 раза въ день по 5 круп. *S.* 1 или *L.* Полныя теплыя ванны съ 50 круп.

Digitized by Google

A. 2, *C.* 2 и *F.* 2. При расширеніи венъ на поверхность живота вн. утр. и веч. по 5 кр. *C.* 5, въ продолженіе дня *A.* 2 × *F.* 1 (2-й ст.) и на печень мази *F.* 2 × *C.* 5. Въ упорн. случаѣ прибавляютъ по 1 кр. *C.* 5 каждый часъ, или *C.* 1 (2-й ст.) $^1/_3$ ст. въ день.

Воспаленіе печени. Симптомы: боль отъ давленія тупая, жестокая, иногда рѣзкая, колющая, сосредоточенная въ правомъ подреберьи, но эта боль можетъ распространяться въ надбрюшіе, въ правую сторону груди до шеи и праваго плеча. Эта боль сопровождается лихорадкою, желтухою, поносомъ или запоромъ, иногда рвотою, икотою, безцвѣтными испражненіями. Ротъ вяжетъ, сильная жажда, языкъ иногда сухой, по серединѣ покрытъ налетомъ и точками по своей окружности, моча темная. Вн. *S.* 1 и *F.* 1 (2-й ст.) въ количествѣ, соотвѣтствующемъ желчнымъ разстройствамъ, лихорадкѣ и степени воспаленія; нар. мазь *F.* 2. Въ опасныхъ случаяхъ можетъ образоваться нарывъ съ опасными мозговыми разстройствами, какъ бредъ, сонливость; изнеможеніе, пульсъ очень слабый. Печень (при полномъ развитіи болѣзни) не гладка, бугриста, болѣзненна. Опухоль ея подвижна при дыханіи (отличіе отъ опухоли желудка). Боли въ правомъ плечѣ, желтуха, лихорадка. Селезенка не увеличена. При образованіи нарыва вмѣсто *S.* 1 даютъ *C.* 1 (1-й ст.) и нар. мазь *C.* 5, *F.* 2. Для сангвиниковъ прибавляютъ *A.* 1, попер. съ прочими. Когда нарывъ разрѣшится, то гной выходитъ черезъ кишки или черезъ легкія. При прорывѣ въ полость живота образуется смертельное гнойное воспаленіе брюшины.

Жировая печень встрѣчается у страдающихъ хроническимъ туберкулезомъ, болѣзнями сердца и у лицъ, принимающихъ многой жирной пищи и мало двигающихся. При незначительныхъ степеняхъ этой болѣзни не бываетъ никакихъ признаковъ; при болѣе же значительныхъ печень находятъ увеличенною, нечувствительною къ давленію, края ея гладки, тупы. Нерѣдко нарушается при этомъ пищевареніе. Эта болѣзнь отличается отъ воспаленія печени отсутствіемъ боли въ области печени, синевато-желтаго цвѣта кожей и происхожденіемъ, а

Digitized by Google

при дальнѣйшемъ теченіи селезенка не припухаетъ, а также не бываетъ послѣдовательнаго уменьшенія печени и брюшной водянки. Лѣчится точно также какъ циррозъ печени.

Желчные камни очень тверды и бываютъ различнаго объема; ихъ присутствіе въ желчномъ пузырѣ не сопровождается никакими явленіями и многіе больные не подозрѣваютъ у себя ихъ существованія. Иногда замѣчаются боли, похожія на кардіальгическія и бываетъ желтый оттѣнокъ кожи. Часто камни выходятъ съ испражненіями безъ всякихъ припадковъ. При прохожденіи же большихъ камней черезъ желчный выводной протокъ обыкновенно бываютъ боли, называемыя *желчными коликами*, выражающіяся сильными колющими, сверлящими болями въ области желчнаго пузыря, въ продолженіи которыхъ больной сильно мучается, кричитъ, и бываетъ запоръ, рвота, ипохондрія, разстройство пищеваренія. Какъ скоро камень дойдетъ до кишечнаго канала, боли прекращаются разомъ. Затѣмъ можно найти вышедшій камень. Противъ образованія камней вн. *A.* 1 × *S.* 2 (1—2-й ст.) × *F.* 1. Противъ желчныхъ коликъ вн. 20 кр. *S.* 5; эту дозу при надобности можно повторить; въ упорн. случаѣ *F.* 2 × *S.* 5 (2-й ст.) по чайн. ложкѣ въ частыхъ пріемахъ. На подвзд. горячіе компр. *F.* 2 × *C.* 5. Теплые клистиры при запорѣ. Послѣ каждой рвоты 10 круп. *S.* 1 или *Anti-mal di mare.* Послѣ припадка коликъ: *C.* 10 × *F.* 1 (1-й ст.) и въ сух. видѣ 2 раза въ день по 5 круп. Каждое утро 10 круп. *F.* 1 сухими.

Затвердѣніе печени. Вздутіе, ощущеніе тяжести въ правомъ боку, боль тупая, жестокая, вызываемая давленіемъ на область печени, распространяющаяся до праваго плеча; запоръ, испражненія сѣроватыя, безцвѣтныя, ипохондрія, языкъ желтоватый и пр. Иногда бываетъ достаточно *F.* 1 (2—3-й ст.). Въ другихъ случаяхъ *F.* 1 × *C.* 1, на подреберья компр. *F.* 2 одно или попер. съ *C.* 5.

Гиперемія или переполненіе печени кровью происходитъ отъ пьянства, обжорства, зараженія маляріей, сильнаго жара сидячей жизни, прекращенія регулъ и геммороидальныхъ истеченій, болѣзней легкихъ и сердца. Симптомы: печень увеличена

Digitized by Google

значительно выдается изъ подъ края реберъ, при давленіи пальцемъ подъ край правыхъ реберъ ощущается боль; цвѣтъ лица желтоватый, поблекшій. Если впослѣдствіи печень уменьшается въ объемѣ, то къ этому иногда присоединяется брюшная водянка. На тощакъ вн. 5 сухихъ кр. *С.* 5. Затѣмъ *F.* 1×*С.* 1 (2-й ст.). Черезъ часъ по 1 кр. *F.* 1. Мазь на подвзд. *F.* 2, на сердце *А.* 3. На 6 гл. точ. *Эл. Кр.* × *Ж.* Ванны *А.* 2 и *F.* 2.

Гипертрофія печени бываетъ послѣ продолжительной перемежающейся лихорадки, при золотухѣ, сопровождающейся большою потерею соковъ, и у пьяницъ. Печень увеличена на столько, что замѣтна выпуклость правой половины живота; худоба, разстройство пищеваренія, тяжесть въ правомъ подреберьи, боли и желтухи не бываетъ; болѣзнь длительная. Для лѣченія см. *Гиперемія печени.*

Ракъ печени (часто сопровождаетъ ракъ желудка). Симптомы: увеличеніе объема въ правомъ подреберьѣ, на печени твердыя, выпуклыя неровности, иногда болѣзненныя; въ правомъ подреберьи тупыя или колющія боли, доходящія до плеча или до праваго подплечья, усиливающіяся отъ прикосновенія. Иногда желтуха или брюшная водянка. Трудное пищевареніе, запоръ; позже поносъ, кровотеченіе и пр. Еще позже усиленіе боли ночью, тоска, одышка, лихорадка, потъ, отеки ногъ, водянка, головная боль и пр. Для лѣченія см. *Ракъ.*

Воспаленіе селезенки. Вначалѣ бываютъ лихорадочныя явленія, опухоль и боль болѣе или менѣе сильная въ лѣвомъ подреберьи, распространяющаяся на сосѣднія части и до лѣваго плеча, отсутствіе аппетита, жажда, кашель, тошнота, рвота и усиленіе лихорадки, появляющейся неопредѣленно, таковы въ общемъ симптомы. Въ нѣкоторыхъ опасныхъ случаяхъ бываетъ бредъ, томленіе, одышка, сердцебіеніе и нарывъ на поясницѣ, появляющійся въ видѣ опухоли, могущей быть признанной за воспаленіе почекъ. Лѣчится точно также какъ *Воспаленіе печени.*

Опухоль селезенки. Острое опуханіе селезенки бываетъ при брюшномъ тифѣ, перемежающейся лихорадкѣ и другихъ острыхъ

Digitized by Google

лихорадочныхъ болѣзняхъ. Хроническое опуханіе печени достигаетъ часто громадныхъ размѣровъ и бываетъ при малярійной кахексіи и сифилисѣ. *Лѣченіе* основной болѣзни съ примѣненіемъ во всякомъ случаѣ *Фебриф.* вн. и наружно.

Излѣченія. Ж. 76 л. страдала и лѣчилась 40 л. сряду безуспѣшно аллопатіей и гомеопатіей отъ желчныхъ камней и желчныхъ коликъ. Вылѣчена совершенно вышеозначенными лѣкарствами въ 3 м. Начало лѣченія 4 Янв. 1889 г. Въ продолженіе 1-й недѣли лѣченія колики начинали было появляться, но быстро были прерваны 3 пріемами сух. кр. *S.* 5 и компрес. *F.* 2 × *C.* 1. При этомъ силы быстро возстановились, а также аппетитъ и сонъ, тогда какъ до этого лѣченія послѣ припадковъ она лежала въ кровати по недѣлѣ въ сильномъ изнеможеніи (*C.*).

Хроническое воспаленіе печени съ затвердѣніемъ ея у м. 60 л. вслѣдствіе брюшной водянки; нѣсколько лѣтъ до этого лѣченія быль сдѣланъ проколъ для выпуска воды. Черезъ 6 мѣс. изліяніе воды въ нижней части живота уничтожилось отъ *F.* 1 (3-й ст.), на подвзд. *F.* 2 и на лож. *Эл. Кр.* (*C.*).

— Воспаленіе печени съ открытымъ геморроемъ, отсутствіе аппетита, общая слабость, безсонница, боль въ правой рукѣ, запоръ, блѣдность и пр. у ж. 30 л. Вылѣчена *F.* 1×*A.* 1 (2-й ст.). На подвзд. *F.* 2 (*C.*).

— Желтуха у ж. 24 л. вылѣчена въ 8 дней *F.* 1 (2-й ст.) и на подвзд. *F.* 2 (*C.*).

Совѣтъ черезъ корреспонденцію въ Казанской губ. По діагностикѣ доктора 70-лѣтняя дама страдала *гипертрофіей печени.* 13 іюня 1884 г. было назначено *F.* 1×*A.* 2×*C.* 2 (2-й ст.). Утромъ 2 сух. кр. *F.* 1, веч. 2 сух. кр. *C.* 5, на подвзд. мазь *F.* 2 (20 кр. разведен. въ *Эл. Б.*) 4 раза въ д. На 6 гл. точ. *Эл. Кр.* три раза въ д. На сердце и во всѣ опухшія железы и узлы мазь *A.* 2 (20 кр. разведен. въ *Эл. A.*) три раза въ д. Противъ запора 10—20 кр. *Verm.* въ рюмкѣ воды въ 1 пріемъ. На почки пластырь *A.* 2. При стрѣляющихъ боляхъ въ лѣвомъ глазу—къ зат., подгл., надгл. и симп., нер. *Эл. Зел.* или *Акж.* При приступахъ кашля 5—10 сух. кр. Р. 2. Ван. *F.* 2 × *C.* 5 два раза въ недѣлю. Къ 26 числу того же іюня больная отъ этого лѣченія на столько поправилась, что могла уже сама написать автору этой книги письмо, въ которомъ она благодаритъ его за избавленіе ея отъ тяжкихъ страданій, и присовокупляетъ, что до этихъ средствъ ее поднимали и клали на постель, а теперь она сама ходитъ, что печень еще болитъ, но гораздо мягче и не такъ

Digitized by Google

вздута; селезенка уменьшилась и всѣ застои въ сочлененіяхъ видимо уменьшаются. Остается слабость и желтизна въ лицѣ. 6 іюля 1884 г. назначено продолжать тоже лѣченіе; но *А.* 2 принимать изъ 3-го ст. два раза въ недѣлю по 6 ч. л. въ день (*С*).

— М. 72 л., страдалъ 2 дня острымъ воспаленіемъ печени; сильная колющая боль въ области печени, усиливавшаяся при давленіи на правое подреберье и тоже при кашлѣ и чиханіи, стѣсненное дыханіе, рвота зелеными массами, лихорадка. Вн. *F.* 1 × *С.* 2 (средняя доза), на подвзд. и согрѣв. компр. *F.* 2, на правое подреберье *Эл. Б.* и ван. *F.* 2. Вылѣченъ въ одну ночь (*С*).

Число излѣченій воспаленій печени и селезенки у муж, и женщ. весьма значительно.

Пляска Св. Вита, хорея состоитъ въ непроизвольной спазмодической игрѣ мышцъ, особенно лица и конечностей, вызывающія самыя странныя позы и гримасы, съ выраженіемъ глазъ полныхъ мольбы о сочувствіи и состраданіи. Характерно то, что *эти движенія прекращаются во время сна.* Бываетъ у дѣтей обоего пола въ возрастѣ 8—10 лѣтъ и у молодыхъ женщинъ въ періодѣ половой зрѣлости, и у нихъ эта болѣзнь находится въ связи съ малокровіемъ, блѣдною немочью и яснымъ предрасположеніемъ къ чахоткѣ; иногда бываетъ въ связи съ ревматизмомъ, можетъ быть вызвана глистами, испугомъ и просто подражаніемъ этой болѣзни. Вн. *S.* 1 или *S.* 2 (2-й или 3-й ст.) отъ 4 до 6 ч. въ день, на пораженныя мышцы прим. *S.* 1 или *Эл. Кр.*, на соотв. нерв. *Эл. Кр.* При неправильномъ кровообращеніи *А.* 3 × *S.* 1 (2-й ст.); дѣтямъ, въ особенности при глистахъ *S.* 1 × *Verm.* (2-й ст.). Въ упорн. случаѣ: *S.* 1 × *С.* 5 (2-й ст.). Ван. *С.* 5, *S.* 1, *S.* 5. На сердце мазь *А.* 2. На всю голову мазь *С.* 5. На 6 гл. точ. и по длинѣ позвон. столба *Эл. Кр.* × *Желт.* Въ застарѣлыхъ случаяхъ давать лѣкарства въ 1-мъ стак. и даже до крѣпкаго разведенія, и всегда 3 раза въ день *S.* 2 по 3—5 круп. передъ ѣдой.

— Д. 20 л. страдала 3 г. пляской Св. Вита. Отъ *S.* 1 и *Эл. Кр.* не было улучшенія. Дано *Verm.* попер. съ *S.* 1 (4-й ст.), припадки тогда прекратились черезъ 2 недѣли (*С*).

Digitized by Google

Подагра бываетъ острая и хроническая у людей, употребляющихъ крѣпкія вина и пищу, сильно приправляемую пряностями, и ведущихъ недѣятельную сидячую жизнь. Предвѣстники этой болѣзни: общая слабость, дурное настроеніе духа, головныя боли и отсутствіе аппетита. Подагра застигаетъ больного внезапно, ночью. Характеристическій признакъ этой болѣзни есть боль въ суставѣ большого пальца ноги, который снаружи представляется припухшимъ, кожа его покраснѣвшая, а иногда только тѣстовая на ощупь. Боль ожесточается ночью, а днемъ она значительно стихаетъ. Эта болѣзнь чаще всего всего осложняется разстройствомъ пищеваренія и вслѣдствіе сего всеобщимъ исхуданіемъ тѣла, одышкою и сердцебіеніемъ.

Другой несомнѣнный признакъ подагры присутствіе въ мочѣ песчанаго осадка бѣлаго, но чаще кирпичнаго цвѣта. При хронической подагрѣ сочлененія распухаютъ и искривляются, вслѣдствіе чего движенія иногда невозможны, но во всякомъ случаѣ болѣзненны. Болѣзнь наслѣдственная, поражаетъ всѣ темпераменты, чаще мужчинъ, чѣмъ женщинъ. При лѣченіи не прерывать быстро первый припадокъ подагры; такимъ образомъ скорѣе отстраняется возвратъ припадковъ; на больное сочлененіе *Эл. Зел.*, и его обвертываютъ въ вату,—а вн. *A.* 3 × съ *S.* 1 или 2 (2-й ст.), или *C.* 3 × *S.* 1 (2-й ст.); ван. *C.* 5 и *A.* 3. Важное лѣкарство при подагрѣ также *L.* въ раствор., сухомъ видѣ и ваннахъ. При сифилит. происхожденіи прибавляютъ *V.* Соблюдать покой и діэту, пища преимущественно растительная и прогулки на чистомъ воздухѣ.

Измѣченія. М. 48 л. болѣлъ нѣсколько лѣтъ подагрой и ревматизмомъ въ лѣвой ногѣ. Аллопатическія средства только ухудшили болѣзнь. Ходилъ на костыляхъ. Отъ прилож. *Эл. Кр.* на соотв. нер. и вн. *S.* 1 (1-й ст.) и 10 кр. *S.* 1 въ день на столько облегчили больного, что на 3-й день онъ могъ ходить безъ костылей. Вылѣченъ совершенно въ 3 мѣс. *S.* 5 вн. и нар. въ ван. и мази (*C.*).

— Упорная подагра была вылѣчена въ 3 дня *V.* (средняя доза) и прим. *S.* 1 на больныя мѣста (*C*).

Digitized by Google

- Нѣсколько разъ подагра была вылѣчена вн. *Эл. Анж.* (5 капель въ л. воды) и *А.* 1 (2-й ст.).

— Подагра у м. 50 л. была вылѣчена *L.* и *Эл. Анж.* вн. и нар.

Подвздошная колика происходитъ отъ засоренія кишекъ или ихъ съуженія. Главные симптомы: сильная, нестерпимая боль въ желудкѣ, въ желудочной области ощущается какъ бы движеніе кишекъ, твердость живота, отрыжка, рвота содержимымъ въ желудкѣ и кишкахъ, упорный запоръ въ теченіе всей болѣзни. При этомъ черты лица бысто измѣняются, лицо блѣдное, туловище сгибается впредъ, безпокойство, отчаяніе, слабый голосъ, одышка, обмороки, конвульсіи, дыханіе воняетъ каломъ, слабый и неправильный пульсъ, холодныя конечности, холодный потъ, увеличивающійся упадокъ силъ. Припадки этой болѣзни часто усиливаются; теченіе болѣзни быстро, въ продолженіе немногихъ дней оканчивается смертію. Икота, бредъ, напрасныя усилія ко рвотѣ, потеря голоса, нечувствительность пульса предшествуютъ смерти и ее предвѣщаютъ. Иногда, послѣ кажущагося излѣченія, симптомы вновь возобновляются съ прежнею быстротою и съ большею опасностію. Вн. каждый часъ по 5 сухихъ кр. *S.* 1 и *C.* 1 изъ 2-го или 3-го ст. На подвзд. согрѣв. компр. *F.* 2. На пояс., промежн. и симп. нер. *Эл. Кр.* Каждый часъ ставить клистиры изъ 10 кр. *C.* 5 на стаканъ воды.

Позвоночный столбъ. Твердый остовъ туловища, дающій тѣлу отвѣсное положеніе, образуется позвоночнымъ столбомъ, который, извиваясь слегка змѣевидно и увеличиваясь къ низу въ толщинѣ, идетъ по срединѣ спины, отъ головы до выхода таза. Части, его составляющія, называются шейною, грудною, поясничною и тазовою. Внутри позвоночнаго столба, въ такъ назыв. *позвоночномъ каналѣ* лежитъ *спинной мозгъ*, чрезъ отверстія съ боковъ позвоночнаго столба выходятъ нервы спинного мозга. Такихъ нервовъ имѣется 31 пара (8 шейныхъ, 12 спинныхъ, 5 брюшныхъ или поясничныхъ, 5 крестцовыхъ и 1 копчиковая); каждый нервъ начинается двумя корешками— *переднимъ*, содержащимъ двигательныя волокна и *заднимъ*, содержащимъ чувствительныя волокна. Части тѣла, въ кото-

Digitized by Google

рыхъ распространяются нервы спинного мозга, суть главнымъ образомъ туловище съ его внутренностями и конечностями. Ощущенія и произвольныя движенія здѣсь происходятъ при участіи тѣхъ нервныхъ нитей, которыя доходятъ до головного мозга. Непроизвольныя же движенія во внутренностяхъ зависятъ отъ тѣхъ нитей, которыя начинаются въ спинномъ мозгу.

Соединенныя связками кости, отъ наложенія которыхъ другъ на дружку образуется позвоночный столбъ, суть 24 позвонка (7 шейныхъ, 12 грудныхъ, 5 поясничныхъ), крестецъ и копчикъ. Каждый позвонокъ представляетъ короткій цилиндръ, въ передней своей половинѣ гораздо болѣе толстый, чѣмъ въ задней, и снабженный нѣсколькими отростками для прикрѣпленія мышцъ. Между позвонками, въ передней ихъ части, лежатъ эластическіе хрящевые кружки. Съ обоихъ боковъ каждаго изъ 12 грудныхъ позвонковъ прикрѣпляется по ребру, а съ крестцовой костью соединяются *безъимянныя кости* для образованія таза.

Болѣзни позвоночнаго столба.

Острое воспаленіе спинного мозга. Послѣ чувства ползанія мурашекъ, онѣмѣнія пальцевъ рукъ и ногъ, иногда послѣ рвоты желчью или судорогъ появляется боль по длинѣ позвоночнаго столба. Затѣмъ слѣдуетъ параличъ, который поражаетъ одну половину тѣла, или ноги, или мочевой пузырь и прямую кишку, что производитъ недержаніе или задержаніе мочи и фекальныхъ массъ.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ больной жалуется на тупую боль въ членахъ, при чемъ бываетъ лихорадка, напряженіе, судорожныя подергиванія и сведеніе мускуловъ; или на боль въ поясницѣ, на ощущеніе какъ бы обруча вокругъ живота или груди.

Если воспаленіе сосредоточивается въ области почекъ, то боль постоянная, и тогда нижнія конечности, мочевой пузырь и прямая кишка парализуются вслѣдъ затѣмъ, и во всемъ животѣ ощущаются сильныя колики.

Digitized by Google

Воспаленіе мозга шейныхъ позвонковъ выражается трудностію глотанія и нѣкоторыми симптомами жабы. Боль существуетъ въ затылкѣ или въ мускулахъ, которые нѣмѣютъ, сводятся; параличъ переходитъ въ мускулы верхнихъ конечностей и въ грудные, вслѣдствіе чего появляется давленіе, доводящее больного до асфиксіи.

Когда воспаленіе существуетъ въ спинѣ, то являются тѣ же симптомы асфиксіи со стороны груди: дыханіе короткое, скорое, судорожныя подергиванія въ туловищѣ, сильное біеніе сердца и общее нервное раздраженіе, или параличъ одной половины лица.

Наконецъ, если воспаленіе распространится до головн. мозга, то являются ужасные симптомы бѣшенства и помѣшательства, полное разстройство умственныхъ способностей, неистовый бредъ, судорожное сжатіе челюстей, скрежетъ зубовъ и сильныя рвоты.

Хроническое воспаленіе спинного мозга развивается гораздо медленнѣе, иногда же оно является какъ послѣдствіе остраго воспаленія. Главные симптомы: ограниченная боль въ позвоночномъ столбѣ, съ безпокоющимъ жаромъ, зудъ и безпокойство въ нижнихъ конечностяхъ при невѣрной походкѣ, ноги скрещиваются между собою постоянно; чувство ползанія мурашекъ и слабость могутъ появиться гораздо ранѣе паралича; наконецъ непроизвольныя сведенія (гораздо рѣже судороги) съ параличемъ мочевого пузыря и прямой кишки, который постепенно развивается.

Острые случаи воспаленія мозга оканчиваются обыкновенно смертью черезъ 8—14 дней; при хроническомъ всѣ эти припадки значительно слабѣе, жизнь возможна и больные могутъ дожить даже до преклонныхъ лѣтъ.

Главныя лѣкарства противъ обѣихъ формъ этой болѣзни *S.* 1, 2, 3 и 5, *A.* 1, *C.* 1 и 5. Ихъ употребляютъ послѣдовательно, каждое отдѣльно. Въ этой болѣзни дозы составляютъ исключеніе изъ общаго правила, такъ какъ при остромъ воспаленіи съ болью слабые растворы усиливаютъ боль, то потому лѣкарство дается изъ 1-го ст. по стол. ложкѣ черезъ

Digitized by Google

¼ часа, а при хронич. воспаленіи безъ боли изъ 2-го или 3-го ст. по чайной ложкѣ черезъ полчаса. На 6 гл. точ. и по обѣимъ сторонамъ спины *Эл. Кр.*, *Анж.*, *Желт.* или *Бѣл.* На подреберья и на весь животъ согрѣв. компр. *A.* 2 × *C.* 5 × *F.* 2. Ван. *S.* 1, *S.* 5, *A.* 2, *C.* 5, каждую недѣлю по одной. Обтирать спину спиртомъ *C.* 5 или *S.* 5 съ *A.* 2. При хрон. воспаленіи спин. мозга удостовѣриться не происходитъ ли оно отъ сифилиса, и вообще при осложненіи другими болѣзнями лѣченіе сообразно тому измѣняется.

Это же лѣченіе употребляется противъ: *боли* позвоночн. столба, его *искривленія*, *перемѣщенія позвонка* и *горба*.

Сухотка спинного мозга (Tabes dorsalis). Атаксія. Главнымъ отличительнымъ признакомъ табеса или спинной сухотки является постепенно развивающаяся неспособность къ согласованнымъ мышечнымъ движеніямъ. Прежде всего появляется невѣрная походка, закидываніе ногъ, разбрасываніе рукъ. При пораженіи рукъ больной не можетъ застегнуть пуговицу, завязать уголъ или поднести руку ко рту. Выдающимся признакомъ этой болѣзни, даже при слабой ея степени, считается то, что больной не можетъ стоять съ закрытыми глазами— онъ теряетъ равновѣсіе. Съ теченіемъ времени поражается рѣчь, образуются двоезрѣніе, почти полная слѣпота, косоглазіе, катаракта на одномъ глазу и опусканіе верхняго вѣка; иногда глухота; задержаніе мочи, половое безсиліе, недержаніе кала и мочи; *жестокія боли* въ разныхъ частяхъ тѣла острыя или сверлящія или ноющія и внезапныя, подобно электрическому току. Болѣзнь всегда прогрессируетъ, но съ различною быстротою.

Лѣченіе. Если болѣзнь узнана въ самомъ началѣ, *то она вполнѣ излѣчима*, если же параличъ охватилъ уже и верхнія конечности, то излѣченіе возможно лишь еще въ рѣдкихъ случаяхъ, чаще всего именно, когда причиной является сифилисъ. Вн. *A.* 3 × *F.* 1 × *C.* 1 × *V.* (3—1-й ст.), 3 раза въ день по 5 круп. *S.* 1 съ 5 кап. *Эл. Бѣл.* Прилож. *Эл. Анж.* или *Бѣл.* вначалѣ, *Эл. Зел.* или *Бѣл.* въ позднѣйш. періодѣ болѣзни, на гл. нерв. точ. 11, на весь спинной хребетъ до

Digitized by Google

точ. 22. Втираніе во все тѣло, послѣ прилож. Эл. жидк., растворомъ *А.* 2, *F.* 2, *С.* 5. Два три раза въ недѣлю теплая ванна съ *А.* 2, *F.* 2, *С.* 5. Въ подреберья мазь *F.* 2. Больной долженъ избѣгать всякихъ чрезмѣрныхъ мышечныхъ напряженій, особенно въ началѣ болѣзни много лежать. Пища должна быть легкая и питательная, безъ всякихъ раздражающихъ приправъ, избѣгать кофе и всего спиртнаго. Сопутствующія осложненія лѣчить соотвѣтствующимъ образомъ.

Излѣченія. М. 4 л. страдалъ искривленіемъ позвон. столба, при этомъ худоба, слабость, вздутый животъ, увеличенный объемъ головы. Вылѣченъ въ 8 мѣс. Вн. *S.* 1 × *С.* 1 (2-й ст.), 2 раза въ день по 3 сух. кр. *S.* 1. Обтираніе спины растворомъ *S.* 1 въ спиртѣ. Ван. *S.* 1 × *С.* 5. На 6 гл. точ. и по длинѣ спины *Эл. Кр.* × *Ж.* (*С.*).

— Совѣтъ черезъ корреспонденцію въ Твер. губ. По діагностикѣ доктора 40 л. м. вслѣдствіе сифилиса страдалъ хронич. восп. спин. мозга съ неполнымъ параличемъ въ нижнихъ конечностяхъ и проявленіемъ паралича въ верхнихъ конечн. и отчасти мочевого пузыря, раздражительность, разстройство всей нервной системы, боль въ шейныхъ позвонкахъ, сердцебіеніе учащенное. Вн. *А.* 3 (3-й ст.) 6 чайн. л. въ д., *S.* 5 (1-й ст.) и обтираніе столба растворомъ *С.* 5 въ спиртѣ. Черезъ 6 мѣс. нерв. система укрѣпилась, походка сдѣлалась правильной, отправленіе мочевого пузыря нормальнымъ (*С.*).

— Ж. 42 л. три года страдала хрон. восп. спин. мозга и прогрессивнымъ параличемъ, была признана неизлѣчимой. Вылѣчена въ 5 мѣс. Вн. *А.* 1 × *S.* 1 (1-й ст.). На позвон. столбъ *Эл. Б.* и *Анж.* × съ мазью *S.* 5. Ван. *S.* 5 × *А.* 2 (*С.*).

Полипы суть новообразованія слизистой оболочки и встрѣчаются въ различныхъ полыхъ органахъ тѣла. Они обыкновенно сидятъ на широкомъ, рѣдко на тонкомъ основаніи, имѣютъ круглую, овальную, неправильную и т. д. форму и различную величину и состоятъ главнымъ образомъ изъ соединительной ткани и слизистыхъ железокъ. Лѣченіе ихъ одинаково, на какомъ бы органѣ они не находились, и указано въ своемъ мѣстѣ, и кромѣ средствъ тамъ назначенныхъ вн. и нар. *V.*

Половые органы обусловливаютъ собою разность половъ мужскаго и женскаго и по достиженіи зрѣлаго возраста служатъ для размноженія рода.

Digitized by Google

Мужскіе половые органы назначены для вырабатыванія оплодотворяющаго вещества—*сѣмени* и непосредственнаго его выведенія съ находящимися въ немъ сѣмянными живчиками или нитями; женскіе—для образованія зародыша и развитія плода. Кромѣ того, какъ у мужчинъ, такъ и у женщинъ существуютъ особые органы для совокупленія. Къ первымъ у мужчинъ относятся: яички съ ихъ придатками, выносящими сѣменными протоками и прибавочными железами, каковы: сѣменные пузырьки, предстательная и куперовы железы и ко вторымъ—мужской дѣтородный членъ. У женщинъ къ органамъ, служащимъ для образованія зародыша и развитія плода относятся: матка съ яйцепроводами и яичники, а къ органамъ совокупленія—влагалище съ наружными половыми частями.

1. МУЖСКІЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ.

а) *Яички* суть парные железистые органы, отдѣляющіе *сѣмя*. Величина ихъ достигаетъ размѣра голубинаго яйца; они помѣщаются на днѣ просторнаго мѣшка, образуемаго кожею—*мошонки*. Посрединѣ, на кожѣ мошонки замѣчается *шовъ*, которому въ полости соотвѣтствуетъ перегородка, раздѣляющая мошонку на правую и лѣвую части, и въ каждой изъ нихъ находится по яичку, которое виситъ на *сѣмянномъ канатикѣ*; позади яичка сидитъ *придатокъ*, имѣющій *сѣмянной протокъ*. Оба сѣменные протока сближаются между собою и, соединившись съ устьями двухъ маленькихъ *сѣмянныхъ пузырьковъ*, лежащихъ между прямою кишкою и заднею поверхностью дна мочевого пузыря, прободаютъ *предстательную железу*, которая лежитъ позади лоннаго срощенія, подъ основаніемъ мочевого пузыря, впереди прямой кишки, чрезъ которую и можно прощупать ее пальцемъ. Она выдѣляетъ бѣлковинное вещество, смѣшивающееся съ сѣменемъ и охватываетъ собою начало мочеиспускательнаго канала. Длина ея равняется 1 дюйму, ширина немного меньше. *Куперовы железы*—суть маленькія гроздевидныя железки величиною въ горошину, выдѣляющія

Digitized by Google

слизь и изливающія ее двумя выводящими протоками въ мочеиспускательный каналъ.

б) *Мужской дѣтородный членъ* служитъ для мочеиспусканія и для совокупленія. На немъ различаютъ: *корень* или верхнюю часть, *тѣло* или среднюю часть и конецъ или *головку*. Основою его служатъ *три пещеристыхъ тѣла* губчатаго строенія, что́ зависитъ отъ множества перегородокъ, раздѣляющихъ вещество тѣлъ на множество маленькихъ *полостей*. Вслѣдствіе большого накопленія этихъ полостей кровью, при застоѣ въ нихъ крови, подъ вліяніемъ нервнаго возбужденія — дѣтородный членъ, въ обыкновенное время вяло висящій, увеличивается въ длину и толщину, дѣлается плотнымъ и въ этомъ состояніи становится уже способнымъ проникать въ женскіе органы совокупленія. Снаружи членъ покрывается кожею, отличающеюся большою подвижностію, которая не только окружаетъ весь членъ, но и спускается болѣе или менѣе съ головки въ видѣ складки, образуя *крайнюю плоть*, внутренняя поверхность которой, а равно и шейка головки выдѣляетъ чрезъ сальныя железки особую *смазку*. Отъ соединенія внутренней поверхности крайней плоти съ нижнею поверхностью головки, образуется *уздечка*.

Болѣзни мужскихъ половыхъ органовъ.

Воспаленіе крайней плоти наблюдается въ особенности у дѣтей и есть послѣдствіе тренія. Крайняя плоть и членъ немного зудятъ, боль слегка жгучая и цвѣтъ ярко-красный. Иногда образуются маленькіе гноящіеся прыщики. Вн. и нар. *S.* 1 и соблюдать чистоту и опрятность. При появленіи прыщиковъ и нагноенія *S.* замѣняютъ *C.* 1.

Воспаленіе мошонки часто представляетъ послѣдствіе бленноррагіи, воспаленія околоушной железы, невралгіи нижней части живота или оспы. Быстро вылѣчивается *C.* 1 вн. и нар.

Водянка яичка (Hydrocele) или скопленіе сыворотки въ мошонкѣ вызываетъ чувство неловкости и причиняетъ больному много неудобствъ по своей величинѣ и тяжести. Если поставить

Digitized by Google

съ боку опухоли свѣчу, заслонивъ ее сзади рукою, то опухоль просвѣчиваетъ. Этимъ признакомъ, а также и тѣмъ, что опухоль не перемѣщается при кашлѣ, она отличается отъ паховой грыжи. Во время лѣченія носить суспензорій. Вн. и нар. *С.* 2, попер. съ *А.* 1. См. *Водяная.*

Растиреніе венъ въ сѣмянномъ канатикѣ (Varicocele) выражается болѣзненною опухолью въ тѣхъ же мѣстахъ. Вн. *А.* 1 × *С.* 5 (2-й ст.); прим. *Эл. Анж.* съ *А.* 2. Ср. *Расширеніе венъ.*

Воспаленіе яичка и придатка бываетъ по большей части послѣдствіемъ перелоя, иногда отъ ушиба или сильнаго давленія, напр. при верховой ѣздѣ. Одно, а очень рѣдко оба яичка, и придатокъ опухаютъ такъ, что больное яичко вдвое или втрое дѣлается больше здороваго. Боль при этомъ нестерпимая, распространяющаяся въ паха и поясницу. Почти всегда и общее лихорадочное состояніе. Вн. *С.* 1 × *А.* 1. Въ упорн. случаѣ, ван. мазь, прим. *S.* 5, *С.* 5. (Ср. *Трипперъ*).

Сифилитическое воспаленіе яичекъ. Вн. и нар. (въ мази или прим.) *V.* Въ упорн. случаѣ *V.* × *С.* 1 или *V.* × *А.* 2 или *V.* × *С.* 1 × *А.* 2. Также ван., мазь, прим. *С.* 5, *S.* 5. Компр. *Эл. Б.* и въ ваннахъ. (Ср. *Сифилисъ*).

Сперматоррея выражается истеченіемъ сѣмени, которое происходитъ приблизительно каждые 8 дней у молодыхъ мужчинъ по ночамъ и сопровождается чувствомъ сладострастія (*поллюціи*), представляетъ явленіе совершенно нормальное, обусловленное переполненіемъ органовъ, выдѣляющихъ сѣмя, т. е. сѣмянныхъ пузырьковъ. Изліянія же сѣмени, происходящія каждую ночь, не сопровождающіяся пріятными ощущеніями и влекущія за собой замѣтное утомленіе и ослабленіе всего тѣла, должны считаться уже за болѣзненное состояніе. Оно является чаще всего слѣдствіемъ онанизма, также половыхъ излишествъ вообще, поэтому устраненіе того или другого необходимо при лѣченіи сперматорреи или поллюціи (ср. *Онанизмъ* или *Рукоблудіе*). Затѣмъ принимать внутрь *А.* 1 × *S.* 1 (2-й ст.), кромѣ того утр. 2 круп. *А.* 1, днемъ и веч. по 5 круп. *S.* 1 въ сух. видѣ. Въ подреб. мазь *F.* 2. Въ упорн.

Digitized by Google

случ. *C.* 1 × *A.* 1 или 3 (2—1-й ст.). Обтир. и ванны изъ *A.* 2, *S.* 5, *C.* 5. На поясн., промежн. и впрыскив. въ мочев. каналъ *Эл. Кр.* (1 ч. л. на стак. воды).

Мужское безсиліе, т. е. неспособность къ совокупленію *(Импотенція)*.

Прежде всего нужно убѣдиться, не происходитъ ли безсиліе отъ открытаго геморроя, воспаленія мошонки, болѣзни почекъ или желудка (диспепсіи). При отсутствіи этихъ причинъ безсиліе зависитъ: 1) отъ нервной системы; оно можетъ имѣть мѣсто при теченіи двигательной атаксіи (см. *Сухотка спинного мозга*), при параличѣ (см. *Параличъ*); въ этихъ случаяхъ лѣченіе должно быть направлено противъ производящей причины, и 2) безсиліе есть послѣдствіе половыхъ излишествъ, онанизма, и тогда оно сопровождается частыми непроизвольными истеченіями сѣмени (см. *Сперматоррея*). Абсолютный покой для истощенныхъ органовъ впредь до укрѣпленія ихъ. Вн. *S.* 1 въ крѣпкомъ развед., 3 раза въ день по чайн. лож., если причина половыя излишества; прилож. *Эл. Кр.* на гл. нерви. точки 11, на весь спинной хребетъ до точки 22 и кажд. веч. обтир. поясницы или прохладн. сидяч. ванны изъ раствора *A.* 2, *C.* 5 и *F.* 2, съ *Эл. Кр.* Избѣгать всякихъ средствъ, раздражающихъ половой органъ. Женатые, страдающіе не полнымъ полов. безсиліемъ, могутъ позволять себѣ полов. сношеніе не болѣе одного раза въ недѣлю или даже того рѣже.

Мужское безплодіе. Новѣйшія изслѣдованія доказали, что $^1/_4$ часть всѣхъ бездѣтныхъ браковъ происходитъ отъ безплодія мужчины. Это безплодіе зависитъ отъ неспособности къ совокупленію или отъ неспособности къ оплодотворенію. Послѣднее происходитъ отъ двухъ причинъ: 1) сѣмя не извергается наружу во время акта совокупленія отъ непроходимости выбрасывающихъ протоковъ, атрофіи яичекъ, гипертрофіи предстат. железы или отъ стриктуры и 2) отъ отсутствія въ сѣмени нитей или живчиковъ, что распознается помощью микроскопа. Причинами могутъ быть: половыя излишества, онанизмъ, пораженіе сифилисомъ половыхъ органовъ, заста-

Digitized by Google

рѣлый трипперъ, осложненный воспаленіемъ обоихъ придатковъ и свѣжій трипперъ, который заражаетъ женщину и дѣлаетъ ее неспособною къ зачатію. Лѣченіе должно быть направлено противъ производящей причины.

Воспаленіе предстательной железы (*Простатитъ*). Къ симптомамъ простатита, которые приведены выше на стр. 325 принадлежитъ выдѣленіе, при каждомъ испражненіи, изъ моч. канала тягучей, прозрачной, рѣже бѣловато-мутной клейкой жидкости, которую больные часто принимаютъ за сѣмя. При хрон. простатитѣ, послѣ мочеиспусканія, больные должны сильно жилиться, и вслѣдъ за натугами, выходитъ студенистое вещество. Вн. *A.* 1 (3-й ст.) × *C.* 1 (2-й ст.) и полуванъ съ 50 кр. *S.* 5 или *C.* 5. Въ упорн. случаѣ на пояс., лобокъ и промежн. *Эл. Кр.* и мазь *C.* 5.

Медленное истеченіе сѣмени во время совокупленія зависитъ отъ неправильнаго устройства или слабости половыхъ органовъ, и имѣетъ своимъ послѣдствіемъ невозможность оплодотворенія. Вн. *S.* 1 или *A.* 1 × *C.* 1. На лобк. кость, промеж. и поясн. компр. *Эл. Кр.* × *Желт.* Вспрыск. въ каналъ *Эл. Кр.* (1 ч. л. на ст. воды).

Площицы или вши водятся преимущественно на волосахъ, покрывающихъ половые органы и промежность, но могутъ распространяться на ноги и друг. части покрытыя волосами; вызываютъ сильный зудъ. Лучшее средство растворъ жидкости Джейса — одна чайная ложка на полстакана воды, которымъ обмываютъ пораженныя части. Достаточно одного раза. Также дѣйствуетъ растворъ карболовой кислоты (отъ $^1/_2$ до 1 драхмы на стаканъ воды).

2. ЖЕНСКІЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ.

Матка представляетъ собою полый органъ, лежащій въ маломъ тазу, между мочевымъ пузыремъ и прямою кишкою; имѣетъ грушевидную сплющенную спереди назадъ форму. Длина матки $2^1/_2$ дюйма, вѣсъ около 12 — 18 золотниковъ. Верхняя широкая ея часть называется *дномъ*, средняя—

Digitized by Google

тѣломъ и нижняя, узкая часть, вдающаяся во влагалище— *шейкою*. Вершина полости матки продолжается къ шейкѣ въ видѣ *канала*, въ которомъ различаютъ верхнее отверстіе, граничащее съ полостью тѣла матки — *внутреннее рыльце*, и нижнее, открывающееся во влагалище — *наружное рыльце*. Эти отверстія уже самаго канала шейки: наружное имѣетъ видъ поперечной щели, ограниченной спереди и сзади краями шейки — *маточными губами*. *Передняя губа* вдается болѣе во влагалище, *задняя* лежитъ выше. Въ полости матки и совершается развитіе зародыша. Во время беременности форма и величина матки совершенно измѣняется не только отъ растяженія, но и вслѣдствіе разращенія составныхъ ея тканей. Отъ дна матки по сторонамъ идутъ въ видѣ двухъ боковыхъ трубъ, заложенныхъ въ самой верхней части широкихъ связокъ — *яйцепроводы или фаллопіевы трубы*. Внутреннее отверстіе этой трубы узко, а наружное — болѣе широко и снабжено по краямъ зубцами въ видѣ бахромы.

Яичники (правый и лѣвый яичникъ) представляютъ собою два овальныхъ сплющенныхъ тѣла, величиною съ миндальный орѣхъ, расположенныхъ по бокамъ матки, прикрѣпляясь къ послѣдней *связкою*. Болѣе узкій конецъ яичника обращенъ къ маткѣ, другой тупой — кнаружи. Надъ каждымъ яичникомъ, между его тѣломъ и яйцепроводомъ, лежитъ маленькій *придатокъ*. Вещество яичка состоитъ изъ волокнистой наружной оболочки, дающей внутрь отростки, между которыми заключаются множество круглыхъ мѣшечковъ, величиною отъ просянаго до овсянаго зерна — *граафіевы пузырьки*, служащіе вмѣстилищемъ яичекъ, величиною съ точку. Граафіевы пузырьки наполнены жидкостью и въ нихъ развивается человѣческое яичко, которое есть ничто иное какъ маленькій пузырекъ, имѣющій оболочку и внутри ея желтокъ. Выхожденіе яичка изъ Граафіева пузырька происходитъ слѣдующимъ образомъ: пузырекъ вслѣдствіе накопленія въ немъ жидкости, все увеличивается въ объемѣ, оболочка его растягивается, истончается и разрывается; освобожденное яичко выступаетъ на поверхность яичника; здѣсь оно захватывается бахромкой

Digitized by Google

Фаллопіевой трубы и приводится въ трубу и по ней проходитъ въ матку. Оплодотвореніе его, т. е. прониканіе черезъ его оболочку сѣменныхъ живчиковъ, находящихся въ мужскомъ сѣмени, происходитъ или на поверхности яичника или въ Фаллопіевой трубѣ. Оплодотворенное яичко, попадая въ матку, внѣдряется въ одну изъ ея стѣнокъ и здѣсь развивается до размѣровъ доношеннаго младенца. Въ очень рѣдкихъ случаяхъ яичко, вмѣсто того, чтобы попасть въ матку, остается въ Фаллопіевой трубѣ или попадаетъ въ полость живота, гдѣ можетъ развиваться. Эти случаи называются *внѣматочной беременностью* *). У взрослыхъ женщинъ яичники бываютъ шероховаты на поверхности, тогда какъ у недостигшихъ еще половой зрѣлости они имѣютъ гладкую поверхность. Рубецъ отъ яичка, которое оплодотворяется, остается на всю жизнь. Чаще всего созрѣваніе и лопаніе Граафіева пузырька совпадаетъ съ періодическимъ отдѣленіемъ у женщинъ крови изъ матки — *мѣсячными очищеніями*, но можетъ происходить и безъ нихъ.

Влагалище или маточный рукавъ представляетъ изогнутый ходъ длиною до 3 дюймовъ, идущій отъ матки къ наружнымъ половымъ частямъ, откуда начинается *входнымъ отверстіемъ*; на верху оно оканчивается *сводомъ*, на который вдается маточная шейка, раздѣляющая его на два отдѣла— передній и задній. Входное отверстіе въ дѣвственномъ состояніи бываетъ закрыто складкою слизистой оболочки — *дѣвственною плевою*; эта плева имѣетъ *полулунный видъ* или въ видѣ *кольца*, рѣже бываетъ сплошная, съ маленькими отверстіями — *рѣшетчатая*. Иногда отверстіе дѣвственной плевы такъ велико, что пропускаетъ тѣла очень большихъ размѣровъ безъ нарушенія цѣлости ея. Отверстіе дѣвственной

*) При внѣматочной брюшной беременности возможенъ благополучный исходъ для матери и младенца; внутри фал. трубы—трудная беременность, въ большинствѣ случаевъ оканчивается смертью матери—увеличивающееся яйцо ведетъ къ разрыву трубы — *если заблаговременно не послѣдуетъ оперативное вмѣшательство.*

Digitized by Google

плевы служитъ для выхода постоянныхъ отдѣленій маточнаго рукава и матки, а также и мѣсячныхъ кровей, а потому сплошная дѣвственная плева, если не будетъ во время замѣчена, можетъ принести большой вредъ здоровью, а иногда отъ этого послѣдуетъ и смерть. При первомъ совокупленіи дѣвственная плева обыкновенно разрывается и на мѣстѣ своего укрѣпленія къ стѣнкамъ влагалищнаго отверстія, оставляетъ небольшіе клочки, которые сокращаются и едва становятся замѣтными, образуя *миртовидныя возвышенія*.

Къ наружнымъ женскимъ половымъ частямъ относятся: *лобокъ, большія и малыя половыя губы и клиторъ*.

Лобокъ — это треугольная часть кожи, составляющая продолженіе кожи живота; онъ покрываетъ собою соединеніе лобковыхъ костей; съ наступленіемъ половой зрѣлости покрывается жесткими курчавыми волосами и пріобрѣтаетъ толстую подстилку изъ жира.

Большія губы представляютъ собою двѣ складки кожи, расположенныя продольно, по бокамъ входа во влагалище, между ними продольная *половая щель*. Въ толщинѣ губъ помѣщаются парныя *бартолиновы железки*. Пространство между заднею спайкою большихъ губъ и заднимъ проходомъ образуетъ *промежность*.

Малыя губы суть также складки, лежатъ въ половой щели, будучи закрыты большими губами, отъ задневнутренней поверхности которыхъ начинаются; на верху дѣлятся на двѣ ножки, изъ коихъ внутреннія образуютъ *уздечку для клитора*, а наружныя, восходя надъ клиторомъ — *крайнюю плоть*. Въ пространствѣ между малыми губами — *преддверіе влагалища*; подъ клиторомъ открывается женскій мочеиспускательный каналъ.

Клиторъ или похотникъ находится въ самой верхней части преддверія влагалища, имѣетъ строеніе, подобное мужскому дѣтородному члену, но состоитъ только изъ двухъ пещеристыхъ тѣлъ, при наполненіи кровью увеличивается въ объемѣ, т. е. пробуждается къ эрекціи.

Всѣ описанныя части женскихъ половыхъ органовъ снаб-

Digitized by Google

жены большимъ количествомъ кровяныхъ сосудовъ и нервовъ, а также и слизистыми оболочками. Нервы половыхъ органовъ связаны съ нервами всего тѣла, а потому болѣзнь женскаго полового аппарата вызываетъ нерѣдко самыя разнообразныя страданія во всей нервной системѣ, при чемъ мѣстная болѣзнь часто отодвигается на задній планъ и женщина жалуется вовсе не на то, чѣмъ она дѣйствительно больна. Слизистыя оболочки покрываютъ внутреннюю поверхность большихъ губъ, остальныя наружныя половыя части, внутреннія стѣнки влагалища и выстилаютъ полости матки и Фаллопіевыхъ трубъ. Слизистая оболочка имѣетъ видъ нѣжной, рыхлой, богатой кровеносными сосудами и нервами ткани, вслѣдствіе чего она розоваго цвѣта и чувствительна. Отдѣляемая слизистыми оболочками жидкость называется *слизью*; свойства этой слизи неодинаковы, смотря по мѣсту. Слизь влагалища густа, похожа на сливки и никогда не бываетъ тягуча; запахъ ея довольно острый. Слизь полости матки жидка, водяниста, свѣтлаго или сѣроватаго цвѣта, приторнаго запаха; слизь канала шейки густа, тягуча, болѣе темнаго цвѣта и напоминаетъ собой сырой яичный бѣлокъ. Въ нормальномъ состояніи слизистая оболочка отдѣляетъ лишь только слизи, сколько необходимо для смазки, увлажненія. Если же оболочка раздражена, больна, то къ ней приливаетъ больше крови и вырабатывается больше слизи; вмѣстѣ съ этимъ происходитъ усиленное отпаденіе клѣтокъ и размноженіе слизистыхъ тѣлецъ, вслѣдствіе чего слизь становится болѣе густой, принимаетъ бѣловатый или желтоватый цвѣтъ и получаетъ названіе гноя. При бѣляхъ слизь отдѣляется въ обиліи.

Къ придаточнымъ половымъ органамъ женщины относятся *грудныя железы*, представляющія у достигшихъ половой зрѣлости женщинъ видъ возвышеній на срединѣ груди, раздѣленныхъ пазухой. Физіологическое значеніе ихъ состоитъ въ отдѣленіи молока, которое собирается чрезъ протоки къ поверхности *сосковъ*. Соски окаймлены окрашенною кожею въ видѣ ободковъ *околососковыми кружками*; сами покрыты очень

Digitized by Google

нѣжною кожею, подходящею къ слизистой оболочкѣ. На верхушкѣ соски имѣютъ нѣсколько отверстій, изъ которыхъ и высасывается или выдавливается молоко тонкими струями. Кожа женскихъ грудей богата жиромъ.

Величина и форма женскихъ грудей различна, смотря по возрасту, состоянію организма и племени женщины. Очень мало развитыя груди у взрослыхъ особъ указываютъ на ненормальное развитіе частей половыхъ органовъ. Груди находятся въ тѣсной связи съ половымъ аппаратомъ.

Способы опредѣленія женскихъ болѣзней.

Болѣзни женскаго полового аппарата находятся, въ большинствѣ случаевъ, въ связи съ регулами, беременностью и родами; кромѣ сего, отправленія эти подъ вліяніемъ болѣзненныхъ процессовъ въ половыхъ органахъ, измѣняютъ свое правильное теченіе. Чтобы получить свѣдѣнія о половой дѣятельности, которыя могутъ дать болѣе или менѣе вѣрныя указанія относительно существующей болѣзни, предлагаютъ больной рядъ вопросовъ, относящихся къ регуламъ, беременности и родамъ, а также о состояніи сосѣднихъ органовъ въ данное время, самочувствіи, образѣ жизни, возрастѣ и родѣ занятій. См. Гл. VIII о діагностикѣ.

Каждое страданіе половыхъ органовъ сопровождается болями въ нижней части живота и выдѣленіемъ изъ нихъ жидкостей.

Боль острая, рѣжущая въ нижней части живота указываетъ на приливъ крови къ маткѣ и яичникамъ или на воспаленіе ихъ. Если при этомъ больную лихорадитъ, то воспаленіе матки или яичниковъ внѣ всякаго сомнѣнія. *Постоянная острая боль* бываетъ при воспаленіи; *перемежающаяся*— при ракѣ матки и *потугообразная*— въ тѣхъ случаяхъ, когда въ маткѣ накопляется слизь, кровь, или въ ней находятся остатки послѣда и оболочекъ. *Боль* въ одной или въ обѣихъ сторонахъ нижней части живота бываетъ при воспаленіи яичниковъ. *Тупая боль* внизу живота или чувство тяжести, уси-

Digitized by Google

ливающіяся при стояніи, хожденіи, указываетъ на увеличеніе матки, хроническое ея воспаленіе, измѣненіе положенія; *боль* или чувство тяжести и напиранія, усиливающаяся при подъемѣ на лѣстницы, указываетъ на загибъ матки назадъ.

Боль въ наружныхъ половыхъ частяхъ бываетъ при воспаленіи губъ, язвахъ, ссадинахъ; въ послѣднихъ случаяхъ боль усиливается при мочеиспусканіи или выдѣленіи ѣдкихъ жидкостей изъ влагалища.

При болѣзняхъ изъ половыхъ органовъ выдѣляется или чистая кровь, или жидкости различной густоты, цвѣта и запаха.

Кровотеченіе изъ матки бываетъ при хроническомъ воспаленіи, вялости и разрыхленіи ея слизистой оболочки, язвахъ, опухоляхъ, ракѣ. Блѣдная водянистая жидкость выдѣляется при пораженіи половыхъ органовъ мокрымъ лишаемъ, или у дѣвицъ, страдающихъ блѣдною немочью, взамѣнъ отсутствующихъ регулъ. Густая, желтоватая, бѣловатая или зеленоватая жидкость—при катаррахъ влагалища и матки. Истеченія эти получаютъ гнилостный запахъ, когда долго застаиваются въ половыхъ органахъ, или когда задержавшіеся въ маткѣ свертки крови, куски послѣда или оболочекъ загниваютъ. Выдѣленіе кровянистой жидкости, похожей на мясные помои и при томъ особенно противнаго гнилостнаго запаха, бываетъ при ракѣ матки.

При болѣзняхъ половыхъ органовъ, сосѣдніе органы нерѣдко вовлекаются также въ страданіе или тѣмъ, что болѣзненный процессъ переходитъ на нихъ, или ненормально увеличенная и измѣнившая свое положеніе матка производитъ на нихъ давленіе и нарушаетъ правильность отправленій. Такъ, при остромъ воспаленіи влагалища и матки, процессъ переходитъ также на мочеиспускательный каналъ, пузырь и прямую кишку. Больныя вслѣдствіе этого жалуются на жженіе при мочеиспусканіи, болѣзненность и частые позывы. Увеличенная въ объемѣ, наклоненная или загнутая впередъ матка, производя давленіе на пузырь, не дозволяетъ ему растягиваться и накоплять мочу; малѣйшія количества ея произво-

Digitized by Google

дятъ поэтому позывъ. Если смѣщенная или увеличенная матка прижимаетъ мочеиспускательный каналъ, то происходитъ задержаніе мочи. При наклоненіяхъ и загибахъ матки назадъ страдаетъ прямая кишка: развиваются запоры, геморрой, болѣзненность испражненій. Маточныя болѣзни часто сопровождаются катарромъ носа. Долго продолжающіяся страданія половыхъ органовъ ведутъ къ разстройству питанія, малокровію, истощенію тѣла. Больныя худѣютъ, цвѣтъ лица ихъ дѣлается землистымъ, глаза западаютъ глубоко въ орбиты, теряютъ свой блескъ, на лицѣ являются сыпи, желтыя или бурыя пятна; походка дѣлается вялою, аппетитъ пропадаетъ и нерѣдко головныя боли, шумы въ ушахъ и обмороки. Эти припадки происходятъ отъ того, что пищевареніе разстраивается и организмъ теряетъ много соковъ въ видѣ крови при кровотеченіяхъ и въ видѣ слизистыхъ или гнойныхъ истеченій—бѣлей. Разстройства пищеваренія, бывающія при болѣзняхъ матки, проявляются болями въ желудкѣ, періодически повторяющимися рвотою, изжогою, скопленіемъ газовъ, вслѣдствіе чего животъ вздувается, накопленіемъ слизи въ кишкахъ и замедленіемъ передвиженія по нимъ каловыхъ массъ, составляющее причину запоровъ. Боли и плохой составъ крови вредно дѣйствуютъ и на нервную систему: больныя страдаютъ безсонницею, становятся капризными, раздражительными, поражаются истерикою или другими нервными болѣзнями.

Неправильный образъ жизни и нѣкоторыя занятія, если не всегда вызываютъ болѣзнь, то всегда ее поддерживаютъ; напр., плохое питаніе, продолжительное стояніе на ногахъ, работа на ножной швейной машинѣ, поддерживаютъ страданія половыхъ органовъ. Пока причины, производящія и поддерживающія страданія не будутъ отстранены, до тѣхъ поръ никакія лѣкарства не принесутъ пользы.

Знаніе возраста больной имѣетъ также нѣкоторое значеніе при опредѣленіи болѣзни. Нѣкоторыя болѣзни встрѣчаются только въ извѣстномъ возрастѣ, напр., въ дѣтскіе годы никогда не бываетъ болѣзней матки и яичниковъ, а только бо-

Digitized by Google

лѣзни наружныхъ частей; въ зрѣлые годы встрѣчаются всѣ воспалительныя болѣзни наружныхъ и внутреннихъ частей; въ пожиломъ возрастѣ — ракъ матки, грудей, кровотеченія и т. п.

Составивъ путемъ распросовъ нѣкоторое понятіе о существующей болѣзни, приступаютъ къ изслѣдованію половыхъ органовъ. Наружное изслѣдованіе производится посредствомъ зрѣнія, осязанія или ощупыванія, а внутреннее посредствомъ пальца или маточнаго зеркала. См. гл. VIII о діагностикѣ. Искусное примѣненіе этой методы лѣченія къ женскимъ болѣзнямъ гораздо выше существующихъ способовъ врачеванія.

По *Lahmann*'у традиціонное лѣченіе хроническихъ катарровъ матки, заключающееся въ прижиганіяхъ, выскабливаніяхъ, и т. п. оказывается совершенно безполезнымъ, потому что оно не дѣйствуетъ на основную причину этой болѣзни, а въ болѣе позднемъ возрастѣ служитъ прекрасной почвой для развитія ненормальнаго разращенія эпителія. Это ясно для каждаго, кому приходилось наблюдать упорные хроническіе катарры матки, съ полнымъ правомъ могущіе быть названными переходными ступенями къ раку.

О дѣйствіи Электро-Гомеопатическихъ лѣкарствъ въ крупинкахъ и жидкостяхъ и о способахъ ихъ примѣненія сказано въ первой части этой книги. Здѣсь мы повторимъ только то, что было уже сказано о главныхъ лѣкарствахъ, а скажемъ подробнѣе о спринцованіи, тампонаціи и сухой пульверизаціи влагалища. Одно изъ главныхъ лѣкарствъ противъ всѣхъ болѣзней женскихъ половыхъ ортановъ — это *Canceroso* и его одноименныя. Оно въ большинствѣ случаевъ дается въ дозѣ изъ 2-го ст. Чтобы дѣйствіе его было болѣе проницательно на организмъ, и въ особенности, если существуютъ какія-либо затвердѣнія въ половыхъ органахъ, то его нужно принимать съ однимъ изъ *Angioitico*. Но *Ang.* при усиленномъ сердцебіеніи или кровотеченіи или порокѣ сердца дается въ дозѣ болѣе слабой и въ меньшемъ количествѣ, чѣмъ *Canc.* Третье главное лѣкарство, дѣйствующее на половые органы и вмѣстѣ съ тѣмъ возстановляющее пищевареніе, силы, сонъ и аппе-

Digitized by Google

титъ—это *Scrof.* съ его одноименными. Его надо принимать попер. съ *Canc.* и *Ang.* въ растворѣ или въ сухихъ крупинкахъ.

При слабонервности *S. G.* и *A.* 3 дѣйствуютъ лучше, чѣмъ ихъ одноименныя.

При перемежающихся припадкахъ или боляхъ надо принимать *Febr.* попер съ однимъ или двумя изъ предъидущихъ.

При остромъ иоспаленіи сперва прервать лихорадку вн. *F.* 1 и на подвзд. мазь, компр. *F.* 2. Втираніе мазей въ животъ при болѣзняхъ матки производится слегка отъ лобка кверху.

Относительно того, что правильныя регулы нисколько не препятствуютъ началу и продолженію лѣченія, лишь бы не входило во внутр. лѣченіе *Ang.* и *Эл. Анж.* сказано на стр. 48.

Одно изъ наичаще употребляющихся наружныхъ средствъ при лѣченіи женскихъ болѣзней есть *вода.* Она употребляется съ цѣлію: а) соблюденія чистоты и опрятности въ половыхъ органахъ, въ которыхъ, при несоблюденіи ея, задерживаются и разлагаются выдѣленія, производящія раздраженіе и дурной запахъ, а у дѣвицъ предохраняетъ дѣвственную плеву отъ разрушенія; б) отъ растворенія въ ней лѣкарственныхъ веществъ, которыя должны приходить въ соприкосновеніе съ больнымъ мѣстомъ и в) для дѣйствія на все тѣло больной (ванны, купанія).

Съ цѣлію соблюденія чистоты употребляется чистая комнатная или тепловатая вода. Во время регулъ слѣдуетъ обмывать половыя части нѣсколько разъ въ день. Для обмыванія влагалища и маточной шейки дѣлается *спринцованіе* помощію спринцовокъ различнаго устройства. Лучше всего брать эсмарховскую кружку съ краномъ внизу, на который надѣвается каучуковая кишка длиною не менѣе 2 аршинъ. Эту кружку вѣшаютъ не очень высоко на стѣну, нижній конецъ каучуковой кишки надѣвается на маточный наконечникъ, который долженъ быть непремѣнно прямымъ и имѣть кранъ; при такомъ наконечникѣ струя воды попадаетъ на шейку

Digitized by Google

матки и въ стѣнки влагалища; увеличивая и уменьшая отверстіе въ трубкѣ, посредствомъ крана, усиливаютъ или ослабляютъ струю воды. Спринцованіе дѣлается сидя на бедѣ, и на одно спринцованіе употребляютъ отъ 2-хъ до 4-хъ стак. воды. Когда дѣлаютъ спринцованіе изъ растворенныхъ крупинокъ, и требуется, чтобы жидкость находилась какъ можно долѣе въ соприкосновеніи съ внутр. половыми органами, то больная во время спринцованія должна лежать на спинѣ съ приподнятымъ тазомъ, для чего ей подъ поясницу подкладываютъ твердую подушку. Для стока жидкостей ставятъ подъ половыя части судно.

Д-ръ медицины Кашеварова-Руднева въ своей книгѣ [1]) настоятельно совѣтуетъ употреблять спринцованіе для каждой дѣвушки съ наступленіемъ первыхъ регулъ, такъ какъ это предохранитъ ее отъ многихъ несносныхъ женскихъ болѣзней. Но вмѣстѣ съ тѣмъ говоритъ, что подобный совѣтъ встрѣчаетъ сильное сопротивленіе и даже негодованіе со стороны матерей и самихъ дѣвицъ. А именно—большая часть публики думаетъ, что если дѣвица можетъ сдѣлать спринцованіе, то она уже не дѣвушка, т. е., что дѣвственная плева у такихъ субъектовъ уничтожена. Понятно поэтому, что докторъ, предлагающій дѣлать спринцованіе дѣвушкѣ, рискуетъ навлечь на себя негодованіе матерей, которыя считаютъ подобное предложеніе оскорбительнымъ для своихъ дочерей, а доктора невѣжественнымъ, не знающимъ своего дѣла. Вслѣдствіе этого многіе доктора-спеціалисты не предлагаютъ подобныхъ мѣръ, даже и тогда, когда спринцованіе необходимо для излѣченія болѣзни.

Чтобы показать всю несостоятельность воззрѣній матерей на этотъ предметъ, д-ръ Кашеварова-Руднева, обращаясь къ анатоміи, доказываетъ, что дѣвственная плева не представляетъ напряженной, легко лопающейся перепонки, а есть складка слизистой оболочки маточнаго рукава, очень сильно и легко растяжимой безъ того, чтобы быть разорванною; что не спринцованіе разрушаетъ дѣвственную плеву, а нечистота и болѣзни, возникающія отъ этой нечистоты; что въ нормально устроенной дѣвственной плевѣ находится отверстіе для истеченія мѣсячныхъ кровей, и нерѣдко черезъ это отверстіе вы-

[1]) Заглавіе этой книги см. выше „Литература“.

Digitized by Google

ходятъ бѣли, часто ѣдкаго характера, которыя нерѣдко разрушаютъ дѣвственную плеву. Черезъ это отверстіе, когда это бываетъ необходимо, дѣлаютъ спринцованіе дѣтямъ (помощію резиноваго шарика съ тоненькимъ костянымъ или гуттаперчевымъ наконечникомъ), черезъ это же отверстіе всякая дѣвица можетъ дѣлать спринцованіе сама, безъ всякой посторонней помощи и безъ малѣйшаго вреда или надрыва дѣвственной плевы, но напротивъ съ большою пользою для здоровья. Для этого употребляютъ эсмарховскую кружку, о которой сказано выше, но на нижній конецъ каучуковой кишки надѣваютъ очень тоненькій наконечникъ, который съ этою цѣлію существуетъ для дѣвицъ. Правою рукою этотъ наконечникъ вставляютъ въ маточный рукавъ и подвигаютъ его такъ далеко, какъ только онъ можетъ войти (около 2 дюймовъ), и кранъ кружки открывается. Въ заключеніе г. Кашеварова-Руднева присовокупляетъ, что во Франціи и Англіи спринцованіе очень распространено, и женщины тамъ считаютъ спринцовку необходимою принадлежностью своего туалета, поэтому и здоровѣе русскихъ. Такимъ образомъ спринцованіе нужно дѣлать всю жизнь, не прекращая даже во время беременности, и, по ея мнѣнію, и во время регулъ.

Желающіе подробнѣе ознакомиться съ этимъ вопросомъ могутъ обратиться къ упомянутой ея книгѣ.

Для *тампонаціи влагалища* берутъ кусокъ чистой вываренной или гигроскопической ваты, которую обматываютъ нѣсколько разъ ниткою и завязываютъ узломъ; отъ узла нитка оставляется такой длины, чтобы, когда тампонъ будетъ введенъ во влагалище, конецъ ея выступалъ изъ наружныхъ половыхъ органовъ. Больная можетъ тогда сама, потягивая за нитку, удалить тампонъ. Если тампонъ назначенъ для защищенія больной изъязвленной шейки матки отъ прикосновеній стѣнокъ влагалища, или для разъединенія воспаленныхъ или изъязвленныхъ его стѣнокъ, то его дѣлаютъ небольшихъ размѣровъ. При кровотеченіяхъ же необходимо, чтобы весь просвѣтъ влагалища былъ выполненъ тампономъ. Въ этомъ случаѣ онъ берется большой величины, а еще лучше употребить нѣсколько небольшихъ, вводимыхъ непосредственно другъ за другомъ. Каждый тампонъ долженъ быть снабженъ ниткою и удаленіе ихъ должно быть начато съ ближайшаго ко входу

Digitized by Google

во влагалище. Для удержанія на мѣстѣ вправленной матки французская акушерка M-me Boivine предложила обыкновенную губку. Изъ губки, вываренной нѣсколько разъ въ кипяткѣ, вырѣзывается овальный кусокъ надлежащей величины; черезъ середину ея продѣвается нитка для удобнаго удаленія, и смоченная въ глицеринѣ, вводится въ тотъ сводъ, куда наклонено дно матки. Губку оставляютъ во влагалищѣ часовъ на шесть, и вводятъ ее каждые 2 — 3 дня. Увеличивая постепенно ея размѣръ, можно достигнуть полнаго выпрямленія матки. Такой тампонъ оказываетъ хорошую услугу при хроническомъ воспаленіи матки: вслѣдствіе вызываемаго прилива крови онъ способствуетъ уменьшенію объема матки; язвы шейки отъ дѣйствія глицерина очищаются и боли, если были, становятся меньше; по извлеченіи такого тампона, изъ половыхъ частей вытекаетъ прозрачная жидкость. Употребленіе губки представляетъ еще то удобство, что ее можно смачивать лѣкарственными растворами изъ *Canc.*, *Scrof.*, или *Ang.* (20 кр. на стаканъ воды, или 20 кр. на унцію глицерина).

Для введенія тампона вставляется во влагалище зеркало, тампонъ вкладывается въ просвѣтъ его и палочкою прижимается къ маточной шейкѣ; зеркало въ это время выводится. Можно вводить тампонъ и безъ зеркала одними пальцами.

Послѣ удаленія тампона дѣлается спринцованіе тепловатою водою или изъ растворовъ крупинокъ.

Тампонъ, введенный во влагалище, вызываетъ приливъ крови къ маткѣ, а потому беременнымъ надо быть осторожнымъ съ тампонами изъ опасенія вызвать выкидышъ. Очень удобной формой для введенія лѣкарственныхъ веществъ во влагалище служатъ *маточные шарики* (см. ст. 96).

Кромѣ спринцованія и тампонаціи влагалища примѣняется изрѣдка еще *вдуваніе лѣкарственныхъ порошковъ* во влагалище, а именно: противъ бѣлей, триппера влагалища, разныхъ опухолей и новообразованій матки. Для примѣненія вдуванія предварительно спринцуютъ влагалище лѣкарственнымъ растворомъ, который указанъ противъ болѣзни въ этой книгѣ, и спустя $^1/_4$ часа послѣ того вдуваютъ во влагалище порошокъ

Digitized by Google

состоящій изъ 15—20 тѣхъ же крупинокъ стертыхъ въ фарфоровой ступкѣ съ унціею рисовой пудры или плауннаго порошка; затѣмъ берутъ резиновый баллонъ, употребляемый для персидскаго порошка, всыпаютъ въ него для взрослой женщины двѣ полныхъ чайныхъ ложки, а для дѣвочки одну чайную ложку этого порошка; вводятъ наконечникъ во влагалище и сильно сжимаютъ баллонъ, и этими порошками пропудриваютъ и наружныя части. Это повторяютъ утромъ и вечеромъ. Наконечникъ баллона долженъ быть всегда сухъ, чтобы порошокъ не сбивался въ немъ въ комки и могъ бы легко разсыпаться. Эта сухая пульверизація прекращаетъ зудъ и быстро улучшаетъ болѣзненное состояніе.

Болѣзни наружныхъ половыхъ органовъ.

Воспаленіе большихъ губъ встрѣчается у женщинъ всѣхъ возрастовъ; по большей части заболѣваетъ только одна губа. Въ началѣ болѣзни губа краснѣетъ, припухаетъ, въ ней появляется жаръ, боль, увеличивающаяся при хожденіи и сидѣніи; при ощупываніи на серединѣ болящаго мѣста ощущается небольшое затвердѣніе; боль иногда такъ сильна, что отнимаетъ сонъ, иногда бываетъ лихорадка. Вн. и нар. *S.* 1, при лихорадкѣ попер. съ *F.* 1. Въ упорномъ случаѣ вн. и нар. *C.* 5.

Воспаленіе слизистой оболочки большихъ и малыхъ губъ, или катарръ губъ происходитъ отъ раздраженія губъ треніемъ дурно приложенной одежды, онанизма, себорреи, ѣдкихъ истеченій изъ влагалища, пыли и неопрятности. Симптомы: зудъ, жженіе, особенно сильное при мочеиспусканіи, боль, усиливающаяся при ходьбѣ; губы краснѣютъ, припухаютъ, въ особенности припухаютъ малыя губы, и начинается выдѣленіе сначала слизистое, а потомъ слизисто-гнойное, которое такъ ѣдко, что попадая на кожу бедра, производитъ на немъ изъязвленіе и сыпь. Вн. *L.* (2-й ст.), между большими и малыми губами тампонъ съ прим. или мазью *L.* Теплыя полуванны съ 50 кр. *L.* Въ упорн. случ. *S.* 1 или *S.* 2 × *A.* 3 (3—2-й ст.)

Digitized by Google

и 3 раза въ день по круп. *S.* 1, кажд. веч. *Verm.* 1 по 1—5 круп. Прохладн. обмыванія раствор. *A.* 2, *C.* 5 и *V.*

Площицы встрѣчаются на наружной поверхности большихъ губъ, покрытыхъ волосами, промежности и на лобкѣ, вызываютъ сильный, иногда нестерпимый зудъ. Лучшее средство—растворъ чайной ложки жидкости Джейса на полстакана воды, которымъ обмываются пораженныя части. Достаточно одного раза. Также дѣйствуетъ растворъ карболовой кислоты отъ $^1/_2$ до 1 драхмы на стаканъ воды.

Острицы—маленькіе, толстенькіе глисты, тѣло которыхъ постоянно съуживается къ заднему концу, заползаютъ во влагалище изъ задняго прохода, чаще всего водятся у дѣтей; производятъ сильный зудъ въ особенности къ вечеру и по ночамъ, когда выползаютъ наружу. Производимый ими зудъ бываетъ причиной онанизма и катарра губъ. Для лѣченія см. *Глисты.*

Ракъ наружныхъ половыхъ органовъ встрѣчается преимущественно у женщинъ пожилыхъ и присоединяется къ раку влагалища, или развивается самостоятельно. Ракъ первоначально является въ видѣ небольшого твердаго болѣзненнаго узелка, который постепенно увеличивается и превращается въ бугристую опухоль, которая впослѣдствіи распадается въ язву, выдѣляющую зловонную, гноевидную жидкость. Съ изъязвленіемъ, а иногда и раньше, появляются колющія боли и истощеніе больной: худоба, малокровіе и смерть отъ истощенія. Для лѣченія см. *Ракъ.*

Примѣры излѣченій см. ниже.

Болѣзни внутреннихъ половыхъ органовъ.

Болѣзни влагалища.

Бѣли. У здоровой женщины изъ половыхъ органовъ не происходитъ никакихъ выдѣленій; слизистыя оболочки влагалища, матки и наружныхъ органовъ выдѣляютъ лишь столько слизи, сколько ее необходимо для увлажненія частей; эта слизь имѣетъ видъ свѣтлой, рѣдко тягучей и желтоватой жид-

Digitized by Google

кости. Бѣли же есть выдѣленіе больной (воспаленной) слизистой оболочки влагалища и матки, и бываютъ то слизистыя, слизисто-гнойныя, то съ примѣсью крови, то въ видѣ чистаго гноя; бываютъ жидкія безцвѣтныя, или густыя бѣлаго, желтоватаго и зеленаго цвѣта, безъ запаха или же съ непріятнымъ гнилостнымъ запахомъ.

Большая часть болѣзненныхъ и слабыхъ женщинъ, жалующихся на запоръ, боли въ поясницѣ и ногахъ, потерю аппетита, несвареніе желудка, тяжесть и боль головы, невралгію и на множество другихъ страданій, не подозрѣваютъ, что бѣли причиной всѣхъ этихъ явленій и что, излѣчившись отъ бѣлей, всѣ другіе недуги одинъ за другимъ исчезаютъ Бѣли у молодой дѣвицы составляютъ признакъ золотушнаго или лимфатическаго состоянія, у замужней же женщины почти всегда указываютъ на болѣзнь матки, во многихъ случаяхъ на венерическую болѣзнь. Въ послѣднемъ случаѣ необходимо бываетъ лѣчить обоихъ супруговъ, такъ какъ излѣченіе одного безъ излѣченія другаго невозможно. При лѣченіи соображаться съ тѣлосложеніемъ и со всѣми прочими сопровождающими обстоятельствами. Въ большинствѣ случаевъ утромъ и вечеромъ по 1 сухой кр. *S.* 1 и *C.* 1 (2-й ст.), которое, въ случаѣ если бѣли увеличатся, принимаютъ изъ 3-го и даже изъ 4-го стак. Но если и отъ этихъ дозъ бѣли не уменьшаются, тогда *C.* даютъ попер. съ *A.* 1 (3-й стак.), или *S.* 1 × *A.* 1 и *C.* 1 продолжая давать утромъ и вечеромъ по сухой кр. *S.* 1. Въ упорномъ случаѣ вн., спринц. и вдуваніе *S.* 2, *C.* 4, или тампоны изъ *S.* 2 или *C.* 2 съ глицериномъ, или шарики съ *Анж.*, на поясн. и лобков. кость мазь *C.* 5. На тѣ же мѣста *Эл. Кр.* × *Ж.* Противъ бѣлей цвѣта молочнаго, бѣлаго, желтаго или зеленаго и ѣдкихъ вн. *V.* × *C.* 1 (2-й ст.). Во всѣхъ случаяхъ—выяснить и лѣчить болѣзнь, производящую бѣли.

Воспаленіе или катарръ слизистой оболочки влагалища и матки часто встрѣчается. Причины: простуда въ особенности во время регулъ, неопрятность, онанизмъ, частыя совокупленія, истеченіе изъ канала шейки, маточныя кольца, прижиганіе шейки, но чаще отъ зараженія трипперомъ. У дѣтей

Digitized by Google

причиной можетъ быть заползаніе острицъ (см. *Острицы*), золотуха, плохое питаніе, блѣдная немочь. Начинается жаромъ, жженіемъ во влагалищѣ и чувствомъ тяжести въ полости таза; эти припадки постепенно усиливаются и къ нимъ присоединяется еще боль внизу живота, распространяющаяся на бедра; иногда болѣзненное мочеиспусканіе съ частыми позывами; нерѣдко лихорадка, головная боль, сухость во рту, отсутствіе аппетита и сна. Вначалѣ не бываетъ никакихъ истеченій, но дня черезъ два является болѣе или менѣе обильное истеченіе безцвѣтной, весьма ѣдкой жидкости, превращающейся въ бѣловатую, зеленоватую и болѣе густую, точно густыя сливки; слизистая оболочка влагалища темнокраснаго цвѣта, припухла и болѣзненна, введеніе зеркала невозможно. При хроническомъ катаррѣ обыкновенно не бываетъ болѣзненныхъ ощущеній, существуютъ только бѣли. Продолжаясь долго-катарръ ведетъ къ безплодію, упадку силъ, малокровію и общему истощенію. Для лѣченія см. *Бѣли*, *Болѣзни матки*, *Трипперъ*.

Вагинизмъ. При значительной толщинѣ и неуступчивости дѣвственной плевы, первыя попытки къ совокупленію бываютъ очень часто неудачны и сопровождаются небольшими поврежденіями, ссадинами, трещинами входа во влагалищѣ. Послѣдующія попытки ухудшаютъ состояніе. Малѣйшее прикосновеніе къ половымъ органамъ вызываетъ сильныя боли, спазмы и иногда истерическіе припадки. У нѣкоторыхъ дѣвушекъ и безъ особыхъ внѣшнихъ причинъ влагалище необычайно болѣзненно при малѣйшемъ прикосновеніи; въ такихъ случаяхъ боль является какъ бы невралгической, нервной. Вн. и прим. *S*. 1. Тампонъ между большими и малыми губами съ *Эл. Зел.* Въ упорномъ случаѣ вн. *A*. 3 × *C*. 1 × *F*. 1 (2-й ст.), прилож. *Эл. Бѣл.* и *мазь бѣлая*. Прохладныя сидячія ванны съ *A*. 2 и *C*. 5. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ лучше дѣйствуютъ теплыя полуванны съ тѣми же лѣкарствами.

Выпаденіе влагалища наблюдается у женщинъ пожилыхъ и многорожавшихъ. По большей части выпадаетъ одна изъ стѣнокъ, рѣже все влагалище. Больная жалуется на чувство

Digitized by Google

тяжести, жженіе во влагалищѣ, затрудненіе при ходьбѣ, изъ половой щели выдается мягкая круглой формы краснаго или синяго цвѣта опухоль, нерѣдко изъявившаяся. То же лѣченіе, что для смѣщенія матки (см. ниже), но при лѣченіи выпаденій слѣдуетъ прежде всего заботиться, чтобы мочевой пузырь и прямая кишка часто опорожнялась, и потому при задержаніи мочи или запорахъ употребить средства, назначенныя противъ этихъ болѣзней.

Примѣры излѣченій см. ниже.

Болѣзни матки.

Воспаленіе матки. Матка состоитъ изъ плотныхъ мясистыхъ стѣнокъ и двухъ оболочекъ, одной наружной называемой брюшиннымъ покровомъ матки и другой внутренней, выстилающей всю полость; это слизистая оболочка матки. Каждая изъ трехъ частей матки отъ неосторожности во время регулъ или даже внѣ регулъ, отъ простуды и множества другихъ вредныхъ вліяній можетъ поражаться воспаленіемъ, при чемъ средняя часть, т. е. мясистыя стѣнки, заболѣваютъ гораздо рѣже, чѣмъ наружная и внутренняя оболочка, а эта послѣдняя заболѣваетъ чаще, чѣмъ наружная. Если заболѣваніе происходитъ вдругъ и сопровождается значительною лихорадкою и болью въ нижней части живота, то такое состояніе называется *острымъ воспаленіемъ*. Если острое воспаленіе брюшиннаго покрова матки будетъ дурно лѣчимо или вовсе не будетъ лѣчимо, то острые припадки (сильная боль и лихорадочное состояніе) пройдутъ сами собою, но болѣзнь все-таки останется и пріобрѣтетъ *хроническій характеръ*. Послѣдняя форма болѣзни встрѣчается гораздо чаще, чѣмъ первая.

1) *Острое воспаленіе матки*, какъ уже сказано, начинается болью въ нижней части живота и болѣе или менѣе значительною лихорадкою; за ознобомъ наступаетъ жаръ, температура тѣла 39—40° Ц. и держится довольно долго, понижаясь только по утрамъ, къ вечеру она опять поднимается; при этомъ головныя боли, иногда тошнота и рвота. Кожа суха, горяча, языкъ обложенъ, чаще бываетъ запоръ, чѣмъ поносъ;

Digitized by Google

частые позывы и боли при мочеиспусканіи. Если больная раньше страдала бѣлями, или болѣзнь развилась во время регулъ, то бѣли и регулы вдругъ прекращаются. Особенность при преимущественномъ пораженіи брюшиннаго покрова матки, кромѣ нестерпимыхъ болей, высокой температуры, состоитъ еще во вздутіи всего живота. (Ср. *Брюшина, ея воспаленіе*). Какъ только эти припадки появятся, надо соблюдать совершенный покой, лежа въ постелѣ по преимуществу на спинѣ. Сперва прервать лихорадку вн. *F.* 1 (2—3-й ст.), на подвз. мазь, компр. *F.* 2. На животъ, лобковую кость, промеж. и поясн. мазь *C.* 5. Затѣмъ вн. *C.* 1 (2-й или 3-й ст.), сприн. изъ 20 кр. *C.* 1 на 2 ст. тепловатой воды. При тошнотѣ и рвотѣ вн. 10 сухихъ кр. *S.* 1, въ одинъ пріемъ при запорѣ 10—20 кр. *V.* въ рюмкѣ воды въ одинъ пріемъ.

Въ трудн. и упорн. случаяхъ *A.* 1 × *C.* 5 × *F.* 1 (4—3-й ст. до средней дозы). Мазь *L.* или *зелен. мазь* на область крестца и на весь животъ — 3 раза въ день. При очень сильныхъ боляхъ тонкій компрессъ, смоченный *Эл. Бѣл.*, а поверхъ него часто смѣняемые (черезъ 10 — 15 мин.) компрессы изъ раствора 20 круп. *A.* 2 и 40 круп. *C.* 5 въ двухъ квартахъ воды. 2 — 3 раза въ день — теплыя спринцованія влагалища растворомъ 10 круп. *A.* 2 и 20 круп. *C.* 5 съ чайной лож. *Эл. Анж.* (позднѣе *Эл. Зел.*) въ 2 стаканахъ воды (ср. *Воспаленіе брюшины*). Впредь до полнаго выздоровленія больная должна лежать въ постели и получать лишь очень легкую пищу.

2) *Хроническое воспаленіе матки* отражается вредно на общемъ состояніи здоровья: больныя теряютъ аппетитъ, пищевареніе разстраивается, являются запоры, прихоти, малокровіе, худоба; цвѣтъ лица землистый, блѣдно-зеленый; глаза западаютъ, подъ ними образуются темно-синіе круги; на верхней губѣ, лбу, щекахъ появляются коричневыя или желтоватыя пятна; выраженіе лица страдальческое. Женщина съ этою болѣзнью не можетъ много стоять, ходить, ѣздить въ тряскомъ экипажѣ и пр. Всѣ эти положенія вызываютъ боль въ животѣ. Нервная система разстраивается, женщина становится раздра-

Digitized by Google

жительною, подозрительною, мрачною. Если поражена ткань матки, то послѣдняя увеличена въ объемѣ и чувствительна, такъ что давленіе на нее черезъ покровы нижней части живота вызываетъ боль. Болѣзнь эта излѣчивается электрогомеопатическими лѣкарствами, и тѣмъ скорѣе, чѣмъ менѣе продолжалась болѣзнь, чѣмъ раньше приступлено къ этому лѣченію. Вн. *C.* 1 (2—3-й ст.) × *S.* 1 × *A.* 1 (3—2-й ст.); на поясн., лобков. кость и промежность мазь *C.* 5, на животъ согрѣвающ. компр. *A.* 2 и *C.* 5. Ван. съ *A.* 2 и *C.* 5. Въ упорн. случаѣ прибав. *V.* вн. и нар. Если же страдаетъ преимущественно слизистая оболочка матки, то увеличеніе послѣдней будетъ незначительно; но за то будутъ преобладать обильныя истеченія изъ матки различнаго свойства, которыя иногда бываютъ окрашены кровью вскорѣ послѣ регулъ; нерѣдко происходитъ выдѣленіе чистой крови, продолжающееся цѣлые недѣли, мѣсяцы. То же лѣченіе, а наружно лѣкарства, назначенныя противъ бѣлей. См. *Бѣли.* Для остановки кровотеченія см. *Метроррагія.* При этой болѣзни ходить слѣдуетъ не много и не до усталости, но на воздухѣ необходимо бывать какъ можно чаще и дольше.

Воспаленіе маточнаго брюшиннаго покрова (Периметритъ). При этомъ заболѣваетъ та часть брюшины, которая покрываетъ матку и околоматочныя широкія связки, такимъ образомъ получается ограниченное воспаленіе брюшины. Болѣзнь эта является при воспаленіи матки или же самостоятельно вслѣдствіе простуды или промоканія. Подъ упомянутымъ образуется выпотъ, экссудатъ, который можетъ всосаться или нагноиться; въ послѣднемъ случаѣ возможенъ смертельный исходъ; въ случаяхъ благополучнаго разрѣшенія или разсосанія такого экссудата остаются сращенія тазовыхъ органовъ со смѣщеніемъ съ ихъ натуральныхъ мѣстъ. Общія явленія такія же, какъ при остромъ воспаленіи матки. Вн. *A.* 1 × *C.* 2 × *F.* 1 (3—2-й ст.), 3 раза въ день по 5 круп. *S.* 1, при рвотѣ—10 круп. *S.* 1 или *Anti-mal di mare.* Прочее, какъ при воспаленіи матки.

Воспаленіе околоматочной клѣтчатки (Параметритъ) бываетъ обыкновенно лишь у роженицъ и такъ какъ сопро-

Digitized by Google

вождается раздраженіемъ брюшиннаго покрова матки, то болѣзнь эту легко смѣшать съ периметритомъ (см. выше). Болѣзнь эта начинается всегда лихорадкой и болѣзненностію живота, особенно при давленіи.

Въ глубинѣ паховой области появляется опухоль, давящая на сосѣдніе органы и нервы и иной разъ переходящая даже на бедро; она можетъ перейти въ нагноеніе, въ каковомъ случаѣ болѣзнь прянимаетъ длительный и очень серьезный, и даже опасный для жизни характеръ. На начавшееся нагноеніе указываютъ повторные приступы озноба и явленія злокачественной лихорадки. Поэтому крайне важно не допустить до нагноенія опухоли. Вн. *A.* 1 × *C.* 2 × *F.* 1 (средняя доза или литровая—1 круп. на 4 стакана воды), кажд. 2 часа по 2 круп. *C.* 2 съ 1 каплей *Эл. Зел.* Наружное лѣченіе какъ при воспаленіи брюшины. Сидячія теплыя ванны изъ *C.* 2. При признакахъ нагноенія наружное лѣченіе то же, а внутрь *A.* 2 × *C.* 5 × *F.* 1 или *F.* 2 (3-го до 1-й ст.).

3) *Боль въ маткѣ* (самостоятельная или случайная) прекращается отъ 1 до 5 сухихъ кр. *C.* 1, также отъ одной чайн. ложки *S.* 1 или *C.* 1 изъ 1-го ст. На лобк. кость мазь *C.* 5, на поясн. компр. *Эл. Бѣл.* или *Эл. Кр.* × *Желт.* (ср. ниже: *Маточная невральгія*). Если причина ея какая-либо болѣзнь матки, то требуется соотвѣтствующее лѣченіе.

4) *Опухоли матки*:

а) *Кисты* (см. *Опухоли*) имѣютъ весьма длительное теченіе и обнаруживаются постепеннымъ увеличеніемъ объема матки, которая можетъ достигать громадныхъ размѣровъ, бѣлями, а впослѣдствіи водянкою и проч. явленіями истощенія. Для лѣченія см. *Кисты*.

б) *Раковая опухоль матки* является большею частію въ видѣ мягкой, мозговидной массы, почти обыкновенно у внутренняго отверстія маточной шейки. Прежде всего образованіе рака обнаруживается маточными кровотеченіями, которыя совпадаютъ съ періодомъ регулъ, однако значительнѣе ихъ и сопровождаются сильными бѣлями. У женщинъ же, уже переставшихъ имѣть регулы, кровотеченія появляются время

Digitized by Google

отъ времени. Вскорѣ присоединяются летучія, колючія, пронизывающія боли въ тазу. Постепенно кровотеченія дѣлаются постоянными, боли усиливаются и становятся похожими на ощущеніе какъ бы отъ прижиганія каленымъ углемъ, изъ половыхъ частей вытекаетъ гнойная вонючая жидкость, больныя худѣютъ, цвѣтъ ихъ кожи становится грязножелтымъ, кожа морщинистою и черезъ годъ или $1^1/_2$ они умираютъ отъ истощенія или водянки. Для лѣченія см. *Ракъ*.

в) ***Фибринозный полипъ матки*** (см. *Полипы*). Послѣ выкидыша или родовъ иногда развиваются полипообразныя, прикрѣпленныя стебелькомъ въ внутренней поверхности матки опухоли, которыя вдаются во влагалище и всегда сопровождаются обильными маточными кровотеченіями. Они всегда развиваются на мѣстѣ прикрѣпленія послѣда. Иногда излѣчивались *S.* 1, но чаще *C.* 1 вн. и нар., какъ при ракѣ матки. При кровотеченіи прибавляютъ *A.* 1 вн. и нар. Въ упорн. случаѣ *V.* Ван., на лобковую кость и поясн. мазь, прим. *C.* 5, *A.* 2. На лобковую кость и поясн. *Эл. Б.* или *Эл. Кр.* × *Ж.* Ван. *S.* 5. Спринцованія и вдуванія: *C.* 1, *C.* 4, *C.* 5, *A.* 2, *S.* 5, *S.* 2. Черезъ часъ по 1 кр. *C.* 5. При кровотеченіи ван. и на сердце прим. *A.* 2. Употребляются также лѣкарства противъ рака. См. *Ракъ*.

г) ***Слизистые полипы*** (см. *Полипы*) представляютъ мягкія, стебельчатыя, большею частію незначительныя опухоли внутр. поверхности матки, величиною отъ простаго орѣха до куринаго яйца, которыя происходятъ или отъ увеличенія маточныхъ железокъ, или вслѣдствіе сосковиднаго разростанія слизистой оболочки, и развиваются преимущественно при хроническихъ катаррахъ матки. Они обусловливаютъ увеличенное отдѣленіе слизи и частыя кровотеченія. Для лѣченія см. выше катарръ желудка.

д) ***Фиброиды*** развиваются весьма медленно и принадлежатъ къ доброкачественнымъ опухолямъ, хотя въ нихъ иногда образуются ракъ и саркомы. При дальнѣйшемъ теченіи, они часто омѣляются или въ нихъ образуются кисты. Вслѣдствіе же поворота стебельчатыхъ фиброидовъ, можетъ произойти

Digitized by Google

нагноеніе и отпаденіе опухоли. Маточные фиброиды ведутъ частью къ перегибамъ и искривленіямъ матки, частью къ разстройствамъ кровообращенія въ толщѣ ея и наконецъ къ сдавливанію сосѣднихъ органовъ. Симптомы: твердая, круглая, медленно увеличивающаяся опухоль въ маткѣ (на наружной поверхности дна матки или въ ея полости), колики въ періодѣ регулъ, мѣстная боль при прикосновеніи къ животу, бѣли и кровотеченія, часто несоотвѣтствующія времени менструаціи. Вн. *C.* 1 или *S.* 1, на подвзд. мазь *F.* 2, на животъ компр. *Эл. Кр.* Въ упорн. случаѣ: мазь, прим. и ван. *C.* 5, ван. *S.* 1, *A.* 2, *S.* 5. На животъ компр. *Эл. Б.*, по 1 кр. *C.* 5 черезъ часъ; спринц. и вдуванія *C.* 4, *S.* 2.

5) *Смѣщеніе матки.* Измѣненія нормальнаго положенія матки называются смѣщеніями и выражаются въ наклоненіяхъ, загибахъ, опущеніи и выпаденіи матки.

а) *Наклоненія матки впередъ и назадъ.* Въ естественномъ положеніи дно матки наклонено слегка впередъ; ненормально болѣзненное наклоненіе будетъ тогда, когда дно матки настолько наклонено *впередъ,* что приближается къ задней поверхности лоннаго соединенія; при наклоненіяхъ *назадъ* дно приближается къ крестцу. Для лѣченія употребляются лѣкарства, назначенныя противъ фибринознаго полипа матки (см. выше), а въ застарѣлыхъ случаяхъ—употребляютъ спринцованія, а еще лучше тампонація влагалища губкой съ глицериномъ, смѣшаннымъ съ *C.* 1 или *C.* 5, также *L.*

б) *Загибы матки впередъ и назадъ.* При загибѣ происходитъ измѣненіе въ очертаніи и фигурѣ матки, такимъ образомъ, что если тѣло ея болѣе или менѣе приближается къ передней поверхности шейки, то будетъ *загибъ впередъ*; если же къ задней—то *загибъ назадъ*, въ томъ или другомъ случаѣ образуется уголъ. Лѣченіе одинаково съ наклоненіями матки см. выше.

в) *Опущеніе и выпаденіе матки.* Когда матка опускается гораздо ниже въ полость таза, то это называется опущеніемъ, а если она выходитъ совсѣмъ изъ родовыхъ путей—то это будетъ выпаденіе. При опущеніяхъ матки больныя

Digitized by Google

жалуются на чувство тяжести въ полости таза, доходящее нерѣдко до боли, которая чаще всего ощущается въ крестцѣ и распространяется на бедра и поясницу. Въ спокойномъ состояніи боли значительно ослабляются, при стояніи и ходьбѣ усиливаются; больныя жалуются на чувство тяжести въ полости таза и боли достигаютъ значительной силы, выпавшая матка затрудняетъ движеніе, прижимаетъ мочеиспускательный каналъ и тѣмъ производитъ полную остановку мочеиспусканія.

При опущеніи матки слѣдуетъ устранить причины, которыя вызываютъ опущеніе, не поднимать тяжестей и не имѣть частыхъ половыхъ сношеній, а выпавшую матку слѣдуетъ прежде вправить. Противъ опущенія и выпаденія то же лѣченіе, что и противъ наклоненія матки. См. выше. Вправленную матку со введеннымъ тампономъ удерживаютъ отъ полнаго выпаденія наложеніемъ Т—образной повязки.

6) *Грануляціи и изъязвленія матки.* Грануляціи можно предположить при существованіи бѣлей, которыя составляютъ постоянный симптомъ, и онѣ сопровождаются разстройствомъ пищеваренія съ слабостію или общимъ безсиліемъ, невралгическою болью въ животѣ, поясницѣ, подвздошной и подчревной областяхъ, яичникахъ, большихъ губахъ и бедрахъ. Истеченіе бываетъ то прозрачное и липкое, то мутное или непрозрачное и бѣловатое. Черезъ осязаніе можно ощупать иногда неровность выпуклости, которую образуютъ грануляціи. Здѣсь точно такъ же, какъ и при простыхъ бѣляхъ могутъ явиться нервныя разстройства всякаго рода и худѣніе. Почти всегда грануляціи наблюдаются у женщинъ рожавшихъ и у тѣхъ, которыя страдаютъ бленноррагіею острой или хронической.

Когда существуютъ *простыя изъязвленія*, то при нихъ бѣли точно также составляютъ главный симптомъ; изъязвленія отличаются отъ грануляцій по боли, которая болѣе рѣзкая, иногда мучительная или жгучая, при этомъ разстройство регулъ, потеря аппетита, извращенный вкусъ, иногда тошнота и рвота. Эта болѣзнь является между 25 и 30 годами жизни и имѣетъ хроническое теченіе. Для лѣченія см. *Бѣли*.

Digitized by Google

7) *Послѣродовое воспаленіе матки.* См. *Родильная горячка.*

8) *Метроррагія* есть обильное кровотеченіе изъ матки, которое бываетъ при хроническомъ воспаленіи, вялости и разрыхленіи ея слизистой оболочки, язвахъ, опухоляхъ, ракѣ. Лѣченіе должно быть направлено противъ производящей причины. Для остановки кровотеченія иногда бываетъ достаточно 1 сухой кр. *A.* 1, принятой вечеромъ, или *A.* 1 (2-й или 3-й ст.). Въ упорномъ случаѣ *A.* 1 (3-й ст.) × *F.* 1 (1-й ст.) и каждые 2 часа по сухой кр. *C.* 1, спринцов. или тампоны съ *A.* 2 и мази на сердцѣ *A.* 2 и на подвзд. *F.* 2. На животъ мазь, прим. *A.* 2. На поясн. *Эл. Анж.*, при сильномъ кровотеченіи послѣднее также внутрь по 5—10 кап. каждые полчаса или часъ.

9) *Нимфоманія*, бѣшенство матки составляетъ очень рѣдкую болѣзнь, зависитъ отъ крайней раздражительности и слабости нервной системы, и выражается въ болѣзненной похотливости, не имѣющей предѣловъ и ведетъ къ крайнему истощенію, умопомѣшательству и мучительной смерти. Вн. въ слабыхъ дозахъ *S.* 1, также *C.* 1 или *C.* 5 × *A.* 3 (3—2-й ст.). Въ упорн. случаѣ: ван. *C.* 5, *S.* 5. На лобков. кость и поясн. мазь, прим. *C.* 5.

10) *Маточныя спазмы* (во время регулъ) проходятъ отъ 1 или 2 сухихъ кр. *S.* 1 или *C.* 1. Или *C.* 1 или *C.* 2 (2-й ст.). Точно также помогаетъ *S.* 1 (1-й или 2-й ст.).

11) *Безплодіе* зависитъ отъ: 1) отсутствія или опухоли яичниковъ и порочнаго ихъ развитія; 2) опухоли, вялости, выпаденія и катарровъ матки; 3) перелоя матки или влагалища; 4) бѣлей гнойныхъ, ѣдкихъ или съ кислою реакціей; 5) значительной тучности женщины; 6) вагинизма и 7) блѣдной немочи. Если нельзя опредѣлить причину, то надо какъ можно долѣе задерживать сѣмя во влагалищѣ при плотно сдвинутыхъ ногахъ и совокупленіе совершать при возвышенномъ тазѣ больной.

12) *Маточная невралгія* обусловливается жестокою болью въ животѣ, который сильно вздувается около пупа; малѣйшее прикосновеніе къ животу вызываетъ жестокій крикъ; пульсъ

Digitized by Google

слабый, лицо сморщенное, холодный потъ по всему тѣлу, частыя икоты, иногда рвота. Эту невралгію легко принять за воспаленіе брюшины. Для прекращенія боли вн. *S.* 1 (2-й ст.) въ частыхъ пріемахъ, растирать животъ и ляжки *Эл. Анж.* каждый часъ. По прекращеніи боли принимать утр. и вечер. по 10 сух. кр. *S.* 1, частыя теплыя ванны *L.* × *C.* 5, предупреждать запоры. Легкая и освѣжающая пища, прогулки на свѣжемъ воздухѣ.

Примѣры излѣченій. См. ниже.

Болѣзни яичниковъ.

1) *Воспаленіе яичниковъ* одного или обоихъ развивается или самостоятельно, или присоединяется къ воспаленіямъ матки и послѣродовымъ ея заболѣваніямъ. Въ первомъ случаѣ причины: удары въ нижнюю часть живота, простуда, но чаще всего неумѣренное совокупленіе. Чаще заболѣваютъ молодыя женщины, и при томъ одинъ яичникъ, преимущественно лѣвый. Симптомы: тупая боль, въ одномъ или обоихъ пахахъ, ощущеніе тяжести въ полости таза; то и другое ослабѣваетъ или усиливается въ особенности послѣ ходьбы или долгаго стоянія на ногахъ; боли иногда распространяются на одно или оба бедра, крестецъ и поясницу. Регулы всегда разстраиваются: они появляются слишкомъ часто, въ обильномъ количествѣ и бываютъ болѣзненны. Долго длящееся воспаленіе яичниковъ отражается на общемъ состояніи организма и нервной системѣ; у больныхъ являются сильные припадки истерики и такія же разстройства, какъ и при хроническомъ воспаленіи матки. Черезъ покровы живота прощупывается увеличенный яичникъ, въ видѣ овальнаго твердаго тѣла, давленіе болѣзненно; если не удается ни прощупать его, ни вызвать чувствительности, то это объясняется тѣмъ, что увеличенный яичникъ смѣщается иногда въ глубь полости таза. Иногда болѣзнь обостряется вслѣдствіе простуды, неумѣренной ходьбы, совокупленія, маточнаго кольца, прижиганія шейки матки; тогда является ознобъ, жаръ, температура тѣла 39—40°, тошнота, рвота, поносъ; боль

Digitized by Google

въ пахахъ становится острой, жгучей, усиливается при каждой попыткѣ вставанія, частые позывы мочиться и болѣзненность, жженіе при мочеиспусканіи; во время обостренія болѣзни замѣчается припухлость въ одной или обѣихъ паховыхъ сторонахъ и чувствительность этихъ мѣстъ, а также иногда и всего живота. При хроническомъ состояніи: вн. *A.* 1 × *C.* 1 или *C.* 5 (2-й ст.). мазь и спринц. *C.* 5; на 6 гл. точ. и по обѣимъ сторонамъ позвон. столба *Эл. Анж.* или *Кр.* × *Ж.* Въ упорномъ случаѣ вн. каждый часъ по 1 кр. *C.* 5 или 3 раза въ день по 5 круп. *L.* При обостреніи болѣзни сперва прервать лихорадку: вн. *F.* 1 (2-й или 3-й ст.), на подвзд. мазь, компр. *F.* 2, и затѣмъ тѣ же лѣкарства. Въ упорн. случ. утр. и веч. сидячая ванна съ 5 круп. *A.* 2, 30 круп. *C.* 5 и 1 ч. лож. *Эл. Анж.* или *Бѣл.* 1—2 раза въ день вводить въ задній проходъ суппозиторій *Анж.*, а во влагалище маточн. шарикъ *Анж.* При лихорадкѣ утр. и веч. *F.* 1 по 2—3 круп.

2) *Кисты яичниковъ.* Въ нихъ нерѣдко развивается опухоль, такъ называемая киста, очень опасная болѣзнь. Развитіе кисты происходитъ такимъ образомъ: извѣстно, что граафіевый пузырекъ при созрѣваніи наполняется жидкостью, увеличивается въ объемѣ, разрывается и изъ него выходитъ яичко. Если почему либо стѣнка пузырька не разрывается, то вслѣдствіе накопленія жидкости пузырекъ не разрывается, постоянно растягивается и можетъ достигнуть огромныхъ размѣровъ, *это и есть киста.* Содержаніе кисты представляется въ видѣ прозрачной мутной или густой клейкой жидкости и доходитъ отъ $^1/_2$ до 5 пудовъ, своею тяжестью давитъ сосѣдніе органы и вызываетъ въ нихъ разстройства; поражаетъ женщинъ нестарыхъ и проявляется постепеннымъ увеличеніемъ живота, крайне затрудняющимъ движеніе больной.

Лѣченіе. Вн. *A.* 1 × *C.* 2 × *F.* 1 (начать съ высшаго разведенія и каждую недѣлю переходить къ послѣдующему ни шему; при наступившемъ улучшеніи, однако, не переходи къ нисш. развед., пока улучшеніе продолжается); утр. и ве по 2 круп. *F.* 2 и 3 раза въ день по 5 круп. *L.* Втирать ут мазью *L.*, вечеромъ — мазью *C.* 5 (зеленой). Спринцев. и

Digitized by Google

A. 2, *C.* 5 и *V.*, введеніе во влагалище утр. и веч. маточн. шарика съ *Анж.*—Ср. *Кисты.*

3) *Водянка яичника* развивается сначала медленно, незамѣтно, безъ всякаго разстройства или какой-либо мѣстной боли, съ увеличеніемъ одной стороны живота; затѣмъ является тяжесть въ животѣ и въ почкахъ, трудное и учащенное мочеиспусканіе, запоръ; позднѣе опухоль нижнихъ конечностей, затрудненное дыханіе, давленіе иногда чрезвычайное, болѣзнь можетъ продолжаться 15, даже 30 лѣтъ и повлечь за собою разнообразныя боли. Вн. лѣченіе, какъ при *Кистахъ.*

4) *Невралгія яичника* наблюдается въ уровнѣ съ однимъ изъ яичниковъ (паха), которая появляется или усиливается во время регулъ. Боль, вызываемая иногда черезъ давленіе, бываетъ рвущая и сопровождается тоскою, меланхоліею, иногда симптомами анеміи и нервными, коихъ она представляетъ только послѣдствіе. На пахъ втирать *Эл. Анж.* или *Бѣл.* Если больная малокровная или нервная, то для лѣченія см. *Малокровіе* и *Истерика.* Въ другихъ случаяхъ *C.* 1 (3-й ст.) или *S.* 1 (2 — 3-й ст.) должны прекратить боль. Если невралгія является только во время регулъ, то *A.* 1 (1-й ст.).

5) *Раковыя опухоли яичниковъ* достигаютъ иногда величины дѣтской головки. Симптомы: по достиженіи опухолями яичниковъ довольно значительной величины, ихъ легко прощупать черезъ покровы живота, и вслѣдствіе давленія на сосѣдніе органы, вызываютъ запоръ, безпрерывный позывъ къ мочеиспусканію, чувство ползанія мурашекъ въ соотвѣтственной ногѣ и иногда явленія, которыя сопровождаютъ беременность (тошнота, колотье и даже отдѣленіе молока въ грудяхъ). Надо замѣтить, что опухоли яичниковъ развиваются лишь въ одной сторонѣ живота, что регулы при нихъ прекращаются только въ рѣдкихъ случаяхъ, влагалищная часть матки не измѣняется, біеніе дѣтскаго мѣста не слышно и пр. Свойства опухоли яичниковъ опредѣляются не столько по бугорчатымъ возвышеніямъ, сколько по быстрому развитію сильной боли, свойственной раку и по быстрому, развивающемуся раковому худосочію. Иногда при ракѣ яичниковъ бываетъ припуханіе паховыхъ железъ. Для лѣченія см. *Ракъ.*

Digitized by Google

Болѣзни женскихъ грудей.

1) *Воспаленіе грудной железы, грудница.* Поражаетъ обыкновенно одну грудь, рѣже обѣ одновременно. Симптомы: напряженность, жаръ и иногда боль въ заболѣвшей груди, болѣе или менѣе сильная, распространяющаяся въ подмышку, лихорадка болѣе или менѣе сильная, иногда головная боль и запоры. Вн. *C.* 1 × *S.* 1 (2-й ст.). При образованіи нарыва вн. *C.* 1 (1-й ст.), утр. и веч. *S.* 1, мазь *C.* 5 и припарки.

2) *Млекотеченіе*, галакторрея, т.-е. чрезмѣрное отдѣленіе молока. Вн. *C.* 1 (2-й ст.) × *A.* 2 (3-й ст.). На грудь *Эл. Б.* и тепловатые компр. *C.* 5.

3) *Прекратившееся выдѣленіе молока* лѣчится *Эл. Ж.*, см. выше стр. 101. Также *A.* 1 × *C.* 1 (1-й ст.). Болѣзненныя или предрасположенныя къ чахоткѣ женщины не должны кормить.

4) *Чирья на грудяхъ.* Вн. и нар. *A.* 1 или *A.* 2 × *C.* 1 (2-й ст.). Ср. *Болѣзни кожи.*

5) *Трещины и язвинки грудныхъ сосковъ* происходятъ отъ нечистоплотности, раздраженія одеждою, деснами ребенка и пр. Вн. и нар. *S.* 1, въ упорн. случаѣ *C.* 1 (2-й ст.).

6) *Воспаленіе соска.* Лѣчится какъ предъидущая болѣзнь.

7) *Ракъ грудной железы.* Женская грудь подвержена различнаго рода увеличеніямъ и оплотнѣніямъ, зачастую безболѣзненнымъ, которыя, однако, отнюдь не носятъ раковаго характера. Опухоль можетъ произойти отъ простуды или быть симпатическою, въ связи съ неправильными регулами, или же быть чисто жировою. Слѣдуетъ принять въ соображеніе всѣ признаки, которые могутъ объяснить оплотненіе и увеличеніе объема груди, равно какъ возрастъ и общее состояніе здоровья больной, а также присутствіе или отсутствіе раковыхъ признаковъ, которые здѣсь приводятся. Во всякомъ случаѣ слѣдуетъ обратить серьезное вниманіе на всякую стойкую опухоль въ грудной железѣ и не запускать болѣзнь.

Ракъ начинается образованіемъ въ груди небольшаго, твердаго, совершенно безболѣзненнаго узелка, по достиженіи имъ нѣкоторой величины являются довольно сильныя колющія

Digitized by Google

боли. Узелокъ увеличивается и превращается въ неровную бугристую опухоль, приближающуюся постепенно къ поверхности груди. По мѣрѣ увеличенія опухоли, сосокъ все болѣе и болѣе западаетъ, и потомъ образуетъ воронкообразное углубленіе. Кожа становится вскорѣ розовою, сине-багровою, истончается и вмѣстѣ съ тѣмъ начинается распаденіе и изъязвленіе опухоли, такъ что она превращается въ глубокую и обширную язву. Раковая язва покрыта красными сосочками и выдѣляетъ гнойно-кровянистую, дурно пахучую жидкость. Съ началомъ изъязвленія опухоли въ груди являются мучительныя, пронизывающія насквозь боли. Во время регулъ боли обыкновенно усиливаются, а послѣ кровотеченій изъ опухоли на время утихаютъ; боли бываютъ до того сильны, что лишаютъ больныхъ сна, аппетита, появляются лихорадка, худоба и больныя умираютъ отъ истощенія. Продолжительность болѣзни различна: отъ 3-хъ мѣсяцевъ до нѣсколькихъ лѣтъ. Для лѣченія см. *Ракъ*.

Примѣры излѣченія см. ниже.

Мѣсячныя очищенія, регулы.

Регулы суть періодически, каждыя 3 — 4 недѣли, повторяющееся у дѣвушекъ и женщинъ истеченіе крови, смѣшанной съ слизью, изъ половыхъ органовъ, и сопровождающееся выходомъ зрѣлаго яичка изъ яичника въ Фаллопіеву трубу. Эта кровь идетъ изъ слиз. обол. матки, тонкіе сосуды которой во время регулъ переполняются кровью и во многихъ мѣстахъ разрываются; самая слизистая оболочка дѣлается при этомъ толще, рыхлѣе и темнѣе съ ясно замѣтными железами. Почти всегда регуламъ предшествуютъ: общее недомоганіе, судороги въ бедрахъ, боль въ крестцѣ, опухоль и ощущеніе теплоты въ наружныхъ половыхъ частяхъ, тошнота, боль въ грудяхъ и животѣ. Регулы продолжаются отъ 4 до 5 дней, но иногда 1, 2 или даже 8 дней. Количество вытекающей крови опредѣляютъ приблизительно въ 4 — 5 унцій. Болѣзни бываютъ причиною разстройства регулъ, и потому

Digitized by Google

большею частію весьма вредно насильственно ихъ вызывать лѣкарствами.

Правильное возвращеніе этого физіологическаго явленія служитъ несомнѣннымъ доказательствомъ прекраснаго здоровья женщины и способности ея къ размноженію своего рода. Не безъ основанія одинъ извѣстный ученый сказалъ: «Безъ этого истеченія красота не существуетъ или же изглаживается, правильное отправленіе всѣхъ жизненныхъ функцій нарушается, душа впадаетъ въ томленіе и тѣло истощается».

Регулы продолжаются до 45 и 50 лѣтъ. Не бываетъ ихъ только во время беременности, кормленія грудью (только у совершенно здоровыхъ женщинъ) и нѣкоторыхъ болѣзней. Но нерѣдко случается, что регулы прекращаются на 38 и 40 году и очень рѣдко на 25 году жизни. Способность произрождать прекращается только по прекращеніи регулъ. Они прекращаются или вдругъ или постепенно. Прекращеніе ихъ сопровождается болѣе или менѣе тяжкими разстройствами, какъ-то: тягость во всѣхъ членахъ, бросаніе въ потъ, боль въ поясницѣ, приливы крови къ головѣ, къ лицу, головная боль, головокруженіе, сердцебіеніе, раздражительность, чувство замиранія, исходящее изъ желудка и проч. Этотъ періодъ жизни называется *критическимъ возрастомъ*. Нерѣдко въ этомъ періодѣ быстро развиваются разныя болѣзни, особенно матки и грудей, бывшія до того скрытыми.

Неправильности въ мѣсячныхъ очищеніяхъ состоятъ въ слѣдующихъ разстройствахъ:

1) *Метроррагія*, т.-е. сильное кровотеченіе во время регулъ, продолжающееся отъ нѣсколькихъ дней до нѣсколькихъ недѣль, и даже мѣсяцевъ. Причины: несоотвѣтствующее содержаніе во время регулъ, болѣзни или разстройства въ половыхъ органахъ. Лѣчится какъ *Метроррагія*, см. выше. Впрочемъ одно вн. употребленіе *S.* 1 часто помогало какъ противъ метроррагіи, такъ равно противъ остановки регулъ или рѣдкаго ихъ появленія.

2) *Аменоррея*, т.-е. непоявленіе мѣсячныхъ очищеній при наступленія половой зрѣлости, или же прекращеніе уже яв-

Digitized by Google

лявшихся регулъ. Причиною этого бываетъ или неправильное устройство матки, или же малокровіе. Иногда вслѣдствіе простуды ногъ регулы быстро прекращаются, производя болѣзненныя ощущенія въ области матки, общее недомоганіе, головныя боли и общее лихорадочное состояніе. Лѣчится *S.* 1 или *C.* 1 × *A.* 1 (1-й ст.).

Слѣдуетъ замѣтить, что *Ang.* въ обыкновенной дозѣ вызываетъ регулы, въ дозѣ изъ 2-го стакана ихъ умѣряетъ и иногда пріостанавливаетъ.

3) *Дисменоррея, болѣзненные регулы.* Симптомы: судороги въ маткѣ, острая боль въ груди, поясницѣ и ляжкахъ. При этомъ дрожь, головная боль, иногда рвота, обмороки, рѣдко конвульсіи и холодный потъ; аппетитъ отсутствуетъ или извращенный, усталость, сердцебіеніе и общее недомоганіе. Въ моментъ кризиса и до его прекращенія вн. *A.* 1 (1-й ст.) по чайн. ложки черезъ полчаса и, между этими пріемами, тоже черезъ полчаса, по 1 сух. кр. *C.* 1 или *S.* 1. Для излѣченія: утр. и веч. по 2 кр. *S.* 1 и въ теченіе дня *A.* 1 × *C.* 1 (2-й ст.); при малокровіи, кромѣ того, каждый разъ съ пищею по 5 кр. *S.* 1.

4) *Критическій возрастъ.* Вн. *S.* 1 × *A.* 1 (2-й ст.); Тѣже лѣкарства въ сухомъ видѣ съ пищей. Ван. *C.* 5, спринц. *A.* 2 При разстройствѣ нервной системы эти лѣкарства на время замѣняютъ *C.* 1 × *A.* 3 (2-й ст.).

Беременность и роды.

Если женщина желаетъ легко родить, то въ продолженіи своей беременности она должна исполнять существующія по этому предмету правила гигіены и принимать вн. *C.* 1 (2-й ст.), одинъ стаканъ въ день, спринц. влагалище разъ въ день *C.* 5 и 2 раза въ нед. принимать общую ванну *C.* 5 на полчаса. Противъ рвоты, являющейся во время беременности; 10 круп. *S.* 1 или *Anti-mal di mare*; если она бываетъ въ послѣднія недѣли беременности, то даютъ *C.* 1 (2-й ст.). При судорожномъ кашлѣ беременной *P.* 3 × *P.* 4 (3—1-й стак.) или въ сух. видѣ.

Digitized by Google

Противъ запоровъ беременная не должна принимать никакихъ слабительныхъ, а лишь ставить себѣ клистиры, 1—2 въ день.

Въ концѣ 5-го мѣсяца беременности движенія плода ясно ощущаются, и если они чувствуются на лѣвой сторонѣ, то женщина *беременна мальчикомъ*, а если на правой — то *дѣвочкой*. Беременность длится отъ 265 до 280 дней.

Субъективно наступленіе родовъ характеризуется появленіемъ сильныхъ перемежающихся болей въ низу живота и въ поясницѣ, принимющихъ все болѣе и болѣе рѣзкій характеръ; боли эти вызываются періодическими сокращеніями матки. При изслѣдованіи наружный маточный зѣвъ нѣсколько открытъ. При этихъ признакахъ прежде всего необходимо основательно: 1) опорожнить кишечникъ слабительными и клизмой изъ прохладной воды; 2) проспринцовать влагалище 1—2% растворомъ карболовой кислоты и 3) принять теплую (+ 28° Р.) ванну, въ которой обмыть половыя части; приготовить комнату, кровать, дезинфекціон. средства и пр. И послѣ этого наступаетъ дѣятельность акушера или акушерки.

Напрасныя боли въ нижней части живота, когда ожидаются роды, облегчаются 4 сух. кр. *С.* 1 или *С.* 5; этотъ пріемъ повторяютъ при надобности каждые полчаса; на поясн. и симп. нерв. *Эл. Бѣл.* или *Эл. Кр.* × *Ж.* Если затруднено мочеиспусканіе, то вн. *S.* 6 (2-й ст.).

Боли послѣдующія за родами (*послѣродовыя*) совершенно естественны, такъ какъ тогда матка входитъ въ свое мѣсто. Если эти боли очень сильны и продолжительны, то они уменьшаются или прекращаются отъ *С.* 1 (1-й ст.) и на весь животъ компр. *Эл. З.* Возобновленіе сильныхъ маточныхъ спазмъ предупреждаютъ 10 сух. кр. *S.* 1.

Иногда родовой актъ осложняется *эклямпсіей*, которая можетъ развиться какъ во время беременности, такъ и послѣ родовъ, и характеризуется появленіемъ сильныхъ судорогъ мышцъ туловища, конечностей и лица. И въ виду того, что причина эклямпсіи находится въ связи съ заболѣваніемъ почекъ, то во время беременности нужно особенно внимательно слѣдить за отправленіемъ почекъ, нѣсколько разъ подвергать

Digitized by Google

мочу анализу *на бѣлокъ*, и при появленіи малѣйшихъ *его слѣдовъ*, или же *отековъ лица* примѣнить лѣченіе противъ Брайтовой болѣзни. У женщинъ, перенесшихъ эклямпсію, *неоднократно* наблюдалось развитіе психическихъ разстройствъ. См. *Эклямпсія*.

Тотчасъ послѣ родовъ обыкновенно отдѣляется болѣе или менѣе значительное количество крови, а затѣмъ въ первые 3 дня должно быть постоянное отдѣленіе слизи и крови безъ всякаго дурного запаха. Въ слѣдующіе 3—4 дня отдѣленіе бываетъ уже блѣднѣе и въ меньшемъ количествѣ. И затѣмъ до 6-ти недѣль изъ половыхъ органовъ, постоянно уменьшаясь, отдѣляется бѣловатая жидкость. Половые органы должны обмываться и влагалище спринцоваться нѣсколько разъ въ день не одною водою, но съ прибавленіемъ одного изъ двухъ золотниковъ карболовой кислоты на бутылку воды. Въ золотникѣ содержится около ста капель кислоты.

Обильныя или очень скудныя послѣродовыя отдѣленія остаются безъ дурныхъ послѣдствій. Самочувствіе здѣсь играетъ важную роль; и отсутствіе болѣзненнаго ощущенія гдѣ либо въ организмѣ, отсутствіе лихорадки, хорошій сонъ и аппетитъ указываютъ, что все идетъ нормально. При малѣйшемъ же уклоненіи отъ нормальнаго хода слѣдуетъ тотчасъ же лѣчиться.

Родильная горячка обусловливается проникновеніемъ въ организмъ женщины особыхъ микроскопическихъ зародышей, которые бываютъ двухъ видовъ: *гнилостныя бактеріи* и *цѣпочные кокки*, и сообразно этому наблюдаются и двѣ формы родильной горячки: *гнилостная лихорадка* и *септицемія*. Первая изъ нихъ менѣе опасна и возникаетъ при слѣдующихъ условіяхъ: изслѣдующимъ пальцемъ, инструментомъ или другимъ способомъ, болѣзнетворные зародыши заносятся въ матку, и если тамъ находятся отторгнутыя ткани—части послѣда, оболочекъ, даже скопленіе послѣродовыхъ очищеній, то они вызываютъ разложеніе этихъ органическихъ образованій, гнилостный распадъ всасывается кровью и обусловливаетъ мѣстное воспаленіе и общую лихорадку.

Зародыши *септицеміи* также заносятся въ родовой каналъ

Digitized by Google

извнѣ, но способъ дѣйствія ихъ нѣсколько иной: мѣстной реакціи они почти не вызываютъ, и если попадаютъ на здоровое не раненое мѣсто, то могутъ долгое время оставаться тамъ безъ всякаго вреда для организма; но какъ только *кокки* попадутъ на раненую поверхность, то хотя бы рана имѣла видъ едва замѣтной царапины въ такомъ случаѣ они быстро переходятъ въ глубину ткани, проникаютъ въ кровеносные сосуды, разносятся по всему тѣлу и вызываютъ тяжелую общую болѣзнь, характеризующуюся потрясающимъ ознобомъ, высокой температурой (40° Ц. и болѣе), потерею сознанія, судорогами, страшнымъ упадкомъ силъ. Раненія, ссадины слизистой оболочки половыхъ органовъ воспаляются и превращаются въ язвы, которыя имѣютъ наклонность распадаться по всѣмъ направленіямъ. Выдѣленіе язвъ жидкое, гноевидное. Послѣродовое очищеніе перестаетъ выдѣляться вовсе и получаетъ рѣзкій гнилостный запахъ. Дальнѣйшее теченіе болѣзни весьма различно: въ болѣе легкихъ случаяхъ процессъ ограничивается воспаленіемъ рукава матки, фаллоп. трубы, околоматочной клѣтчатки или части брюшиннаго покрова матки. Иногда бываютъ случаи выздоровленія, но всегда остаются слѣды въ видѣ рубцовъ, уплотненія, сморщиванія тканей и пр. Болѣе тяжелая *септицемія* протекаетъ обыкновенно въ формѣ общаго воспаленія брюшины и почти всегда кончается смертію.

Особенно опасны тѣ случаи, при которыхъ внезапно наступившая высокая температура держится на одной высотѣ безъ всякихъ послабленій, сильно вздутый животъ не сопровождается болѣзненностью и во все время болѣзни бываетъ упорный запоръ. Опасны также случаи, при которыхъ наблюдаютъ сильные и часто повторяющіеся ознобы. Выздоровленіе въ этихъ случаяхъ бываетъ рѣдко.

Надо имѣть въ виду, что не всякое заболѣваніе родильницы непремѣнно горячка. У родильницъ могутъ развиться воспаленія наружн. и внутр. половыхъ органовъ, язвы. Но эти заболѣванія ничего общаго съ горячкою не имѣютъ, такъ какъ не сопровождаются общимъ зараженіемъ организма, бывающимъ при горячкѣ. На практикѣ иногда очень трудно отличить —

Digitized by Google

представляетъ ли данный случай послѣродовое воспаленіе матки или родильную горячку. Лѣченіе въ этихъ случаяхъ одинаково.

Главное вниманіе должно быть обращено на высокую температуру, а потому вн. *F.* 1 (3-й ст.) × *C.* 1 (3-й или 2-й ст. до 1-го усиленнаго разведенія), на подвзд. согрѣв. компр. *F.* 2. На животъ и лобк. кость мазь *C.* 5 или компр. *Эл. Бѣл.* На поясниц. *Эл. Кр.* × *Ж.* Ванны (+ 23 до 26° Р.) съ 50 кр. *C.* 5 или *S.* 1 или *A.* 2 и *F.* 2, кромѣ пониженія температуры на 1—2°, дѣйствуютъ успокаивающимъ образомъ: жажда уменьшается, головныя боли и бредъ пропадаютъ; больныя чувствуютъ себя бодрѣе и свѣжѣе и требуютъ всегда повторенія ваннъ. Продолжительность каждой, смотря по силамъ больныхъ, отъ 5 до 10 мин.; въ теченіе дня ванна можетъ быть повторена до 4-хъ разъ. Руководителемъ въ этомъ случаѣ долженъ служить термометръ. Чѣмъ температура выше, чѣмъ меньше она понижается въ теченіе дня, тѣмъ чаще должны повторяться ванны. Къ ваннамъ вообще прибѣгаютъ, когда температура тѣла выше 39° Ц. При сильныхъ головныхъ боляхъ на затыл., подглаз. и симп. нер. *Эл. Бѣл.* и то же на темя 10 капель. Противъ тошноты и рвоты вн. 10 сухихъ кр. *S.* 1 или *S.* 5 или *Anti-mal di mare* или каждый часъ по 1 сухой кр. *C.* 2. Если лѣкарства въ разведеніяхъ вызываютъ тошноту, то даютъ кажд. 2 часа по 2 — 3 круп. сух. *A.* 1 × *S. G.* × *F.* 1 и по 3 — 5 кап. *Эл. Бѣл.* Язвы должны постоянно омываться, очищаться тепловатою водою съ прибавленіемъ 1 или 2 золотниковъ карболовой кислоты на бутылку воды. Этотъ же растворъ карболовой кислоты употребляется для спринцованія влагалища, но оно должно производиться крайне осторожно, чтобы наконечникомъ не произвести раненій, ссадинъ. Температура впрыскиваемыхъ жидкостей должна быть не ниже 20 — 24° Р. Въ упорн. случаѣ вмѣсто *C.* 1 (2-й ст.) давать каждые два часа по 1 сух. кр. *C.* 5.

Выкидышъ. Выкидышемъ называется изверженіе плода раньше срока. Симптомы: у женщины внезапно появляются схватывающія боли въ нижней части живота и въ поясницѣ (въ видѣ потугъ), которыя повторяются все чаще и постепенно

Digitized by Google

усиливаются; общее недомоганіе, головная боль, лихорадочное состояніе, тошнота, позывы къ мочеиспусканію и на низъ, иногда біеніе сердца и пр.; изъ половыхъ частей показывается кровь и кровотеченіе постепенно усиливается, вмѣстѣ съ которымъ наконецъ (въ тотъ же, на другой или третій день) и отходитъ плодъ (почти всегда мертвый). Больная должна лечь въ постель.

Для остановки кровотеченія даютъ немедленно 10 капель *Эл. Анж.* въ чайн. л. воды, черезъ полчаса повторить. Также тампонъ изъ *Эл. Анж.* На животъ—холодные компрессы изъ раствора *A.* 1, *C.* 5 по 20 круп. въ 2 стаканахъ воды съ 1 чайн. лож. *Эл. Анж.* Вн. *A.* 2 × *C.* 1 или *C.* 5 (3-й ст., въ трудн. случ. изъ 4-го ст.).

Боли, послѣдующія за выкидышемъ, прекращаются тѣми же лѣкарствами, которыя выше назначены противъ боли послѣ родовъ и примѣняются тѣ же обмыванія половыхъ органовъ и спринцованія влагалища, которыя тамъ назначены. *Діэта.* Пища должна быть питательная, самая простая, и по возможности холодная. Все возбуждающее избѣгать.

Для предотвращенія выкидыша, при первыхъ его признакахъ, тѣ же лѣкарства, только безъ тампонаціи, которая примѣняется только при упорныхъ кровотеченіяхъ.

Для предотвращенія выкидыша при позднѣйшихъ беременностяхъ избѣгать прежде всего тѣхъ вредныхъ вліяній, которыя вызвали первый выкидышъ. Съ самаго начала беременности брать каждую недѣлю полную ванну или полуванну съ 25 круп. *A.* 1 и 50 круп. *C.* 5. Вн. *A.* 1 × *C.* 5 (3-й или 2-й ст.), 3 раза въ день по 5 круп. *S.* 1 передъ пищей. Устранять запоры (клистиры). При подозрѣніи на сифилисъ отца или матери прибавлять къ ваннѣ еще 25 круп. *V.*, также вн. *V.* (2-й ст.). За два дня до того времени, когда раньше наступалъ выкидышъ, беременная должна ложиться въ постель и оставаться въ ней дня четыре при полномъ душевномъ покоѣ.

Digitized by Google

Примѣры излѣченій женскихъ болѣзней.

Совѣтъ черезъ корреспонденцію.—Ж. 25 л. страдала бѣлями 3 года, бѣли были густыя, зеленаго цвѣта, ѣдкаго свойства. Вылѣчена въ 3 мѣс. Вн. *S*. 2 × *C*. 2 (2-й ст.), спринц. и тампоны съ глицериномъ изъ тѣхъ же лѣкарствъ (*C*).

— Ж. 31 г. страдала 3 м. катарромъ слизистой оболочки влагалища и матки съ легкою лихорадкою и отсутствіемъ аппетита. Вылѣчена въ 1 м. тѣми же лѣкарствами, но для прекращенія лихорадки вн. *F*. 1 (2-й ст.), на подвзд. мазь *F*. 2, и 3 раза въ день по 5 кр. *S*. *G*. для возстановленія аппетита (*C*).

— Ж. 38 л. на 7 мѣс. беременности болѣла 2 нед. острымъ воспаленіемъ матки и брюшины; пользовалась домашними средствами безъ пользы, боли и лихорадка усилились, температура тѣла 40°. Вылѣчена въ 2 нед. Вн. *F*. 1 (3-й ст.) каждыя 5 м., на подвзд. компр. *F*. 2, на животъ, лобк. кость и поясн. *Эл. Зел.* и мазь *C*. 5. Затѣмъ *C*. 3 (2-й ст.) и 10 кр. *C*. 1; во время болѣзни образовалась плесневица, которая уничтожена полоск. *S*. 1 комнатной температуры (*C*).

Совѣтъ черезъ корреспонденцію.—Ж. 40 л. страдала 3 года хрон. воспаленіемъ матки; была поражена ткань матки, при этомъ малокровіе, слабонервность. Вылѣчена въ 4 мѣс. Вн. *A*. 3 × *C*. 3 × *S*. 3 (3-й ст.); ван. и согрѣв. компр. *C*. 5 (*C*.).

Совѣтъ черезъ корреспонденцію.—Ж. 42 л. страдала 2 года хрон. воспаленіемъ матки; была поражена слизистая ея оболочка, сильныя бѣли, иногда кровотеченія, худоба, малокровіе, учащенное біеніе сердца, запоры. Вылѣчена въ 6 м. Вн. тѣ же лѣкарства, спринцов. и тампоны *S*. 2 × *A*. 2 × *C*. 1 (*C*.).

— Ж. 30 л. имѣла около 2 л. фиброидъ на маткѣ; боль на маткѣ, обильныя и очень болѣзненныя регулы, продолжавшіяся 10—12 дн. Лѣченіе начато 15 февраля 1884 г. Вн. *A*. 3 × *C*. 1 Черезъ 2 нед. регулы появились, хотя обильныя, но безъ боли и не столь продолжительныя; начало отдѣляться большое количество слизи съ отрывками волоконъ; въ концѣ апрѣля матка не чувствительна, регулы правильныя и безъ боли, аппетитъ и пищевареніе нормальные, больная могла гулять, не чувствуя усталости. Въ началѣ ноября того же года не осталось слѣда фиброида, силы возвратились и женщина пользуется совершеннымъ здоровьемъ (*C*.).

— Ж. 34 л. болѣе года страдала фабринознымъ полипомъ на маткѣ, обильныя кровотеченія съ небольшимъ количествомъ гноя, значительная слабость; регулы настолько обильныя, что

Digitized by Google

предстояла надобность употреблять *А*. 1. Для поддержанія силъ назначено по 10 кр. *S*. 1 за обѣдомъ. Вн. *С*. 1 (2-й ст.), спринцов. и тампонація влагалища *S*. 5, два раза въ нед. Черезъ 2 мѣс. замѣтное улучшеніе: кровотеченія уменьшились, безъ гноя, силы нѣсколько возстановились, въ нижней части живота ощущалась тяжесть и глухія боли, препятствующія движенію. Нѣсколько дней спустя произошло явленіе, подобное родамъ, вслѣдствіе сокращенія матки выдѣлился полипъ, который задерживался въ большихъ губахъ, изъ нихъ былъ удаленъ помощью хирург. инструмента. Полипъ имѣлъ форму груши, длиною 6 сантим., толщиною 2 сантим., вѣсомъ около 52 граммъ; черезъ 6 дней послѣ удаленія полипа истеченіе прекратилось, здоровье начало возстановляться, регулы появились въ срокъ нормальныя, черезъ 2 нед. больная могла приняться за свои обычныя занятія, во все это время вн. *С*. 1 и нар. *С*. 5 и сухія кр. *S*. 1 (*С*.).

Совѣтъ черезъ корреспонденцію. — Ж. 22 л. страдала нѣсколько лѣтъ наклоненіемъ матки назадъ и хронич. воспаленіемъ лѣваго яичника; обильныя болѣзненныя регулы, болѣзненное испражненіе на низъ, истерика, слабонервность. Вылѣчена въ 6 мѣс. Вн. *А*. 3 (3-й ст.) 6 ч. л. въ день, *С*. 1 (3-й ст.) и *S*. 1 (2-й ст.), за обѣдомъ 10 кр. *S*. 1. На животъ, промежн., лобк. кость и по длинѣ спины мазь *С*. 5. На тѣ же мѣста *Эл. Анж.* и тамопнація влагалища губкою *С*. 1 съ глицериномъ 3 раза въ недѣлю (*С*.).

— Огромная жирная опухоль матки у ж., признанной неизлѣчимою, операція считалась невозможною. Черезъ 3 м. лѣченія, здоровье улучшилось и на 5 мѣс. опухоль отдѣлилась, вѣсомъ около 750 граммъ, отъ вн. употребленія ежедневно *А*. 1 × *С*. 1 (2-й ст.) и утромъ 1 сухая кр. *S*. 1. Нар. у. и в., на 6 гл. точ. и пояс. компр. *Эл. Кр.* и впрыск. 2 раза въ день *С*. 1 × *С*. 5 (на ст. 20 кр.), а при кровотеченіи *А*. 1 и 2 ван. въ недѣлю *С*. 5.

— Послѣродовсе воспаленіе матки съ воспаленіемъ яичника у ж. 30 л. вылѣчено въ 1 мѣс. вн. *С*. 2 въ средней дозѣ, ван. *С*. 2 и на поясн. промеж. и лобк. кость *Эл. Кр.* (*С*.).

— Ж. 22 л. будучи еще дѣвицею, 3 г. страдала маточн. кровотеченіемъ съ сильнымъ біеніемъ сердца, годъ лѣчилась въ больницѣ безъ всякой пользы, и доктора ей посовѣтовали выйти замужъ, увѣривъ ее, что тогда кровотеч. прекратятся. Послѣдовавъ ихъ совѣту, она вышла замужъ, но кровотеч. еще болѣе усилилось. Послѣ того тѣ же доктора признали, что нужно сдѣлать операцію, такъ какъ на маткѣ оказалась

Digitized by Google

опухоль На это она не согласилась. Было дано вн. *A*. 1 (3-й ст.) × *F*. 1 (1-й ст.) и каждые 2 часа по сухой круп. *C*. 1. Наруж. впрыск. *A*. 2 (45 кр. на 3 ст. воды) и мази: на сердце *A*. 2 и на подвзд. *F*. 2. Послѣ трехъ впрыск. кровотеченіе остановилось, и въ двѣ недѣли совершенно выздоровѣла.

— Многія метроррагіи были вылѣчены этимъ же способомъ (С.).

— Маточныя спазмы у многихъ женщинъ проходили очень скоро отъ 2 сух. кр. *S*. 1, повторяемыхъ каждые полчаса также отъ *F*. 1 × *C*. 1 (2-й ст.) и на поясн. *Эл. Кр.* (*C*.).

— Воспаленіе праваго яичка у женщ. 30 л., на 14 день послѣ родовъ, вылѣчено въ одну недѣлю вн. *C*. 1 (2-й ст.), на 6 гл. точ. и спину *Эл. Кр.* и на животъ и спину мазь *C*. 5 (*C*.).

— Ж. 40 л. имѣла кисту на правомъ яичкѣ, гиперемія печени и сильное біеніе сердца. Вылѣчена въ 6 мѣс. Вн. *A*. 1 × *F*. 1 × *C*. 5 (2-й ст.), на 6 гл. точ., сердце и по длинѣ спины *Эл. Анж.*, на подвзд. мазь *F*. 2. На животъ мазь *C*. 5 (*C*.).

— Аменорреи и дисменорреи у многихъ дѣв. и дамъ были вылѣчены въ 3, 5 мѣс. вн. *A*. 1 × *C*. 1 × *S*. 1 (1-й ст.); съ прибавленіемъ иногда ван. *A*. 2, и С. 5, *Эл. Анж.* на лобковую кость, промежность и поясн. (*C*.).

Вообще случаевъ излѣченій разнаго рода женскихъ болѣзней весьма значительно. Мы не отмѣчаемъ здѣсь отдѣльно каждую вылѣченную болѣзнь, потому что основанія и способы лѣченія каждой болѣзни въ общемъ были одинаковы съ предъидущими примѣрами. Но считаемъ нужнымъ присовокупить, что при лѣченіи бѣлей, бленноррагіи, триппера, разныхъ опухолей и новообразованій на маткѣ оказывало благотворное дѣйствіе вдуваніе во влагалище лѣкарственнаго порошка, о которомъ сказано выше на стр. 392 (*C*.).

Поносъ выражается тѣмъ, что появляются частыя и жидкія испражненія. Они по своему составу весьма разнообразны и содержатъ непереваренныя или неудобоваримыя вещества или бываютъ водянисты, или слизисты, или же содержатъ, кровь, гной, много желчи, бѣлокъ и жиръ. Вн. *S*. 1 (1-й ст.) или отъ 10 до 20 сух. кр. *S*. 1 или *C*. 3 или *S*. *G*. въ одинъ пріемъ; на 6 гл. точ. *Эл. Кр.* × *Ж*.

Во множествѣ случаевъ поноса у дѣтей и у взрослыхъ, когда *S*. 1 не дѣйствовало, съ несомнѣннымъ успѣхомъ было употреблено *F*. 1 × *C*. 1 (1-й ст.), а также *Verm.* изъ 1-го ст. Ср. *Кишки*, *Кровавый поносъ*, *Холерина*, *Холера*.

Digitized by Google

Пораженіе молніею можетъ ограничиться или смертію на мѣстѣ или ожогомъ, или сотрясеніемъ мозга, или параличемъ отдѣльныхъ членовъ или органовъ чувствъ. Если пораженный молніей находится лишь въ обморокѣ, то его слѣдуетъ закутать шерстяными одѣялами или шубою для того, чтобы поддержать нормальную температуру тѣла, пока нервы и мозгъ не оправятся отъ сотрясенія, причиненнаго электричествомъ. Вн. 10 сух. круп. *S.* 1; на гл. точ., на темя и на всѣ нервы головы *Эл. Кр.* × *Желт.* На голову прим. съ *Эл. Бѣл.* Ожоги отъ молніи лѣчатся обычнымъ способомъ. См. *Ожоги.* Послѣдовательные послѣ пораженія молніею параличи, отъ лѣченія лѣкарствами графа Маттеи, проходятъ спустя нѣкоторое время.

Потъ. Въ глубинѣ кожи лежатъ выдѣляющія потъ *потныя железы* въ видѣ маленькихъ клубочковъ, спускаясь до подкожнаго слоя. Особенно большія и многочисленныя потныя железы находятся подъ мышками и на стопахъ.

Потливость встрѣчается у людей изнуренныхъ и худосочныхъ и при всѣхъ болѣзняхъ, обусловливающихъ сильное истощеніе тѣла. Болѣзненный потъ холодный, клейкій, очень обильный и имѣетъ непріятный запахъ. Лѣченіе общихъ потовъ должно быть направлено противъ производящей причины. Если причина общая слабость, то даютъ *S.* 1 (крѣпкое развед.) 3 раза въ день по чайн. л. и все тѣло обмыв. утр. и веч. растворомъ изъ 30 круп. *S.* 5 въ 1 унціи воды и 3 унц. вин. спирта съ добавленіемъ 1 ч. л. *Эл. Кр.* или *Бѣл.* Чайная лож. коньяка въ чашкѣ холодн. молока полезно противъ ночного пота.

Вонючій и изобильный потъ отъ ногъ и въ подмышкахъ. Вн. *S.* 1 × *A.* 2 или 3 (1-й ст.) и ван. *S.* 5, утр. 3 круп. *A.* 1, днемъ и веч. по 5 круп. *S.* 1. Потѣющія мѣста обтирать утр. и веч. растворомъ *S.* 5, *C.* 5 по 10 круп. и 5 круп. *A.* 2 въ унціи воды и 3 унц. вин. спирта. Мѣстныя теплыя ванны съ *A.* 2, C. 5, *S.* 5.

Скрывшійся потъ. То же лѣченіе, но слабыя дозы.

Поясница. Боль и ломъ въ поясницѣ бываютъ при простудѣ, геморроѣ, бедреной боли, ревматизмѣ, глистахъ, пораженіи почекъ и матки, а изъ острыхъ болѣзней—при оспѣ.

Digitized by Google

Лѣченіе должно быть направлено противъ производящей причины.

Приливы крови. Расширеніе кровеносной сѣти сосудовъ подъ вліяніемъ раздраженія, будь это треніе, паръ или иная какая-нибудь внѣшняя или внутренняя причина, вслѣдствіе чего является краснота, увеличеніе тепла и объема кожи или органа, называется приливомъ крови. Приливы крови подъ вліяніемъ тѣхъ же причинъ бываютъ и во внутреннихъ органахъ. Кровь приливаетъ къ кожѣ или къ органамъ изъ сосѣднихъ болѣе или менѣе отдаленныхъ частей и внутреннихъ органовъ. При сильномъ приливѣ случается, что кровеносные сосуды не выдерживаютъ напора находящейся въ ней лишней крови и разрываются. Устранивъ причину, вызвавшую приливъ, всѣ явленія прилива скоро проходятъ. Вн. *А.* 1 (2-й ст.), нар. прим. *А.* 2, на сердце *Эл. Анж.*

Простуда, простудное состояніе. Такъ называется общее недомоганіе, послѣ промоченія и охлажденія тѣла и состоитъ въ нерасположеніи, потерѣ аппетита, разстройствѣ пищеваренія, часто съ ломомъ въ костяхъ, головной болью, лихорадкой и проч. При самомъ началѣ простуда прерывается очень быстро 2-мя или 4-мя сухими круп. *S.* 1. Но при лихорадочномъ состояніи вн. *F.* 1 (1-й ст.) и на подвзд. мазь, компр. *F.* 2. Каждое утро вн. 5 кап. *Эл. Анж.* въ литрѣ воды предупреждаютъ простуду. Заболѣванія отдѣльныхъ органовъ см. въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ этой книги.

Ракъ. Изъ всѣхъ болѣзней наиболѣе ужасныхъ, которыя поражаютъ человѣчество, и изъ всѣхъ тѣхъ, которыя медицина признаетъ неизлѣчимыми, ракъ несомнѣнно занимаетъ первое мѣсто. Единственно радикальнымъ способомъ лѣченія считается только хирургія, которая вырѣзываетъ раковую опухоль. Но вырѣзать—не значитъ еще вылѣчить; операція можетъ лишь на время устранить наличные симптомы, коренной же причины она уничтожить не можетъ. Эта причина, которую называютъ *раковымъ предрасположеніемъ* (diathesis cancerosa), не замедлитъ обнаружиться во вторичномъ раковомъ проявленіи, болѣе ужасномъ и болѣе опасномъ, чѣмъ первое, потому, что теченіе болѣзни становится болѣе быстрымъ.

Digitized by Google

Мы основываемъ наше утвержденіе на доказательствахъ и фактахъ: кто не встрѣчался въ своей жизни со множествомъ больныхъ ракомъ, которые были оперированы, и которые вторично становились жертвами, имѣя въ перспективѣ ужасную смерть, сопровождаемую жестокими страданіями.

Статистика подтверждала и подтверждаетъ этотъ выводъ.

Такъ, наприм., д-ръ *Jacobson* говоритъ въ своемъ сочиненіи *„Les opérations de la chirurgie“*, 2-*е изд.*, между прочимъ слѣд.: 1) *Ракъ языка.* Если нагноеніе существовало три мѣсяца и болѣе, то выздоровленіе весьма сомнительно. Продолжительность жизни въ тѣхъ случаяхъ, которые не были оперированы, не превышаетъ 18 мѣсяцевъ, но во многихъ случаяхъ она не болѣе 1 года. Запоздалая операція можетъ иногда продолжить жизнь больному мѣсяцевъ на 6 или 8, но такая операція сопряжена съ рискомъ, такъ какъ можетъ быть причиною воспаленія легкихъ или бронховъ, рожи, отека глотки, сильнаго кровотеченія съ роковымъ исходомъ и пр. 2) *Ракъ гортани.* Изъ 50 больныхъ, подвергнутыхъ операціи, 15 умерло въ теченіе 24 часовъ, 11 не пережили и одной недѣли, 20 умерло въ теченіе двухъ недѣль и только 4 спустя 6 мѣсяцевъ еще не представляли никакихъ симптомовъ возврата. 3) *Ракъ грудной железы.* Есть много случаевъ, гдѣ операцію нельзя произвести, или она просто сомнительна, какъ, напр., для женщинъ 60 лѣтъ и старше этого возраста, у очень тучныхъ, обжорливыхъ, много пьющихъ вина, склонныхъ къ частымъ бронхитамъ или съ ослабленнымъ сердцемъ. Если больная перенесла операцію, то *она можетъ быть* проживетъ $3^1/_2$ года, лишь бы операція была произведена безотлагательно, какъ только болѣзнь была обнаружена. Средняя продолжительность возврата болѣзни, послѣ операціи, это 1 годъ. Болѣе чѣмъ $^1/_2$ больныхъ подвергаются возврату болѣзни въ теченіи 12 мѣс. и $^2/_5$ въ теченіи 6 мѣсяцевъ. Изъ *59 случаевъ рака въ разныхъ органахъ*, послѣ операціи, которыя наблюдалъ Джемсъ Пэджетъ (*Sir James Paget*): 23 вновь образовались въ теченіи 3 мѣс. послѣ операціи, 22 въ продолженіи 6 мѣс., а остальные 14 случаевъ обнаружились черезъ годъ.

Digitized by Google

Нужно замѣтить, что уже древніе врачи признавали почти несомнѣннымъ возвратъ рака послѣ операціи.

Если мы можемъ утверждать, что Электро-Гомеопатія графа Маттеи располагаетъ дѣйствительно драгоцѣнными лѣкарствами, которыя нейтрализуютъ раковую болѣзнь, то этимъ не сказано, что она вѣрно излѣчиваетъ *ракъ какой бы то ни было во всѣхъ его періодахъ* или видоизмѣненіяхъ *и у всѣхъ больныхъ*. Подобная претензія будетъ смѣшна до тѣхъ поръ, пока не будетъ доказано, что существуетъ такое цѣлебное средство, которое можетъ произвести такое чудо. Но основываясь на опытахъ, произведенныхъ во всѣхъ странахъ свѣта множествомъ врачей, на опытахъ, сдѣланныхъ не-врачами, на личныхъ опытахъ самихъ больныхъ и наконецъ на своемъ опытѣ, мы не колеблясь можемъ сказать, что если ракъ только въ началѣ своего образованія, *недавній, если теченіе его* додовольно *медленное,* допускающее исправленіе организма, то онъ поддастся лѣченію и затѣмъ исчезнетъ. Тогда увидятъ возстановленіе пораженнаго органа въ возможной степени.

Что несомнѣнно—это то, что, послѣдуетъ-ли излѣченіе или нѣтъ, Канчерозы во всякомъ случаѣ произведутъ свое благотворное дѣйствіе, и ихъ цѣлебное свойство удивитъ каждаго добросовѣстнаго наблюдателя. Они увидятъ жестокую борьбу, возникшую между лѣкарствомъ и болѣзнью, и если, къ несчастію, послѣдняя побѣдитъ, то смерть послѣдуетъ безъ особенныхъ страданій, а можетъ быть и безъ всякой боли, въ чемъ мы неоднократно удостовѣрились.

Ракъ, если кахексія еще не существуетъ и симптомы его неясны, неопредѣленны, можетъ быть діагностированъ только при помощи микроскопа, потому что колющія боли могутъ существовать въ опухоляхъ и не раковаго происхожденія.

Ракъ есть опухоль, по строенію своему существенно отличающаяся отъ той ткани, на которой она развивается. Ракъ превращаетъ всѣ сосѣднія ткани въ раковую ткань и производитъ *метастазы* (переносы) въ различныхъ частяхъ тѣла; онъ имѣетъ наклонность къ распаденію и угрожаетъ жизни больного; причина его конституціональная, въ дальнѣйшемъ

Digitized by Google

же теченіи главная опасность для больного состоитъ во всасываніи его продуктовъ въ кровь, чѣмъ и обусловливается *злокачественный характеръ* раковой болѣзни.

Ракъ, по своимъ внѣшнимъ признакамъ, раздѣляется на *твердый* и *мягкій*.

Твердый ракъ или *скирръ* встрѣчается наичаще въ грудной железѣ, маткѣ, желудкѣ и прямой кишкѣ. Скирръ — это одна изъ формъ рака, которая никогда не изъязвляется; конституціональное отравленіе имѣетъ мѣсто въ періодѣ развитія опухоли.

Мягкій ракъ или *мозговикъ* (Энцефалоидъ), т. е. напоминающій по своей консистенціи вещество мозга, имѣетъ нѣсколько разновидностей, а именно:

1. *Эпителіальный*, какъ-то на губѣ, языкѣ, половыхъ органахъ и на шейкѣ матки. Этотъ видъ въ свою очередь распадается на два: *разращеніе въ видѣ цвѣтной капусты* и *ворсинистый ракъ*.

2. *Черный*, содержащій черный пигментъ.

3. *Коллоидный*, студенистый, который представляетъ большія щели, наполненныя студенистою, клеевидною жидкостью.

4. *Кровоточивый* и

5. *Костный*, который можетъ быть окостенѣвшимъ, твердымъ или мягкимъ ракомъ.

Первично эпителіальный ракъ или мозговикъ можетъ впослѣдствіи стать чернымъ или кровоточивымъ; скирръ или твердый мозговикъ можетъ иногда окостенѣть.

Какъ твердый, такъ и мягкій ракъ имѣетъ фиброзную основу, содержитъ раковыя клѣтки и выдѣляетъ раковый сокъ или молочно-бѣлую жидкость. Мягкій ракъ отличается изобиліемъ клѣточныхъ элементовъ.

Всѣ виды рака могутъ годами оставаться стаціонарными, т. е. безъ видимыхъ измѣненій, но отъ всякой внѣшней причины, напр. удара, насилія, инфлуенцы, они начинаютъ развиваться дальше и обыкновенно скоро приводятъ больного къ смерти.

Раковыя новообразованія встрѣчаются во всѣхъ тканяхъ

Digitized by Google

и органахъ, за исключеніемъ хрящевой, внутренней и средней оболочекъ артерій. Впрочемъ, различныя ткани и органы ракъ поражаетъ не одинаково часто. Относительно частоты появленія рака, *на первомъ мѣстѣ стоятъ*: матка, маточный рукавъ и женскія груди; *потомъ слѣдуютъ*: лимфатическія железы, печень, желудокъ, пищепріемникъ; *рѣже*: легкія, кожа, кишечный каналъ, брюшина, кости, мозгъ и мозговыя оболочки, глазное яблоко, почки, надпочечныя железы, яички; *всего рѣже*: мочевой пузырь, яичники, мышцы, языкъ, воздухоносные пути, слюнныя железы, щитовидная железа, спинной мозгъ, селезенка, вены и лимфатическіе сосуды.

Ракъ встрѣчается или въ видѣ одной опухоли, или одновременно въ числѣ нѣсколькихъ, иногда весьма многочисленныхъ опухолей. Въ послѣднемъ случаѣ они поражаютъ либо одинъ и тотъ же органъ (напр. печень, легкія и т. д.), либо и другіе сходные органы (лимфатическія железы различныхъ частей); либо они размѣщаются въ различныхъ органахъ.

Раковая опухоль (раковые узлы, ограниченные раки) бываетъ отъ едва замѣтной (милліарный ракъ) до величины головы и даже болѣе. Форма ея бываетъ или правильно круглая или совершенно неправильная, плоская или шарообразная; въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ опухоль находится подъ вліяніемъ давленія, форма соотвѣтствуетъ этому давленію; отъ сліянія многихъ опухолей получается форма бисквита, овальная, дольчатая и т. д. Плотность опухолей различна, то подобно твердости кости, то кашицеобразной мякоти.

Въ кожѣ, на слизистыхъ оболочкахъ, въ полыхъ органахъ (матка и т. д.) ракъ чаще всего производитъ *инфильтраціи* (инфильтрованный или разлитой ракъ). Въ такихъ случаяхъ соотвѣтствующая оболочка или органъ сами всегда бываютъ пропитаны на большемъ или меньшемъ пространствѣ (никогда на всемъ протяженіи) однообразною, различнаго цвѣта массою, дающею часто при соскабливаніи сокъ, похожій на молоко; такъ что составныя части ткани или совсѣмъ нельзя бываетъ узнать, или только частію; вообще онѣ бываютъ утолщены въ большей или меньшей степени.

Digitized by Google

Очень часто эти два обстоятельства встрѣчаются вмѣстѣ т. е. инфильтрація образуетъ шарообразную, круглую или зазубренную, ясно ограниченную массу, — случаи, которые обыкновенно принимаются за раковые узлы, напр. въ печени, легкихъ.

Раковыя образованія состоятъ изъ *раковаго сока* и плотнаго вещества, *основы* (стромы), служащей резервуаромъ для него. Раковый сокъ въ свою очередь состоитъ изъ раковыхъ ячеекъ и зеренъ и находящагося между ними, въ незначительномъ количествѣ, жидкаго междуячеистаго вещества или раковой сыворотки. Раковая основа въ обыкновенныхъ неворсинистыхъ ракахъ образуютъ замкнутыя или сообщающіяся между собою полости, внутри которыхъ содержатся раковыя ячейки; въ ворсинистыхъ ракахъ бываетъ разращеніе сосочковъ различной формы, въ окружности которыхъ и располагаются раковыя ячейки.

Размягченіе рака встрѣчается то какъ явленіе самостоятельное, то оно сопровождается жировымъ и слизистымъ перерожденіемъ раковыхъ ячеекъ. Слѣдствіемъ размягченія бываетъ главнымъ образомъ начало распаденія и изъязвленія рака.

Образованіе гноя во внутренности рака встрѣчается рѣдко, а на поверхности гораздо чаще. Оно иногда такъ незначительно, что можетъ быть открыто только помощью микроскопа, иногда же такъ значительно, что видно простымъ глазомъ; то оно разлито, то образуются полости, подобныя нарывамъ или кистамъ, напр. въ грудной железѣ. Внутренняя поверхность такихъ кистъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ покрыта разращеніями, подобными грануляціямъ.

Послѣ болѣе или менѣе продолжительнаго существованія рака на оболочкахъ, въ особенности на кожѣ и слизистой оболочкѣ пищеварительныхъ органовъ, поверхность рака начинаетъ распадаться и происходитъ *раковая язва*, которая, смотря по органамъ, представляетъ отчасти различный характеръ. Жидкость, покрывающая язву, сходна или съ обыкновеннымъ раковымъ сокомъ, или же сывороточна, рѣдко сывороточно-гнойная, чаще окрашена кровью въ красноватый или корич-

Digitized by Google

невый цвѣтъ, безъ запаха или съ рѣзкимъ запахомъ, долго остающимся на пальцахъ изслѣдователя и портящимъ воздухъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ ней содержатся чаще маленькія, рѣдко большія частицы раковой ткани.

Послѣдствія развитія рака, кромѣ вреднаго мѣстнаго дѣйствія, заключаются въ отнятіи питательнаго матеріала разрастающимся новообразованіемъ и въ поступленіи въ организмъ вредныхъ веществъ изъ раковыхъ язвъ, или изъ неизъязвившихся еще, но перерожденныхъ опухолей. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ можетъ присоединиться піэмія (гнойное отравленіе крови). *Раковая кахексія*, выражающаяся сильнымъ исхуданіемъ, малокровіемъ и грязно-желтовато-зеленымъ цвѣтомъ кожи, есть послѣдствіе этихъ различныхъ вліяній.

Степень злокачественности рака опредѣляется мѣстонахожденіемъ, ростомъ и перерожденіемъ опухоли. Чѣмъ скорѣе растетъ опухоль, тѣмъ болѣе богата клѣтками и мягка, тѣмъ болѣе склонна къ размягченію и изъязвленію и тѣмъ болѣе доставляется матеріала для переноса.

Приводимыя нѣкоторыми авторами причины заболѣванія ракомъ можно назвать только случайными и вообще сомнительными; сюда относятся ушибъ, ударъ или вообще мѣстное механическое раздраженіе. Несомнѣнно лишь то, что ракъ есть продуктъ болѣзнетворной причины особаго рода, вѣроятнѣе всего бактерійнаго характера, дѣйствующій однако, на организмъ лишь при *предрасположеніи* послѣдняго къ раковому заболѣванію, при раковомъ діатезѣ.

Доказательствами этого служатъ наслѣдственность рака, безполезность его вырѣзыванія, общее пораженіе имъ организма съ общей кахексіей въ конечномъ результатѣ. Поэтому-то и лѣченіе должно быть главнымъ образомъ общее, а не лишь мѣстное.

Теченіе рака бываетъ большею частію хроническое, отъ одного до нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ; но оно весьма различно, смотря по роду, величинѣ и числу раковъ равно какъ по значенію пораженнаго органа. Въ немногихъ случаяхъ ракъ имѣетъ скоротечное теченіе, причемъ рѣдко первично, большею

Digitized by Google

же частію вторично, т. е. при существованіи болѣе стараго рака, образуются въ различныхъ, а иногда и во всѣхъ органахъ и тканяхъ тѣла множество мелкихъ (до горошины) раковыхъ новообразованій.

Въ началѣ своего образованія, когда опухоль еще закрыта, ракъ легко излѣчимъ; но когда образовалось нагноеніе, тогда лѣченіе затруднительно. Наконецъ, когда масса крови заразилась отъ язвенныхъ соковъ и образовались язвы, то случаи выздоровленія возможны. Само собою разумѣется, когда одинъ изъ органовъ, необходимыхъ для жизни, безвозвратно разъѣденъ, или поврежденъ, или просверленъ насквозь, тогда нужно не лѣченіе, а чудо. Здѣсь же идетъ вопросъ не о чудесахъ, а только о простомъ лѣченіи естественными средствами, — о лѣченіи, которое до настоящаго времени считалось невозможнымъ при способахъ, до сихъ поръ употребляемыхъ.

Къ сожалѣнію, надо сказать, что къ новымъ лѣкарствамъ обращаются только тогда, когда уже всѣ аллопатическія средства были испробованы, или послѣ операціи, т. е. когда болѣзнь слишкомъ развилась. Большинство лицъ, болѣе или менѣе выдвинувшихся по своему образованію дальше чернаго народа, отвергаютъ дѣйствіе невѣдомыхъ атомовъ на организмъ человѣческій, а между тѣмъ вѣра въ аллопатію не спасаетъ ихъ, только подвергаетъ калѣченію или изуродованію, и страшась преждевременной смерти они прибѣгаютъ къ электро-гомеопатіи, когда нужно было съ нея начать.

Предупредительное лѣченіе.

Когда можно опасаться предрасположенія къ раковому заболѣванію, то слѣдовало бы начать лѣченіе съ самой юности. Предлагаемое лѣченіе очень просто, и можетъ быть исполнено людьми, даже очень занятыми. Оно состоитъ въ употребленіи внутрь одинъ разъ въ день пяти сух. круп. *S. G.*, и въ теченіе пяти недѣль весною и пяти — осенью пить ежедневно одинъ стаканъ *C.* 1 (1-й ст.) по маленькимъ глоткамъ.

Это лѣченіе можно примѣнить во всякомъ возрастѣ. Но

Digitized by Google

время, болѣе подходящее для мужчинъ—это въ началѣ сороковыхъ годовъ и для женщинъ около 35 л., и точно также въ періодѣ критическаго возраста, въ теченіе котораго надо предупреждать маточные приливы пріемомъ *A.* 1 (2—3-й ст.), которое въ этомъ случаѣ принимаютъ попеременно съ *C.* 1. Продолжительность этого лѣченія опредѣляется въ 3 или 4 года, чтобы организмъ могъ вполнѣ освободиться отъ болѣзнетворныхъ началъ, которыя неминуемо могутъ развиться позже подъ видомъ *рака* или *опухолей*, *затвердѣній*, *полиповъ* и пр.

Въ каждомъ семействѣ, въ которомъ оказалось заболѣваніе ракомъ со стороны матери или отца, мать во время каждой своей беременности должна бы принимать каждое утро 1 круп. *A.* 3, каждый вечеръ 1 круп. *C.* 1, въ теченіе же дня передъ кушаньемъ 5 круп. *S.* 1 или *S. G.* То же самое должно бы практиковаться во всѣхъ семействахъ, одержимыхъ наслѣдственнымъ предрасположеніемъ къ золотухѣ, чахоткѣ, подагрѣ, ревматизму и проч. и такимъ образомъ можно способствовать рожденію на свѣтъ дѣтей съ болѣе здоровой организаціей.

Если, по невѣдѣнію, указанный способъ предупрежденія болѣзни упущенъ былъ со стороны матери, то по крайней мѣрѣ родившемуся младенцу слѣдуетъ давать, въ теченіе не менѣе года, каждое утро 1 круп. *A.* 1, днемъ 1 круп. *S. G.* и вечеромъ 1 круп. *C.* 1.

Общія правила лѣченія рака.

Раковыя опухоли, какъ мы уже сказали, имѣютъ разнообразные виды. Но изобрѣтатель электро-гомеопатіи различаетъ только два вида: *первый видъ*, когда теченіе рака настолько быстро, что никакое лѣченіе не можетъ исправить глубокой порчи лимфы и крови, отъ которыхъ этотъ ракъ происходитъ, и *второй*—когда теченіе болѣзни болѣе или менѣе медленно и допускаетъ это исправленіе. Что же касается до перваго вида, электро-гомеопатія только облегчаетъ страданія. Второй же—она вылѣчиваетъ.

Ракъ съ медленнымъ теченіемъ представляется въ трехъ видахъ:

Digitized by Google

1) *Опухоль закрытая*, твердая или мягкая.

2) *Опухоль, начинающаяся гноиться.*

и 2) *Опухоль нагноившаяся* или раковая язва.

Первый видъ излѣчивается всегда, второй — довольно затруднительно, третій—никогда или очень рѣдко и тѣмъ труднѣе его излѣченіе, чѣмъ обширнѣе и старѣе его язва.

Отъ какой бы причины ракъ не происходилъ, съ него прямо слѣдуетъ начинать лѣченіе.

Одно изъ первыхъ условій лѣченія заключается въ отдѣленіи раковой опухоли отъ ея основанія и въ размягченіи. Это достигается употребленіемъ внутрь *Canceroso* 1, съ котораго всегда слѣдуетъ начинать лѣченіе, потому что оно въ большинствѣ случаевъ давало наилучшіе результаты. Первоначально оно какъ бы усиливаетъ болѣзнь, но по мѣрѣ насыщенія организма улучшеніе начинаетъ проявляться. Усиленіе болѣзни, если оно оказалось, продолжается приблизительно около недѣли.

Если *C.* 1, испробованное въ разныхъ дозахъ, не произвело ожидаемаго дѣйствія, или если это дѣйствіе прекратилось, или оно существуетъ, но уже не въ той степени, то его замѣняютъ другимъ Канчерозо.

Здѣсь представляется разрѣшенію вопросъ: какъ распознать то, что то или другое Канчерозо не производитъ достаточнаго дѣйствія и которымъ изъ другихъ Канчерозо его слѣдуетъ замѣнить? Для этого имѣть въ виду, что когда дѣйствіе одного изъ Канчерозо пріостановилось, то пробуютъ возстановить это дѣйствіе болѣе слабою дозою, чѣмъ та доза, которую до того времени давали. Въ случаѣ неуспѣха, замѣняютъ растворъ десятью сухими крупинками того же Канчерозо, 3 или 4 раза въ день, но только въ продолженіе нѣсколькихъ дней. Если этимъ способомъ удалось направить болѣзнь къ улучшенію, то немедленно принимаютъ изъ 1-го или 2-го стакана именно ту дозу, при которой было замѣчено, что дѣйствіе лѣкарства пріостановилось; въ противномъ случаѣ это моментъ для замѣны Канчерозо однимъ изъ его одноименныхъ: *C*, 4 послѣ *C.* 1 или *C.* 2 и *C.* 5 послѣ *C.* 4 или *C.* 6.

Digitized by Google

При этомъ нужно замѣтить, что *С.* 5 одно изъ тѣхъ Канчерозо, которое рѣже даютъ внутрь въ растворѣ, но преимущественно по 10 сухихъ крупин. съ пищею. Тогда какъ при наружномъ употребленіи оно предпочитается прочимъ при совокупномъ употребленіи другихъ его одноименныхъ или Анжіоитико.

Общее правило, на которомъ мы остановились, и которое лучше всего удается въ особенности въ *упорныхъ случаяхъ*, слѣдующее:

1) Разнообразить насколько возможно и при томъ методически какъ внутреннее, такъ и наружное лѣченіе посредствомъ Канчерозо, давая каждое изъ нихъ въ продолженіе 7 или 14 дней, и возвращаться постоянно къ предъидущимъ одноименнымъ, которыя были оставлены.

Это правило имѣетъ исключеніе и непримѣнимо въ томъ случаѣ, если хотя ничтожное хорошее дѣйствіе одного изъ Канчерозо легко замѣчается у больныхъ, которые имѣютъ большую воспріимчивость къ этимъ лѣкарствамъ. Въ этомъ случаѣ продолжаютъ лѣченіе тѣмъ же лѣкарствомъ, пока оно приноситъ пользу и мѣняютъ его тогда, когда дѣйствіе его прекратилось. Это послѣднее правило примѣнимо въ тѣхъ случтяхъ, когда существуетъ незначительная воспріимчивость больного къ лѣкарству, или когда дѣйствіе одного изъ Канчерозо не можетъ быть сразу замѣчено.

2) Соединить при внутреннемъ и наружномъ лѣченіи дѣйствіе двухъ Канчерозо одновременно, давая напр. внутрь: одно по 5 или 10 сухихъ крупинокъ только утромъ или вечеромъ, а другое въ растворѣ; наружно примѣнять одинъ день одно, на другой день другое Канчерозо всѣми возможными способами, о которыхъ сказано ниже. При внутреннемъ лѣченіи можно одинаково разнообразить два Канчерозо, давая внутрь въ сухихъ крупинкахъ то, которое въ продолженіе нѣсколькихъ дней употреблялось въ растворѣ и наоборотъ.

3) Когда въ болѣзни послѣдовало замѣтное улучшеніе, но таковое часто останавливается и ракъ упорствуетъ лѣченію, то его можно вывести изъ этой неподвижности либо употреб-

Digitized by Google

леніемъ отъ 20 до 30 сухихъ крупинокъ *C.* 5 въ одинъ пріемъ— дозу, которую можно повторять нѣсколько дней — и увеличеніемъ наружныхъ дозъ; либо же примѣненіемъ *Verm.*, которое употребляютъ во всѣхъ упорныхъ болѣзняхъ на томъ основаніи, что если есть присутствіе глистовъ, то они парализуютъ дѣйствіе внутр. лѣкарствъ. Въ этомъ случаѣ принимаютъ утромъ и вечеромъ по 10 круп. *Verm.* въ рюмкѣ воды въ одинъ пріемъ, продолжая при томъ принимать *Канчерозо* и *Анжіоитико.* Точно также получались хорошіе результаты отъ примѣненія *V.* При лихорадкѣ примѣняется *F.* 1.

Ракъ, будучи скорѣе болѣзнью сангвиниковъ и лифматико-сангвиниковъ, всегда сопровождается неправильностями въ кровообращеніи, противъ которыхъ нужно примѣнить *Ang.* Это послѣднее даютъ вн. попер. съ *Canc.* При кровотеченіяхъ *Ang.* употребляютъ наружно различнымъ образомъ, а также и на сердце, въ прим. или мази, при значительной неправильности кровообращенія.

А потому примѣрно *внутреннее лѣченіе* будетъ состоять изъ *A.* 1 × *C.* 1 (2-й ст.), по полстакана каждаго ежедневно; каждый часъ по 1 сухой кр. *C.* 4, и передъ завтракомъ и обѣдомъ по 5 сухихъ кр. *C.* 4. Если больной при этомъ жалуется на несвареніе желудка или на слабость, то принимать натощакъ, послѣ завтрака и обѣда по 5 сухихъ кр. *S.* 1. Такъ продолжать цѣлый мѣсяцъ. Если *C.* 1 по истеченіи мѣсяца мало дѣйствуетъ, то принимать *A.* 2 и *C.* 5 (2-й ст.), кромѣ того каждый часъ по 1 сухой кр. *C.* 5 по 10 сухихъ кр. *C.* 1 съ виномъ или безъ онаго за завтракомъ и обѣдомъ.

Наружное лѣченіе. Втирать въ закрытую опухоль мазь изъ 20 кр. *C.* 5 на унцію глицерина (послѣдній лучше всасывается въ тѣло, чѣмъ жиръ или вазелинъ); на область сердца мазь *A.* 3, на подвзд. мазь *F.* 2, на 6 гл. точ. и на нервы, соотвѣтствующіе опухоли, *Эл. Кр.* × *Желт.*, каждое изъ этихъ средствъ по 3 раза въ день и на темя утромъ 5 капель *Эл Бѣл.* Кромѣ того на закрытую опухоль прикладывать один разъ въ день кусочекъ полотна, смоченный съ *Эл. Кр.*, на него наложить большой компрессъ, намоченный въ раствор

20 кр. *С.* 5 на стаканъ воды, сверхъ того наложить клеенку и укрѣпить бандажемъ.

Лѣкарства, признанныя производящими хорошее дѣйствіе, должны быть употребляемы не только внутрь, но еще и наружно всѣми возможными способами; то-есть: въ компрессахъ или примочкахъ, обмываніяхъ, спринцованіяхъ, впрыскиваніяхъ, втягиваніяхъ, полосканіяхъ, пульверизаціяхъ, клистирахъ, мазяхъ и въ особенности въ ваннахъ.

Изъ этихъ способовъ выбираютъ только тотъ, который лучше соотвѣтствуетъ больному органу.

Доза для внутренняго употребленія должна быть слабая, потому что ракъ—болѣзнь тяжелая. Слабыя дозы необходимы для женщинъ вслѣдствіе чрезвычайной чувствительности ихъ организма. Точно такъ же слабыя дозы лучше соотвѣтствуютъ городскимъ жителямъ, чѣмъ сельскимъ [1]). Впрочемъ, для дозъ никакое общее правило не можетъ замѣнить *опытъ;* безконечное разнообразіе организмовъ всегда порождаетъ непредвидѣнныя исключенія. Тотъ же опытъ необходимъ при перемѣнѣ лѣкарствъ и для различныхъ способовъ ихъ примѣненія въ упорныхъ и застарѣлыхъ случаяхъ.

Вообще можно сказать, что доза, которая чаще всего приноситъ пользу, не производя ни малѣйшаго ухудшенія—это 2-й стак., иногда 3-й ст., какъ для *Canc.* такъ и для *Ang.* Само собою разумѣется, что *Ang.* можетъ иногда соотвѣтствовать только въ 3-мъ ст., тогда какъ *Canc.*—во 2-мъ ст.

При сильной боли надо ослабить на день или на два внутрен. дозы и точно такъ же разбавить и наружныя дозы, и затѣмъ вновь усилить тѣ и другія, какъ только боль успокоится. Всякая доза, которая, вмѣсто успокоенія и облегченія страданій больного, вызываетъ и усиливаетъ ихъ въ какой бы то ни было степени, должна быть немедленно уменьшена. Облегчающая доза будетъ всегда слѣдующая по разведеніи за той, которая усилила. (Ср. еще въ 1-ой части: дифференціальныя свойства при кажд. серіи лѣкарствъ, особенно же гл. IV).

---

[1]) У деревенскихъ женщинъ раковая опухоль въ грудяхъ проходила въ теченіе 3—6 недѣль отъ *Canc.* изъ 1-го ст.

Digitized by Google

Электро-гомеопатическія жидкости должны быть также употреблены при лѣченіи рака, примѣняя, попеременно, преимущественно тѣ, которыя болѣе соотвѣтствуютъ темпераменту больного и его болѣзни.

Эл. Бѣл., *Анж.* и *Зел.* всегда можно прикладывать въ компрессахъ на язвы, и это почти всегда съ пользою, въ особенности *Зеленое* противъ боли въ раковой язвѣ. Это последнее вмѣстѣ съ тѣмъ помогаетъ излѣченію.

Можно прикладывать съ пользою *Эл. Кр.* попер. съ *Желт.* на нервы, соотвѣтствующіе раковой опухоли или язвѣ и на 6 гл. точ. Это послѣднее приложеніе даетъ всегда хорошіе результаты, въ особенности при выздоравливаніи.

Наружныя лѣкарства, кромѣ ваннъ, употребляются обыкновенно утромъ и вечеромъ и даже чаще, смотря по необходимости и по производимому ими дѣйствію.

Обмыванія язвъ производятся при каждой перевязкѣ, отъ 4 до 5 разъ въ сутки. Столько же разъ мѣняютъ и примочки, которыя дѣйствуютъ только пока они влажны. Язвамъ и ранамъ болѣе соотвѣтствуютъ примочки, чѣмъ мази, которыя лучше дѣйствуютъ на закрытыя опухоли.

Для обмыванія язвъ гораздо лучше употреблять пульверизаторъ съ постояннымъ орошеніемъ.

Когда язва подвержена кровотеченію, то перевязку дѣлаютъ слѣдующимъ образомъ: растворяютъ 15 круп. *А.* 2 въ полустаканѣ комнатной воды, и начинаютъ этимъ растворомъ пульверизовать прежнюю перевязку, прилипшую къ язвѣ, до тѣхъ поръ, пока она свободно не отдѣлится. Такимъ образомъ обнаженную поверхность язвы пульверизуютъ этимъ растворомъ, чтобы ее очистить отъ кусковъ запекшейся крови, гноя и частичекъ язвы, отдѣляющихся отъ внутренняго употребленія лѣкарствъ. При этой операціи стараются пропульверизовать этимъ растворомъ всѣ пазушины и всѣ впадины, изъ которыхъ сочится кровь. Когда это сдѣлано, то на язву прикладываютъ компрессъ изъ мягкой марли, смоченный въ *Эл. Анж.*, стараясь, чтобы онъ проникъ во всѣ малѣйшія извилины, изъ которыхъ течетъ кровь, и на него накладываютъ

Digitized by Google

большой компрессъ, намоченный въ растворѣ 20 круп. *C.* 5 на стаканъ воды, затѣмъ укрѣпляютъ бандажемъ, предупреждающимъ передвиженіе компрессовъ и вмѣстѣ съ тѣмъ всякое давленіе.

Если нева не подвержена кровотеченію, то *A.* въ этомъ случаѣ не нужно, а употребляютъ для пульверизаціи одно *C.* 5, въ той же дозѣ; послѣ пульверизаціи на раковую язву прикладываютъ компрессъ изъ *Эл. З.* и на него накладываютъ большой компрессъ, намоченный въ растворѣ *C.* 5, какъ выше сказано.

При ракѣ могутъ появиться три вида боли: *колющія боли*, свойственныя раку и всегда облегчаемыя *Эл. Зел.*, которое прикладываютъ въ компрессахъ или на раковую опухоль или на болящія мѣста раковой язвы; *невралгическія боли*, грызущія, появляющіяся въ одинъ и тотъ же часъ, противъ которыхъ употребляютъ *Эл. Бѣл.*, кромѣ того внутрь во всякомъ случаѣ *F.* 1 (2-й ст.); наконецъ боли, зависящія отъ прилива крови, жгучія съ яркимъ окрашиваніемъ кожи, проходятъ отъ примочекъ *A.* 2.

Ванны общія на все тѣло съ *C.* 5 и *A.* 2 или *A.* 3 могутъ быть повторяемы отъ одного раза въ недѣлю до одного раза въ день, смотря по произведенному ими дѣйствію и силамъ больного; при нервномъ раздраженіи, время отъ времени, полезны ванны съ *F.* 2, которыя значительно успокоиваютъ.

При лѣченіи нѣкоторыхъ видовъ застарѣлаго рака удавалось возстановить силы больного, возбудить аппетитъ и дать новый толчекъ замедлившемуся излѣченію *обтираніями* тѣла спиртно-воднымъ растворомъ соотвѣтствующ. лѣкарствъ въ слѣдующей пропорціи: 15—25 круп. на 1 унц. винн. спирта и 3 унц. воды, съ 30 капл. до 1 чайн. л. электр. жидкости.

Видимые признаки улучшенія болѣзни заключаются въ слѣдующемъ:

Раковая опухоль становится меньшею, менѣе твердою, менѣе приросшею, и менѣе окрашенной; она становится подвижнѣе, разбивается, уменьшается и наконецъ совершенно исчезаетъ. Колющія боли проходятъ первыми.

Digitized by Google

Язва теряетъ свой запахъ, боли уменьшаются и затѣмъ совершенно проходятъ. Цвѣтъ язвы постепенно переходитъ изъ темнаго въ красный, потомъ въ розовый. Куски раковой язвы отдѣляются и отпадаютъ при каждой перевязкѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ края язвы опускаются, сравниваются и смягчаются. Отдѣляемое язвы постепенно становится болѣе густымъ, желтоватымъ или розовымъ [1]). Новая ткань (мясо) начинаетъ образовываться въ глубинѣ язвы, которая постепенно пріобрѣтаетъ признаки обыкновенной раны, съ наклонностію къ заживленію.

Иногда не мѣшаетъ взвѣшиваться на вѣсахъ: прибавленіе въ тѣлѣ вѣса служитъ вѣрнымъ признакомъ улучшенія здоровья.

Пока это благодѣтельное и возстановляющее дѣйствіе продолжается, то имѣютъ очевидное доказательство, что лѣкарство дѣйствуетъ, и потому должно остерегаться что либо измѣнять въ лѣченіи и въ особенности прерывать хотя бы на одинъ день.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ (при ракѣ на женской груди, на губѣ и на маткѣ), раковая опухоль отпадаетъ цѣлымъ кускомъ, вмѣсто того, чтобы отдѣляться по частямъ.

Бываютъ и такіе случаи, когда ракъ кажется почти вылѣченнымъ, но вдругъ получаетъ новую силу, тогда надо уменьшить дозы, или употребить другія противораковыя средства.

Наконецъ, бываютъ еще случаи, когда рана очищается и ходъ болѣзни, повидимому, вполнѣ обѣщаетъ выздоровленіе; но вдругъ наступаетъ общее истощеніе и больной умираетъ съ раною, готовою зажить. Это случается тогда, когда къ Электро-Гомеопатіи обратились слишкомъ поздно, когда масса крови слишкомъ заражена и больной истощается до окончанія излѣченія.

Послѣ излѣченія рака, какъ и послѣ всякаго другого выздоровленія, *необходимо продолжать лѣченіе* тѣмъ болѣе продолжительно, чѣмъ болѣе болѣзнь была тяжела и застарѣла.

---

[1]) Пока нагноеніе изобильно и въ особенности густо, то всегда есть надежда на выздоровленіе. Но эта надежда становится сомнительною, когда нагноеніе становится жидкимъ, какъ вода.

Digitized by Google

Не должно забывать, что ракъ есть признакъ глубокаго пораженія организма, даже тогда, когда онъ въ самомъ началѣ своего образованія и не обнаруживается никакими внѣшними признаками. Онъ даже наслѣдственъ, но проявляется, по большей части, только на 40 или 50 году жизни. Слѣдовательно не удивительно, что нужно очищать организмъ еще долгое время послѣ видимаго исчезновенія болѣзни. Съ застарѣлымъ ракомъ приходится бороться весьма долго и если больные преклоннаго возраста, то лѣченіе ихъ должно продолжаться всю жизнь, по крайней мѣрѣ въ пріемахъ сухихъ круп. *Scrof.* и *Canc.*

Изъ всѣхъ этихъ правилъ, самое важное заключается въ лѣченіи рака въ самомъ его началѣ, когда онъ представляется въ видѣ опухоли или подозрительнаго нагноенія. Чѣмъ скорѣе приступятъ къ лѣченію, тѣмъ скорѣе онъ побѣждается.

Приведемъ еще нѣсколько общихъ замѣчаній къ лѣченію рака и о діэтѣ изъ извѣстной книги по Электро-Гомеопатіи д-ра *Hewser*'а.

«Въ случаяхъ, особенно—запущенныхъ, главное, что ускоряетъ роковой конецъ, это—сильныя, упорныя боли и постоянная безсонница, являющаяся слѣдствіемъ этихъ болей. Боли, являющіяся въ первой стадіи рака, очень легко предупреждаются или устраняются электрогомеопатич. лѣкарствами. Если же больные приступаютъ къ этому лѣченію лишь въ дальнѣйшей стадіи болѣзни, то не всегда удается вполнѣ побороть часто столь ужасныя боли, которыя уже сами по себѣ способны изнурить и безъ того уже ослабленныхъ больныхъ. Долгъ человѣколюбія заставляетъ насъ въ такихъ случаяхъ не отворачиваться совсѣмъ отъ болеутоляющихъ палліативныхъ средствъ. Къ морфію и опію прибѣгать не слѣдуетъ, однако, ни въ какомъ случаѣ, такъ какъ средства эти безусловно вредны для общаго состоянія организма, наоборотъ же безвредными утоляющими боль и дающими сонъ средствами надо считать препараты, получаемые фабричнымъ путемъ изъ каменнаго угля. Къ таковымъ относятся, напримѣръ, *Фенацетинъ* и *Тріоналъ*. То и другое всего удобнѣе принимать въ

Digitized by Google

видѣ таблетокъ въ $2^1/_2$ грана. При сильной боли принимать 2 таблетки *Фенацетина*, запивая водой. Обыкновенно боль проходитъ уже спустя 10—15 мин. послѣ пріема; въ крайн. случ. можно этотъ пріемъ повторить и 2 и 3 раза. Фенацетинъ въ такихъ дозахъ не только не вреденъ, но онъ даже укрѣпляющимъ образомъ дѣйствуетъ на сердце и нервы, улучшаетъ даже аппетитъ и пищевареніе, даетъ также и сонъ. Лишь въ исключительныхъ случахъ приходится, вмѣсто Фенацетина, прибѣгать къ Тріоналю, который принимается въ тѣхъ же дозахъ. Рядомъ съ этими средствами можно и должно продолжать электрогомеопатическое лѣченіе внутреннее и наружное». При всѣхъ формахъ раковыхъ заболѣваній заботиться о правильномъ ежедневномъ испражненіи на низъ (въ случаѣ надобности— клистиры, см. *Запоръ*).

Что касается *діэты*, то самую лучшую пищу для больныхъ, страдающихъ ракомъ, составляетъ свѣжее молоко или пахтанье, также зрѣлые свѣжіе фрукты, нѣжные овощи, хорошій пшеничный хлѣбъ съ масломъ или медомъ. Мясной бульонъ и нѣжное не жирное мясо, особенно—курятина (не утка и не гусь), заяцъ, также говядина и дичь. При ракѣ желудка или пищевода питаніе часто очень затруднительно. Въ такихъ случаяхъ ставить черезъ каждые 4 часа питательный клистиръ, состоящій изъ одного яичнаго желтка, крѣпкаго мясного отвара и чайной ложки коньяку. Запрещены должны быть кофе, пиво, вино и водка.

Изложивъ общія правила лѣченія рака, мы здѣсь укажемъ на лѣкарства, которыя употребляются въ частныхъ, отдѣльныхъ случаяхъ раковыхъ заболѣваній.

Ракъ желудка (см. *Желудокъ, болѣзни желудка*). Вн. и нар. въ прим. или мази *C.* 1 × *A.* 1 или мазь *C.* 5 и *A.* 2 (даже на язву).

Ванны: *C.* 5, *A.* 2, *S.* 1, *S.* 5, тоже съ *Эл. Б.*, *Зел.*, *Кр.* или *Анж.* На соотвѣтствующій нер. и на 6 гл. точ. *Эл. Кр.* попер. съ *Желт.* На язву, при боли, компр. *Эл. Зел.* и еще *Эл. Бѣл.* На подвзд. мазь прим. *F.* 2 или *C.* 5.

Въ частности должно лѣчить:

Digitized by Google

Ракъ желудка или пищевода (см. *Желудокъ, болѣзни желудка*). Вн. и нар. въ прим. или мази *C.* 1 попер. съ *A.* 1 и 3 или *A.* 1 или *A.* 3 (3-й ст.) въ первую половину дня, *C.* 1 (3-й ст.) во вторую половину дня, и также по 1 круп. сухой параллельно съ однимъ и другимъ изъ этихъ средствъ. При повышен. нервн. раздражительности лучше начать съ высшаго разведенія (4-й стак.) и вмѣсто *C.* 1 употреблять *C.* 10. Если въ жидкомъ видѣ лѣкарства плохо переносятся, то принимать ихъ лишь сухими крупинками или въ растираніяхъ (см. стр. 87). При сильн. боли—черезъ каждыя 5—10 мин. брать вн. по 5—10 кап. *Эл. Бѣл.* въ чайн. лож. воды. При рвотѣ кровью или темными массами брать *Эл. Анж.* 5—10 капель въ двухъ унціяхъ ледяной воды. *Наружно* на болѣзнен. область желудка прилож. *Эл. Зел.* и компрессы изъ *A.* 2 и *C.* 5.

Такъ же въ общемъ лѣчится *ракъ печени* или *селезенки* только еще съ прибавл. *F.* 1 вн. и *F.* 2 наружно.

При *ракѣ почекъ* или *мочевого пузыря* то-же лѣченіе, только вмѣсто *C.* 1, или рядомъ съ нимъ, примѣняется *C.* 6.

Ракъ кишекъ лѣчится какъ ракъ желудка.

Ракъ прямой кишки лѣчится вообще какъ ракъ матки (см. ниже).

Ракъ языка или губъ или гортани, равно какъ и эпулисъ (ракообразное новообразованіе на деснѣ или челюсти). Въ началѣ болѣзни *A.* 1 × *C.* 1, при ракѣ *гортани*—съ самаго же начала *C.* 4. Обмываніе опухоли и полосканіе изъ раствора 20 круп. *A.* 2 и *C.* 5 и 1 ч. л. *Эл. Зел.* въ стак. воды. Параллельно принимать *A.* 3 и *C.* 1 сухими круп., кажд. часъ по 1 круп. При ракѣ *губы*—вм. *C.* 1 примѣнять *C.* 3 или *Lord.* Кромѣ того 3 раза въ день по 5 круп. *S.* 1 или, при пораженіи и печени, *S.* 5.

Ракъ грудной железы. При первомъ появленіи затвердѣнія, если ракъ не наслѣдственный, давать въ первую недѣлю *L.* изъ 3-го стак., во вторую недѣлю—*L.* изъ 2-го стак., въ 3-ю недѣлю—*L.* изъ 1-го стак. и 3 раза въ день по 5 круп. *L.* послѣ ѣды; въ грудь слегка втирать мазь *L.* и раза 3 въ недѣлю брать теплую ванну также съ *L.*

Digitized by Google

Если же ракъ несомнѣнно наслѣдственнаго происхожденія или, если послѣ 3-недѣльнаго употребленія *L.*, вн. и нар., опухоль не уменьшилась значительно, а тѣмъ болѣе увеличилась и уже имѣется краснота и боль, тогда принимать *A.* 1 или *A.* 3 × *C.* 1 (3-й стак.), а въ грудь съ большой осторожностію втирать утр. и веч. мазь *Анж.* или *C.* 5. Послѣ втиранія покрыть грудь фланелью и не носить никакого тѣснаго платья. Если бы, не смотря на это лѣченіе, боль усилилась, то покрывать всю грудь 2 раза въ день тонкой полотняной тряпочкой съ *Эл. Зел.*, а поверхъ нея — компрессъ изъ раствора по 15 круп. *A.* 2 и *C.* 5 съ 30 — 40 каплями *Эл. Зел.* въ стак. воды; компрессъ этотъ черезъ каждыя 15—30 минутъ смачивать указаннымъ растворомъ, наново мѣняя его лишь 1—2 раза въ день. Параллельно съ разведеніями принимать тѣ же лѣкарства въ сухомъ видѣ, также попеременно по 1 круп. на пріемъ и кромѣ того 3 раза въ день по 5 круп. *S.* 1 послѣ ѣды (при одновременномъ страданіи печени—*S.* 5 вмѣсто *S.* 1). Тепл. ванны съ *C.* 5.

При болѣе сильномъ развитіи рака грудной железы, но при отсутствіи еще язвъ, лѣченіе то же, какъ въ началѣ. Если же значительныя язвы уже образовались и имѣется гнойное или сукровичное выдѣленіе, тогда требуется выполненіе слѣдующихъ трехъ задачъ: *содержать язву въ крайней чистотѣ, производить надлежащую перевязку ея и примѣнять аккуратнѣйшимъ образомъ электрогомеопатич. средства.*

1—2 раза въ недѣлю брать теплую ванну; язву съ помощью ирригатора (эсмарх. кружка) или резиноваго шприца обмывать 2—3 раза въ день тепловатой водой, на литръ которой берутъ 1 чайн. ложку *Эл. Зел.* Затѣмъ обсушиваются края язвы (но не сама язва). Если язва имѣетъ гнилостный запахъ, тогда къ указанному раствору прибавлять 10 круп. *C.* 5 или *C.* 4. Затѣмъ на язву положить тонкую льняную тряпку, смоченную *Эл. Зел.* и смѣняемую утр. и веч. (при обильномъ выдѣленіи даже чаще), а надъ нею большіе компрессы изъ того же раствора, какъ для первоначальнаго новообразованія (см. выше—стр. 432); компрессы намачиваются

Digitized by Google

каждые 3—4 часа или же наново мѣняются, если гнойное выдѣленіе очень обильно. Если язва кровоточитъ, то вм. *Эл. Зел.* примѣнять *Эл. Анж.*, причемъ смоченную ею тряпку не удалять насильно (не отрывать), а ждать, пока сама отдѣлится (во избѣжаніе возобновленія кровотеченія). Кровотеченіе останавливается также отъ приложенія раствора 20 круп. *A.* 2 въ стаканѣ воды. Устранять запоры. Противъ безсонницы—*Эл. Бѣл.* вн. и на подошвы ногъ, и каждый вечеръ передъ отходомъ ко сну растворъ изъ 2 круп. *Verm.* или *S.* 1 или *F.* 1 въ рюмкѣ горячей воды, глоточками. При болѣе сильной боли въ язвѣ, большіе компрессы отставить, а на тряпку съ *Эл. Зел.* накапывать послѣднее каплями; если причина боли обильное скопленіе гноя, то совсѣмъ наново сдѣлать перевязку. Само собой разумѣется, что удерживается компрессъ на груди цѣлесообразно наложеннымъ (черезъ плечи) широкимъ бинтомъ. Внутрь даются тѣ же средства, какъ и при первоначальномъ затвердѣніи (см. стр. 439).

Въ послѣдней стадіи рака грудной железы, когда уже имѣется общій упадокъ питанія и силъ, когда боли уже необычайно сильны, когда больная лишена всякаго аппетита и сна, тогда лѣченіе является уже очень трудной задачей и состоитъ въ общемъ изъ тѣхъ же примѣненій, которыя приведены выше для первыхъ стадій грудного рака. Начинать лѣченіе съ 3-го разведенія указанныхъ лѣкарствъ и постепенно переходить къ болѣе низкимъ. Не всегда, однако, возможно еще теперь, въ этой стадіи болѣзни значительно облегчать страданія больной и продолжить жизнь, но, хотя рѣдко, но бывали излѣченія еще и въ этой стадіи. При крайнемъ упадкѣ силъ показано усиленное первое разведеніе. (О палліативахъ противъ болей и безсонницы см. выше стр. 437).

Ракъ матки и прямой кишки. Внутреннее лѣченіе то же, какъ при ракѣ грудной железы (см. выше). Если обильное съ дурнымъ запахомъ выдѣленіе изъ пораженной ракомъ матки не уступаетъ *C.* 1, то вмѣсто послѣдняго примѣнять *C.* 4, *C.* 5 или *C.* 3.

Наружно втирать въ животъ утр. и веч. зеленую мазь

Digitized by Google

(мазь *C.* 5) послѣ предшествующей каждый разъ сидячей ванны (тепловатой, негорячей), въ которой разводятся *C.* 5 и *A.* 2 по 20—30 круп. (при сильной боли съ чайн. ложк. *Эл. Зел.*). Послѣ каждой ванны спринцеваніе влагалища (при ракѣ матки) или промываніе прямой кишки (при ракѣ послѣдней) растворомъ изъ 10 круп. *C.* 5, *A.* 2 (при сильной боли и 1 чайн. л. *Эл. Зел.*) въ литрѣ воды, послѣ чего вводится шарикъ *C.* 5 при ракѣ матки или суппозиторій *C.* 5 при ракѣ прямой кишки. Противъ кровотеченія изъ раковой матки — тампоны съ *Эл. Анж.*, противъ кровотеченія изъ прямой кишки— суппозиторій *A.* 3. Во всякомъ случаѣ кровотеченія давать внутрь 1—5 капель *Эл. Анж.* въ чайн. лож. воды каждыя 10—30 минутъ.

Ракъ вѣкъ. Общее лѣченіе (см. выше) съ прим., пульвер., обмыван., маз., ван. и на глазные нер. *Эл. Зел.* или *Анж.*

Ракъ носа. Общее лѣченіе и прим., частыя втягиванія или пульвер. растворовъ *C.* 5, *A.* 2. Нар. компр. *Эл. Бѣл.* и *Зел.* и мази на носъ: *C.* 5, *S.* 5 или *A.* 2.

Въ прочихъ случаяхъ рака—общее лѣченіе (см. выше).

Излѣченія. Раковая опухоль въ правой груди у жен. 47 л. вслѣдствіе ушиба, существовавшая 27 лѣтъ; при наклоненіи изъ соска вытекалъ обильный жидкій гной, вся грудь твердая, колющія боли по временамъ. Предполагалась операція. Вылѣчена въ 6 мѣс. *C.* 1 × *S.* 1 (2-й ст.), прим. *S.* 5, ван. *S.* 5. На 6 гл. точ. *Эл. Кр.* (*C.*).

Совѣтъ черезъ корреспонденцію. — Раковая опухоль въ лѣвой груди твердая, величиною съ куриное яйцо, съ хронич. воспаленіемъ лѣваго яичника у женщ. 30 л. вылѣчена въ 1 годъ. *C.* 1 × *A.* 1 × *V.* (2-й ст.), на грудь и спину мазь *C.* 5 попер. съ *Эл. Анж.* (*C.*).

— У дѣв. 20 л. раковыя опухоли, существовавшія 4 года: въ лѣвой груди величиною съ воложскій орѣхъ, а въ правой— съ огурецъ средней величины, распространяющіяся въ подмышку, твердыя. Ея мать умерла отъ рака въ маткѣ послѣ операціи. Предполагалась операція. Отъ *S.* 1 × *A.* 1 × *C.* 1 (2-й и 3-й ст.), на грудь мазь *C.* 5 и ван. *C.* 1, *S.* 1, *A.* 1 опухоль въ лѣвой груди прошла, въ правой значительно уменьшилась, боли совершенно прошли (*C.*).

Digitized by Google

Число излѣченій раковыхъ опухолей въ женскихъ грудяхъ весьма значительно (*С.*).

— Раковая опухоль на маточной шейкѣ у женщ. 45 л., въ продолженіе 10 мѣс., съ сильными кровотеченіями и болью. Предполагалась операція. Вылѣчена въ 6 мѣс. *А.* 1 и *С.* 1 вн. и нар. (*С.*).

— Раковое затвердѣніе въ языкѣ у муж. 40 л. вылѣчено въ 1 мѣс. сухими круп. *А.* 2 попер. съ *С.* 1 и *S.* 5, полоск. изъ тѣхъ же лѣкарствъ и *Эл. Б.* (*С.*).

— Такое же затвердѣніе языка у ж. 27 л. вылѣчено въ 2 мѣс. *А.* 2 × *С.* 1 (1-й ст.) и полоск. *С.* 5 (*С.*).

— Ракъ нижняго вѣка вылѣченъ совершенно *С.* 1 вн. и нар.

— Скирръ въ желудкѣ у ж. 50 л., рвало отъ всякой пищи, даже отъ воды, твердая опухоль въ надбрюшіи, выпуклая, болящая. Вылѣчена въ 2 мѣс. *С.* 4 × *А.* 2 (*С.*).

— Совѣтъ черезъ корреспонденцію. — Ж. 25 л. лѣчилась сама 1 годъ отъ рака въ маткѣ *А.* 1 и *С.* 1, но безуспѣшно. Вылѣчена въ 8 мѣс. *С.* 5 × *А.* 3 и *Verm.* (1-й ст.), ван. *А.* 3 и *С.* 5, впрыск. *Эл. Анж.* (ч. л. на ст. воды) и компр. на животъ и промежность *Эл. Зел.* (*С.*).

— Раковая опухоль въ правой груди у ж. 30 л. весьма упорная, не подававшаяся обыкновенному лѣченію въ слабыхъ дозахъ, была вылѣчена въ 1 годъ: *С.* 1 × *А.* 3 × *Verm.* (1-й ст.), за завтракомъ по 10 кр. *С.* 5 и за обѣдомъ по 10 кр. *А.* 3 съ пищей; по одному разу въ день вн. по 5 капель то *Эл. Кр.*, то *Эл. Анж.*, то *Эл. Б.* въ ложкѣ воды и ван. изъ тѣхъ же лѣкарствъ попер. (*С.*).

Рана. Раной называется поврежденіе кожи (или слизистой оболочки) съ нарушеніемъ цѣлости ея и является слѣдствіемъ порѣза, удара, укола, ущемленія, укуса; кромѣ того раны бываютъ разорванныя и огнестрѣльныя. По характеру своему раны бываютъ чистыя или загрязненныя, свѣжія, кровоточащія или застарѣлыя, гноящіяся, изъязвляющіяся; въ послѣднемъ случаѣ говорятъ уже больше объ язвахъ, нежели о ранахъ.

Раны заживаютъ двумя различными способами, смотря по ихъ происхожденію и лѣченію: 1) путемъ сростанія краевъ

Digitized by Google

раны безъ нагноенія, такъ называемымъ *первымъ натяженіемъ* и 2) путемъ нагноенія и образованія мясисто-зернистой ткани (*вторымъ натяженіемъ*).

По первому способу заживаютъ, притомъ въ теченіе 1—3 сутокъ, обыкновенно только чистыя, гладкія раны отъ порѣза и не очень глубокаго укола, при условіи тѣснаго сближенія краевъ раны, въ противномъ случаѣ заживленіе идетъ медленно. Рана можетъ быть заражена или отравлена гнилостными грибками, носящимися въ воздухѣ, слѣдствіемъ чего можетъ быть рожистое воспаленіе, гнило-или гноекровіе (см. *Антоновъ огонь*).

Всякую рану слѣдуетъ основательно промыть прокипяченной водой, затѣмъ приложить компрессъ съ *Эл. Анж.*, поверхъ него—слой гигроскопической ваты и обвязать. При болѣе обширной ранѣ заживленіе идетъ гораздо быстрѣе, если края раны стянуть хирургическими швами, для чего надо обратиться къ врачу. Помощь послѣдняго необходима и въ случаѣ перерѣзки артерій, когда кровотеченіе не прекратится до тѣхъ поръ, пока перерѣзанная артерія не будетъ подлежащимъ образомъ перевязана.

Внутрь дается *A.* 1 (2-й ст.), для ускоренія заживленія—поперем. съ *S.* 1 (1-й ст.).

Воспаленіе раны лѣчится соотвѣтствующимъ образомъ (ср. *Антоновъ огонь*, *Нарывъ*, *Ракъ*, *Сифилисъ* и проч.).

Рвота и тошнота чаще всего бываетъ при болѣзни желудка и если при этомъ бываютъ неправильныя испражненія, то это указываетъ на разстройство желудка и кишекъ; причины могутъ быть и болѣе отдаленныя, какъ-то: завалы кишекъ, закупорка или заворотъ ихъ, беременность, сотрясеніе мозга или воспаленіе его, болѣзни печени, почекъ и проч.. Такимъ образомъ: 1) если тошнота и рвота привычны, то существуетъ органическое разстройство желудка и сосѣднихъ органовъ; 2) если при тошнотѣ и рвотѣ языкъ густо обложенъ и увеличенъ, и послѣ рвоты чувствуется улучшеніе, то это указываетъ на присутствіе въ желудкѣ трудноваримаго вещества, что также подтверждается и свойствомъ рвоты; 3) если пища

Digitized by Google

и питье извергаются рвотою тотчасъ по принятіи—это указываетъ на воспаленіе, раздраженіе или на непроходимость кишечника; 4) если тошнота и рвота сопровождаются внезапнымъ пароксизмомъ *судорожной боли* и внезапнымъ *прекращеніемъ дыханія*, то это указываетъ на раздражительность спазмодическаго свойства; 5) если эти два симптома являются утромъ и нѣтъ при этомъ указанія на раздраженіе желудка, то это служитъ признакомъ *каменной болѣзни*, и 6) если каждый день тошнитъ и рвотою извергается, преимущественно утромъ, слизистая жидкость безъ боли и припадковъ, сопровождающихъ болѣзни желудка, мозга, брюшины или матки, то такая рвота *нервнаго свойства*. Лѣченіе должно сообразоваться съ причиною, такъ: тошнота и рвота вслѣдствіе разстройства желудка и пищеваренія или нервнаго свойства прекращается у взрослаго пріемомъ вн. отъ 1 до 10 сух. круп. *S.* 1 или 5, или *S. G.* или *Anti-mal di mare*, и то же самое лѣкарство изъ 1-го ст.; въ упорномъ случаѣ попер. съ *F.* 1 (2-й ст.); при тошнотѣ и рвотѣ у беременныхъ женщинъ вн. 3—4 раза въ день по 5 сух. круп. *C.* 10 (см. *Беременность*). При рвотѣ отъ болѣзней мозга или печени, непроходимости кишекъ, глистовъ и отравленія, лѣченіе должно быть направлено противъ производящей причины.

Рвота кровью. Кровь, извергаемая рвотою, рѣдко бываетъ чистою, имѣетъ кислую реакцію или цвѣтъ кофейной гущи и болѣе или менѣе смѣшана съ желчью или съ пищею, количество ея различно, иногда выдѣляется сгустками. *Причины*: язва или ракъ желудка, отравленіе ѣдкими веществами, ушибъ, застой крови въ области воротной вены, болѣзнь печени и какъ предвѣстникъ легочной чахотки; рвота кровью бываетъ иногда при беременности или вслѣдствіе остановки регулъ, часто съ предшествующимъ спазмомъ желудка. Вн. *A.* 1 (2-й—3-й ст.), полоск. съ *Эл. Анж.* Клистиры *S.* 1. На ступни ногъ *Эл. Кр.* Для предупрежденія рвоты *A.* 1 × *C.* 1 (1-й ст.). Для избѣжанія послѣдствій ванны *A.* 2 и втирать въ позвоночн. столбъ *Эл. Кр.*

Рвота каломъ. См. болѣзни кишекъ.

Digitized by Google

Ревматизмъ *острый сочлененій* бываетъ слѣдствіемъ долгаго пребыванія въ сыромъ холодномъ воздухѣ. Почти одновременно съ болями въ одномъ или нѣсколькихъ сочлененіяхъ появляется потрясающій ознобъ, а затѣмъ и жаръ. Температура можетъ повышаться до 40° Ц.; пульсъ 80—100 ударовъ въ минуту; языкъ обложенъ обильнымъ налетомъ. Боли въ сочлененіяхъ или тупыя, дергающія или раздирающія, сверлящія. Снаружи сочлененій незамѣтно никакихъ измѣненій; а иногда бываетъ краснота кожи и припухлость всего сочлененія. Днемъ боли довольно еще сносны, но къ вечеру усиливаются, а ночью доходятъ до высшей степени. При остромъ ревматизмѣ сочлененій необходимо чаще изслѣдовать сердечную область по отношенію къ симптомамъ перикардита и эндокардита, или же больные сами должны обращать вниманіе на симптомы этихъ двухъ болѣзней, которыя могутъ появиться.

Хроническій ревматизмъ сочлененій образуется изъ остраго, по причинѣ несовершеннаго его излѣченія, или же развивается самостоятельно. Отъ остраго онъ отличается отсутствіемъ горячечнаго состоянія и болями, ожесточающимися только по временамъ. Нѣкоторые больные предчувствуютъ, вслѣдствіе начинающейся боли, дурную погоду. При хроническомъ ревматизмѣ слѣдуетъ удостовѣриться—нѣтъ ли здѣсь примѣси сифилиса.

Лѣченіе остраго ревматизма. При температурѣ 39½° Ц. общія теплыя ванны съ прибавл. 50—100 круп. *L.* или *C.* 5 и 1 или 2 чайн. лож. *Эл. Бѣл.* Лежаніе въ постели въ случаяхъ даже легко начинающихся и, по возможности потѣніе. Вн. *A.* 1 × *S.* 1 или *C.* 1 (3—2-й ст.) кажд. ¼—½ ч. по чайн. лож. и 3 раза въ день по 5 круп. *S.* 1. Втирать въ больн. суставы мази красной (*S.* 5) или зеленой (*C.* 5) или согрѣвающ. компрес. изъ раствора по 30 круп. *A.* 2 и *C.* 5 съ 1 или 2 ч. л. *Эл. Зел.* въ 4 стакан. воды. Часто полезны бываютъ горячіе компресы, а въ иныхъ случаяхъ, наоборотъ, больнымъ пріятнѣе возможно болѣе холодные. Надо поэтому сообразовываться съ индивидуальностію случая. Надо слѣдить за со-

Digitized by Google

стояніемъ сердца, заболѣваніемъ котораго остр. ревматизмъ часто осложняется. При малѣйш. непріятн. ощущеніи въ сердцѣ, смазывать область послѣдняго *Эл. Анж.* При лихорадкѣ *A.* 1 × *C.* 5 × *F.* 1 (3-й ст.).

Пища должна быть очень легкая, жидкая, но питательная. Вино и вообще спиртные напитки запрещаются. Заботиться о ежедневн. опорожненіи кишечника на низъ.

Если поражены только отдѣльные маленькіе суставы, то дѣлать мѣстныя теплыя ванны съ 25 круп. *L.* или *C.* 5 съ 1 чайн. лож. *Эл. Зел.* и смазывать ихъ повторно красной или зеленой мазью (мазью *S.* 5 или С. 5) съ *Эл. Кр.* или *Зел.*

Лѣченіе хроническаго ревматизма. Втирать красн. или зелен. мазью, мѣстныя или общія теплыя или паровыя ванны съ *L.* или *C.* 5. Вн. *A.* 3 × *C.* 1 или С. 4 (1-й стак.), при лихорадкѣ поперем. съ *F.* 1 (1-й ст.). Растворы можно доводить до 1-го усилен. разведенія. Въ упорн. случ. прибавить *V.* вн. и наружно.

При *сведенныхъ или тугихъ суставахъ* втиранія, ванны, согрѣв. компресы съ *L.* или *C.* 5 также *V.* Вн. лѣченіе, какъ при хронич. ревматизмѣ.

Перелойный ревматизмъ образуется внезапно и вызывается только трипперомъ мочевого канала; онъ также появляется внезапно послѣ употребленія въ большихъ дозахъ копайскаго бальзама въ самомъ началѣ гнойнаго уретрита; чаще поражаетъ суставы, рѣже мышцы и еще рѣже бедреные нервы. Болѣзнь обыкновенно ограничивается однимъ сочлененіемъ, преимущественно колѣннымъ. Принимая хроническую форму, этотъ ревматизмъ можетъ продолжаться мѣсяцы, иногда годы. Острая и хроническая форма этого ревматизма всегда сопровождается лихорадкою. При острой формѣ вн. *A.* 2 × *C.* 1 × *F.* 2 и на подвзд. *F.* 2, а при хронической формѣ тѣ же самыя лѣкарства, но вмѣсто *A.* 2 принимать *V.*, и на больныя мѣста втирать спиртъ *V.* или *S.* 5, или *C.* 5; ван. изъ этихъ же лѣкарствъ.

Ревматизмъ мышцъ характеризуется болью болѣе или менѣе острою, постоянною или измѣнчивою въ одномъ или нѣ-

Digitized by Google

сколькихъ мускулахъ и усиливающеюся черезъ сжиманіе больныхъ мышцъ. Этотъ ревматизмъ никогда не сопровождается ни опухолью, ни краснотою, ни жаромъ кожи, и оканчивается всегда разрѣшеніемъ. Но его продолжительность весьма различна, и онъ имѣетъ чрезвычайную наклонность къ возврату. Онъ можетъ поразить *мышцы всего тѣла*. Различаютъ по мѣсту нахожденія боли нѣсколько разновидностей, а именно:

1) *Ревматизмъ заднихъ мышцъ шеи* (torticolis) происходитъ отъ простуды, продолжительнаго неправильнаго положенія головы и проч., черезъ что движенія головы становятся невозможными, и она наклоняется на одну сторону.

2) *Ревматизмъ грудныхъ стѣнокъ* (pleurodynia) мѣняетъ часто самое мѣсто, усиливается отъ дыханія, кашля и въ особенности отъ поворотовъ тѣла; лихорадка отсутствуетъ. Не смѣшивать съ плевритомъ.

3) *Ломъ поясницы* (lumbago). Этотъ ревматизмъ характеризуется болью, которая занимаетъ одну сторону поясницы или обѣ сторонѣ одновременно, и не сопровождается ни опухолью, ни краснотою, ни жаромъ, и появляется обыкновенно вдругъ. Эта форма мышечн. ревматизма является часто на почвѣ хроническаго разстройства кишекъ, геморроя или катарра.

Противъ всякаго мышечнаго ревматизма вн. утр. и веч. по 5 сух. кр. *S.* 1, а въ теченіе дня *S.* 1 или *S.* 2 попер. съ *F.* 1 (2-й ст.); на больныя мѣста втираніе мази *F.* 2. Противъ ревматизма грудныхъ мышцъ вн. *A.* 2 (1-й и 2-й ст.) и втирать мазь *A.* 2. Прилож. *Эл.* жидкостей, растираніе, ванны съ *S.* 5, *C.* 5, *V.* Въ упорн. случ. *A.* 3 × *C.* 1 × *F.* 1 (2-й ст.) и 3 раза въ день по 5 круп. *S.* 1. Наружно *L.*, *S.* 5 или *C.* 5 съ *A.* 2.

Совѣты черезъ корреспонденцію.—М. 20 л., страдалъ долгое время перелойнымъ ревматизмомъ съ сильною болью въ колѣнѣ. Лѣкарства ему были назначены въ сухомъ видѣ, такъ какъ растворовъ не могъ принимать: *S.* 5, *A.* 2 и *V.* по одной кр. чрезъ полчаса попер. Утр. и на ночь вн. по 2 капли *Эл. Зел.* и ван. *S.* 5. Черезъ мѣсяцъ выздоровѣлъ.

— М. 40 л., страдалъ 9 л. сряду хрон. ревматизмомъ вслѣд-

Digitized by Google

ствіе сифилиса, жестокая боль въ ногахъ, преимущественно ночью, ночи безсонныя. Назначено утр. и веч. по 4 капли *Эл. Анж.*, въ теченіе дня *V.* × *S.* 1 и тѣ же кр. съ пищею; на соотв. нер. *Эл. Кр.* × *Ж.*, мазь *C.* 5, ван. *V.* × *C.* 5. Черезъ 4 мѣс. совершенно выздоровѣлъ (*C.*).

М. 45 л. страдалъ 2 мѣс. острымъ ревмат. въ сочлененіяхъ, лежалъ, и отъ боли не могъ двигать ногами. Вылѣченъ въ 2 нед. сухими кр. *S.* 1, сперва по 1, а потомъ по 2 утр. и веч. и *Эл. Кр.* на 6 гл. точ., бедр. и берц. пер. (*C.*).

Совѣтъ черезъ корреспонденцію. М. 50 лѣтъ болѣлъ 15 лѣтъ хронич. ревмат. въ ногахъ, боль усиливалась при всякой перемѣнѣ погоды. Вылѣченъ въ 3 мѣс. Вн. *V.* попер. съ *S.* 5 и *A.* 2 (2-й ст.), на нерв. *Эл. Зел.* и ванны: *S.* 5, *C.* 5 и *V.* попер. (*C.*).

— Упорный ревматизмъ съ подагрою у м. 55 л., страдавшаго около 8 лѣтъ, вылѣченъ въ 4 мѣс. смѣсью *S.* 1, *C.* 1, *A.* 1 и *V.* изъ 3-го ст. и ван. изъ тѣхъ же лѣкарствъ (*C.*).

Число излѣченій ревматизма безчисленно.

Родимыя пятна. При простыхъ пигментныхъ пятнахъ оказывается полезнымъ настойчивое примѣненіе главныхъ электрогомеоп. лѣкарствъ и въ различныхъ нумерахъ (*Анж. Скроф.* и *Канч.* (3-й ст. и нисш. развед.) попеременно. Наружно *Эл. Анж.*, также *A.* 2.

Ротъ. Отверстіе рта образуется *верхнею и нижнею губами;* обѣ губы соединяются въ *углахъ рта.* Если открыть ротъ и оттянуть отъ зубовъ, то показываются *десны*; между ними и каждою губою, по срединѣ, передъ средними рѣзцами — *верхняя и нижняя уздечка губъ.* Раскрывъ губы, мы увидимъ *преддверіе рта*, и по раскрытіи обоихъ рядовъ зубовъ—самую *полость рта.* Здѣсь прежде всего замѣчается *языкъ* (части котораго—кончикъ, корень, спинка и края). Если приподнять кончикъ языка, то можно замѣтить по срединѣ *уздечку языка* (складку слизистой оболочки) и возлѣ нея направо и налѣво, на гребневидныхъ возвышеніяхъ устья слюнныхъ железъ. Крышку полости рта и вмѣстѣ дно полости носа образуетъ *нёбо*, впереди *твердое*, сзади *мягкое*, съ середины котораго свѣшивается *язычекъ.* По бокамъ языка *нёбныя дуги* окружаютъ *миндалевидныя железы.* Выходъ изъ полости рта называется *зѣвомъ* и ведетъ въ *глотку.*

Digitized by Google

Болѣзни полости рта.

Афты или молочница представляютъ пятна, слегка возвышенныя, бѣлаго или желтоватаго цвѣта, величиною отъ просянаго до чечевичнаго зерна, сидящія на слизистой оболочкѣ рта. Они сидятъ чаще всего на кончикѣ языка, на уздечкѣ языка, на слизистой оболочкѣ щекъ и губъ, иногда на миндалевидныхъ железахъ и тогда ихъ легко смѣшиваютъ съ несильно-выраженнымъ дифтеритомъ. Они часто являются у дѣтей во время прорѣзыванія зубовъ. Кромѣ того они бываютъ у людей, нечисто содержащихъ ротъ и у курящихъ табакъ. Иногда афты появляются при регулахъ. При афтахъ бываютъ всегда жгучія боли во рту, особенно безпокоющія больного при сосаніи и жеваніи. Поэтому грудныя дѣти не могутъ долго сосать грудь. Распознаваніе основано на мѣстныхъ явленіяхъ. Вн. и въ полоск. *S.* 1 одно или попер. съ *C.* 1. Иногда *A.* 2× *C.* 5 (1-й ст.), полоск. *A.* 2, *C.* 5, ван. *C.* 5, *L.*

Острое воспаленіе рта ограничивается иногда пораженіемъ десенъ или нёба или внутр. поверхности щекъ. Не представляя опасности, оно сопровождается небольшою опухолью, жженіемъ, и болѣе или менѣе острою болью. Нѣсколькихъ полосканій *S.* 1 бываетъ достаточно для быстраго облегченія и излѣченія, вн. *S.* 1 одно или попер. съ *A.* 1.

Хроническое воспаленіе рта съ изъязвленіями очень опасно. Распознается по сѣроватымъ перепонкамъ, изъязвленнымъ и кровоточивымъ, которыя поражаютъ весь ротъ и становятся черноватыми вслѣдствіе изліянія подъ ними крови. Дыханіе и ротъ издаютъ запахъ гнилостный, шейные железы опухаютъ и очень болѣзненны. Иногда скорбутъ или антоновъ огонь осложняютъ эту болѣзнь. См. *Афты*, также *Цынга*.

Плесневица. На слизистой оболочкѣ рта, зѣва, носа, гортани, глотки появляются бѣлыя, творожистыя отложенія, разсѣянныя на подобіе островковъ или слившіяся въ одну массу; появляется преимущественно у слабыхъ новорожденныхъ младенцевъ въ первыя недѣли жизни, особенно въ теплое лѣтнее время и у нечисто содержимыхъ дѣтей, также у взрослыхъ,

Digitized by Google

страдающихъ изнурительными болѣзнями (бугорчаткой, тифомъ, воспаленіемъ брюшины, матки и проч.). Симптомы: дѣти не могутъ сосать, худѣютъ и часто умираютъ отъ истощенія. Распознаваніе основывается главнымъ образомъ на мѣстномъ осмотрѣ. Лѣченіе то же, что и для афтъ. (См. выше). Взрослымъ при изнурительныхъ болѣзняхъ достаточно полоскать ротъ нѣсколько разъ въ день растворомъ *S.* 5.

Твердая опухоль губы. Вн. *C.* 1 (2-й ст.). Въ упорномъ случаѣ компр. *C.* 1 или *Эл. Зел.* Ван., мазь, прим. *C.* 5; чер. $^1/_2$ часа по 1 круп. *C.* 5.

Ракъ на губѣ. Для лѣченія см. *Ракъ.*

Болѣзни десенъ всѣ вообще лѣчатся *S.* 1 или *A.* 1. Въ упорномъ случаѣ *A.* 2, или *S.* 1 попер. съ *C.* 1 или *C.* 5 (1-й или 2-й ст.). Полосканіе изъ всѣхъ названныхъ лѣкарствъ, такъ же съ *Эл. Кр.*, *Б.*, *Анж.*

Полипъ на нёбѣ. Вн. и въ полоск. *C.* 1. Въ упорн. случаѣ *C.* 5 (1-й ст.). Полоск. *C.* 5, *A.* 2, *C.* 4, также съ *Эл. Б.* ил *Кр.* Ван. *C.* 5.

Цынга или скорбутъ. Симптомы: синеватая опухлость и кровоточивость десенъ, багровыя пятна въ родѣ подтековъ на тѣлѣ, кровоизліянія въ серозныя полости и разныя кровотеченія; кромѣ того боль въ членахъ, опуханіе суставовъ, общая слабость и безсиліе; разстроенное пищевареніе и въ сильной степени даже лихорадочныя явленія. Вн. отъ 3 до 10 капель *Эл. Желт.* на кускѣ сахара утромъ и вечеромъ. Основаніемъ лѣченія должно служить *S.* 1. Его даютъ попер. съ небольшимъ количествомъ *A.* 2 изъ 2-го ст., но при образованіи язвъ или нагноенія во рту и въ другихъ частяхъ тѣла *S.* замѣняютъ *C.* 1 (1-й или 2-й стак.). Весьма полезны общія ванны: *S.* 1, *S.* 5, *C.* 5, *A.* 2 и *L.* При болѣзни въ деснахъ полосканія изъ тѣхъ же лѣкарствъ, также съ *Эл. А.* или *Бѣл.* На подвзд. *F.* 2, на область сердца и аорту мазь *A.* 2. На язвы пульв. и прим. *C.* 5 и *S.* 5, а при кровотеченіи *A.* 2. Для окончанія лѣченія прописываютъ *S.* 1, потомъ *S.* 2, и наконецъ *S.* 5. Необходимымъ условіемъ для излѣченія свѣжая и питательная пища, а именно молоко,

Digitized by Google

овощи, зелень, фрукты, мясо и вполнѣ доброкачественный хлѣбъ.

Саркомы представляютъ мясистыя опухоли, состоящія изъ соединительной ткани, содержащей сосуды; по своему теченію представляютъ переходную степень отъ доброкачественныхъ къ злокачественнымъ опухолямъ; ростъ ихъ медленный или быстрый, а потомъ медленный; встрѣчаются *большею частію подъ кожею* между мышцами живота, спины и конечностей, въ женскихъ грудяхъ, въ маткѣ и внутри костей, также на деснахъ; саркомы встрѣчаются въ различныхъ формахъ. Послѣ вырѣзанія ихъ, въ оставленныхъ рубцахъ развиваются новыя саркомы. Для лѣченія см. *Ракъ*. Развившія саркомы неизлѣчимы.

Совѣтъ черезъ корреспонденцію. — У одной дамы образовалась саркома въ первомъ суставѣ указательнаго пальца руки. На операцію она не согласилась. Было назначено вн. *А.* 1 × *С.* 5 (3-й ст.) и каждый часъ по 1 круп. *А.* 1 и *С.* 5 безъ воды; прим. изъ смѣси V., *С.* 5 и А. 2 по 10 круп. каждаго въ одномъ стак. воды; черезъ 10 дней прекратились сильныя боли, воспаленіе и опухоль, и саркома уменьшилась на половину. Лѣкарства тогда были назначены изъ 2-го ст. и тѣ же примоч. Черезъ мѣсяцъ выздоровѣла, но лѣченіе продолжала нѣсколько мѣсяцевъ сряду (С.).

Сердце помѣщается въ передней части грудной полости, между легкими, занимая пространство отъ 3-го до 6-го ребра. Оно имѣетъ видъ конуса, обращеннаго *основаніемъ* вверхъ и вправо, *верхушкой*—внизъ и влѣво. Верхушка сердца расположена ниже четвертаго ребра. Какъ у женщины, такъ и у мужчины верхушка сердца имѣетъ неизмѣнное соотношеніе съ груднымъ соскомъ (если у женщины сосокъ не очень великъ и не смѣщенъ или своею собственною тяжестью, или болѣзненнымъ состояніемъ); верхушка сердца лежитъ непосредственно подъ груднымъ соскомъ и въ глубинѣ вертикальной линіи, проходящей черезъ эту точку. Разстояніе верхушки сердца отъ соска равняется 3 или 4 сантиметрамъ. Величина сердца равняется приблизительно кулаку того человѣка, которому принадлежитъ. Оно свободно помѣщено въ особаго рода

Digitized by Google

мѣшкѣ—*околосердечной сумкѣ*. Если вскрыть сердце, то внутри его оказываются четыре отдѣла *полости сердца*, которыя во время жизни всегда наполнены кровью и попеременно то выгоняютъ изъ себя часть крови, то принимаютъ, взамѣнъ выгнанной, новую порцію крови. Вертикальною перегородкою сердце дѣлится на *правую* и *лѣвую* половины; каждая изъ этихъ половинъ поперечною перегородкою раздѣляется опять на два отдѣла. Всего получается четыре отдѣла. Въ каждой половинѣ сердца отдѣлъ, лежащій въ верхней, широкой части сердца, называется *предсердіемъ*, а отдѣлъ, лежащій въ нижней части сердца, у верхушки его, называется *желудочкомъ*. Оба предсердія, правое и лѣвое, имѣютъ весьма тонкія стѣнки и сообщаются еще съ особыми придатками — *сердечными ушками*. Въ каждое предсердіе входятъ большіе кровеносные сосуды; въ правое двѣ *полыя вены (верхняя и нижняя)* и въ лѣвое четыре *легочныя вены*. Изъ того или другого предсердія ведетъ довольно большое овальное *отверстіе* внизъ, въ желудочекъ, изъ праваго предсердія въ правый, изъ лѣваго въ лѣвый желудочекъ. Желудочки имѣютъ толстыя стѣнки, особенно лѣвый желудочекъ, и это потому, что они должны сильно сокращаться и сильно давить на содержащуюся въ нихъ кровь. Отъ давленія, оказываемаго при ихъ сокращеніи на кровь, послѣдняя устремляется чрезъ *круглое отверстіе* въ большія артеріи. Изъ праваго желудочка такое круглое отверстіе ведетъ въ *легочную артерію*, а изъ лѣваго желудочка—въ *большую артерію тѣла, аорту*. Послѣдняя, выходя изъ лѣваго желудочка, подымается вверхъ и влѣво, затѣмъ дугообразно сгибается внизъ, переходя чрезъ лѣвую первичную вѣтвь дыхательнаго горла, на которомъ дуга аорты сидитъ какъ бы верхомъ, направляется влѣво и внизъ, и спускается по лѣвой сторонѣ позвоночнаго столба, проходя чрезъ собственное отверстіе, въ грудобрюшной преградѣ, въ брюшную полость. Вслѣдствіе этого на аортѣ различаютъ 3 части: восходящую аорту (часть ея до дуги), дугу аорты и нисходящую аорту (часть ея за дугой). Чтобы при давленіи со стороны стѣнокъ желудочковъ, кровь всегда стремилась чрезъ круглое отверстіе

Digitized by Google

въ артерію и не могла бы отливать назадъ, чрезъ овальное отверстіе въ предсердіе, у овальнаго отверстія помѣщена тонко-перепончатая *заслонка*, закрывающаяся въ моментъ сокращенія желудочка. Въ правой половинѣ сердца эта заслонка называется *трехстворчатою*, въ лѣвой—*двухстворчатою*.

Мускулистое сердце наше сокращается, особенно въ желудочкахъ, съ правильною періодичностью (ритмомъ), и за каждымъ сокращеніемъ сердца слѣдуетъ также и правильное ослабленіе его. Сокращеніе (систола) съуживаетъ полости сердца и выгоняетъ оттуда часть крови; при ослабленіи же (діастола) полости опять расширяются, и взамѣнъ вытѣсненной передъ тѣмъ крови поступаетъ новая. Какъ и другія мышцы, сердце работаетъ не самостоятельно, а должно получать возбужденіе для своихъ движеній отъ нервовъ, которые не зависятъ отъ нашей воли. Сердечные нервы частію расположены въ мышцахъ сердца и снабжены множествомъ нервныхъ узловъ (ганглій), частію же состоятъ въ связи съ головнымъ и спиннымъ мозгомъ.

При одновременномъ сокращеніи обоихъ желудочковъ, которому предшествуетъ незначительное сокращеніе предсердій, сердце становится короче и выпуклѣе. Своею передней, болѣе выпуклою стѣнкою оно плотнѣе прижимается къ передней грудной стѣнкѣ (обыкновенно между 5 и 6 ребромъ на лѣвой сторонѣ) и нѣсколько отдавливаетъ ее наружу. Это послѣднее явленіе, всегда ощутимое при приложеніи къ сторонѣ сердца только оконечности пальца, а часто и видимое глазомъ, называется *толчкомъ* или *ударомъ* сердца, *пульсомъ* сердца. У взрослаго сердце ударяетъ 60, 70, даже 80 разъ въ минуту, у дѣтей отъ 90 до 120 разъ; вообще приходится 4 удара сердца на одно дыханіе. Такъ какъ вслѣдствіе сокращенія сердца, причиняющаго толчокъ его, вытѣсненная въ артеріи кровь производитъ въ нихъ также пульсъ, то очевидно, что толчекъ сердца и пульсъ артеріи должны быть одновременны, артерія должна биться столько же разъ, какъ сердце. Если приложить ухо къ тому мѣсту грудной стѣнки, позади котораго лежитъ сердце, то слышатся два звука, такъ называемые *тоны сердца*.

Digitized by Google

Первый звукъ совпадаетъ съ толчкомъ сердца (т. е. сокращеніемъ его) и производится заслонками, двухъ и трехстворчатою, которыя колеблются подъ давленіемъ на нихъ крови. Второй звукъ производится колебаніями полулунныхъ заслонокъ, этотъ звукъ слышенъ во время расширенія сердца.

Сердце можетъ сокращаться чаще и сильнѣе, чѣмъ слѣдуетъ, отъ множества различныхъ причинъ. И такъ какъ сердце есть мышца, то подобно всякой другой мышцѣ, оно становится отъ слишкомъ сильнаго напряженія мясистѣе, объемистѣе, и тогда его усиленныя сокращенія особенно тяжело ощущаются.

Сердечные тоны чрезвычайно важны при распознаваніи пороковъ сердца. Именно, если вмѣсто чистыхъ тоновъ слышатся тоны нечистые, или *шумы*, то это показываетъ, что та или другая заслонка, то или другое отверстіе сердца не въ порядкѣ.

Одышка при болѣзняхъ сердца развивается вслѣдствіе застоя крови въ маломъ кругѣ кровообращенія по причинѣ ослабленія лѣваго желудочка, и *не имѣетъ ничего общаго съ астмою.*

Болѣзни сердца.

Къ симптомамъ, указывающимъ на неправильное кровообращеніе, и, какъ слѣдствіе того, возможнаго существованія болѣзни сердца относятся: головокруженіе, трепетаніе сердца, расширеніе венъ, геморрой, неправильная пульсація сердца, боль или опухоль въ лѣвомъ боку, одышка, опухоль нижнихъ конечностей и пр. Противъ этихъ болѣзней главное лѣкарство *Анжіоитико.*

Когда рядомъ съ означенными симптомами обнаруживается болѣзнь печени черезъ окрашиваніе кожи въ желтоватый цвѣтъ, моча густая, желтоватая или красноватая, рѣдкая; испражненія сѣроватыя и глинистыя; боль въ правомъ подвздошьѣ или подъ ложечкою, распространяющаяся до позвоночнаго столба и даже до праваго плеча и шеи, съ тяжестію въ правомъ боку, иногда рвота желчью и проч.: тогда *Анж.* даютъ попер. съ *F.* 1 изъ 2-го ст.

Digitized by Google

При лѣченіи органическихъ страданій сердца *Анж.* должно быть употреблено въ очень слабыхъ дозахъ, въ особенности при опухоли конечностей и водянки сердца. Но разбавленіе дозъ еще здѣсь недостаточно: вмѣсто стакана или половины стакана даютъ только нѣсколько чайныхъ ложекъ въ день, иногда сначала по одной въ день.

При всякой болѣзни сердца, но *въ особенности при аневризмѣ*, наружные компр. изъ кр. *A.* 2 и изъ *Эл. Анж.* болѣе необходимы, чѣмъ внутр. лѣченіе. Ихъ прикладываютъ часто на сердце и къ мѣсту, которое представляется наиболѣе болящимъ, какъ напр. на аорту или сонныя артеріи. Въ упорн. случаѣ: *A.* 2 × *C.* 2 (2-й ст.). На сердце мазь, прим. *A.* 2. Ван. *C.* 5, *A.* 2. На подвзд. мазь, прим. *F.* 2, *C.* 5. При сильномъ біеніи сердца быстро провести по области сердца рукою, смоченною слегка въ *Эл. Анж.* При боли въ сердцѣ вн. 5 кап. *Эл. Анж.*, въ ложкѣ воды; также дѣйствуетъ на сердце одна капля *Эл. Анж.* влитая въ стаканъ съ растворомъ круп. *Анж.* При опухоли ногъ—прим. на подвзд. *S.* 1 и вн. *S.* 6. Это лѣченіе несомнѣнно, но оно должно производиться при нѣкоторомъ соображеніи и большомъ вниманіи; оно употребляется противъ: *аневризмы*, *неправильнаго сердцебіенія*, *расширенія сердца*, *біенія артерій*, *пороковъ сердца*, напр., *недостаточности двухстворчатой его заслонки*, и прочихъ болѣзней сердца, которыя здѣсь приводятся.

Электро-Гомеопатическое лѣченіе болѣзней сердца въ искусномъ примѣненіи гораздо лучше обыкновенныхъ способовъ врачеванія.

Водянка околосердечной сумки. Симптомы: болѣе или менѣе сильная боль, иногда просто чувство неловкости около сердца, припадки сильнаго или перемежающагося біенія сердца, выгибъ (опухоль), склонящійся то въ одну, то въ другую сторону, смотря по положенію тѣла, часто шумъ струженія (bruit de râpe) [1]); учащенный пульсъ (или перемежающійся при сильно развившейся болѣзни); рѣдко: головокруженіе, шумъ

[1]) Bruit de râpe походитъ на шумъ, бывающій при струженіи дерева или при пряденіи, также на продолжительный

Digitized by Google

въ ушахъ, внезапныя пробужденія; еще рѣже: испугъ, бредъ, конвульсіи, опухоль нижнихъ конечностей. Вн. изъ 3-го, 4-го или 5-го ст. *А.* 1 и на область сердца мазь *А.* 2. Въ упорн. случаѣ: *С.* 2 × *А.* 2 (3-й ст.), на сердце мазь *А.* 2. Ван. *С.* 5, компр. *Эл. А.* На подвзд. мазь, прим. *F.* 1, *F.* 2, *С.* 5.

Аневризма аорты бываетъ вслѣдствіе пороковъ сердца, а иногда она врожденная. Аневризмой чаще всего поражается грудная ея часть. Припадки аневризмы грудной аорты довольно неясны, и ихъ легко смѣшать съ пороками сердца, но болѣе выдающіеся слѣдующіе: ненормальная выпуклость грудной клѣтки съ одной стороны; кромѣ пульсаціи сердца, слышится еще пульсація въ аневризматическомъ мѣшкѣ; одышка даже при умѣренныхъ движеніяхъ; одутловатость и синева лица. Аневризма брюшной части аорты прощупывается въ видѣ глубоко-лежащей, твердой, пульсирующей опухоли.

Аневризмы другихъ артерій, доступныхъ нашему глазу, отличаются отъ обыкновенныхъ опухолей ясною пульсаціею.

Аневризма сердца заключается въ развитіи перегородокъ сердца или въ ихъ утолщеніи, откуда слѣдуетъ съуженіе полостей сердца, или же въ ихъ растяженіи, вслѣдствіе котораго перегородки сердца становятся тоньше и полости сердца увеличиваются. Сжимающая сила сердца увеличена въ первомъ случаѣ и ослаблена во второмъ случаѣ (гипертрофія).

Аневризму аорты и сердца трудно распознать даже медику; но такъ какъ аневризма не можетъ существовать безъ одного или двухъ признаковъ сангвиническаго темперамента, и къ этимъ признакамъ можетъ присоединиться, на мѣстѣ аневризмы, еще наружная опухоль, въ которой всегда ощущается біеніе и пульсація, то въ примѣненіи лѣкарствъ, упомянутыхъ выше противъ болѣзней сердца, не можетъ быть ошибки.

Воспаленіе околосердечной сумки (перикардитъ, pericarditis) случается рѣже, чѣмъ эндокардитъ, но болѣзнь эта опаснѣе другихъ серьезныхъ воспаленій по причинѣ малой величины

звукъ буквы Р., и бываетъ обыкновенно продолжителенъ. Тонъ этого шума всегда болѣе или менѣе неровный, какъ бы хрипучій.

Digitized by Google

сердечной сумки. Острый перикардитъ рѣдко бываетъ первичною болѣзнью, въ большинствѣ случаевъ онъ вторичная болѣзнь; по большей части онъ бываетъ осложненіемъ остраго ревматизма сочлененій, плеврита, воспаленія легкихъ, Брайтовой болѣзни. Симптомы: боль, ощущаемая въ предсердіи, бываетъ жгучая, рѣжущая и часто сопровождается чувствомъ сжиманія. Она усиливается при вдыханіи и отъ тѣлодвиженій. Боль иногда ощущается въ надбрюшіи, или вправо или въ серединѣ грудины. Она иногда распространяется къ спинѣ, или къ лѣвому плечу и вдоль лѣвой руки, какъ это бываетъ при грудной жабѣ. Эта боль очень похожа на боль при плевритѣ, съ которымъ перикардитъ иногда смѣшивается. Эти двѣ болѣзни могутъ существовать одновременно, а также пораженіе боковой поверхности груди (плевродинія) и межреберная невралгія. Чувствительность при давленіи встрѣчается обыкновенно, равно какъ и боль мѣняется въ степени и рѣдко бываетъ значительною. Если чувствительность распространена, то это указываетъ на плевритъ или плевродинію. Неестественное сердцебіеніе встрѣчается въ раннемъ періодѣ болѣзни. Пульсъ при началѣ болѣзни бываетъ сильный, быстрый, дрожащій, болѣе или менѣе учащенный, и иногда неправильный. По мѣрѣ того, какъ сердце ослабѣваетъ, пульсъ дѣлается слабѣе, а въ случаѣ жидкаго изліянія пульсъ становится слабымъ и рѣдкимъ, и замѣчается большая неправильность въ его ритмѣ. Если дыханіе ускоренное, то замѣчается расширеніе крыльевъ носа; одышка можетъ быть и можетъ отсутствовать даже при чрезмѣрномъ расширеніи сердечной сумки. Кашель сухой, судорожный или спазмодическій бываетъ часто и независимо отъ легочной болѣзни. Сухой, рѣдкій кашель въ связи съ удушьемъ, учащенный и слабый пульсъ, синюха губъ и багроватость лица—суть признаки неминуемой опасности. Голосъ можетъ быть очень слабый до того, что больной не можетъ говорить или говоритъ съ большимъ усиліемъ; рвота иногда существуетъ и упорно держится; иногда бываетъ затрудненное глотаніе; выраженіе страха бываетъ часто выдающимся симптомомъ; сардоническій смѣхъ наблюдался въ нѣ-

Digitized by Google

сколькихъ случаяхъ, которые окончились смертію. Больной обыкновенно лежитъ на спинѣ или діагонально, рѣдко на лѣвомъ, но чаще на правомъ боку, при чемъ голова и плечо приподняты, и весьма неохотно перемѣняетъ избранное имъ положеніе, отъ перемѣны котораго наблюдался иногда смертельный обморокъ. Кромѣ умственной тоски, унынія и страха смерти случается и настоящій бредъ. Послѣдствіемъ воспаленія околосердечной сумки всегда бываетъ выпотъ жидкости въ сердечную сумку, который появляется уже на 6-й или 7-й день отъ начала болѣзни. Присутствіе выпота узнается по нѣкоторой выпуклости вокругъ лѣваго грудного соска; звуки сердца становятся для уха изслѣдующаго не такъ явственны и какъ бы отдаленные; явственно слышится шумъ тренія въ области сердца. Рука, приложенная къ лѣвому соску, чувствуетъ нѣкоторое дрожаніе.

Перекардитъ наименѣе опасенъ при ревматизмѣ; болѣе опасенъ при болѣзняхъ почекъ, при сыпныхъ и непрерывныхъ лихорадкахъ, при піэміи, и почти всегда смертеленъ въ связи съ разстройствами нервной системы, вызывающими манію, столбнякъ, пляску св. Витта и т. д. Продолжительность болѣзни различна: иногда смерть бываетъ въ 24 часа, обыкновенно же длится отъ одной до двухъ недѣль, и если въ это время не наступаетъ смерть, то болѣзнь кончается выздоровленіемъ или принимаетъ хроническій характеръ. При лѣченіи этой болѣзни больной долженъ лежать въ постели, не дѣлать усиленныхъ движеній и ничѣмъ не волноваться. Вн. *А.* 1 изъ 3-го или 4-го, или 5-го стак., на область сердца компр. *Эл. Анж.* попер. съ прим. *А.* 2. При лихорадкѣ вн. *F.* 1 (2-й ст.) × *А.* 1, и на подвзд. мазь, согрѣв. компр. *F.* 2.

Воспаленіе внутренней оболочки сердца (эндокардитъ, endocarditis) весьма рѣдко случается, какъ болѣзнь самостоятельная. Этою болѣзнію очень часто осложняется острый ревматизмъ сочлененій. Если къ сильному лихорадочному состоянію, сопровождающему ревматизмъ, присоединяется бурное сердцебіеніе, съ ускореннымъ неправильнымъ пульсомъ, возрастающею одышкою и нѣкоторою тупою и глухою болью въ

Digitized by Google

бласти сердца, а при выслушиваніи сердца шумъ мягкій, похожій на шумъ, производимый раздувательнымъ мѣхомъ, то нѣтъ сомнѣнія, что мы имѣемъ дѣло съ страданіемъ внутренней оболочки сердца. Болѣзнь эта чаще встрѣчается въ хроническомъ состояніи. При остромъ ревматизмѣ сочлененій для лѣченія см. *Ревматизмъ*. Противъ сердцебіенія вн. *A*. 1 (2-й или 3-й стак.), на область сердца *Эл. Анж.*, прим. или мазь *Апд*. 2. При ревматической боли въ сердцѣ на область сердца компр. *Эл. Зел.*; вн. 5 капель *Эл. Анж.* въ ложкѣ воды.

Воспаленіе мышцы сердца (міокардитъ, myocarditis). Одновременно съ воспаленіемъ внутренней оболочки сердца бываетъ и воспаленіе самой мышцы сердца. Въ *остромъ* состояніи эта болѣзнь протекаетъ отъ нѣсколькихъ часовъ до двухъ сутокъ и оканчивается, по большей части, смертію. Симптомы: сильное лихорадочное состояніе, боль въ области сердца, усиливающаяся при каждомъ его толчкѣ; весьма сильная одышка; пульсъ весьма ускоренный и неправильный; больнымъ овладѣваетъ безотчетный страхъ; по временамъ бываютъ обмороки. *Хроническое* воспаленіе мышцы сердца протекаетъ медленно и распознается съ большею трудностію до появленія явнаго органическаго порока сердца. При остромъ состояніи вн. *F*. 1 (2-й или 3-й ст.) × *A*. 1 (3-й или 4-й ст.), на область сердца *Эл. Анж.* попер. съ примочк. или мазью *A*. 2, на подвзд. мазь прим. *F*. 2, *C*. 5. При боли въ сердцѣ вн. 6 кап. *Эл. Анж.* въ л. воды. При лѣченіи хроническаго воспаленія вн. *A*. 1 одно, или попер. съ *F*. 1 или *C*. 1; тѣ же наружныя средства, что и при остромъ состояніи; соблюдать совершенный покой, пища должна быть питательная въ умѣренномъ количествѣ; хорошее сухое помѣщеніе, температура комнаты не выше 15° Реом.

Недостаточность двухстворчатой заслонки сердца бываетъ вслѣдствіе воспаленія внутренней оболочки сердца. Эта болѣзнь протекаетъ хронически. Въ началѣ болѣзни: сердцебіеніе и общее недомоганіе. Впослѣдствіи неправильные толчки сердца и мучительная одышка, затѣмъ кашель и кровохарканіе, цвѣтъ лица грязножелтый, поблеклый. Въ дальнѣйшемъ періодѣ одышка еще болѣе усиливается; отъ затрудненнаго

Digitized by Google

дыханія и кровообращенія цвѣтъ лица становится грязносиній; появляется отекъ ногъ и вскорѣ наступаетъ водянка брюшная и даже общая. Лѣченіе см. выше. При этой болѣзни соблюдать покой, дѣлать только умѣренныя и неутомительныя прогулки; пища должна быть легковаримая и питательная, какъ-то: молоко, яица, творогъ, домашняя птица, вареная свѣжая капуста, морковь. Чай, кофе, вино и пряности воспрещаются.

При бронхитѣ, часто осложняющемъ эту болѣзнь, даютъ *P.* 1 × съ *A.* 1. При развитіи водянки: вн. *A.* 1 × *C.* 2 × *S.* 6; при опухоли ногъ—на подвзд. прим. *S.* 1. При разстройствѣ пищеваренія утр. и веч. по 10 сух. кр. *S.* 2. Если появляются приливы крови къ мозгу—на голову холодныя прим. *A.* 2 и на всѣ нервы головы и сердце *Эл. Анж.*

Гипертрофія, расширеніе или увеличеніе объема сердца бываетъ всегда послѣдствіемъ эмфиземы легкихъ. При этой болѣзни всегда замѣчается особая выпуклость области сердца. Толчекъ сердца до того усиленъ, что глазамъ видимы его удары. При сильныхъ ударахъ сердца замѣчается сотрясеніе всей грудной клѣтки. Сильная одышка и сердцебіеніе при посредственныхъ даже движеніяхъ. При изслѣдованіи сердца оно оказывается увеличеннымъ въ продольномъ и поперечномъ діаметрахъ своихъ, иногда до того, что тупой звукъ простирается отъ 3-го до 8-го ребра. Лѣченіе см. выше. При этой болѣзни не дѣлать движеній, вызывающихъ сердцебіеніе, и больнымъ крѣпкаго тѣлосложенія соблюдать строгую діэту.

Атрофія сердца. При этой болѣзни замѣчается ослабленная дѣятельность сердца; толчки его едва слышны; пульсъ очень слабый. Сердцебіеніе наступаетъ при малѣйшемъ напряженіи силъ. Больные очень скоро утомляются; появляется наклонность къ головокруженіямъ и даже обморокамъ. Вн. *A.* 2 (1-й ст.), въ упорн. случаѣ попер. съ *C.* 5 (1-й ст.); по 1 кр. *C.* 5 черезъ часъ. На область сердца *Эл. Анж.*, прим., мазь *A.* 2. При этой болѣзни соблюдать совершенный покой, немного гулять на свѣжемъ воздухѣ и употреблять удобоваримую пищу въ достаточномъ количествѣ. Если бываютъ головокруженія и обмороки, то для лѣченія см. эти болѣзни.

Digitized by Google

Нервное сердцебіеніе (неврозъ сердца) свойственно людямъ нервнымъ, т.-е. такимъ, которые способны возбуждаться отъ ничтожныхъ причинъ. Блѣдная немочь и малокровіе всегда бываютъ причинами сердцебіенія. Кромѣ того оно бываетъ у людей, страдающихъ геморроемъ, у пьяницъ, онанистовъ и у предающихся неумѣреннымъ совокупленіямъ. Симптомы: тягостное чувство стучанія сердца, сопровождаемое тоскою, а иногда и одышкою; легкая, давящая боль въ области сердца, общая слабость и даже наклонность къ обморокамъ. У полнокровныхъ, во время приступа сердцебіенія, лицо дѣлается краснымъ, и принимаетъ тоскливое выраженіе, глаза выпячиваются изъ своихъ орбитъ, и блестятъ; больной испытываетъ мельканіе искръ въ глазахъ; въ ушахъ появляется шумъ. Очень часто при этой болѣзни появляются спазмы глотки и гортани, при которыхъ рѣчь и глотаніе совершенно затруднено. Сердцебіеніе появляется приступами и притомъ часто безъ видимыхъ причинъ. Каждый приступъ продолжается отъ нѣсколькихъ минутъ до часу. Въ промежуткахъ между приступами больные чувствуютъ себя очень хорошо. Болѣе всего приступы сердцебіенія вызываются употребленіемъ крѣпкаго кофе, вина, душевными волненіями и усиленными совокупленіями.

При лѣченіи нервнаго сердцебіенія прежде всего обратить вниманіе на причины, производящія оное, и сообразно съ ними, назначить лѣкарство. Во всякомъ случаѣ не дѣлать усиленныхъ и быстрыхъ тѣлодвиженій, не волноваться, не до утомленія гулять на свѣжемъ воздухѣ; лѣтомъ купаться 2—3 раза въ день въ рѣкѣ; пища питательная и удобоваримая; воздухъ въ жилищѣ долженъ быть чистый, не выше+15° Реомюра. Вн. *А.* 3 (3-й или 4-й ст.) $\times$ *S.* 3 (2-й ст.). На область сердца *Эл. Анж.*, попер. съ прим. *А.* 3. Если нервное сердцебіеніе происходитъ отъ малокровія или блѣдной немочи, то для лѣченія см. эти болѣзни.

Грудная жаба (неврозъ сердца) характеризуется въ особенности болью въ предсердіи и чувствомъ необъяснимаго безпокойства, появляющагося припадками. Чаще поражаетъ

Digitized by Google

мужчинъ, чѣмъ женщинъ, и чаще наблюдается въ холодныхъ и сырыхъ климатахъ, чѣмъ въ теплыхъ. Причины: органическія страданія сердца и большихъ сосудовъ, подагра, ревматизмъ и злоупотребленіе курительнымъ табакомъ. Разъ существуетъ грудная жаба, то припадки ея обнаруживаются подъ вліяніемъ разныхъ причинъ, которыя одинаковы для всѣхъ больныхъ, таковы: трудное пищевареніе, усталость, усилія и быстрыя движенія. Симптомы: отъ какой бы ни было причины припадокъ обнаруживается *внезапно* съ необычайною силою. Это жестокая боль по всей груди; ея мѣсто обыкновенно налѣво въ уровень съ соскомъ, но она распространяется въ шею и въ лѣвую руку, иногда распространяется въ надбрюшіе, иногда въ мошонку. Эта боль не увеличивается ни чрезъ давленіе, ни чрезъ движеніе. Тоскливый, неподвижный, покрытый холоднымъ потомъ, поблѣднѣвшій отъ испуга больной чувствуетъ себя умирающимъ. Движенія сердца ослаблены, становятся рѣдкими и перемежающимися, даже можетъ быть обморокъ. Дыханіе относительно свободное, безъ одышки, при грудной жабѣ, не зависящей отъ болѣзни сердца или аорты, и наоборотъ—очень затрудненное, если жаба представляетъ симптомъ страданія сердца или аорты, что бываетъ часто. Припадокъ прекращается вдругъ, точно такъ, какъ начался; боль и безпокойство проходятъ; больной же изнеможенный, опечаленный, мучится боязнью новаго припадка. Иногда пустая отрыжка и большое выдѣленіе мочи указываютъ на окончаніе припадка. Вначалѣ припадки продолжаются только нѣсколько секундъ и не представляютъ серьезной опасности, но по мѣрѣ того, какъ они повторяются, ихъ продолжительность увеличивается и подвергаетъ больного опасности внезапной смерти. Такими внезапными ударами очень часто оканчиваются органическія болѣзни сердца или аневризмы аорты. Повтореніе припадковъ различно: вначалѣ промежутокъ между припадками въ нѣсколько мѣсяцевъ, потомъ они сближаются и достаточно для ихъ появленія сильнаго волненія, усилія, продолжительной ходьбы, быстраго вхожденія на лѣстницу, избытка пищи и пр. Если жаба са-

Digitized by Google

мостоятельна, то послѣ одного или двухъ припадковъ больной можетъ выздоровѣть; если же она является симптомомъ болѣзни сердца, то смерть можетъ постигнуть во время припадка или же быть послѣдствіемъ органической болѣзни, которой жаба представляетъ симптомъ. Вн. *С.* 1 × *А.* 3 или *А.* 1 × *С.* 5 изъ 3-го или 4-го ст., нар. обильныя примочки и втираніе во все туловище спереди и сзади *А.* 2 × *С.* 5 и *Эл. Анж.* На 6 гл. т. *Эл. Анж.* × *Бѣл.*

Корчи или спазмы сердца выражаются приступами невыносимаго стѣсненія и болѣзненнаго стягиванія груди: больнымъ кажется, что они задыхаются, хотя они могутъ дѣлать глубокія вдыханія, чѣмъ и отличаются отъ страдающихъ одышкою. Дѣятельность сердца по большей части неправильна, сердечный толчекъ не слышенъ или слабъ (иногда, впрочемъ, усиленъ); вмѣстѣ съ тѣмъ едва слышны и тоны сердца. Боли распространяются отъ сердечной области къ лѣвой подмышкѣ и лѣвой рукѣ, а часто и къ соотвѣтствующей половинѣ головы и пищеводу, въ которомъ вызываютъ ощущеніе истерическаго жара. Приступы продолжаются отъ нѣсколькихъ минууъ до нѣсколькихъ часовъ и смѣняются свободнымъ отъ боли промежуткомъ. Болѣзнь встрѣчается довольно рѣдко, причины не вполнѣ извѣстны. Повидимому, къ ней болѣе предрасполагаютъ ожирѣніе сердца, окостенѣніе вѣнечной артеріи сердца и болѣзни заслонокъ аорты. Сущность ея, повидимому, заключается въ судорожныхъ сокращеніяхъ сердца въ связи съ раздраженіемъ сердечнаго сплетенія. Вн. *А.* 3 (3-й или 4-й ст.) × *С.* 5 (2-й ст.); на область сердца холодныя прим. *А.* 3 попер. съ *Эл. Анж.* Въ упор. случаѣ вн. растворъ *А.* 3 (3-й или 4-й ст.) съ одною каплею *Эл. Анж.* При этомъ нужны прогулки на свѣжемъ воздухѣ (горный и морской), спокойствіе духа, питательная пища, гимнастика, лѣтомъ купанье въ морѣ.

Ожирѣніе сердца. Подъ этимъ названіемъ въ публикѣ понимаютъ совершенно иное, чѣмъ оно есть на самомъ дѣлѣ. Это не есть жиръ на сердцѣ или кругомъ его, *это жировое перерожденіе всей мускулатуры сердца* въ той или другой

Digitized by Google

степени. Оно встрѣчается при общей тучности, старческомъ истощеніи, малокровіи, блѣдной немочи, при воспаленіяхъ сердца, тифѣ, родильной горячкѣ, худосочіи пьяницъ, брайтовой болѣзни и проч. Острое жировое перерожденіе нельзя опредѣлить съ достовѣрностію, но во всякомъ случаѣ оно ведетъ къ неблагопріятному исходу означенныхъ скоротечныхъ болѣзней. Хроническое же ожирѣніе сопровождается, какъ отличительнымъ признакомъ, увеличеніемъ притупленія звука при постукиваніи. Вмѣстѣ съ тѣмъ толчекъ верхушки сердца едва слышенъ, сердечные тоны слабы (особенно первый), пульсъ малъ, часто замедленъ, дыханіе сперто. Весьма характерны также апоплексическіе припадки, почти никогда не ведущіе къ параличу, но нерѣдко кончающіеся смертію. Если всѣ эти явленія наблюдаются у весьма тучныхъ и малокровныхъ лицъ, то можно съ полною достовѣрностью предположить ожирѣніе сердца. Вн. *А.* 2 (2-й ст.) × *V.* (1-й ст.). Ср. *Тучность*. При этой болѣзни не употреблять мучной пищи, водки, пива и пр., ограничиться нежирною мясною пищею; вмѣстѣ съ тѣмъ полезны умѣренная гимнастика, прогулки на свѣжемъ воздухѣ, жизнь въ горахъ, на берегу моря, морскія путешествія.

Излѣченія:—Ж. 38 л. страдала 4 г. корчами сердца, сердечный толчекъ не слышенъ и тоны сердца едва слышны. Приступы являлись до 4-хъ разъ въ недѣлю и продолжались до 20 мин. Вылѣчена въ 3 м. *А.* 3 (4-й ст.) 4 ч. л. въ д. попер. съ *С.* 5 (3-й ст.) ½ ст. въ д.; на сердце холодныя прим. *А.* 3 × *Эл.* *Анж.* по 6 разъ въ день каждое (*С.*).

— М. 55 л. страдалъ 6 л. расширеніемъ сердца, шумъ струженія, одышка, біеніе сонной артеріи, катарромъ желудка и кишекъ и гипереміей печени. Признанъ неизлѣчимымъ. Вылѣченъ въ 6 мѣс. *А.* 1 (3-й ст.) × *F.* 1 и *С.* 1 (2-й ст.) и нар. *А.* 2, *С.* 5 и *F.* 2 (*С.*).

— М. 60 л., д-ръ медицины, аллопатъ, нѣсколько лѣтъ страдалъ болѣзнію сердца. По своимъ симптомамъ его болѣзнь рѣзко отличалась отъ всѣхъ извѣстныхъ болѣзней сердца, и потому ни русскіе, ни иностранные врачи не могли ее назвать и они признали его неизлѣчимымъ. Безуспѣшное лѣченіе аллопатіей побудило его обратиться къ Электро-Гомеопатіи. Онъ

Digitized by Google

чувствовалъ мгновенное облегченіе отъ пріема *А.* 1 изъ тридцатаго стакана, тогда какъ *А.* 1 изъ 29-го стак. усиливало его сердцебіеніе. Слѣдуя указаніямъ автора этой книги онъ принималъ *А.* 1 (30-й стак.) 2 ч. л. въ день, затѣмъ *F.* 1 и *S.* 5 (2-й стак.); нар. *Эл. Анж.*, *А.* 2 и *F.* 2. При этомъ лѣченіи одышка и боль сердца значительно уменьшились, и онъ свободно могъ ходить и даже посѣщать обществен. увеселенія. Не прерывая это лѣченіе, онъ прожилъ шесть лѣтъ, тогда какъ по опредѣленію ученыхъ врачей, при ихъ лѣченіи, онъ могъ прожить не больше одного мѣсяца (*С.*).

— Ж. 35 л. много лѣтъ страдала аневризмой аорты, сильнѣйшею одышкою при малѣйшемъ движеніи; блѣдная немочь, цвѣтъ кожи восково-блѣдный, опухоль ногъ настолько велика, что не могла встать на ноги не ощущая въ нихъ сильной боли, гиперемія печени, боли въ сердцѣ. Вн. А. 1 (5-й ст.) 4 ч. л. въ день, *F.* 1 × *С.* 2 (2-й ст.), на сердце прим. *А.* 2 и *Эл. А.* На подвад. и ноги прим. *S.* 1. При удушьи 10 сух. кр. *S.* 1 вн. Черезъ 2 нед. замѣтное улучшеніе во всемъ (*С.*).

— Ж. 45 л. болѣе 20 л. страдала водянкою околосердечной сумки, сильная боль и неловкость въ сердцѣ, шумъ струженія. Черезъ годъ выздоровѣла отъ *А.* 3 (5-й ст.) 3 ч. л. въ день, *F.* 1 × *С.* 1 (2-й ст.). На сердце мазь А. 3. При боли въ сердцѣ вн. 5 капель *Эл. А.* въ ложкѣ воды (*С.*).

Совѣтъ черезъ корреспонденцію:—М. 45 л. страдалъ 18 л. сильнымъ біеніемъ сердца, иногда сильнымъ расширеніемъ аорты и опухолью всего тѣла, на лѣвое ухо совершенно оглохъ, въ этомъ ухѣ ощущалъ постоянный свистъ. Вылѣченъ совершенно въ 4 мѣс. вн. *А.* 1 (3-й ст.) 4 ч. л. въ д., на сердце и аорту мазь *А.* 2, на темя и за ухо *Эл. Б.* (*С.*).

— М. 38 л. страдалъ аневризмой аорты съ очень сильною одышкою, говорилъ отрывисто, аорта очень болѣзненна, не выносила прикосновенія даже легкаго одѣяла; движеніе было почти невозможно. Вылѣченъ въ 6 мѣс. Вн. и нар. *А.* 1 и *А.* 2 и *Эл. Анж.* (*С*).

— Біеніе и болѣзни сердца были всегда побѣждаемы очень слабыми дозами *А.* 1 (иногда изъ 7-го ст. не болѣе 3 ч. л. въ день) и нар. мазь или прим. *А.* 1 и *А.* 2, то же въ очень слабыхъ дозахъ (2—3 кр. на ст. воды) и *Эл. Анж.* При боли въ сердцѣ вн. *Эл. Анж.* (*С.*).

Совѣты черезъ корреспонденцію: 1) въ г. Курскѣ.—Ж. 65 л. внезапно заболѣла атрофіею сердца. Вылѣчена въ 3 мѣсяца. Вн. *А.* 2 × *F.* 1 × *С.* 5, нар. *Эл. Анж.*, *А.* 2 и *F.* 2 (*С.*).

2) Въ Орлов. губ. М. 61 г. страдалъ два года грудною жа-

Digitized by Google

бою и хрон. бронхитомъ; всѣ припадки усиливались отъ душевнаго безпокойства, усиленнаго движенія и послѣ пищи. Извѣстными врачами въ Москвѣ былъ признанъ неизлѣчимымъ. Назначено въ Апрѣлѣ 1895 г. вн. *A.* 3, *F.* 1, *C.* 5, *S.* 3 попер. и *P.* 2, нар. *Эл. Анж.*, *A.* 2, *F.* 2 и *C.* 5. Вылѣченъ въ теченіи 1 года (*C.*).

Синяки на тѣлѣ вслѣдствіе ушиба, паденія и проч. Для лѣченія см. *Застой крови.*

Синяя немочь, ціанозъ—выражается синимъ цвѣтомъ кожи, причемъ температура послѣдней уменьшена. Вн. *S.* 1 × *A.* 1, на зат. и спин. нерв. *Эл. Кр.* или *Эл. Анж.* Въ упорн. случаѣ: прим. *A.* 2, мазь, ван. *C.* 5. и *A.* 2; на подвзд. мазь *F.* 2. Каждые ½ ч. по 1 кр. *C.* 5.

Сифилисъ и вообще венерическія болѣзни. Венерическими называются тѣ болѣзни, которыя въ большинствѣ случаевъ возникаютъ впервые на половыхъ органахъ отъ зараженія при половыхъ сношеніяхъ. Выдѣленія слизистыхъ оболочекъ, язвъ, наростовъ, наконецъ кровь больныхъ венерическою болѣзнью, приходя въ соприкосновеніе съ тѣломъ здороваго человѣка, вызываютъ въ немъ при благопріятныхъ къ тому условіяхъ одноименную болѣзнь. Половыя сношенія не единственный путь передачи болѣзни. Всѣ разнообразныя случаи зараженія сифилисомъ можно раздѣлить на 3 группы: на прямое, посредственное и наслѣдственное зараженіе. Прямое зараженіе чаще всего происходитъ при совокупленіи съ субъектомъ, имѣющимъ сифилитическую язву на половыхъ органахъ, при поцѣлуѣ сифилитика, имѣющаго такія язвы на губахъ; или на внутренней поверхности щекъ; при кормленіи грудью сифилитическаго ребенка; у врачей и акушерокъ—при изслѣдованіи пальцемъ половыхъ органовъ, покрытыхъ сифилитическими язвами. Къ посредственному зараженію относятся случаи передачи болѣзни черезъ посуду, бѣлье, платье, мундштуки, совмѣстныя ванны, инструменты, повязки и т. д. Наслѣдственная передача наблюдается на дѣтяхъ, отецъ и мать которыхъ больны сифилисомъ въ раннемъ, кондиломатозномъ періодѣ.

Digitized by Google

Заразительность сифилитическаго яда имѣетъ нѣкоторые предѣлы; такъ, разъ имѣвшій сифилисъ, второй разъ заразиться имъ уже не можетъ, и кромѣ того заразительность сифилитическаго яда уменьшается со временемъ; всего сильнѣе она въ началѣ болѣзни, при первичныхъ и вторичныхъ явленіяхъ, или въ такъ называемомъ *кондиломатозномъ* періодѣ сифилиса; когда же болѣзнь вступитъ въ послѣдній третичный или *гуммозный* періодъ, заразительность ея значительно уменьшается. Кромѣ отдѣляемаго сифилитическихъ язвъ, напулъ, прыщей и т. д. заразительно также сѣмя, кровь и молоко больныхъ.

Эти болѣзни распространены повсемѣстно, встрѣчаются въ хижинѣ бѣдняка и въ хоромахъ вельможъ. Зло, причиняемое ими обществу, сильнѣе всякихъ эпидемій.

Въ настоящее время прочно установлено въ наукѣ дѣленіе венерическихъ заболѣваній на три группы: перелой, мягкій шанкръ и твердый или сифилитическій шанкръ. Двѣ первыя группы рѣзко отличаются отъ третьей тѣмъ, что эти страданія только мѣстныя, не заражающія всего организма, тогда какъ при сифилитическомъ или твердомъ шанкрѣ весь организмъ человѣка пропитывается, такъ сказать, ядомъ. Какъ ни тяжелъ хроническій перелой или мягкій шанкръ, особенно, если послѣдній, вслѣдствіе неопрятнаго содержанія, поведетъ къ образованію новыхъ ранъ, или приметъ разъѣдающій характеръ,—но все это относительно ничтожно въ сравненіи съ тѣми страшными страданіями, къ которымъ ведетъ зараженіе сифилитическимъ шанкромъ.

Всѣ три группы венерическихъ болѣзней характеризуются тѣмъ, что они заразительны для здороваго субъекта, заразительна именно та матерія, которая отдѣляется отъ заболѣвшихъ мѣстъ, будетъ ли это пораженная перелоемъ слизистая оболочка или отдѣляемое мягкаго шанкра и слизистой папулы. Каждая изъ трехъ группъ вызываетъ на здоровомъ субъектѣ такую же болѣзнь: перелойная матерія вызываетъ *только* перелой, отдѣляемое язвы мягкаго шанкра — *только* мягкій шанкръ и отдѣляемое твердаго шанкра — *только* твердый шанкръ съ послѣдующимъ сифилисомъ всего организма. До-

Digitized by Google

статочно имѣть царапинку, не замѣтную для глаза, или легкую ссадину кожи или слизистой оболочки, чтобы произошла прививка сифилитическаго яда съ твердаго шанкра или слизистой папулы. А потому твердый шанкръ по силѣ своей заразительности стоитъ на первомъ планѣ. Мягкій шанкръ не такъ легко прививается, и передаваясь почти исключительно путемъ совокупленія, развивается преимущественно только на половыхъ органахъ. Перелойное воспаленіе бываетъ только на слизистыхъ оболочкахъ половыхъ органовъ, мочеиспускательнаго канала и глазъ

Разсматривая венерическія заболѣванія въ отдѣльности, различаютъ три главныхъ формы ихъ: 1) *перелой* (трипперъ или гоноррея), 2) *мягкій шанкръ*, 3) *твердый шанкръ* (*сифилисъ*).

I. Перелой (трипперъ или гоноррея).

1) *Перелой* (называемый также *трипперомъ*, *гонорреей* или *бленорреей*) появляется обыкновенно вслѣдствіе переноса трипперпаго яда во время акта совокупленія. Источникомъ заразы служатъ гнойныя клѣточки, и чѣмъ богаче гноемъ перелойное отдѣленіе, тѣмъ оно заразительнѣе; нерѣдко перелой переходитъ на мочевой пузырь, и черезъ мочеточники даже на почечныя лоханки. Иногда вслѣдствіе переноса перелойнаго отдѣленія на придатки яичекъ появляется воспаленіе послѣднихъ; соотвѣтствующая половина мошонки сильно распухаетъ, яичко и придатокъ сильно увеличены и чрезвычайно чувствительны. По прошествіи остраго состоянія нерѣдко остается еще утолщеніе яичекъ. Эта болѣзнь выражается у мужчинъ чувствомъ зуда и жара въ головкѣ ствола. Изъ канала выдѣляется гнойная матерія. При мочеиспусканіи жгучая и рѣжущая боль въ стволѣ и преимущественно въ кончикѣ его. Не рѣдко бываютъ частые позывы къ мочеиспусканію и по ночамъ эрекціи очень болѣзненныя.

Трипперъ бываетъ *острый и хроническій*. Острый трипперъ у мужчинъ, если его запустить или неправильно лѣчить,

Digitized by Google

сопровождается часто осложненіями и имѣетъ болѣе или менѣе серьезныя послѣдствія.

Къ осложненіямъ относятся: *фимозъ*, или *незалупа*, когда отечная крайняя плоть не можетъ быть отворочена надъ головкой члена; *парафимозъ* или *удавка* („испанскій воротникъ"), когда отвороченная кзади крайняя плоть не можетъ быть обратно наведена на головку; *трипперный бубонъ* (воспаленіе паховыхъ железъ); *шанклотъ*—трипперное воспаленіе яичка; *простатитъ* (воспаленіе предстательной железы); *трипперныя кондиломы* (бородавчатыя разращенія на головкѣ члена). Къ послѣдствіямъ триппера относится главнымъ образомъ *стриктура* (съуженіе мочевого канала), а также затвердѣніе придатка и яичка, увеличенныя предстательныя железы и общее трипперное истощеніе. Если отдѣляемое при хроническомъ трипперѣ состоитъ изъ *бѣловато-мутной слизи*, то оно *не заразительно*, если оно *желтоватаго цвѣта* и состоитъ изъ гнойныхъ клѣтокъ, то оно *заразительно*, такъ какъ въ немъ есть присутствіе гонококковъ (микроорганизмовъ). Присутствіе у отверстія мочевого канала по утрамъ капли гноя или слизи и нахожденія нитей въ мочѣ служитъ нѣсомнѣннымъ признакомъ хроническаго триппера. Теченіе болѣзни очень продолжительное, нерѣдко годъ и больше. Невоздержность въ пищѣ и поллюціи вызываютъ обостреніе процесса.

Трипперъ очень рѣдко вполнѣ вылѣчивается аллопатіей и какъ тать таится въ скрытомъ состояніи. Гонорройный ядъ мужа заражаетъ его жену и его потомство, и по своимъ гибельнымъ послѣдствіямъ внушаетъ столько же страху и ужаса сколько и сифилисъ. Зараженная женщина долгое время чувствуетъ себя какъ бы совершенно здоровою, и потомъ внезапно выступаютъ всѣ явленія триппера. Вотъ эта-то хроническая гонорея причиняетъ имъ наибольшее число женскихъ болѣзней, и кромѣ того влечетъ за собою безплодіе, выкидыши, преждевременные роды, воспаленіе брюшины и тазовыхъ связокъ.

У женщинъ трипперомъ поражается слизистая оболочка

Digitized by Google

наружныхъ половыхъ органовъ, влагалища, шейки матки и мочеиспускательнаго канала.

Трипперъ наружныхъ половыхъ частей и трипперъ влагалища бываютъ острые и хроническіе. Симптомы ихъ одинаковы: чувство зуда и теплоты въ этихъ частяхъ, которыя черезъ 2—3 дня переходятъ въ боль, усиливающуюся при ходьбѣ и стояніи и во время мочеиспусканія; опухоль губъ, въ особенности малыхъ; отдѣляемое вначалѣ слизистое, затѣмъ становится обильнымъ и гнойнымъ; нерѣдко лихорадка, слабость, вялость, отсутствіе аппетита и сна. Болѣзнь длится отъ 7 до 14 дней.

Хроническая форма характеризуется усиленными отдѣленіями слизи и длится отъ нѣсколькихъ недѣль до 3 мѣсяцевъ. При обостреніи болѣзни, отдѣленія принимаютъ гнойный характеръ.

Трипперъ шейки и полости матки происходитъ вслѣдствіе распространенія процесса со влагалища.

Трипперъ мочевого канала у женщинъ выражается тѣми же явленіями, что и у мужчинъ, и осложняется воспаленіемъ паховыхъ железъ и шейки мочевого пузыря, а также острыми кондиломами.

Трипперъ часто осложняется воспаленіемъ Бартолиновыхъ железъ и начинается болью въ глубинѣ одной изъ большихъ губъ; боль усиливается при движеніи и ощупываніи, срамная губа значительно припухаетъ и черезъ нѣсколько дней образуется нарывъ, который вскрывается на наружную или внутреннюю поверхность губы.

Перелойное воспаленіе глазъ можетъ случиться при перелоѣ вслѣдствіе зараженія пальцами рукъ. Симптомы: глаза обыкновенно закрыты, вѣки сильно краснѣютъ и опухаютъ, особенно верхнее, достигающее иногда величины кулака; кожа на нихъ горяча, рѣсницы склеены обильнымъ выдѣленіемъ, засыхающимъ въ корки; если разнять глазъ, что очень болѣзненно, то окажется, что глазъ покрытъ обильнымъ гноемъ, яблоко сплошь сильно окрашено и зрачка почти не видно.

Digitized by Google

II. Мягкій шанкръ.

Мягкій шанкръ появляется нѣсколько дней спустя послѣ зараженія. На головкѣ члена образуется одинъ или нѣсколько пузырьковъ, которые скоро превращаются во столько же нагноеній круглыхъ, маленькихъ, мягкихъ, окруженныхъ красноватымъ кружкомъ, съ сѣрымъ основаніемъ и краями, разрѣзанными какъ бы рѣзцомъ. По прошествіи пяти или шести недѣль, и послѣ нагноенія, эти язвы легко заживаютъ. При этомъ паховыя железы часто распухаютъ (воспалительный бубонъ, переходящій нерѣдко въ нагноеніе).

Всего легче смѣшать мягкій шанкръ съ твердымъ, поэтому представляемъ здѣсь параллельно главные отличительные признаки каждаго изъ нихъ.

Мягкій шанкръ.	*Твердый шанкръ.*
а) Развивается безъ инкубаціи, то-есть безъ скрытаго развитія болѣзни въ организмѣ, а вскорѣ послѣ зараженія.	Развивается послѣ 25 — 26 дневнаго періода инкубаціи.
б) Начинается или въ видѣ пустулы, или же прямо язвой.	Чаще начинается папулой, бугоркомъ, который изъязвляется лишь впослѣдствіи.
в) Рѣдко бываетъ единичнымъ, но большею частью бываетъ нѣсколько язвочекъ.	Большею частью бываетъ единичнымъ, у больного рѣдко наблюдаются нѣсколько шанкерныхъ язвъ.
г) Изъязвленіе всегда глубокое, съ рѣзко обрѣзанными и подрытыми краями; дно язвы также болѣе или менѣе изрыто.	Изъязвленіе почти всегда поверхностное, плоское, иногда даже возвышенное подъ окружающей его здоровою тканью; края язвы незамѣтно сливаются съ дномъ ея, которое представляется гладкимъ и неизрытымъ.
д) Цвѣтъ язвы, бѣловато-сѣрый, сальный.	Цвѣтъ ея красный, похожій на цвѣтъ сырого окорока.
е) Воспалительные припадки, сопровождающіе изъязвленія, очень сильны и язва болѣзненна.	Воспалительные припадки или отсутствуютъ или выражены очень слабо, а потому язва почти безболѣзненна.
ж) Отдѣляемое язвой обильно, гнойно, часто кровянисто и очень заразительно, какъ	Отдѣляемое скудно, серозно и почти никогда не прививается ни самому больному,

Digitized by Google

для самого больного, такъ и для другихъ.	ни другому сифилитику, но легко заражаетъ здороваго.
з) Края и дно язвы мягки, иногда слегка твердоваты; но твердость эта тѣстообразна и безъ рѣзкихъ границъ.	Края и дно язвы тверды, чаще даже хрящеваты, эластичны. Твердость рѣзко ограничена.
и) Мягкій шанкръ сопровождается опуханіемъ одной а въ рѣдкихъ случаяхъ 2—3 железъ въ паху.	Твердый шанкръ сопровождается отвердѣніемъ всѣхъ лимфатическихъ железъ въ пахахъ.
і) Опухоль железъ болѣзненна и часто подвергается нагноенію.	Опухоль железъ безболѣзненна и нагнаивается лишь въ исключительныхъ случаяхъ.
к) Язвы мягкаго шанкра всегда заживаютъ рубцомъ, который мягокъ и никогда не изъязвляется вторично.	Послѣ твердаго шанкра нѣтъ большого рубца, а остается значительное затвердѣніе, которое можетъ подвергаться вторичному изъязвленію.
л) Мягкій шанкръ прививается какъ человѣку, такъ и животнымъ.	Твердый шанкръ встрѣчается лишь у человѣка; животнымъ не прививается.

Шанкръ почти всегда образуется на половыхъ органахъ; иногда, но очень рѣдко, на губахъ рта или въ заднемъ проходѣ.

Иногда вышеприведенныя язвы, вмѣсто излѣченія, принимаютъ слѣдующую злокачественную форму.

Злокачественный шанкръ (*разъѣдающій или фагеденическій*).

Въ этой формѣ болѣзни язвы становятся разъѣдающими, ползучими, заживая въ одномъ мѣстѣ, увеличиваясь въ другомъ. Они имѣютъ неправильную форму, изъѣденные, синеватые, подрытые края, сѣрое или зеленоватое дно и выдѣляютъ вонючій гной.

Такія язвы разрушаютъ часто обширные участки тѣла (*гангренозный, омертвѣлый шанкръ*).

Такого рода шанкръ влечетъ за собою сильное истощеніе организма, а иногда даже смерть.

III. Твердый шанкръ. Сифилисъ.

1) Сифилисъ первичный.

Шанкерное затвердѣніе образуется рѣдко на третій день, обыкновенно между 12 или 15 днемъ, но часто лишь спустя

Digitized by Google

6 и 8 недѣль. Оно называется *первичной сифилитической язвой*. Твердый шанкръ отличается отъ мягкаго, и отличительные признаки приведены выше (см. стр. 472). Заживленіе твердаго шанкра требуетъ нѣсколькихъ недѣль времени, иногда и нѣсколько мѣсяцевъ. Какъ и мягкій шанкръ, твердый можетъ принять форму фагеденическую или гангренозную (см. стр. 473). Опухающія паховыя железы (безболѣзненный бубонъ) разсасываются лишь очень медленно. Признаки: рана въ видѣ чаши, слишкомъ поднятая, въ центрѣ мягкая и осѣвшая. Нагноеніе не очень изобильное. На губахъ рта продолговатая язва въ видѣ трещины съ выдающимися краями, или прыща зернистаго, струповатаго. На головѣ язва скорѣе круглая. Поражаетъ въ особенности мужчинъ. Иногда этотъ шанкръ превращается въ

2) Сифилисъ вторичный.

Сначала: впечатлительность, капризное расположеніе духа и грусть. Апатія, отвращеніе, душевное разстройство. Сонъ тревожный перемежающійся, нисколько не возстановляющій. Утомленіе, чрезмѣрная усталость, общая слабость. Шумъ въ ушахъ.

Вскорѣ: лихорадка съ ознобомъ и жаромъ, подъ вечеръ. Ночной потъ. Давленіе. Кровотеченіе изъ носа. Сердцебіеніе.

Впослѣдствіи: Отсутствіе аппетита, тошнота или чрезмѣрный голодъ, поносъ. Худѣніе. Опухоль и нагноеніе десенъ. Пятна на тѣлѣ. Кровотеченіе изъ кишекъ. Боли сжимающія и острыя на головѣ; волосы тусклые, грязные, свалявшіеся, а потомъ падающіе и точно также вся волосяная система. Струповатая сыпь на головѣ. Затвердѣніе шейныхъ железъ, грудей. Язва иногда въ горлѣ, подъ челюстями, подмышками и проч. и проч. Ревматическія боли въ мускулахъ, въ спинѣ, въ груди, въ верхнихъ межреберныхъ сочлененіяхъ, и въ особенности (характеристическія) въ грудной кости. (Мѣсто очень болящее около $^1/_2$ окружности этой кости). Состояніе хлороанемическое.

Digitized by Google

Наконецъ: сифилитическія сыпи, весьма разнообразныя, круглыя, цвѣта мѣди или ветчины, или красно-оранжевыя (безъ зуда и боли), а именно:

Плоскія кондиломы (гноевые прыщи или болячки) гладкія, влажныя, послѣ заживленія шанкра.

Въ половыхъ органахъ, потомъ въ шулятной мошонкѣ, въ заднемъ проходѣ и проч., въ ноздряхъ, между большими пальцами ногъ, на пупѣ и проч.

Круглыя, овальныя, мягкія или выдающіяся, правильныя или разсѣянныя, изолированныя или слившіяся, плоскія или выпуклыя, гладкія, сочащіяся, вонючія, свѣтло-розовыя или багровыя, массами безобразными, отвратительными.

Пѣтушьи гребни, или кондиломы, или наросты, въ особенности въ заднемъ проходѣ, съ трещинами на немъ и на ногтяхъ и между большими пальцами.

Нагнаиваясь на слизистой поверхности образуютъ на краяхъ ноздрей и на подбородкѣ струпъ, подобный тутовой ягодѣ, а на грудяхъ сочащіеся пузырьки.

Пятнистая или стекловидная сыпь (болѣе медленная и болѣе продолжительная, чѣмъ обыкновенная).

Круглыя пятна, изолированныя или соединенныя, темно-розовыя, съ зубчатыми краями, съ бугорчатою или гладкою поверхностію, позже прыщеватыя или имѣющія видъ шагреневой кожи.

На груди, на животѣ и проч., никогда на лицѣ.

Сначала неопредѣленныя, потомъ мало-по-малу исчезаютъ.

Лишай. Маленькіе прыщи на ограниченномъ пространствѣ, коническіе или острые, часто чечевицеобразные и изолированные, появляющіеся отъ непрерывнаго нагноенія.

Распространяясь отъ груди и живота къ членамъ, въ особенности къ половымъ органамъ, гдѣ они скопляются, а также на лицо, ладони и ступни ногъ. Развиваются медленнѣе, чѣмъ стекловидная сыпь.

Лопуха. Пузырьки круглые, острые или осѣвшіе съ темно-краснымъ кругомъ, которые упорствуютъ послѣ заживленія язвы.

Струпъ на волосистой кожѣ, подобный угрямъ: чешуйча-

Digitized by Google

тый, желтоватый, покрытый маленькими прыщиками, съ потерею волосъ.

Корона Венеры. Сине-багровыя пятна, имѣющія свойство гноевыхъ прыщиковъ, расположенные въ видѣ діадемы вокругъ лба (характеристическая черта сифилиса).

Сыпь на подбородкѣ. Гноящіеся прыщики, сгруппированные вокругъ подбородка, струпящіеся, которые, сливаясь, уничтожаютъ бороду.

Сифилитическая жаба. Плоскіе слизистые прыщи въ глубинѣ рта съ опухолью миндалевидныхъ железъ, бугорчатые и гнойные, желтоватые, затрудняющіе глотаніе.

Сифилитическій насморкъ, сопровождающій предъидущіе случаи.

Пятна коричневыя и широкія, въ особенности у людей съ бѣлою кожею и у женщинъ.

Роговидная сыпь. Чешуйчатыя, роговидныя сыпи собственно на ладоняхъ и на ступняхъ ногъ, фіолетовые, съ толстою чешуею, которая отпадаетъ и снова появляется на твердой поверхности съ трещинами, причиняющими зудъ и ощущеніе жженія.

Сифилитическія пустулы. Группа твердыхъ прыщей, подобныхъ угрямъ, струпъ отъ которыхъ отпадаетъ, оставляя пятна и неизгладимые шрамы.

Сифилитическіе волдыри. Въ особенности на ногахъ съ красными пятнами и вѣнчикомъ, увеличивающіеся, струпъ отъ которыхъ, отпадая, оставляетъ фіолетовый шрамъ.

Сифилитическія болячки. Въ особенности на лицѣ, на языкѣ, на нёбѣ, ва верхней губѣ, на мужскомъ членѣ, на маточной шейкѣ. Подобныя вишнѣ, твердыя, темно-красныя, нечувствительныя; нагноеніе вязкое или съ кровью; расположенныя въ кругѣ, иногда разъѣдающія или змѣевидныя, разрушающія носъ, губу, ухо, щеки, половые органы и влекущія часто гніеніе костей.

Разъѣдающій лишай. Подобный предъидущимъ болячкамъ; поражаетъ особенно лицо.

Сифилитическое воспаленіе ногтей, которые становятся

Digitized by Google

фіолетовыми, рыхлыми, толстыми, пластинчатыми съ нагноеніемъ около основанія; это послѣднее дѣлается иногда губчатымъ и выворачивается, съ нагноеніемъ вонючимъ и изобильнымъ.

Сифилитическое воспаленіе глазъ. Зрачковый ободокъ покрывается полосками или мясистымъ наростомъ, цвѣта темнаго или темно-мѣднаго. Глазъ утолщается, сверканіе въ глазахъ, ослабленіе зрѣнія, приростаніе глазъ къ роговой оболочкѣ, боль нервовъ глазной впадины.

Сифилитическая мясная грыжа. Отвердѣніе и увеличеніе узловатое или зернистое шулятъ, которыя просачиваются, разрушаются, иногда просверливаются, покрываются губчатыми наростами.

3) Сифилисъ третичный.

Явленія болѣе рѣдкія, болѣе запоздалыя, медленно развивающіяся и болѣе упорныя, не прилипчивы, разрушаютъ самую глубину организма.

Рупія. Кратковременные пузыри величиною въ копѣечную монету, съ гноемъ коричневатымъ или толстымъ струпомъ, зеленоватымъ, съ темно-бурымъ вѣнчикомъ, оставляющіе шрамы фіолетовые, или засыхаютъ и иногда не заживаютъ.

Пузырная сыпь. Пузыри величиною съ куриное яйцо, круглые, прозрачные, при лопаніи отдѣляютъ желтоватый или коричневый гной и затѣмъ образуется коричневый тонкій струпъ, послѣ котораго остается красное пятно. Они преимущественно поражаютъ новорожденныхъ на ладоняхъ или на ступняхъ ногъ.

Сифилитическія гуммы. Шишковатыя опухоли, величиною съ горошину или даже съ орѣхъ, изолированныя или разсѣянныя по всему тѣлу, сначала безболѣзненныя, затѣмъ изъ нихъ вытекаетъ липкій тягучій гной, оставляя глубокія язвы почти невозможныя для заживленія, которыя иногда становятся разъѣдающими или змѣевидными.

Перерожденіе разныхъ мускуловъ, которые твердѣютъ или представляютъ небольшія твердыя болящія опухоли.

Съуженіе задняго прохода и прочихъ проходовъ.

Digitized by Google

Боли, подобныя лому въ костяхъ, болѣе пространныя и менѣе глубокія, острыя, пронзительныя, усиливающіяся въ постелѣ или отъ нажатія; въ особенности появляются въ ногахъ и тѣмъ препятствуютъ движенію, въ грудной кости, производя затрудненное дыханіе, въ головѣ, дѣлающейся неспособной ни къ какому труду, и причиняютъ продолжительную безсонницу.

Сифилитическія болѣзни костей.

Воспаленіе надкостной плевы. Раздутость костей, происходящая отъ сифилитическихъ опухолей, которыя иногда гноятся и влекутъ за собою еще большее разстройство.

Костные наросты. Шероховатые наросты на голени, локтѣ, черепѣ, ключицѣ, преимущественно на нёбѣ, что характеристично, и влекутъ иногда за собою вывихъ нижней челюсти, худѣніе мускуловъ, опухоль, онѣмѣніе и параличъ.

Костоѣда и омертвѣніе костей (Антоновъ огонь). Послѣдствія костныхъ наростовъ, поражающія преимущественно стопу, ребра, грудную кость, ключицы, черепъ и лицо.

Прободеніе нёба, вслѣдствіе язвы, которое портитъ голосъ и произношеніе.

Костоѣда и омертвѣніе носовыхъ костей. То же лѣченіе.

Рѣзкое воспаленіе зубовъ, которые выходятъ изъ своихъ луночекъ, затрудняютъ жеваніе и безобразятъ лицо.

Воспаленіе безпарной кости (въ ноздряхъ), которому предшествуютъ головныя боли по ночамъ, боль въ переносицѣ, истеченіе отвратительной сукровицы, смѣшанной съ обломками костей, и всего чаще сопровождается осѣданіемъ нёба, ноздри закручиваются и обнаруживаютъ свою внутренность.

Воспаленіе собственно носовыхъ костей, съ раздутостію и рожистымъ окрашиваніемъ кожи, которая скоро воспаляется и покрывается язвами. Кости шатаются, трещатъ, потомъ ломаются; на мѣстѣ носа остается круглая болячка съ шрамами.

Слезная фистула, происходящая отъ воспаленія челюстныхъ костей.

Воспаленіе костей глазной впадины, съ углубленіемъ или проекціей глаза, съ болью, съ слабостію зрѣнія и темною водою болѣе или менѣе значительною.

Воспаленіе ушныхъ костей, съ острою болью, глухотою, ушною течью, могущее перейти на мозгъ, а затѣмъ и смерть.

Digitized by Google

Сифилитическія внутреннія болѣзни.

Происходящіе отъ сифилиса: приливы, изліянія, новообразованія, жировое перерожденіе, худѣніе или ожирѣніе, костоѣда или омертвѣніе костей, сведеніе больныхъ мускуловъ; всѣ эти болѣзни упорны, разнообразны по производимымъ ими страданіямъ, и влекутъ за собою общее истощеніе организма.

Главныя изъ нихъ: Упорная безсонница. Потеря памяти. Потеря памяти, даже послѣ излѣченія. Поврежденіе произношенія. Воспаленіе мозга и его оболочекъ. Сумасшествіе или безуміе съ параличемъ. Эпилепсія и истерика. Пляска св. Витта. Невралгія и параличъ. Прогрессивный параличъ всего тѣла. Параличъ нижней половины тѣла. Неправильное движеніе членовъ, двигательная атаксія. Темная вода. Косоглазіе или двойное зрѣніе. Тупоуміе, несвязность понятій, идей. Душевныя болѣзни.

Сифилисъ дыхательныхъ органовъ.

Гортанный сифилисъ. Внутренняя опухоль, дѣйствующая подобно туберкуламъ гортанной чахотки, но съ болѣе сильнымъ поврежденіемъ въ гортанномъ отверстіи и окружающихъ костей, переходящая въ сифилитическое воспаленіе горловыхъ вѣтвей.

Легочный сифилисъ или *сифилитическая чахотка.* Съ такими же симптомами, какъ и обыкновенная чахотка; изнурительная лихорадка, сильное потѣніе, харканіе кровью; потомъ гноевидное, сопровождающееся внутреннимъ поврежденіемъ, воспаленіемъ надкостной плевы въ ключицѣ, наростомъ на берцовой кости, гніеніемъ нёба, наружной грудной кости, упорныя узловатыя затвердѣнія вокругъ шеи. Всѣ эти симптомы характеризуютъ сифилисъ.

Сифилитическая одышка. Послѣдствіе предъидущихъ поврежденій мли можетъ быть отъ происшедшаго неправильнаго кровообращенія.

Сифилисъ сердца. Слѣдствіе гуммозной массы, образовавшейся въ различныхъ частяхъ сердца, порождающее повреж-

Digitized by Google

деніе, гипертрофію или атрофію заслонокъ и проч. и проч., сопровождается еще и другими характеристическими симптомами.

Сифилисъ печеночный. Еще мало извѣстный, съ глухою болью, гипертрофіею и желтизною, болѣе или менѣе явственною съ самаго начала.

Сифилисъ почечный. Съ бѣлковымъ мочеизнуреніемъ.

Сифилитическое воспаленіе яичника. Болѣзни предстательной железы, матки и проч. Эти виды сифилиса мало еще изслѣдованы.

Сифилитическое истощеніе (кахексія).

Симптомы истощенія могутъ появиться уже въ первомъ и второмъ періодахъ болѣзни, обыкновенно же они проявляются въ позднѣйшемъ періодѣ и заключаются въ исхуданіи, потерѣ силъ и аппетита. Разстройство пищеваренія. Безсонница. Упорныя боли. Сильное нагноеніе костоѣды. Общая атрофія главныхъ внутренностей: печени, почекъ, мочевого пузыря и проч. Кожа сухая, сморщенная, твердая, пыльная, лупящаяся. Пузыри и гнойные прыщи зловѣщіе, черноватые, аспиднаго цвѣта, съ потомъ, окрашеннымъ кровью. Сыпи сине-багровыя, при внутреннихъ кровотеченіяхъ, и иногда съ бѣлковымъ мочеизнуреніемъ. Сильное потѣніе. Лихорадка. Водянистый поносъ. Постепенно развивающееся онѣмѣніе тѣла и ослабленіе разсудка.

Въ общей сложности это сухотка, отъ которой тѣло сохнетъ и разрушается вполнѣ, и никогда уже не возстановляется.

Теперь сдѣлалось извѣстнымъ, благодаря вскрытіямъ, что этотъ родъ смерти гораздо чаще случается, чѣмъ прежде полагали.

Наслѣдственный сифилисъ.

Мужчина, будучи боленъ сифилисомъ первичнымъ или вторичнымъ, хотя бы онъ въ данное время и не имѣлъ на себѣ

Digitized by Google

никакихъ сифилитическихъ явленій, заражаетъ обыкновенно какъ жену, такъ и свое потомство.

Сифилитическая мать, зараженная прежде или послѣ зачатія, или просто которая кормила грудью ребенка сифилитическаго, передаетъ болѣзнь своему зародышу.

Передача неизбѣжна, когда отецъ и мать заражены сифилисомъ.

Послѣдствія сифилитической наслѣдственности.

1. *Выкидыш*. Зародышъ изнемогаетъ прежде своего рожденія вслѣдствіе своего кахетическаго состоянія. Даже послѣ излѣченія (кажущагося) матери, выкидыши слѣдуютъ иногда съ упорнымъ постоянствомъ; но только они случаются позже при беременности и затѣмъ исчезаютъ. Надежды на жизнь увеличиваются для зародышей и у тѣхъ, которые достигнутъ рожденія, признаки наслѣдственности появляются гораздо позже [1]).

2. *Золотуха и англійская болѣзнь*. Здѣсь представляется доказаннымъ тезисъ, еще оспариваемый, что золотуха ничто иное, какъ сифилисъ очень ослабленный или видоизмѣненный. Это доказательство вытекаетъ изъ многочисленныхъ наблюденій.

3. *Рожденіе въ кахетическомъ состояніи* безъ другихъ видимыхъ знаковъ. Признаки: Тѣло исхудалое. Кожа матовая, морщиноватая, тусклая. Краснота воспалительная и сине-багровая на задницѣ, между ляжками и на пяткахъ. Пузырная сыпь, иногда на ладоняхъ или ступняхъ. Нижнія конечности тощія, дряблыя, слабыя, синеватыя. Ноги едва образовавшіеся.

---

[1]) Одинъ сифилитическій мужчина имѣлъ десять человѣкъ дѣтей, умершихъ скоропостижно при рожденіи; но послѣ 18-тимѣсячнаго лѣченія имѣлъ 11-го ребенка, совершенно здороваго.

Иногда надежды на жизнь зародыша уменьшаются, вмѣсто того, чтобы увеличиваться Въ другихъ еще случаяхъ одни умираютъ или родятся зараженными, попеременно съ другими, которые умираютъ.

Digitized by Google

Волосы сухіе и рѣдкіе. Лицо желтое, темнобурое, цвѣта кофейной гущи или разведенной сажи. (Этотъ симптомъ характеристическій). Черты лица старческія, миніатюра дряхлости.

Ребенокъ слишкомъ слабъ, чтобы сосать грудь, онъ чахнетъ спустя нѣсколько дней или нѣсколько часовъ съ слабо выраженнымъ крикомъ.

4. *Рожденіе съ наружными заболѣваніями*, которыя обнаруживаются въ раннемъ времени, или черезъ недѣлю послѣ рожденія, а самое позднее — черезъ годъ. Чѣмъ болѣе они опаздываютъ, тѣмъ они слабѣе выражены. Эти раннія обнаруживанія слѣдующія: гноевые прыщи, плоскія кондиломы. пузырная сыпь, которою нѣкоторыя дѣти бываютъ покрыты при самомъ появленіи ихъ на свѣтъ.

5. *Рожденіе безъ видимыхъ сифилитическихъ признаковъ* и съ обнаруженіемъ въ болѣе позднемъ возрастѣ, иногда лишь при половой зрѣлости, при бракѣ, при родахъ или даже позже.

Различаются двѣ степени:

1-я степень. Признаки, появляющіеся нѣсколько дней спустя послѣ рожденія: безпокойство, безсонница. Блѣдность. Кожа дряблая и сухая. Ступни ногъ сухія, синеватыя. Пятна темнаго мѣднаго цвѣта, чечевицеобразныя, не уступающія давленію, на лицѣ и нижнихъ конечностяхъ. Верхняя кожица отдѣляется маленькими пластинками. Дыханіе все болѣе и болѣе шипящее. Ноздри болѣе и болѣе засоряются сукровичнымъ гноемъ, такъ что ребенокъ дышетъ только ртомъ. Голосъ сиплый, вскорѣ вовсе пропадаетъ. Трудное глотаніе. Во рту и заднемъ проходѣ концентрическія трещины съ кровью, постепенно увеличивающіяся.

2-я степень. Признаки (продолженіе 1-й степени): гноевые прыщики на темныхъ пятнахъ. Въ заднемъ проходѣ и въ отверстіи матки группа кондиломъ, или плоскихъ слизистыхъ ранъ. На промежности и между ягодицами то же самое. Между ляжками, на шеѣ, спинѣ и на лицѣ то же самое.

Позже: нагноеніе гноевыхъ прыщиковъ и кондиломъ; въ особенности на шеѣ, въ складкахъ ляжекъ, на поджилкахъ, между ягодицами, на большихъ губахъ, на пяткахъ, съ твер-

Digitized by Google

дыми приподнятыми краями; вѣнчикъ красный, грязный, сукровичный, разъѣдающій, часто течетъ кровь съ гноемъ зеленоватымъ и чернымъ струпомъ. Носъ гноящійся отвратительною мокротою и опускающійся. Горло съ язвами. Голосъ теряющійся. Потеря аппетита увеличивающаяся. Безсонница увеличивающаяся. Слабость увеличивающаяся. Общее истощеніе.

Эта сифилитическая зараза можетъ быть передана ребенкомъ кормилицѣ, а ею другому ребенку и этимъ послѣднимъ другой кормилицѣ и т. д.

И отсюда возможное вырожденіе семействъ и поколѣній.

Лѣченіе венерическихъ болѣзней.

Лѣченіе остраго перелоя.

Главное условіе для достиженія быстрыхъ и вполнѣ успѣшныхъ результатовъ лѣченія является полный тѣлесный и душевный покой и ношеніе суспензорія. Больной долженъ пить въ изобиліи свѣжую воду или остуженный настой льняного сѣмени (изъ 1 столовой ложки на 2 стакана воды), избѣгать совершенно пива, спиртныхъ напитковъ вообще и кофе, пищу же употреблять преимущественно растительную и молочную.

Изъ лѣкарствъ принимать въ первые 4—5 дней вн. *A.* 2 (1-й ст.) и черезъ 2 часа по 1 сух. кр. *V.*, также 3 раза въ день по 5 круп. *S.* 1 передъ кушаньемъ; когда симптомы воспаленія и мочерѣзъ значительно уменьшатся, когда появится истеченіе изъ канала, когда эрекціи будутъ рѣже и поллюціи прекратятся, тогда *A.* 2 × *V.* (1-й ст.), при гнойномъ истеченіи *A.* 1 × *S.* 5 × *V.* (2-й ст.) и черезъ часъ по очереди по 1 круп. этихъ же лѣкарствъ и одинъ разъ въ день вн. 5—10 капель *Эл. Желт.* въ ложкѣ воды; спринц. *V.* попер. съ *C.* 5, на лобковкость, промежность и симп. нер. *Эл. Анж.* или *Эл. Кр.* × *Ж.* Вмѣсто спринцованія часто лучше и цѣлесообразнѣе вводились *бужи Венерео* утр. и веч. въ мочевой каналъ. При сильномъ воспаленіи и сильной боли—примочки изъ раствора 1 ч. л. *Эл. Анж.* или *Эл. Б.*. на стак. воды и каждый ве-

Digitized by Google

черъ теплая сидячая ванна съ прибавл. 10 круп. *A.* 2 и по 20 круп. *S.* 5 и *V.* Это же лѣченіе при воспаленіи и изъязвленіи полового члена, при заворотѣ крайней плоти (парафимозъ) или незалупѣ (фимозъ).

Если имѣется воспаленіе яичекъ, то вн. *A.* 2 × *V.* × *C.* 5 (2—1-й ст.) и тѣ же лѣкарства въ сухомъ видѣ отъ 6 до 8 круп. въ продолженіе дня, и ванны *V.*, *S.* 5, *C.* 5. При этомъ діэта, спокойное положеніе, носить суспензорій и такъ продолжать до совершеннаго излѣченія, то есть до прекращенія истеченія, возстановленія правильнаго отправленія мочевыхъ органовъ и чтобы не осталось слѣда затвердѣнія и боли. Въ началѣ холодные, затѣмъ согрѣвающ. компр. изъ раствора 20 круп. *A.* 2 и 1 чайн. лож. *Эл. Анж.* на стак. воды. При безболѣзнен. затвердѣніи *зеленая мазь* попеременно съ *Венерео-мазь*. При пораженіи яичекъ не дѣлать никакихъ спринцованій въ мочевомъ каналѣ. При хронич. опухоли яичекъ лѣкарства давать тѣ, которыя указаны ниже противъ хронич. перелоя.

Противъ *перелойнаго воспаленія глазъ* въ продолженіе двухъ дней вн. *A.* 2 × *S.* 1, глазн. ван. и прим. *A.* 2 и *S.* 5 или *V.* и *C.* 5; на зат., подгл. и симп. нер. и на виски *Эл. Анж.* или *Эл. Кр.* × *Ж.* (ср. еще *Глаза, воспаленіе ихъ*). Здоровый глазъ предохранять отъ зараженія повязкою.

Женщинамъ *при остромъ перелоѣ* оставаться въ постелѣ, поверхность губъ изолировать, закладывая между ними тампоны изъ гигроскопической ваты, смоченные въ растворѣ *S.* 5, или *C.* 5 или *V.* Внутрь тѣ же лѣкарства, что при остромъ перелоѣ у мужчинъ, то же и примѣненіе Эл.-Гомеоп. жидкостей.

Лѣченіе хроническаго перелоя.

Вн. *A.* 2 × *S.* 5 × *V.* (2—1-й ст.) и 3 раза въ день по 3 круп. этихъ же лѣкарствъ въ сух. видѣ. *Зелен. бужи* или *бужи Венерео*. Въ упорн. случаяхъ спринцованіе изъ раствора 10 круп. *A.* 2 и *S.* 5 и *V.* и 1 чайн. лож. *Эл. Зел.* въ стак. воды.

Стриктура (*съуженіе мочевого канала*) при сильномъ развитіи ея лѣчится механическимъ растираніемъ съ помощью

Digitized by Google

каучуковыхъ бужей. Расширеніе раны должно производиться врачемъ съ надлежащей постепенностію и осторожностію. Рядомъ съ тѣмъ вводить и лѣкарственные мягкіе бужи изъ *Венерео* или *Канчерозо*. Внутрь: *A*. 3 × *C*. 6 или *S*. 6 (3—1-й ст.), каждый вечеръ—тепл. сидячая ванна съ *A*. 2, *S*. 6 и *C*. 6.

Трипперный ревматизмъ. Лѣченіе то же, что при воспаленіи яичекъ (см. выше) вн. и нар. Часто очень благотворно дѣйствуетъ *Линфатико-мазь* поперем. съ *Венерео-мазь*.

Трипперное истощеніе: *L*. × *V*. × *F*. 1 (3—1-й ст.) и 3 раза въ день передъ кушаньемъ *A*. 3 × *S*. 5 по 5 круп. Въ подреб. мазь *F*. 2, ванны или обтиранія съ *S*. 5, *V*. и *F*. 2.

Лѣченіе мягкаго шанкра.

Противъ *мягкаго шанкра безъ бубона* для уничтоженія общихъ симптомовъ, которые составляютъ послѣдствіе мѣстнаго зараженія, а также тяжести головы, безсонницы, жара кожи, отсутствія аппетита и необъяснимой слабости, испытываемой больными, даютъ въ продолженіе двухъ, трехъ дней вн. *A*. 2 (1-й ст.), при сильномъ воспаленіи—*A*. 1. Этотъ способъ задерживаетъ воспаленіе и не допускаетъ излишняго притока крови къ сосѣднимъ частямъ шанкра или язвы. Такимъ образомъ будетъ отстранено внутреннее и наружное воспаленіе и предупредится разъѣдающій характеръ или антоновъ огонь. На язву примочки *V*. (25 круп. на стак. воды). Черезъ 5—6 дней отъ начала приложенія этихъ примочекъ вн. *V*. (1-й ст.) × *A*. 2 (2—1-й ст.) и въ сухомъ видѣ *V*. утромъ и вечеромъ: въ 1-й день по 2, на 2-й день по 3, на 3-й день по 4, и такимъ образомъ дойти до 10 въ одинъ пріемъ, или 20 сухихъ круп. въ день, и затѣмъ, по излѣченіи, слѣдовать этой градаціи въ обратномъ отношеніи, уменьшая количество круп. до 2 утромъ и вечеромъ. Ванны общія съ 150 круп. *V*. способствуютъ выздоровленію. Если шанкерная язва не поддается заживленію, то послѣ употребленія *A*. 2 и *V*. употребляютъ вн. и нар. *S*. 1 или *S*. 5 или *C*. 1—*C*. 5.

Бубонъ при мягкомъ шанкрѣ лѣчится какъ воспаленіе железъ (см. *Железы*).

Digitized by Google

Лѣченіе твердаго шанкра и сифилиса.

При малѣйшемъ подозрѣніи на происшедшее зараженіе сифилисомъ принимать *A.* 1 × *V.* въ сух. круп. слѣдующимъ образомъ: по 2 круп. *V.* передъ завтракомъ и ужиномъ и по 2 круп. *A.* 1 передъ обѣдомъ, и каждый день увеличивать дозу на 1 круп. (до 10 круп.) и затѣмъ въ томъ же порядкѣ уменьшать кажд. день дозу на 1 круп. Пищу принимать преимущественно мясную. 2 раза въ недѣлю теплая или паровая ванна.

Если зараженіе уже произошло и образовалась *первичная сифилитическая язва*, то принимать *A.* 1 × *V.* (1-й стак.), наружно же, компр. изъ неразведеннаго *Эл. Зел.*; то же при опуханіи паховыхъ железъ. Въ упорн. случ. *A.* 3 × *C.* 1 или *C.* 5 въ растворѣ и въ сухомъ видѣ; на шанкръ прим. *V.*, *Эл. Зел.* и *C.* 5 въ смѣси, на соотвѣт. нер. *Эл. Б.* или *Эл. Кр.* попер. съ *Ж.*, ван. *C.* 5.

Противъ *сифилиса вторичнаго и третичнаго* вн. угромъ и веч. 5 — 10 сух. круп. *C.* 5, въ теченіе дня *C.* 1 × *V.* и ван. *C.* 5 × *V.* Въ лѣченіе вводятъ вн. и нар. *A.* 1 или 2 при кровотеченіяхъ и приливѣ крови.

Что касается крѣпости растворовъ при лѣченіи сифилиса, то доза изъ 1 стак., иногда довольно слаба и приходится брать *до десяти круп.* на стаканъ воды для внутренняго употребленія, переходить однако къ крѣпкимъ разведеніямъ слѣдуетъ лишь постепенно. Въ упорн. случ. вводить въ лѣченіе *C.* 4.

При боли въ костяхъ, сочлененіяхъ и слабости поясницы, происходящихъ отъ сифилиса, а также и на язвы прикладываютъ компрессы изъ Эл.-Гомеоп. жидкостей, сообразно съ правилами, указанными въ гл. V и VI.

Наружно лѣкарства примѣняются всѣми возможными способами, сообразно съ пораженнымъ органомъ, и въ особенности въ ваннахъ. См. стр. 92 и далѣе.

Лѣченіе сифилитическихъ заболѣваній внутреннихъ органовъ см. при органахъ въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ этой книги.

Digitized by Google

Лѣченіе и предупрежденіе наслѣдственнаго сифилиса.

Если мать здорова, плодъ же предположительно зараженъ сифилисомъ, то мать должна къ концу беременности принимать напи лѣкарства слѣдующ. образомъ: до полудня *A.* 2 или *A.* 3 (3-й стак.), послѣ полудня *C.* 1 (2-й стак.), кромѣ того *V* въ сух. видѣ передъ завтракомъ и ужиномъ: въ первый день по 2 круп., во второй — по 3, въ третій—по 4 круп. и такъ увеличивая дозу на одну круп., дойдя въ 9-й день до 10 круп. на пріемъ; затѣмъ въ томъ же порядкѣ опять уменьшать дозу каждый день на 1 круп., пока дойдетъ до первоначальной дозы, послѣ чего продолжать принимать только указанныя выше разведенія. Кромѣ того разъ въ недѣлю брать теплую ванну съ 50 круп. *V.* и 1 стол. ложку *Эл. Б.* и кажд. день передъ обѣдомъ въ сух. видѣ внутр. 5 круп. *C.* 1.

Если отецъ сифилитикъ, то онъ долженъ продѣлывать это же лѣченіе при всякомъ возвратѣ у него сифилитическихъ явленій и повторять этотъ курсъ до полнаго выздоровленія.

Если ребенокъ родился съ выраженными сифилитическими явленіями, то дѣлать ему теплыя ванны съ 10 круп. *V.* и 10 каплями *Эл. Б.* Въ перв. недѣлю давать вн. утр. и веч. по 1 круп. *V.*; во вторую недѣлю—по 2 круп. и такъ далѣе до 4 круп. и затѣмъ обратно въ томъ же порядкѣ. Кромѣ того: *A.* 1 (4-й ст.) × *C.* 1 (3-й стак.) и передъ каждымъ кормленіемъ 1 круп. *C.* 1. (Ср. также *Золотуха*, *Кости и болѣзни ихъ*, *Железы*).

Аллопатическія средства до сихъ поръ извѣстныя противъ сифилиса, только замедляютъ его проявленія, но послѣднія рано или поздно снова обнаруживаются. Только одни Электро-Гомеопатическія лѣкарства уничтожаютъ его, въ чемъ всякій добросовѣстный наблюдатель можетъ убѣдиться изъ опытовъ. А потому мы не будемъ перечислять всѣхъ излѣченій совершенно схожихъ между собою. Нѣсколько примѣровъ будетъ достаточно.

Излѣченія. Мягкій шанкръ безъ бубона у м. 30 л. вылѣченъ въ 10 дней *V.* вн. (1-й ст.).

Digitized by Google

— Мягкій шанкръ съ бубономъ у м. 27 л., съ нагноеніемъ правой паховой железы, вылѣченъ въ 2 м. вн. (1-й ст.) и нар. *V.* попер. съ *C.* 1.

— Твердый шанкръ съ бубономъ у м. 30 л. съ нагноеніемъ лѣвой паховой железы вылѣченъ въ 8 м. Вн. *A.* 2 (1-й ст.) попер. съ *V.* и *C.* 5 (по 3 кр. на ½ стак. воды) и тѣ же круп. въ сухомъ видѣ съ пищею; нар. *Эл. Зел.*, *V.* и *C.* 5 въ прим. и ваннахъ (*C.*).

— Разъѣденная крайняя плоть у м. 35 л. вылѣчена въ 3 мѣс. вн. (1-й ст.) и нар. *V.* и компр. съ *Эл. Бѣл.*

Совѣты черезъ корреспонденцію. — Сифилисъ вторичный. М. 35 лѣтъ ощущалъ острыя и сжимающія боли въ головѣ; волоса тусклые, свалявшіеся, струпъ на головѣ, плоскія кондиломы, пятна на тѣлѣ коричневыя, роговидная сыпь на ладоняхъ и ступняхъ ногъ, тревожный сонъ, лихорадка по вечерамъ, катарръ желудка, усиленное біеніе сердца, гиперемія печени, полипъ въ носу, видимый изъ правой ноздри, потеря обонянія, общая слабость. Лѣченіе начато было въ ноябрѣ 1879 г. Вн. *S.* 5 попер. *C.* 5 (2-й ст.) и черезъ день попер. то съ *A.* 2, то съ *F.* 1 (2-й ст.), и ежедневно 10 сухихъ круп. *S.* 1 въ три пріема. Нар. мази и прим. на соотвѣтств. мѣста *A.* 2, *C.* 5 и *F.* 2 и 2 раза въ недѣлю ван. *S.* 5, *C.* 5 и *A.* 2 попер. Черезъ мѣс. послѣ начала лѣченія замѣтное улучшеніе; черезъ 3 мѣс. болѣе выдающіеся симптомы прошли, полипъ уменьшился, обоняніе, аппетитъ и сонъ возвратились; черезъ 6 мѣс. началъ выздоравливать и полипъ совершенно уничтожился, остались только коричневыя пятна, но блѣднѣе, чѣмъ были. Черезъ годъ совершенно выздоровѣлъ. По мѣрѣ улучшенія болѣзни, дозы на всѣ лѣкарства усиливались (*C.*).

— Сифилисъ вторичный. М. 22 л. страдалъ сильнымъ мочерѣзомъ, моча задерживалась, истеченіе изъ мочевого канала гнойное, окрашенное кровью, колѣни очень опухли и чрезвычайно болѣзненны при движеніи; большой палецъ ноги, пятки и передняя часть правой ноги очень опухли и очень болѣзненны. Больной едва стоялъ на ногахъ и движеніе было невозможно. Языкъ густо обложенъ, отсутствіе аппетита, запоръ, пульсъ 125 разъ въ минуту. Вн. 8 кр. *S.* 1 на ст. воды по глотку въ теченіе дня, съ пищею по 4 кр. *A.* 1, спринц. *V.* (20 кр. на 4 унціи воды и 2 унціи очищен. 40° спирта) 4 раза въ день, и ван. *A.* 2 (10 кр. на ван.), на ногу и колѣни мазь *S.* 5. Черезъ 7 дней больной могъ ходить, упираясь на палку, опухоль колѣнъ и боли уменьшились, истеченіе не столь кровянисто, мочеиспусканіе свободнѣе и не столь болѣзненно, аппе-

Digitized by Google

титъ улучшился, запоръ уменьшился. Продолжая это лѣченіе еще 4 нед., больной совершенно выздоровѣлъ. Лѣченіе закончено *V.* (1-й ст.) и сух. круп., которое больной принималъ еще мѣсяцъ (*C.*).

Случаевъ излѣченія вторичнаго сифилиса, въ различныхъ его проявленіяхъ, очень много (*C.*).

— Совѣтъ черезъ корреспонденцію въ г. Эривань. Д. 8½ л. отъ роду страдала 1½ года трипперными зараженіями, выражавшимися воспаленіемъ влагалища и гнойнымъ выдѣленіемъ. Она, по словамъ ея отца, заразилась отъ матери при совмѣстномъ купаніи въ ваннѣ, такъ какъ ея отецъ страдаетъ хрон. трипперомъ 20 л. и онъ заразилъ свою жену, которая болѣетъ со времени замужества 11 л. Дѣвочку безуспѣшно лѣчили аллопаты разными спринцованіями. Назначено 8 Января 1896 г. на тощакъ 10 кр. *V.*, на ночь 2 кр. *A.* 2, въ теченіи дня *V.* × *C.* 2 × *S.* 2 (2-й ст.) и тѣже круп. съ пищею; спринц. и вдуванія *C.* 5 × *S.* 2, на животъ и пахи мазь *C.* 5 × *S.* 1. Черезъ 4 мѣсяца совершенно выздоровѣла (*C.*).

Слюна. Увеличенное отдѣленіе слюны можетъ быть критическимъ, напримѣръ при оспѣ или при медленныхъ нервныхъ лихорадкахъ или вообще при лихорадкахъ вслѣдствіе задержанія пота; или оно можетъ быть симптоматическимъ при беременности, глистахъ, отравленіи ртутью, воспаленіи горла или рта, или часто мѣстнымъ пораженіемъ; или быть въ связи съ сочувственными разстройствами подъ вліяніемъ болѣзни желудка или кишекъ.

Недостатокъ слюны или сухость во рту и въ горлѣ указываетъ на воспалительное или лихорадочное состояніе и въ этомъ случаѣ является постояннымъ симптомомъ, сопровождаемымъ жаждою.

Солнечный ударъ. На зат. и на главн. нервн. точки, соотвѣтствующія пораженной части, *Эл. Кр.*, а на пораженное мѣсто и голову прим. *S.* 1; вн. *S.* 1 (1-й ст.), а при лихорадкѣ попер. съ *F.* 1 (1-й ст.). При безсознательномъ состояніи и симптомами, подобными апоплексіи, вн. 10 сух. круп. *S.* 1, что повторять, пока не возвратится сознаніе. При остановкѣ дыханія производить искусственное дыханіе (см. стр. 349).

Сосудистая система образуется изъ двоякаго рода сосу-

Digitized by Google

довъ, отличающихся между собою главнымъ образомъ характеромъ содержащейся въ нихъ жидкости. Одни изъ этихъ сосудовъ содержатъ *кровь* и называются *кровеносными*, другіе несутъ *лимфу* и называются *лимфатическими* или *всасывающими*.

Кровь необходима для питанія всѣхъ тканей и органовъ. Чтобы постоянно поступать во всѣ части тѣла, она должна находиться въ безпрестанномъ движеніи. Для этой цѣли существуетъ *сердце*, которое, подобно насосу, съ одной стороны выталкиваетъ кровь, чтобы она распредѣлилась по всѣмъ тканямъ и органамъ, съ другой стороны—принимаетъ ее обратно изъ частей тѣла.

Сосуды, выходящіе отъ сердца и непосредственно принимающіе изъ него кровь, называются *венными жилами* или *артеріями*. Положивъ палецъ на артерію, легко замѣтить, что она періодически расширяется и спадается; это явленіе называется *пульсомъ*. Артеріи, на подобіе дерева, раздѣляются на множество постепенно утончающихся вѣтвей, направляющихся въ различныя части тѣла, доколѣ не перейдутъ въ мельчайшія, невидимыя простымъ глазомъ развѣтвленія, называемыя *волосными сосудами* или *капилляpами*. Эти послѣдніе имѣютъ такія тонкія стѣнки, что кровь чрезъ нихъ легко отдаетъ свои составныя части, вступая въ соприкосновеніе съ различными тканями и органами. Различныя ткани организма, принимая здѣсь изъ крови необходимый матеріалъ для своего питанія и отправленія, съ другой стороны даютъ сами въ обмѣнъ вещества, негодныя для своего питанія. Прошедши чрезъ капилляры, кровь собирается въ постепенно утолщающіеся сосуды — *вены*, несущіе кровь обратно къ сердцу; въ нихъ поступаетъ уже кровь насыщенная изъ тканей негодными для питанія веществами.

Такимъ образомъ кровеносная система состоитъ изъ центральной части—*сердца*, и троякаго вида сосудовъ,—*артерій, волосныхъ сосудовъ и венъ*.

Лимфатическіе сосуды назначены для воспринятія изъ химически измѣненныхъ и переработанныхъ въ организмѣ пи-

Digitized by Google

щевыхъ веществъ и паренхиматозныхъ его жидкостей матеріала для образованія существенныхъ составныхъ частей крови, которыя въ готовомъ почти видѣ вносятся въ кровеносную систему прямо. Сосуды эти начинаются въ щеляхъ и промежуткахъ соединительной ткани, всюду распространенной въ организмѣ, и образуя чрезъ постепенное соединеніе болѣе крупные стволики, слѣдующіе обыкновенно ходу венъ, какъ глубокихъ, такъ и поверхностныхъ, переходятъ сперва въ два общихъ лимфатическихъ протока, которые и вливаютъ свое содержимое, безцвѣтную жидкость—*лимфу* въ подключичныя вены, въ углахъ ихъ соединенія съ безъимянными венами. На пути своемъ лимфатическіе сосуды проходятъ чрезъ рядъ *лимфатическихъ железъ*, принимая отъ нихъ вырабатываемыя ими лимфатическія тѣльца. Часть этихъ сосудовъ, расположенная въ слизистой оболочкѣ кишечнаго канала до перехода въ брыжжеечныя железы, называется *млечными сосудами*.

Кровь состоитъ изъ двухъ частей: одна плотная—микроскопическія *кровяныя тѣльца*, главнымъ образомъ *красныхъ*, и небольшого количества *безцвѣтныхъ*, а другая часть жидкая *плазма*, слабо желтоватаго цвѣта, въ которой плаваютъ кровяныя тѣльца.

Лимфа точно также состоитъ изъ двухъ частей: плотной—*лимфатическія тѣльца*, ничѣмъ не отличающіяся по своему виду отъ безцвѣтныхъ кровяныхъ шариковъ, и жидкой части—*плазмы*, ничѣмъ существенно не отличающаяся отъ плазмы кровеносныхъ сосудовъ.

Болѣзни сосудистой системы.

Воспаленіе артерій при жизни съ трудомъ распознается. Впрочемъ, симптомы приблизительно слѣдующіе: на мѣстѣ большой артеріи чувствуется напряженная боль, иногда есть припухлость и краснота кожи. Артерія ощупывается какъ твердый снурокъ, но это возможно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ она лежитъ довольно поверхностно, или по крайней мѣрѣ внѣ полости. Общее лихорадочное состояніе бываетъ весьма сильное,

Digitized by Google

съ бурнымъ пульсомъ. Вн. *А.* 1 одно или попер. съ *S.* 1 (2-й ст.), два раза въ день съ пищею по 5 кр. *S.* 1 и *А.* 1. На больныя артеріи и область сердца компр. *А.* 3 или *Эл. А.* Ван. *А.* 2 или *А.* 2 × *L.*

Біеніе артерій. Для лѣченія см. *Болѣзни сердца.*

Расширеніе венъ представляется подъ видомъ мягкой опухоли, развившейся въ узлы, цвѣта черноватаго или багроваго. Чаще встрѣчаются на голеняхъ, но также наблюдаются и въ другихъ частяхъ тѣла. Образовавшееся вокругъ задняго прохода называется *геморроемъ*, расширеніе венъ яичка называется *Varicocela.* Всякое препятствіе въ кровобращеніи можетъ быть причиною этой болѣзни. Послѣдствія замедленнаго кровообращенія различны: на слизистыхъ оболочкахъ развиваются упорные катарры, на кожѣ—воспаленія поверхностныя и глубокія; изъ очень маленькихъ сперва ссадинъ образуются часто *большія варикозныя язвы*, которыя большею частію бываютъ на голеняхъ. Эти язвы представляютъ рану цвѣта темнаго, синеватаго или черноватаго, изъ которой вытекаетъ кровь черная или красноватая жидкость, которая образуется по сосѣдству въ варикозныхъ опухоляхъ, которыя ея содержатъ. Бываютъ также язвы и свищи, въ особенности въ прямой кишкѣ. Дальнѣйшую опасность представляютъ кровотеченія изъ венъ. Вн. *А.* 1 или *А.* 2 × *С.* 1 (2-й ст.). Отъ 5 до 10 тѣхъ же круп. попер. съ пищею. На вены компр. *А.* 2 или *С.* 5 и разъ въ день *Эл. Анж.*

Этимъ лѣченіемъ возстановляется дѣятельность венъ; тѣ, которыя были расширены и опухли, сокращаются и приходятъ въ свое нормальное состояніе. Варикозная язва быстро излѣчивается, если покрыть поверхность очищенной язвы порошкомъ изъ 20 круп. *А.* 2, истолченныхъ съ 7 золотн. рафинаднаго сахара, и наложить на нее повязку.

Расширеніе венъ яичка. См. *Половые органы, мужскіе.*

Сонъ, *его разстройства:*

1) *Безсонница*—см. стр. 175.

2) *Сонливость* есть состояніе усталости съ постоянной наклонностью къ спанью и встрѣчается особенно часто у блѣдно-

Digitized by Google

немочныхъ дѣвушекъ. Лѣченіе совпадаетъ съ лѣченіемъ основной болѣзни (см. *Малокровіе*, *Блѣдная немочь*).

3) *Спячка* есть сильнѣйшая степень сонливости, изъ которой очень трудно вывести больного. Это состояніе есть признакъ тяжелаго мозговаго пораженія. Сравните:

4) *Болѣзни головы и мозга* (см. стр. 202).

5) *Блужданіе во снѣ*—см. *Лунатизмъ*.

6) *Кошмаръ* (давленіе во снѣ). Здѣсь существуютъ: физическое недомоганіе, происходящее или отъ разстройства пищеварительнаго аппарата или кровообращенія и дѣйствительный бредъ, въ которомъ различныя представленія смѣняются страшными мыслями. Вн. при разстройствѣ пищеваренія *S.* 1 (1-й ст.) × *F.* 1 (2-й ст.) и послѣ обѣда 5 круп. *S.* 1; при разстройствѣ кровообращенія, лихорадкѣ, біеніи сердца, или если кошмаръ происходитъ отъ пьянства, то А. 2 × *F.* 1 (2-й ст.), на подвзд. *F.* 2 и на сердце *A.* 2.

Сочлененія или суставы поражаются различными болѣзнями особенно же ревматизмомъ, подагрой, золотушнымъ пораженіемъ, сифилисомъ, которыя описаны въ своемъ мѣстѣ.

Столбнякъ происходитъ внезапно, вслѣдствіе ушибовъ и ранъ, а у женщинъ и вслѣдствіе родовъ и очень рѣдко отъ простуды. Симптомы: во всемъ тѣлѣ дѣлается рядъ судорожныхъ сотрясеній, за которыми челюсти плотно сжимаются, мускулы шеи твердѣютъ; голова или прижимается къ груди или опрокидывается назадъ; вѣки плотно закрыты; стѣсненное дыханіе, глотаніе невозможно по причинѣ спазма глотки; неподвижное положеніе. Больной, сохраняя сознаніе, лишается способности говорить. Характеръ судорогъ при столбнякѣ—тоническій (см. *Судороги*). Иногда языкъ ущемляется и перекусывается; клейкій потъ; частый и неправильный пульсъ; иногда бываютъ неправильныя испражненія. Продолжительность припадковъ различна.

Причиною можетъ быть поврежденіе, даже такое незначительное, какъ заноза въ пальцѣ, обыкновенно же болѣе значительныя пораненія, затѣмъ и простуда. Различаютъ *частичный* столбнякъ, поражающій мышцы челюстей (см. Судорожн.

Digitized by Google

сжатіе челюстей, стр. 315) и *общій*. Первымъ болѣзнь обыкновенно начинается.

Частичный столбнякъ проходитъ отъ приложенія *Эл. Желт.* къ одному затылку, а общій столбнякъ—проходитъ отъ *Эл. Желт.*, приложеннаго на 6 гл. точ. и ко всѣмъ соотв. нервамъ. На всѣ мѣста, сжатыя или отвердѣвшія мазь *C.* 5, также мазь *S.* 1. Ван. *C.* 5. При возможности глотать вн. *S.* 1 и *Verm.* 1 съ 15 каплями *Эл. Желт.* въ одинъ стаканъ воды, и эту смѣсь даютъ пить по глотку въ частыхъ пріемахъ.

Эл. Кр. обыкновенно въ этомъ случаѣ производитъ упадокъ силъ.

Въ упорн. случ. *A.* 1 × *C.* 1 × *F.* 1 (3-й ст.), *Эл. Анж.* × *Эл. Зел.* на весь позвоночникъ. Если столбнякъ отъ раны, то на послѣднюю класть компр. съ *Эл. Зел.* (ср. *Раны*). *Эл. Зел.* также внутрь 1 капля въ стак. воды, какъ промежуточное средство.

Судороги или конвульсія представляютъ движеніе быстрое, неправильное и непроизвольное мускуловъ. Конвульсіи могутъ быть *тоническія*, когда существуетъ напряженіе мускуловъ, или *клоническія*, когда онѣ представляютъ подергиванія или вздрагиванія, происходящія отъ поперемѣннаго сжиманія и разслабленія мускуловъ, причина же этихъ явленій зависитъ отъ разстройства нервной системы. Къ судорогамъ можно имѣть наслѣдственное предрасположеніе и вслѣдствіе нравственныхъ потрясеній, которыя могла испытать мать во время беременности. Дѣти и женщины болѣе предрасположены къ судорогамъ, чѣмъ мужчины. Симптомы: вдругъ появляется сильная боль въ пальцѣ или икрѣ съ чувствомъ втягиванія, одервенѣнія и какъ бы ползанія мурашекъ, припадокъ продолжается нѣсколько минутъ, но можетъ часто повторяться. Вн. лимфатику *Scrof.*, сангвинку *Ang.*, если отъ глистовъ *Verm.*, при прорѣзываніи зубовъ *Scrof.* Всегда изъ 2-го или 3-го ст. (Ср. *Эклямпсія*—родимчикъ, *Эпилепсія*—падучая болѣзнь, *Столбнякъ*).

Сухотка спинного мозга—см. *Спинной мозгъ*.

Съуженіе кишекъ (см. *Кишки*), съуженіе мочевого канала—см. *Стриктура* (стр. 328, 484), съуженіе пищевода—см. *Ракъ*.

Digitized by Google

Сыпи—см. *Кожа и ея болѣзни, Сифилисъ.*

Темная вода—см. *Глаза, ихъ болѣзни.*

Течь изъ уха—см. *Ухо.*

Тифъ—см. *Лихорадка.*

Тошнота—см. *Рвота и тошнота.*

Трахома—см. *Глаза.*

Трипперъ—см. стр. 469.

Трихинная болѣзнь. Черезъ нѣсколько часовъ послѣ съѣденія трихиннаго мяса появляется урчаніе и водянистый поносъ у всѣхъ ѣвшихъ, потомъ легкое воспаленіе кишекъ. Живыя трихины въ слизи кишечныхъ выдѣленій и сумочки съ трихинами въ остаткахъ пищи видны подъ микроскопомъ. Въ послѣдующіе дни, со втораго, когда трихины начнутъ переселяться изъ кишечника по мышцамъ тѣла, сильная лихорадка, усталость, чувство недомоганія и боли въ мышцахъ, какъ при ревматизмѣ. Опуханіе лица и вѣкъ. Движенія болѣзненны до крика. Голосъ хриплый, дыханіе, глотаніе и жеваніе затруднены. Въ мускулахъ, увеличивающихся въ объемѣ, чувствуется все сильнѣйшая и сильнѣйшая боль. Обильный потъ, потеря аппетита, ослабленіе, быстрое исхуданіе, упорный поносъ; общее истощеніе, которое кончается смертію, иногда черезъ 5 или 6 дней, чаще черезъ 3 или 4 недѣли. Лѣчившіеся аллопатіей выздоравливали медленно, при чемъ выпадали волосы и даже ногти. Иногда верхняя кожица отъ рукъ и ногъ отдѣляется большими кусками.

Если въ желудкѣ есть еще непереваренное мясо, то возбудить рвоту всѣми возможными способами. См. *Отравленіе.* Затѣмъ вн. *Verm.* 1 или *Verm.* 2 отъ 40 до 50 круп. для малолѣтнихъ на стаканъ воды, который принимать по глотку; также вн. 5—10 капель *Эл. Желт.* въ ложкѣ воды или на кускѣ сахара и *S.* 1 въ растворѣ и сухомъ видѣ, въ сильныхъ дозахъ.

Тучность, *ожирѣніе* или *жировая немочь* выражается видимымъ скопленіемъ жира подъ кожею, въ особенности на брюхѣ, груди и шеѣ, и оттого появляются по временамъ: неправильное біеніе сердца, одышка, лѣнь, сонливость, слабость

Digitized by Google

мускуловъ. Внезапное и чрезмѣрное располненіе тѣла находится обыкновенно въ связи съ болѣзнею печени. Множество излѣченій *S.* 1, въ упорномъ случаѣ *C.* 4 или *C.* 5 × *V.* или *S.* 1 или *A.* 2 (1-й ст.). Ван. *C.* 5, *S.* 5, *A.* 2.

Что касается діэты, то она не должна быть сильно ослабляющей. Цѣлесообразна діэта, которой съ большимъ успѣхомъ придерживался князь Бисмаркъ, страдавшій, какъ извѣстно, тучностью въ сильной степени. Больной можетъ черезъ каждые 3 часа принимать любое количество жидкой или твердой пищи, но съ однимъ условіемъ — *никогда не принимать ту и другую пищу одновременно.* Утромъ кофе или чай и 1 или 2 мягко сваренныхъ яйца; 3 часа спустя—мясо, хлѣбъ, картофель и проч., но безъ всякаго соуса, компота или фруктовъ и безъ всякаго питья; опять 3 часа спустя — жидкую пищу, воду, пиво, фрукты, супъ, яйца въ смятку и проч. Лѣченіе должно продолжаться долгое время.

Ужаленіе насѣкомыми, какъ-то: мухами, скорпіонами, осою и пчелою производитъ воспалительное состояніе. Нужно осторожно вынуть жало. Вн. и нар. *S.* 1. Когда ужаленное мѣсто приметъ видъ черный или фіолетовый, то немедленно употребить вн. и нар. прим. или мази *C.* 1, а для окончанія лѣченія, когда гангренозные признаки пройдутъ, принимать *S.* 1. Какъ вспомогательныя средства: компр. *Эл. Кр.*, *Бѣл.*, *Анж.*; пластырь *C.* 5 или *S.* 5, въ упорномъ случаѣ вн. и нар. *C.* 1.

Ужаленіе змѣею и укушеніе бѣшеными животными, какъ заявляетъ графъ Маттеи, онъ никогда не лѣчилъ. Но онъ убѣжденъ, что эти яды, какъ и всѣ прочіе яды, могутъ быть нейтрализованы *S.* 1 и *Эл. Кр.* Были случаи излѣченія посредствомъ *C.* 1.

Если укусившее животное подозрительно, то зараженіе немедленно предупреждается 20 сух. круп. *S.* 1, пріемъ коихъ повторяется отъ 4 до 5 разъ въ первый день, и затѣмъ даютъ *S.* 5.

Утопленники. Помощь имъ состоитъ въ томъ, чтобы вызвать дыхательныя движенія. Во Франціи примѣняется способъ д-ра Лаборда, который заключается въ слѣдующемъ:

Digitized by Google

утопленнику раскрываютъ ротъ при помощи ложки, очищаютъ ротъ и носъ отъ песку и тины и схватываютъ крѣпко за его языкъ и производятъ нѣсколько энергическихъ подергиваній послѣдняго; послѣ этого обнаруживается сильное и шумное сокращеніе горла и грудной клѣтки, которое выбрасываетъ изъ дыхательныхъ путей массу воды, дыхательныя же движенія черезъ ритмическія подергиванія за языкъ становятся явственнѣе и сильнѣе; въ то же время на область сердца кладутъ компрессъ изъ горячей воды, почти кипящей, и примѣняютъ правильное ритмическое надавливаніе груди. (См. *Искусственное дыханіе*, стр. 349).

Способъ откачиванія и раскачиванія, который употребляется въ простомъ народѣ съ утопленниками тѣмъ неудобенъ, что вслѣдствіе этого обморочное состояніе можетъ ухудшиться.

Изъ лѣкарствъ положить на языкъ 10 круп. *S.* 1, и дѣлать это повторно до возвращенія сознанія и дыханія, затѣмъ даютъ *S.* 1 × *F.* 1 (1-й ст.), на подвзд. мазь *F.* 2 и на 6 главн. точекъ *Эл. Кр.* × *Эл. Желт.*

Ухо, подобно глазу, имѣетъ назначеніе доставлять изъ внѣшняго міра головному мозгу, чрезъ слуховой нервъ, матеріалъ для развитія души. Этотъ матеріалъ состоитъ изъ звуковъ. Звуки падаютъ прежде всего на *наружное ухо*, идутъ по *наружному слуховому проходу* внутри, встрѣчаютъ *барабанную перепонку*, и затѣмъ, по цѣпи *слуховыхъ косточекъ* въ барабанной полости, распространяются до *воды лабиринта*, омывающей окончанія волоконъ *слухового нерва*. Происшедшее въ слуховомъ нервѣ возбужденіе проводится до головного мозга и ощущается здѣсь, какъ звукъ.

Слуховой органъ распадается на три отдѣла: *наружное, среднее и внутреннее ухо*. Въ нихъ звукъ распространяется по воздуху, костямъ и водѣ.

Наружное отдѣленіе уха состоитъ изъ *ушной* раковины (то, что обыкновенно называется ухомъ), изъ *наружнаго слухового прохода* и изъ *барабанной перепонки*.

Среднее отдѣленіе слухового органа образуется барабанною полостью, слуховыми косточками и евстахіевою трубою.

Digitized by Google

Внутреннее отдѣленіе слухового органа лежитъ глубоко въ каменистой части височной кости, называется *лабиринтомъ* и состоитъ изъ трехъ частей: *преддверія улитки* и трехъ *полукружныхъ ходовъ*. Полости всѣхъ этихъ частей выполнены *лабиринтной* или *слуховой водой*, омывающей слуховой песокъ, такъ называемые *слуховые камешки*. По стѣнкамъ этихъ полостей распространяется *слуховой нервъ* со своими концевыми органами; входя въ лабиринтъ, онъ раздѣляется внутреннимъ слуховымъ проходомъ (на задней сторонѣ каменистой части) на нервъ преддверія и нервъ улитки. Звукъ, достигшій лабиринта чрезъ слуховыя косточки и стѣнку барабанной полости, приводитъ лабиринтную воду въ волнообразное движеніе, и происходящія, такимъ образомъ, волны ударяютъ въ окончанія слухового нерва. Возбужденіемъ слухового нерва вызываются въ головномъ мозгу слуховыя ощущенія. Направленіе и удаленіе звука собственно не слышатся, а познаются нами только вслѣдствіе сужденія и привычки.

Ушныя болѣзни.

Если слухъ ослабленъ во время лихорадки и въ особенности при тифѣ, то неровность его составляетъ благодѣтельный признакъ.

Если слухъ повышенъ при лихорадкѣ—это указываетъ или на извѣстную степень воспалительнаго вліянія на мозгъ или на слишкомъ повышенную возбудимость нервной системы.

Недостатки, а также болѣзни въ лабиринтѣ, по его глубокому, недоступному для изслѣдованія положенію, узнаются весьма трудно. Если они прирождены или пріобрѣтены скоро послѣ рожденія и повели къ неизлѣчимой глухотѣ, то слѣдствіемъ ихъ бываетъ нѣмота.

Ушная боль. Вн. *S.* 1 и за уши *Эл. Кр.* При чисто нервной (судорожной) боли *A.* 2 × *S.* 2 или *C.* 1 × *F.* 1 (3-й ст.), горяч. компр. изъ *A.* 2, *S.* 5, *C.* 5. Прилож. *Эл. Кр.* × *Ж.*, у женщ. *Эл. Анж.* × *Зел.* или *Бѣл.*

Внутреннее катарральное воспаленіе уха. Симптомы: въ

Digitized by Google

глубинѣ уха жаръ, колющія, стрѣляющія боли, шумъ, звонъ. Наружный слуховой проходъ иногда припухаетъ и бываетъ иногда ослабленіе слуха. Иногда лихорадочное состояніе. Вн. *S.* 1 × *A.* 1, при лихорадкѣ × *F.* 1 (3—2-й ст.). Наружно: тряпочка, смоченная *Эл. Бѣл.* или *Эл. Анж.*, на ухо, а поверхъ нея — тепл. компр. изъ *A.* 2, *S.* 5 или *C.* 5 по 15 круп. на стак. воды. Если наступило нагноеніе, то вн. *A.* 3 × *C.* 4 × *F.* 1 (3—2-й ст.), а на ухо *Эл. Зел.* съ тѣми же компрессами.

Наружное катарральное воспаленіе уха легко отличить по внѣшнимъ явленіямъ. Лѣчится точно также.

Течь изъ уха, также *хроническая.* Вн. *S.* 1 × *A.* 1. Въ упорн. случаѣ: *A.* 3 × *C.* 4 (3 — 2-й ст.) или *C.* 5 × *F.* 1 (3—2-й ст.), 3 раза въ день передъ пищей по 5 круп. *S.* 1 или *S.* 5; утр. и веч. по 2 круп. *V.*; полоск. изъ *A.* 2, *C.* 4 или *C.* 5, *V.*, по 5 круп. на стак. воды, спринц. *C.* 5, *S.* 5. Къ заушнымъ мышцамъ и въ ямочку подъ ухо, замѣтную при открытіи рта *Эл. Кр.* × *Ж.* Ротъ больного при приложеніи Эл. Гом. жидкостей надо открывать. Ван. *C.* 5.

Шумъ въ ушахъ иногда происходитъ произвольно отъ нервныхъ причинъ и въ такомъ случаѣ не имѣетъ особеннаго значенія, или служитъ признакомъ прилива крови къ мозгу, малокровія его, страданія уха и другихъ болѣзней. *S.* 1 или *S.* 2 вн. и нар. смоченные тампоны въ уши; если отъ прилива крови, то вн. *S.* 1 × *A.* 3 (3—2-й ст.) и тампоны въ уши изъ мази *A.* 2 или изъ *Эл. Бѣл.* Въ упорномъ случаѣ: *A.* 2 (1-й ст.), ван. *A.* 2; на все ухо мазь, компр. *A.* 2, или *Эл. Анж.* или *Бѣлое.* При подозр. на сифилисъ прибавить *V* (3-й ст.) Принимать во вниманіе и соотвѣтственно лѣчить общее состояніе организма.

Кровотеченіе изъ ушей. *A.* 1 вн. и нар. Въ упорномъ случаѣ *A.* 2 (2-й ст.), на область сердца компр. *A.* 2 или *Эл. Анж.*; ван. *A.* 2.

Полипъ въ слуховомъ проходѣ. *C.* 1. вн. и *C.* 5 нар. въ тампонахъ. Въ упорн. случаѣ: *C.* 5 (1-й ст.). Ван. *C.* 5. На больное мѣсто мазь, компр. С. 5. Впрыск. или пульвер. въ ухо *S.* 5, *A.* 2.

Digitized by Google

Глухота и тугость на ухо. При нервной глухотѣ *A.* 3 × *S.* 1 (у женщ. *C.* 1) × *F.* 1 (3—2-й ст.); въ подреб. мазь *F.* 2. Прилож. у мужч. *Эл. Кр.*, у женщ. *Эл. Б.* или *Анж.* на гл. нервн. точки 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12 утр. и веч.

Если глухота происходитъ отъ скопленія сѣры въ глубинѣ уха, то она проходитъ отъ одного или двухъ спринцованій уха теплою водою съ примѣсью немного глицерина.

У лимфатиковъ глухота является (въ особенности въ правомъ ухѣ) вслѣдствіе сыпной лихорадки (корь, скарлатина), сыпи, насморка, заживленія гнойныхъ ранъ и пр. Вн. *S.* 1 (1—2-й ст.), спринц. *S.* 1 × *S.* 5, и приложеніе *Эл. Кр.* У сангвиниковъ представляетъ послѣдствіе продолжительнаго прилива, поражаетъ преимущественно лѣвое ухо. Вн. *A.* 1 (2—3-й ст.) спринц. *A.* 2 × *S.* 5, приложеніе *Эл. Кр.* × *Анж.* При неизвѣстной причинѣ или въ упорн. случаѣ *S.* 1 × *A.* 1, частые компр. на зат. и за уши *Эл. Б.*, на все ухо мазь *C.* 5 или *S.* 5; ванны *S.* 5, *A.* 2, *A.* 5.

Существуетъ еще видъ глухоты, очень распространенный— это глухота, происходящая отъ *носо-глоточнаго катарра*, что выражается краснотою горла, опухолью и гипертрофіею миндалевидныхъ железъ, отчего происходитъ частый шумъ въ ушахъ, звонъ, ослабленіе слуха, доходящее иногда до полной глухоты. Для лѣченія см. *Катарръ гортани* и *Насморкъ*.

Излѣченія. Острая боль въ ухѣ, у дѣв. 10 л., была вылѣчена въ 20 мин.: 10 капель *Эл. Б.* въ ухо, тампонъ въ ухо съ мазью *C.* 5 и *Эл. Анж.* (*C.*).

— Течь изъ ушей у мал. 16 л. вылѣченъ: вн. *S.* 2 (2-й ст.) и спринц. въ ухо *S.* 2. За ухо *Эл. Кр.* (*C.*).

Судороги въ ухѣ у женщ. 24 л. вылѣчены полосканіями *Эл. Кр.* (1 часть на $^3/_4$ воды) (*C.*).

— Глухота нервная съ давленіемъ въ головѣ у дѣв. 22 л. вылѣчена въ 2 мѣс. *Эл. Бѣл.* на темя и въ компр. за ушами и зат. и въ уши тампоны изъ *Эл. Б.* (1 чайн. л. на $^1/_4$ стак. воды). Вн. *S.* 1 (2-й ст.) (*C.*).

— Глухота вслѣдствіе носоглоточнаго катарра у женщ. 37 л., страдавшей 12 л., вылѣчена въ 5 мѣс. Вн. *S.* 5, *F.* 1 и *A.* 3. Нар. полоск. и втягиваніе *C.* 5 съ *Эл. Анж.*; вдуваніе въ гортань кр. *C.* 5 стертыхъ съ сахаромъ, ван. *L.* (*C.*).

Digitized by Google

— Глухота на одно ухо у мужч. 20 л., не слышавшаго этимъ ухомъ колокольнаго звона, была вылѣчена въ 5 мѣс. Вн. *S.* 1 × *A.* 1 (1-й ст.); слуховой проходъ пополнялся 4—5 разъ въ день на 5—10 мин. тепловатымъ растворомъ смѣси изъ *S.* 5 и С. 5 каждаго по 7 кр. на стак. воды, и на все ухо компр. изъ этого раствора. Иногда этотъ растворъ смѣшивался съ ½ *Эл. Зел.* (*С.*).

Совѣты черезъ корреспонденцію:—Мал. 12 л., страдалъ 5 л. совершенною глухотою на оба уха. Вылѣченъ въ 3 нед. вн. (средн. доза) и въ компр. на уши *А.* 3; на соотв. нерв. *Эл. А.*, спринц. *С.* 5 × *Эл.* Б. по 3 раза въ день (*С.*).

— Женщ. 35 л. страдала нѣсколько лѣтъ глухотою. Вылѣчена въ 1 мѣс. вн. А. 3 (2-й ст.) × *S.* 1 (1-й ст.), спринц. *Эл. Кр.* × *С.* 1 (*С.*).

Фистула, свищи представляютъ полые канальчатые ходы, которые прокладываютъ себѣ гной въ мягкихъ частяхъ: развиваются вслѣдствіе затековъ гноя изъ ранъ, язвъ и нарывовъ, встрѣчаются въ разныхъ органахъ тѣла (кожѣ, маткѣ влагалищѣ, мочевомъ каналѣ и пр.), и бываютъ слѣпыми (если не открываются отверстіемъ для выхода гноя наружу) и открытыми (въ противномъ случаѣ). Лѣчатся *S.* 1 и на соотв. нер. *Эл. Кр.* Въ упорн. случаѣ *S.* 1 × *С.* 1, мазь, компр. или полоск., но въ особенности, ван. *С.* 5, *S.* 5 и *А.* 2. На соотв. нерв. *Эл. Б.* или *Эл. Кр.* × *Ж.*

Фистулы въ заднемъ проходѣ. См. *Кишечный каналъ, болѣзни кишекъ.*

Холера. Азіатскою или эпидемическою холерою называется особенная болѣзнь, которая, появляясь время отъ времени, большею частію, въ видѣ обширныхъ эпидемій, у насъ всегда зависитъ отъ воспріятія особаго холернаго яда, но никогда не развивается самостоятельно, и которая обнаруживается сильною рвотою и быстро другъ за другомъ слѣдующими водянистыми испражненіями.

Въ началѣ болѣзни больные обыкновенно жалуются на усталость, на утомленіе съ головокруженіями, на давленіе подъ ложечкою, жажду, урчаніе въ животѣ, сопровождаемое обильными водянистыми испражненіями, незловонными; эти испражненія вначалѣ желтоваты и имѣютъ запахъ кала; за-

Digitized by Google

тѣмъ становятся сѣроватыми, подобными рисовой водѣ и смѣшанными съ бѣлыми клочьями бѣлковины.

Начиная съ этого момента силы больного слабѣютъ; появляются очень болѣзненныя судороги въ икрахъ; глаза теряютъ свой блескъ; жажда усиливается; въ пальцахъ появляется особенный зудъ, точно какъ бы мурашки по тѣлу; пульсъ падаетъ и отдѣленіе мочи совершенно прекращается. Это *первый періодъ болѣзни*, за которымъ вскорѣ слѣдуетъ *второй періодъ*. Во второмъ періодѣ больной жалуется на очень жгучую боль въ области сердца, на головокруженія, сопровождаемыя смертельною тоскою и давленіемъ; невыразимое тревожное состояніе; безпрерывное метаніе, въ особенности головы; неутолимая жажда и потребность чѣмъ-либо освѣжиться. Пульсъ, по большей части, частый и нитевидный; нормальная теплота тѣла уменьшается; лицо и конечности холодѣютъ; кожа принимаетъ фіолетовую окраску и становится вялою; глаза впадаютъ и окружаются синевою; лицо искажается; судороги въ ногахъ, въ особенности въ икрахъ, усиливаются; вдругъ наступаютъ легкія рвоты, затѣмъ безпрерывною рвотою и поносомъ извергаются большія количества водянистыхъ массъ, въ продолженіе которыхъ положеніе больного ухудшается и упадокъ силъ все болѣе и болѣе увеличивается. Рвота происходитъ безъ усилій, она имѣетъ видъ желтоватой жидкости, смѣшанной съ бѣлыми клочьями; питье извергается обратно рвотою, и извергаемая жидкость даже превышаетъ количествомъ принятую; точно также и испражненія отдѣляются безъ усилія и жиленья. Въ тоже время голосъ измѣняется, становится хриплымъ, беззвучнымъ, больной впадаетъ въ апатію; нормальная теплота тѣла все болѣе и болѣе уменьшается; кожа покрывается клейкимъ потомъ и больной находится въ тяжеломъ снѣ съ бредомъ. Достигнувъ *послѣдняго періода*, больной представляется въ ужасномъ видѣ. Его лицо обезображено отвратительно; хрящи носа и ушей дряблы; глаза глубоко впали и окаймлены широкими и глубокими черными кругами; роговая оболочка глазъ блестит; зрачки расширены и неподвижны; бѣлочная оболочка глаз

Digitized by Google

грязна, синевата и покрыта полулунными пятнами и черными точками, губы черно-синія; кожа вялая, теряетъ свою упругость и какъ бы маслянистая; конечности съ синими крапинами; пальцы скорчены; ногти синіе. Часто вся кожа становится синею съ пепельнымъ оттѣнкомъ; пульсъ почти неощутимъ и наконецъ совершенно исчезаетъ; дыханіе очень трудное и короткое; голосъ почти угасшій, слабый; языкъ то совершенно чистый и красный, то желтоватый или бѣловатый, сѣрый—аспиднаго цвѣта, широкій и холодный. Больной находится въ постоянной сонливости, глаза полузакрыты и закатились кверху. Лежитъ на спинѣ при полномъ упадкѣ силъ, сохраняя впрочемъ полное сознаніе. Въ то же время его мучитъ сильнѣйшая жажда; онъ вздыхаетъ и стонетъ, жалуется на невыносимыя боли и безпрестанно раскрывается. Въ этомъ періодѣ рвота и поносъ обыкновенно совершенно прекращаются, но животъ вздутъ.

Если еще и существуютъ испражненія, то они жидки, подобны мочѣ, и смѣшаны съ клочьями бѣловато-желтыми или пепельнаго цвѣта. Въ то же время сильнѣйшія судороги въ икрахъ, а также и въ поясницѣ часто прерываютъ состояніе тяжелаго сна; томленіе усиливается каждую минуту; дыханіе становится болѣе и болѣе затрудненнымъ; у больного пристальный взглядъ, глаза широко открыты; сознаніе теряется; дыханіе останавливается; сердце дѣлаетъ еще нѣсколько спазмодическихъ пульсацій; замѣчаютъ нѣсколько усилій вздохнуть и больной умираетъ при общемъ истеченіи, отъ паралича сердца.

Если же больной переживетъ 24 часа, то можно надѣяться на сохраненіе его жизни. При благопріятномъ исходѣ, пульсъ поднимается, кожа дѣлается теплою и покрывается теплымъ потомъ, урчаніе, рвота и поносъ прекращаются, мочеотдѣленіе возстановляется; въ мочѣ, выдѣленной непосредственно вслѣдъ за холернымъ приступомъ, содержится бѣлокъ; черезъ нѣсколько дней больной совершенно выздоравливаетъ.

Въ нѣкоторыхъ же случаяхъ, при всѣхъ прочихъ холер-

Digitized by Google

ныхъ припадкахъ; развивающихся крайне быстро, не бываетъ ни рвоты, ни поноса (такъ наз. *сухая холера*). Однако нерѣдко, по прекращеніи собственно холернаго приступа, развиваются очень тяжкія реакціонныя явленія, которыя, по сходству съ тифомъ, называются *холернымъ тифоидомъ*. Они заключаются въ помраченіи сознанія, потерѣ его, бредѣ, и впослѣдствіи—въ признакахъ угнетенія мозга и обусловливаются тѣми измѣненіями организма, которыя признаны холернымъ приступомъ, при чемъ важную роль играютъ измѣненія въ веществѣ мозга, вслѣдствіе быстраго обезводненія крови.

Существуетъ еще форма холеры — *молніеносная* — самая тяжкая и безусловно смертельная — она убиваетъ человѣка иногда въ 2—3 часа; періоды болѣзни здѣсь такъ сближены, что раздѣлить и описать ихъ трудно.

Спорадическая холера менѣе опасна, появляется въ ограниченномъ числѣ заболѣваній и легче вылѣчивается; она поражаетъ внезапно, во всякое время года, но въ особенности во время лѣтнихъ жаровъ, безъ всякихъ предрасполагающихъ причинъ, точно опредѣленныхъ: избытокъ пищи, дурное пищевареніе или употребленіе испорченной пищи достаточны, чтобы ее вызвать. Она начинается болѣзненными судорогами въ животѣ; затѣмъ рвота полупереваренною пищею, потомъ рвота становится зеленоватой или черноватой; частый поносъ такого же свойства; рѣзкая, раздирающая и жгучая боль въ кишечномъ каналѣ съ охлажденіемъ и сведеніемъ конечностей, иногда обмороки; такимъ образомъ болѣзнь достигаетъ наивысшей своей силы, и вообще не продолжается болѣе 48 часовъ. Здѣсь не встрѣчаются бѣлыя поносистыя испражненія, синеватый оттѣнокъ кожи и прочіе симптомы эпидемической холеры.

Теперь доказано наблюденіями, что всѣ міазматическія эпидеміи имѣютъ посредниками нервные центры, и холера въ томъ же числѣ; при холерѣ есть одинъ симптомъ постоянный и который всегда существуетъ—это судороги. Причиною холеры признаются *холерныя бациллы*. Заразительность бациллъ еще подлежитъ сомнѣнію, потому что тотъ фактъ, что

Digitized by Google

большое число людей, находящихся въ той же атмосферѣ, въ которой другихъ поражаетъ холера, остается невредимымъ, происходитъ отъ того, что для заболѣванія холерой нужна, кромѣ самой міазмы, еще и почва для ея развитія.

Холерныя бациллы, содержащіяся въ испражненіяхъ больныхъ, дѣлаются заразительными при разложеніи испражненій, по этому весьма важно уничтожить заразу тщательною дезинфекціею испражненій.

Холерина развивается иногда и эпидемически, происходитъ большею частію послѣ простуды или принятія пищи, легко переходящей въ броженіе (водянистыхъ плодовъ, кислаго молока и пр.), и имѣетъ характеръ простого желудочно-кишечнаго катарра. Она характеризуется поносомъ съ чувствомъ общаго недомоганія и наклонностію къ холодному поту; упадкомъ силъ физическихъ и моральныхъ, безсонницею, болью подъ ложечкою, слабымъ пульсомъ; тошнотою, сопровождаемою иногда рвотою; моча густая, рѣдкая и красная; поносистыя испражненія желтоватыя или кровянистыя, почти всегда смѣшаны съ бѣловатою слизью. Въ то же время языкъ блѣдный, иногда бѣловатый; больному холодно, его томитъ жажда и онъ чувствуетъ себя слабымъ.

Дѣтская холера подобна спорадической холерѣ, но поражаетъ только отдѣльныхъ субъектовъ въ особенности послѣ отнятія ребенка отъ груди, въ тотъ моментъ, когда пищеварительные органы еще не привыкли къ сытному питанію; иногда эта болѣзнь похожа на эпидемическую холеру потому, что появляются бѣловатыя поносистыя испражненія, подобныя рисовой водѣ и синеватый оттѣнокъ кожи. Чаще всего она обнаруживается во время сильныхъ жаровъ. Болѣзнь обыкновенно начинается внезапно: частыя рвоты и поносистыя испражненія, которыя влекутъ за собою большую слабость, что впрочемъ продолжается отъ 24 до 48 часовъ, и можетъ окончиться гибельнымъ исходомъ. Если удастся остановить поносъ, то является періодъ тифозный, который продолжается отъ 6 до 8 дней, и представляетъ болѣе надежды на выздоровленіе.

Digitized by Google

Во время холерной эпидеміи надо оставаться спокойными передъ представляющеюся опасностью, нисколько при томъ не пренебрегая предосторожностями предписываемыхъ гигіеною и санитарными коммиссіями [1]) противъ зараженія и распространенія холеры. Нужно удвоить стараніе относительно собственно своей чистоты и своихъ жилищъ. Избѣгать простуды, носить на нижней части живота шерстяной набрюшникъ, не употреблять пищи и питья въ излишнемъ количествѣ, и не выходить на воздухъ съ тощимъ желудкомъ. Пища должна быть здоровая, приготовленная просто, легкая для пищеваренія; фрукты и замороженные напитки запрещаются; для питья предпочитаются напитки возбуждающіе, тоническіе, какъ напр. чай, кофе, красное вино и проч.

Отступленіе отъ діэты при выздоравливаніи представляетъ наибольшую опасность. Нужно начинать съ бульона, краснаго вина, затѣмъ яица въ смятку, для питья отварная вода съ краснымъ виномъ, и каждый разъ съ пищею принимать 5 сухихъ круп. *S.* 1.

Во время холерной эпидеміи, чтобы предохранить себя отъ заболѣванія холерою, принимаютъ ежедневно вн. *S.* 1 въ сухомъ видѣ; на тощакъ, каждый разъ съ пищею и на ночь по 5 кр. Чтобы поддержать нормальную теплоту крови, принимаютъ 1 разъ въ день 10 капель *Эл. Анж.* въ ложкѣ воды или на кускѣ сахара. Если холера во время лѣта, то принимать каждые 2 или 3 дня теплыя ванны съ 100 кр. *S.* 5. Сидѣть въ ваннѣ отъ 30 до 45 мин.

Затѣмъ мы приводимъ три способа лѣченія холеры, кото-

---

[1]) Не надо упускать изъ виду, что въ составъ этихъ коммиссій входятъ аллопаты, которые презираютъ Электро-Гомеопатію и Гомеопатію, а между тѣмъ, пользующійся извѣстностію между учеными д-ръ Кохъ, который былъ командированъ въ 1884 году германскимъ правительствомъ въ Марсель и Тулонъ, для изслѣдованія свойствъ свирѣпствовавшей тамъ холеры, заявилъ, что въ аллопатіи не существуетъ никакого средства противъ холеры, и что лучшее предохранительное средство противъ нея это гигіена и соблюденіе санитарныхъ условій.

Digitized by Google

рые оказались дѣйствительными заграницею и въ Россіи въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ она свирѣпствовала въ 1884 и 1892 г.г.

Первый способъ. Въ началѣ холеры первые симптомы часто прерываются 15, 20, 30 или 40 сухими кр. *S.* 1 въ одинъ пріемъ. Кромѣ того надо принимать въ малыхъ и часто повторяемыхъ пріемахъ *S.* 1 въ средней дозѣ, или изъ 1-го или 2-го стакана. На симпат. нерв. и подложечку каждыя 10 минутъ прикладывать *Эл. Кр.* × *Желт.*, или чаще *Эл. Б.*; если больной сангвиникъ, то *Эл. Анж.* Послѣ прекращенія первыхъ симптомовъ надо продолжать нѣкоторое время *S.* 1 изъ 1-го ст. въ малыхъ и часто повторяемыхъ пріемахъ, а также приложеніе означенныхъ жидкостей, и принимать теплыя и непродолжительныя ванны *S.* 5, *C.* 5, или сообразно съ темпераментомъ ван. *A.* 2 (90—100 кр. на ван.), а на подвзд. мазь изъ 20 кр. *F.* 2, растворенныхъ въ *Эл. Б.*, на унцію вазелина.

Если съ начала болѣзни существуетъ сильная лихорадка съ ознобомъ, учащеннымъ пульсомъ, затѣмъ сосредоточиваніе и слабость, лихорадочная дрожь кожи и проч., тогда растворъ *S.* 1 принимать попер. съ *F.* 1 или *F.* 2 въ средней дозѣ или изъ 1-го или 2-го стак., и принимать отъ 4 до 10 сухихъ кр. *F.* 1 или *F.* 2 по одной въ частыхъ пріемахъ, одну за другою.

Въ упорномъ случаѣ настойчиво продолжать употребленіе означенныхъ средствъ, прибавивъ напр. при надобности теплыя ванны съ большою столовою ложкою *Эл. Б.* или *Кр.* и обтираніе всего тѣла растворомъ изъ 50 или 60 кр. *S.* 5 въ двухъ стаканахъ чистаго виннаго спирта и на подвзд. мазь *F.* 2.

(Изъ Revue Française d'Electro-Hom. 1883 г. и Clinique Electro-Homeop. 1884 г.).

Второй способъ. При наступленіи болѣзни, когда предвѣстники холеры появляются, употребленіе *S.* 1 по 20 круп. каждыя 15 или 30 минутъ смотря по степени болѣзни, попер. съ 5 или 10 каплями *Эл. Анж.*, отстранитъ всякую опасность.

Digitized by Google

Если разстройство нервной системы преобладаетъ, т.-е. судороги въ рукахъ и ногахъ, то *Эл. Анж.* замѣняютъ *Эл. Ж.*

Если черезъ 6 часовъ эти лѣкарства не произведутъ никакого дѣйствія, тогда давать *S.* 1 изъ 1-го ст. по чайной ложкѣ каждыя 5 минутъ. Спустя затѣмъ 6 часовъ, и при предположеніи неудачи, можно давать *S.* 1 × *F.* 1 изъ 1-го или 2-го ст. по чайной ложкѣ, одно послѣ другого, черезъ 5 минутъ.

Scrofoloso замѣняютъ *Canceroso*, если испражненія становятся болѣе частыя и если языкъ и губы почернѣли (періодъ адинамическій, разслабляющій); если лихорадка усиливается, то *F.* 1 давать изъ 3-го ст. и на подвзд. *F.* 2.

Докторъ Régi, въ своей статьѣ, напечатанной въ Moniteur de l'Electro-Homéopathie, говоритъ, что противъ упорнаго поноса полезно прикладывать къ пупку *Эл. Бѣл.* и принимать теплыя ванны съ 100 круп. *C.* 5. Эти ванны одинаково полезны для возстановленія силъ ослабленнаго больного. При перемежающейся лихорадкѣ, съ чрезвычайно сильнымъ ознобомъ, весьма полезны энергическія втиранія во все тѣло изъ теплаго очищеннаго вина, смѣшаннаго съ *Эл. Бѣл.* Противъ болѣзненныхъ судорогъ въ членахъ замѣчательно дѣйствуетъ втираніе *Эл. Ж.*, смѣшаннаго съ очищеннымъ виномъ. Если больной счастливо перенесъ періодъ перемежающейся лихорадки съ чрезвычайно сильнымъ ознобомъ (упадокъ силъ съ симптомами тифа), — то является сильная реакція, которая можетъ быть роковою, если не будетъ быстро остановлена. Эта реакція выражается чрезвычайно учащеннымъ пульсомъ, и тогда даютъ *F.* 1 изъ 3-го ст., продолжая давать время отъ времени по чайной ложкѣ *S.* 1 изъ 1-го ст., а на подвзд. мазь *F.* 2. Если существуетъ приливъ крови, что распознается по синему цвѣту характеристическому, который принимаетъ кожа, тогда прибавляютъ къ лѣченію *A.* 3 изъ 3-го ст., и на область сердца мазь *A.* 3. (Изъ Bulletin Electro-Homéopathique 1884 г., № 3).

Третій способъ. При появленіи холерной эпидеміи, для предохраненія себя отъ заболѣванія принимаютъ утр. и веч.

Digitized by Google

по 5 сух. кр. *S. G.* и то же самое лѣкарство изъ 1-го ст. на вареной водѣ по глотку въ продолженіи цѣлаго дня.

Первые симптомы холеры прекращаются однимъ пріемомъ 20 сух. кр. *S. G.*, положенныхъ на языкъ. Для предупрежденія повторенія припадка холеры принимать то же самое лѣкарство изъ 1-го ст. въ частыхъ пріемахъ по глотку, на 6 гл. точ. *Эл. Кр.* × *Ж.*, на подвзд. компр. *F.* 2. Въ упорномъ случаѣ ван. *C.* 5 × *A.* 2 и растирать животъ *Эл. Бѣл.* теплымъ полотенцемъ.

При сильномъ развитіи болѣзни, когда испражненія очень часты и зловонны, кожа синевата, языкъ и зубы покрыты изчерна-желтымъ налетомъ, тогда даютъ $^1/_8$ ст. *A.* 1 (2—3-й ст.) попер. съ $^2/_3$ ст. *C.* 1 (2—3-й ст.) по чайн. л., одно послѣ другого черезъ 5 мин. и каждый часъ по 1 сух. кр. *S. G.*, на животъ мазь *C.* 5, на подвзд. *F.* 2 и на 6 гл. т. *Эл. Кр.* × *Ж.* Если черезъ 6—8 час. не послѣдуетъ облегченія, то прибавляютъ *F.* 1 (2—3-й ст.). Лѣченіе оканчивается *S. G.*, которое принимаютъ въ теченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ. (Изъ Monit. de l'Electro-Homéop. 1890 г., № 1).

Во время эпидеміи холеры необходимо остерегаться простуды и діэтетическихъ погрѣшностей, особенно строго воздерживаться отъ спиртныхъ напитковъ. Если для всѣхъ и въ всякое время полезно принимать передъ каждой ѣдой 3—5 круп. *S.* 1, то въ эпидемію холеры это вдвойнѣ необходимо. Надо заботиться о правильномъ ежедневномъ испражненіи на низъ (см. *Запоръ*), а при поносѣ принимать послѣ каждаго испражненія 10 круп. *S.* 1 или *S. G.*

Въ отношеніи діэты не надо быть черезчуръ мнительнымъ и можно употреблять обычную пищу, а нужно остерегаться лишь излишествъ и помнить, что для предупрежденія холеры самое вѣрное средство—*S.* 1 въ сухихъ крупинкахъ или изъ 2—3-го стакана (не изъ 1-го).

Противъ *холерины* и *спорадической холеры*: 10—20 круп. *S.* 2 или *S. G.*; пріемъ этотъ повторять послѣ каждаго поноснаго испражненія. Прилож. утр. и веч. *Эл. Кр.* × *Эл. Желт.*, на главн. нервн. точ. отъ 11 до 17 и на 5, 6, 7. Кромѣ того

Digitized by Google

еще *S.* 1 (2-й стак.) и 3 раза въ день по 3—5 круп. *S.* 1 передъ ѣдой. Въ болѣе трудныхъ случаяхъ—вытираніе тѣла утр. и веч. растворомъ *C.* 5 и *F.* 2 по 20 круп. въ 2 столов. ложкахъ горячей воды съ прибавл. 6 столов. ложекъ виннаго спирта.

Дѣтская холера лѣчится очень хорошо *S.* 1 (2-й ст.) $^2/_3$ ст. въ день попер. съ *F.* 1 (3-й ст.) $^1/_3$ ст. въ день, утр. и веч. по 1 сух. кр. *S.* 1, но это лѣченіе съ самаго начала требуетъ строгую діэту. Для питья давать рисовую или ячменную воду, въ которую прибавить яичный бѣлокъ.

Въ трудныхъ и упорныхъ случаяхъ—горячіе компрессы на животъ изъ раствора 30 круп. *C.* 5 и 1 чайн. лож. *Эл. Зел.* въ 2 стаканахъ воды; такіе компрессы дѣлать и на ножки, если послѣднія холодны. Противъ рвоты небольшія количества холодной воды съ 3—5 каплями *Эл. Бѣл.* Если это рвоты не унимаетъ, то растворовъ вообще не давать, а лишь въ сух. видѣ *S. G.* или *S.* 1. До прекращенія рвоты не давать никакой пищи, а затѣмъ давать въ короткіе промежутки времени по чайной ложк. мясного бульона или стерилизованнаго (кипяченнаго) молока, также *S. G.*. или *S.* 1 × *A.* 3 × *F.* 1 (3-й стак.). Прилож. черезъ кажд. 1—3 часа *Эл. Кр.*, на точки 5, 6 и 7 и обмывать тѣло растворомъ 1 ч. л. *Эл. Бѣл.* въ 2 столов. ложк. воды и въ стол. ложк. виннаго спирта.

Изъ множества примѣровъ излѣченій холеры и холерины, мы приводимъ изъ Clinique Electro-Homéopathique за 1884 г. только слѣдующіе случаи:

— Преподобный братъ траппистъ Marie-Joseph, въ четырехъ дняхъ ходьбы отъ Пекина, учредилъ со своею братіею монашескій орденъ траппистовъ, съ цѣлію распространенія земледѣлія въ Китаѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Marie-Joseph ревностно занимается Электро-Гом. и производитъ замѣчательныя излѣченія. Изъ ста китайцевъ, заболѣвшихъ холерою, взятыхъ на удачу, онъ отдѣлилъ 90 и поручилъ ихъ лѣченіе сестрамъ милосердія, француженкамъ, по его указаніямъ, а остальныхъ 10 онъ предоставилъ попеченію больничныхъ докторовъ. Черезъ три дня эти 10 умерли, напротивъ остальные 90 всѣ выздоровѣли. Способъ ихъ лѣченія состоялъ въ слѣдующемъ:

Digitized by Google

прежде всего дано каждому вн. 40 сух. кр. *S.* 1 въ одинъ пріемъ, каждыя 5 мин. по 1 сух. кр. *S.* 1; черезъ часъ затѣмъ вн. 40 сух. кр. *F.* 1 въ одинъ пріемъ. Каждые ½ ч. на сплет., лож. и симп. нер. *Эл. Кр.*; втираніе во все тѣло *C.* 5 (30 кр.), растворенныхъ въ 30 капляхъ *Эл. Анж.* и смѣшанныхъ съ 2 унціями алкоголя; на подвзд. мазь *F.* 2 и на животъ *Эл. Б.*

— М. страдалъ 36 часовъ холериною. Послѣ третьяго глотка *S.* 1 и *F.* 2, растворенныхъ вмѣстѣ по 1 кр. въ стак. воды совершенно выздоровѣлъ.

— Точно также холерина въ Марселѣ вылѣчивалась сухими кр. *S. G.*

— М. 13 л. въ Бордо заболѣлъ ночью холериною: сильный поносъ и рвота каждыя 10 мин., начинались судороги въ ногахъ, синева подъ глазами, глаза ввалились, едва переворачивается въ постели. Вн. 15 сух. кр. *S.* 1; въ продолженіе часа каждыя 5 мин. по сух. кр. *S.* 1, затѣмъ *S.* 1 (1-й ст.) по ч. л. черезъ ¼ ч. На другой день утр. м. всталъ, не ощущалъ никакой боли и завтракалъ; предложено продолжать *S.* 1 (1-й ст.) и на слѣд. день былъ совершенно здоровъ.

— Въ г. Тюмени, Тоб. губ., лѣтомъ 1892 г., при жарѣ 43° Р. свирѣпствовала азіатская холера, смертность была значительная. 37 холерныхъ больныхъ, изъ коихъ многіе находились въ третьемъ періодѣ холеры и совершенно безнадежные были вылѣчены г. Н. упомянутыми первыми двумя способами.

Худощавость или худѣніе, не являющееся послѣдствіемъ лихорадки, глубокаго огорченія, или постояннаго умственнаго возбужденія, можетъ быть приписана: 1) ненормальнымъ кровотеченіямъ, выдѣленію воды, быстрому росту и т. п. 2) болѣзни легкихъ; 3) разстройству желудка или кишекъ. Устранить производящую причину, если она извѣстна, перемѣнить городскую жизнь на деревенскую, избѣгать простуды и всякаго излишества, пища должна быть обильная и питательная. Принимать на тощакъ 5—10 сух. кр. *S.* 5 и въ теченіе дня тоже лѣкарство изъ 1-го ст.

Шея есть самая верхняя и узкая, почти цилиндрическая, часть туловища, соединяющая голову съ грудью. На задней ея сторонѣ прощупывается по срединѣ 7 шейныхъ позвонковъ. На шеѣ помѣщается немного органовъ, принадлежащихъ собственно ей — гортань и щитовидная железа; остальные же

Digitized by Google

только проходятъ по шеѣ вверхъ и внизъ, чтобы перейти въ другія области тѣла.

Неподвижность шеи, кривая шея вслѣдствіе простуды. Для лѣченія См. *Ревматизмъ мышцъ.*

Эклямпсія, родимчикъ бываетъ у дѣтей на 1 или на 2 году жизни. *Симптомы*: дѣти теряютъ сознаніе и падаютъ, лицо ихъ блѣднѣетъ и искажается; губы синѣютъ, судорожное сжатіе челюстей, пѣна изо рта бѣлая или съ кровью, глаза дѣлаются неподвижными и перекашиваются, руки и ноги судорожно сводятся и выпрямляются. *S.* 1 (3-й ст.) × *A.* 1 (3-й ст.). Если не поможетъ, то развести 1 каплю *Эл. Желт.* въ стаканѣ воды и давать по чайной ложкѣ въ частыхъ пріемахъ; на челюсть мазь изъ *S.* 2 или *C.* 5. Къ зат., симп., на челюсти и подглаз. нер. *Эл. Желт.*

Если эклямпсія поражаетъ женщину, во время ея беременности, или послѣ-родового состоянія, или продолжается во время сего послѣдняго (см. выше стр. 412), то ей даютъ вн. 2 капли *Эл. Желт.* въ стаканѣ воды попер. съ *C.* 1 (3-й ст.) по чайной л., одно послѣ другаго черезъ 5 мин., и тѣ же наружн. лѣкарства, которыя выше назначены для дѣтей, и стараются вызвать обильное потѣніе ванною 30 — 32° Р. съ двумя стол. лож. *Эл. Ж.*, въ которую погружаютъ больную по самый подбородокъ и держатъ въ ней 2—3 часа, а комнату нагрѣваютъ до + 20° Р.; вынувъ изъ ванны, больную закутываютъ въ нагрѣтыя простыни и теплыя одѣяла. Ванны можно замѣнить влажными обертываніями всего тѣла, въ родѣ согрѣвающаго компресса.

Эпидемія. Во время всякой эпидеміи предохранительнымъ средствомъ служитъ *S.* 1, принимаемое вн. ежедневно 3 раза въ день по 5—10 круп. съ пищей.

Лондонскій медицинскій журналъ *The Lancet* говоритъ, что неосторожно брать для чтенія книги изъ публичныхъ читаленъ, потому что эти книги, переходя изъ рукъ въ руки, служатъ вѣрнымъ распространителемъ эпидемическихъ болѣзней. Легче всего книгами могутъ быть распространены слѣд. болѣзни: бронхитъ, жаба, коклюшъ, корь, оспа, дифтеритъ, скарлатина, тифъ, холера и т. п.

Digitized by Google

Эпилепсія, падучая болѣзнь. Причины этой болѣзни весьма темны. Симптомы: съ больнымъ вдругъ дѣлается головокруженіе и онъ падаетъ, издавая иногда неистовый крикъ; лицо красно-багровое, черты его искажаются, на губахъ появляется обильное количество пѣны, иногда кровавой, вслѣдствіе ущемленія языка; скрежетаніе зубовъ бываетъ всегда, въ членахъ сильныя судороги, при чемъ большой палецъ руки сильно пригнутъ къ ладони, а остальные сложены надъ нимъ въ кулакъ. Иногда непроизвольное отдѣленіе мочи и испражненій, неправильный пульсъ, притупленіе слуха, потеря сознанія и чувствительности. Иногда изверженіе сѣмени. Въ такомъ видѣ припадокъ продолжается отъ 1 до 5 минутъ, затѣмъ смертельная блѣдность и крайнее разслабленіе. При возвращеніи сознанія усталость, головная боль и боль въ членахъ, ушибленныхъ во время паденія. Припадки повторяются въ различные промежутки времени, они не имѣютъ предвѣстниковъ и оставляютъ послѣ себя отупѣніе.

Необходимо лѣчить предполагаемую причину этой болѣзни, которая по большей части происходитъ или отъ неправильнаго кровообращенія, или отъ глистовъ, или отъ золотухи. Вн. *S.* 1. При глистахъ *Verm.* или вн. *Эл. Ж.* При неправильномъ кровообращеніи вн. *A.* 1, на сердце мазь *A.* 2, общія ван. *A.* 2 × *C.* 5; каждый веч. вн. 5 капель *Эл. Анж.*

Обыкновенная доза—одна кр. въ полуштофѣ воды, 3 или 4 чайн. ложки въ день. Иногда эта доза увеличивала припадки, и нужно было принимать по 4 ложки изъ 2-го стак., даже изъ 3-го стакана и еще болѣе высокаго разведенія.

Для женщинъ необходимо давать *A.* 1 попер. съ *C.* 1 если предполагаютъ истерическое предрасположеніе.

Припадокъ эпилепсіи останавливается отъ пріема вн. 20 и болѣе сухихъ круп. *S.* 1. Если эти крупинки будутъ даны въ то время, когда уже начался припадокъ, то послѣдній сокращается и больной быстрѣе приходитъ въ сознаніе.

Если числа мѣсяца, когда случаются припадки эпилепсіи, совпадаютъ съ фазами луны, то тогда *наканунѣ* и *во время новолунія* или *полнолунія* до слѣдующаго дня давать ежедневно

Digitized by Google

по 20 и болѣе сухихъ круп. *S.* 1 въ одинъ пріемъ и каждый разъ съ густою пищею, и на ночь по 1 сухой круп. *A.* 2 безъ воды. Или на тощакъ и каждый разъ съ густою пищею принимать по 5 сух. круп. *S.* 1 и 4 раза въ день по 1 сухой круп. *C.* 1 безъ воды и ван. *A.* 2, *C.* 1.

Если эпилепсіей страдаетъ женщина, и ея припадки совпадаютъ одновременно съ фазами луны и съ появленіемъ у нея регулъ, и *послѣднія болѣзненны*, то для облегченія боли давать ей каждыя $^1/_2$ часа по 1 сухой круп. *C.* 1 или *S.* 1 на лобокъ и животъ мазь *C.* 5 или *A.* 2.

Діэта. Избѣгать кофе, чаю и всякихъ спиртныхъ напитковъ. Питаться преимущественно растительной пищей, мяса поменьше, полезно же напротивъ того молоко, особенно—пахтанье. Жизнь должна быть возможно болѣе спокойной, нормальной, безъ всякихъ излишествъ.

Совѣтъ черезъ корреспонденцію въ г. Новочеркасскъ —М. 32 л., вслѣдствіе испуга, страдалъ 17 лѣтъ сряду эпилепсіей, припадки которой повторялись очень часто. Назначено въ январѣ 1897 г. для предупрежденія припадка вн. въ 1 пріемъ 20 и болѣе сух. кр. *S.* 1. Внѣ припадковъ ежедневно вн. *A.* 1 (3-й ст.) 6 ч. л. и каждый вечеръ 6 капель *Эл. Анж.*, на область сердца мазь *A.* 2 и общія ван. *A.* 2 × *C.* 5. Въ сентябрѣ того же года онъ сообщилъ автору этой книги, что началъ это лѣченіе съ марта, которое и продолжаетъ, но безъ ваннъ, и во все время лѣченія у него не было ни одного припадка, и онъ сталъ не столь раздражительнымъ. (*C.*).

— Ж. 26 л., страдала 8 л. эпилепсіею вслѣдствіе испуга, припадки по нѣсколько разъ въ день, регулы неправильныя, бѣли, головныя боли, головокруженіе, приливы крови къ головѣ послѣ пищи. Вн. 8 кр. *C. T. B.* на стак. воды, по глотку въ теченіе дня; ван. съ 100 кр. *C.* 5, спринц. влагалища *A.* 2, на ночь 2 кр. *A.* 1, на зат. и симпат. нер. *Эл. Анж.* 4 раза въ день. Черезъ $1^1/_2$ мѣс. припадки сдѣлались рѣже и слабѣе, черезъ 2 мѣс. выздоровѣла; въ продолженіе еще одного мѣс. утромъ и вечеромъ по 2 кр. *C. T. B.* и за завтракомъ и обѣдомъ по 2 кр. *S.* 1 (*C.*).

— Д. 7 л., страдала 6 мѣс. эпилепсіею, которая ежедневно усиливалась. Вылѣчена въ 4 недѣли. *S.* 2 и *A.* 3 (2-й ст.) и мазь *C.* 5 на спину (*C.*).

Digitized by Google

Языкъ состоитъ изъ мяса (мышцъ языка), онъ приращенъ на днѣ полости рта къ подъязычной кости. Спинка его покрыта толстымъ покровомъ изъ слизистой оболочки, на которой, кромѣ многочисленныхъ слизистыхъ железокъ, находится множество большихъ и малыхъ бугорковъ, такъ называемые, *сосочки языка* или *вкусовые сосочки*, органы вкуса. Въ мясѣ языка заключено множество нервовъ и сосудовъ, первые служатъ отчасти для движеній, отчасти для чувства вкуса, отчасти же для чувства осязанія. Языкъ служитъ не только для вкуса и осязанія, но по своей подвижности играетъ большую роль и въ рѣчи, жеваніи и глотаніи. Кромѣ того, онъ доставляетъ указанія о нѣкоторыхъ разстройствахъ пищеварительныхъ органовъ, а именно:

1) Языкъ густо-обложенный, грязно или буровато-бѣлый указываетъ на *разстройство слизистой оболочки желудка*, и при томъ недавнее.

2) Языкъ, покрытый вязкою слизью, съ ярко-красными краями и кончикомъ указываетъ на *то же самое разстройство*, но болѣе значительное.

3) Языкъ ярко-красный, натурально влажный, съ неестественно возвышенными сосочками указываетъ на *разстройство нервовъ желудка*, и при томъ недавнее.

4) Языкъ красный, сухой и глянцовитый указываетъ на *то же самое разстройство*, но хроническое.

5) Языкъ потресканный, изборожденный, опухлый или съ отпечаткомъ вдавленныхъ зубовъ съ обѣихъ сторонъ, указываетъ на *значительное разстройство нервовъ желудка*.

6) Языкъ опухшій съ тонкимъ слоемъ бѣлаго налета, ярко-красными краями и кончикомъ указываетъ на *застарѣлую и упорную болѣзнь слизистой оболочки желудка и его нервовъ*.

7) Языкъ однообразно красный и гладкій или гладкій по краямъ и на кончикѣ указываетъ на развившуюся *сахарную болѣзнь*.

8) Языкъ желтый—на *болѣзнь печени*.

9) Языкъ дрожащій при высовываніи указываетъ — на

Digitized by Google

нервное разстройство пищеваренія, вліяющее на спинной мозгъ.

10) Языкъ черноватый, сухой, обложенный и дрожащій представляетъ серьезный *симптомъ брюшного* или *гнилого тифа.*

Болѣзни языка.

Болѣзненныя изъязвленія языка образуются, если края языка упираются въ неровные острые зубы и трутся объ нихъ. По удаленіи производящей причины изъязвленія заживаютъ отъ *S.* 1 или *A.* 1, употребленныя внутрь и въ полосканіи.

Воспаленіе языка занимаетъ или весь языкъ, или только его часть. Симптомы: объемистый и сильно красный языкъ, не помѣщаясь въ полости рта, высовывается наружу, дыханіе затруднено вслѣдствіе давленія на надгортанникъ, сильная боль и болѣзнь развивается быстро. Если заболѣваніе мѣстное, то и явленія слабѣе. Ви. и полоск. *S.* 1 или *A.* 1. Въ упорномъ случаѣ: *C.* 5 (1-й ст.). Полосканія изъ этихъ же лѣкарствъ. На подъяз. нер. мазь, компр. *C.* 5, *A.* 2 или *S.* 1.

Ракъ языка въ началѣ появляется въ видѣ припухлости, которая не причиняетъ боли, но только мѣшаетъ движеніямъ языка, при жеваніи и разговорѣ. Въ толщѣ языка ощупывается твердое ядро. Большею частію онъ развивается на краяхъ языка, въ видѣ одного или нѣсколькихъ узловъ, скоро превращающихся въ язвы. Послѣднія быстро увеличиваются въ ширину и глубину, имѣютъ твердое сальное дно и шишковаты, подкопанные края. Подчелюстныя железы всегда припухаютъ. Сильныя боли въ языкѣ и кровотеченія, сонъ нарушается сверлящей болью. Дыханіе зловонное, какъ только появится нагноеніе. Раковое худосочіе, смерть спустя 12—13 мѣсяцевъ. Для лѣченія см. *Ракъ.*

Параличъ языка. См. *Параличъ.*

Digitized by Google

Списокъ лѣкарствъ графа Маттеи.

КРУПИНКИ:

(Приставка „Anti“ для краткости отбрасывается; см. стр. 34).

S.=Scrofoloso (*Скрофолозо*) №№ 1, 2 или *nuovo*, 3 или *doppio*, 5 и 6.

S. G.=Scrofoloso Giappone. (*Скрофолозо Джіаппоне*).

S. lass. = Scrofoloso Lassativo (*Скрофолозо Лассативо*).

A.=Angioitico (*Анжіоитико*) №№ 1, 2 или *nuovo* и 3.

C.=Canceroso (*Канчерозо*) №№ 1, 2 или *nuovo*, 3 или *doppio*, 4, 5, 6, 10 и Т. В.

L.=Linfatico (*Линфатико*),

V.=Venereo (*Венерео*).

F.=Febrifugo (*Фебрифуго*) №№ 1 и 2 или *nuovo*.

P. = Pettorale (*Петторале*) №№ 1, 2 или *nuovo*, 3 и 4.

Verm.=Vermifugo (*Вермифуго*) №№ 1 и 2 или *nuovo*.

M.=Marina (*Марина*).

Anti-mal di mare (*Анти-маль ди маре*).

Dom-Fin (*Домъ-финъ*).

Lord (*Лордъ*).

ЖИДКОСТИ:

Elettricita	Rossa (*Эл. Красное*).
„	Gialla („ *Желтое*).
„	Bianca („ *Бѣлое*).
„	Azzurra или Bleu („ *Анжіоитико или Синее*).
„	Verde („ *Зеленое.*)

Всѣ эти лѣкарства надо сохранять всегда закупоренными въ сухомъ мѣстѣ и вдали отъ жара.

Центральный складъ Электро-Гомеопатическихъ лѣкарствъ графа Цезаря Маттеи находится въ Сѣверной Италіи, въ г. Болоньи, Palais Mattei, Via Mazzini № 46. Владѣлецъ этого склада, усыновленный сынъ графа Цезаря Маттеи — Mario Venturoli-Mattei. См. выше, стр. 3.

Изъ этого центральнаго склада лѣкарства графа Маттеи доставляются для продажи во всѣ депо, которыя находятся теперь во всѣхъ государствахъ всего Свѣта (Moniteur de l'Electro-Homéopathie 1898, № 12).

Всѣ стклянки съ лѣкарствами графа Маттеи отпускаются изъ центральнаго склада во всѣ депо съ этикетомъ, на которомъ изображенъ замокъ «*La Rochetta*».

Digitized by Google

Цѣна электро-гомеопатическимъ лѣкарствамъ графа Маттеи въ С.-Петербургской Центральной Гомеопатической Аптекѣ, Гороховая, 17.

Эта Аптека числится въ Moniteur de l'Electro-Homéopathie въ числѣ главныхъ депо, получающихъ эти лѣкарства непосредственно изъ вышеупомянутаго центральнаго склада.

Крупинки за стклянку (цилиндръ) обыкновенной величины	— р. 50 к.
Тоже за стклянку двойной величины . . .	1 » — »
Эл.-Гомеопат. жидкости за стклянку . .	1 » — »
» » » » $^1/_2$ стклянки .	— » 50 »
Полная Аптечка, состоящая изъ 32 лѣкарствъ въ крупинкахъ (въ стклянкахъ обыкновенной величины) и 5 стклянокъ Электро-Гомеоп. жидкостей, въ деревянномъ футлярѣ	19 » 50 »
То же изъ 27 средствъ въ крупинкахъ и 5 Эл.-Гомеоп. жидкостей, въ деревян. футлярѣ . .	17 » — »
Малая Аптечка изъ 8 средствъ въ крупинкахъ и 5 Эл.-Гомеоп. жидкостей въ дер. футл.	8 » — »
Карманная Аптечка въ сафьянномъ футлярѣ изъ 12 наиболѣе употребляемыхъ средствъ въ крупинкахъ: *S.* 1, *S.* 2, *S.* 6, *Scrof. Giapp.*, *A.* 1, *C.* 1, *C.* 5, *F.* 1, *Dom-Fin*, *P.* 1, *Verm.* 1 и *Ven.*, безъ Эл.-Гом. жидкостей	8 » — »
Мази изъ любаго лѣкарства за банку въ 1 унцію на *вазелинѣ*	— » 50 »
Мази изъ любаго лѣкарства за банку въ 1 унцію *на спермацетѣ*	— » 60 »
Плоскія карманныя стклянки въ 1 стаканъ.	— » 25 »
Тоже въ $^1/_2$ стак.	— » 20 »

За пересылку полагается особо.

Въ зимнее время Эл.-Гомеоп. жидкости пересылаются въ двойныхъ не полныхъ на половину стклянкахъ для того, чтобы стклянка не лопнула отъ мороза.

Эти жидкости отъ замерзанія не теряютъ своего свойства. См. выше стр. 98.

Digitized by Google

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

болѣзней, лѣкарствъ, органовъ тѣла, статей и терминовъ.

СТР.

А.

Абсцессъ 261
Алкоголизмъ 226, 358
Аменоррея. 410
Аналгезія 356
Анатомическое описаніе каждаго органа. См. названіе органа.
Англійская болѣзнь . . . 170
Аневризма аорты 457
» артерій . . . —
» сердца . . . 457
Анемія 280
Анемія мозга 207
Анестезія 356
Анжіоитико, дифференц. свойства серіи его въ различныхъ дозахъ . 53
Анжіоитико жидкость 31, 102
» крупинки и его одноименныя 47—52
Анжіоитическое или сангвиническое тѣлосложеніе 116
Антидоты 151
Анти-маль-ди-маре . . . 79
Антоновъ огонь мягкихъ тканей 170
Аорта 458
Апоплексія мозга 171
Аппетитъ извращенный, потеря его 172
Артеріи и ихъ болѣзни . 490
Аскариды—см. Глисты.
Астма 172

СТР.

Асфиксія 317
Атрофія см. Мышцы. . 330
» сердца 461
Аускультація органовъ. 184
Афты 450
Ахилесово сухожиліе . . 341

Б.

Бедрен. боль, невралгія 342
» нервъ 335
Бездѣйствіе пальцевъ руки 184
Безплодіе 379, 404
Безсиліе мужское 379
Безсознательное состояніе См. Обморокъ и мнимая смерть.
Безсонница. 175
Беременность 411
» внѣ маточная . . 382
Берцовые нервы 336
Біеніе артерій 492
» сердца . . . 454, 462
Бленоррея 469
Близорукость 196
Блоковые нервы 333
Блуждающіе нервы . . . 333
Блѣдная немочь 281
Боевыя жилы 490
Болѣзни и ихъ классификація: 180
Бронховъ 293
Брюха. 179
Венерическія 467

Digitized by Google

стр.

Болѣзни:
Верхн. конечн. . 182—183
Вн. жен. пол. орг. . . 394
Волосъ 186
Вѣкъ . . . . . 191—192
Глазъ . . . . . 189—192
Глисты 199
Глотки 210
Голоса . . . . 209—210
Гортани 210
Десенъ 245, 451
Душевныя 221
Дыхательныхъ органовъ. См. Болѣзни глотки, гортани и легкихъ.
Дѣтскія. См. Дѣтскія болѣзни.
Железъ 229
Желудка 234
Желчи 361
Женскія 385
Живота 179
Заразительныя . . . 132
Зубовъ 245
Кишекъ 252
Кожи 260
Костей 274
Крови 27, 279
Легкихъ . . . 284—295
Лимфы 27
Лица 314
Мозга головного 205—208
„ спинного . . . 372
Мочевыхъ органовъ 320
Мышцъ 330
Нар. жен. пол. орг. . 393
Нервовъ 336
Нижн. конечностей . 342
Ногъ 345
Носа (его полости) . 346
Острыя 131
Печени 362
Позвон. столба . . . 372
Пол. орган. женск. . 380
„ „ мужск. . 376
Рта (его полости) . . 450
Рукъ 182
Селезенки 367
Сердца 135, 455
Сифилисъ 473
Скоротечныя 132
Сосудистой системы . 489
Спорадическія 132

стр.

Болѣзни:
Ушныя 497
Хроническія 132
Эндемическія . . . . —
Эпидемическія . . . . —
Языка 515
Боль въ нижней части живота у женщины, какъ признакъ женск. бол. См. Женскіе полов. органы.
„ въ различныхъ частяхъ тѣла, какъ признакъ разныхъ болѣзней . 176—179
„ головная см. Голова.
„ зубная см. Зубы.
„ подъ ложечкой см. Желудокъ 234
„ руки 182
Бородавки 268
Брайтова болѣзнь 321
Бредъ 179, 227
Брови 191
Бронхи, бронхитъ . 286, 293
Брюхо или животъ . . 179
Брюшина, ея воспал. . . 181
Брюшная водянка . . . 180
Брюшной тифъ 312
Бубоны 182
Бубонъ трипперный . . . 470
Бугорчатка брыжжеечныхъ
железъ . 230, 254
„ кишекъ . . . 254
„ легкихъ . . . 287
Бужи 97
Бурчаніе кишекъ 258
Бѣлая горячка 353
Бѣлая жидкость . 31, 101
„ опухоль бедеръ . 342
„ „ колѣна . 344
Бѣли 394
Бѣлковое мочеизнуреніе 321
Бѣльма 196

В.

Вагинизмъ 396
Ванны 92, 151
Ванны глазныя 95
Введеніе 5
Вдуваніе 97
Вдыханіе 94
Венерео . . . . . 77—79
Венерическія болѣзни . . 467

Digitized by Google

стр.
Вентуроли-Маттеи, Маріо 517
Вены, расшир. ихъ . . . 490
Вередообразная сыпь (эктима) 264
Вередъ 260
Вермифуго, дифференціальныя (отличит.) свойства его въ разл. дозахъ 74
Вермифуго 1-е и 2-е (нуово) 72
Верхнія конечности и ихъ болѣзни . . . . . 182—183
Веснушки 315
Взвѣшиваніе тѣла 140
Вкусъ, измѣненіе и потеря его 184
Влагалище и его болѣзни 382, 394
Внезапный голодъ . 184, 235
Вниманію иногороднихъ 165
Вн. употр. жидкостей 100—105
Вн. употр. крупинокъ:
„ въ растворѣ . 80
„ сухомъ видѣ и растираніи 86
Внѣшніе признаки болѣзни 132
Вода лабиринтная, слух. 497
Водные растворы (разведенія) 80
Водяная 185
Водянка брюшная . . . 180
„ грудная 288
„ мозга 207
„ общая 185
„ околосердечной сумки 456
„ яичка 376
„ яичника 407
Возвратный тифъ 313
Возрастъ и соотвѣтствующія ему болѣзни . . . 140
Волосные сосуды 490
Волосы и ихъ болѣзни . 186
Волчанка 266
Волчій голодъ 185
Вопросы для описанія болѣзни при заочномъ лѣченіи 165
Воспаленіе 187
„ дифтеритич. . . 215
„ катарральное . . 250
„ крупозное . . 213
„ острое 189
„ хроническое . . —
Воспаленіе разныхъ органовъ изложено при органахъ, которые оно сопровождаетъ. См. Болѣзни или названіе органа.
Впрыскиванія 92
Втиранія 91, 151
Второй стаканъ (*доза*) . . 82
Втягиванія въ носъ . . . 151
Выборъ дозы 146
„ см. еще: дифференціальн. свойства лѣкарствъ.
„ лѣкарства по тѣлосложж. и темпераменту . 142
Вывихъ 278
„ бедра 343
Выкидышъ 415, 481
Выпаденіе:
„ влагалища 396
„ волосъ и рѣсницъ 187
„ задняго прохода . 258
„ матки 402
„ прямой кишки . . . 258
Выслушиваніе вн. органовъ 134
Вѣки и ихъ болѣзни 191—192
Вѣра въ лѣкарства нужна-ли? 163
Вѣтры см. Болѣзни желудка.
Вѣтряная оспа 307

Г.

Галакторрея 408
Гангрена 170
Гастрическая лихорадка. 234
Гемиплегія 356
Геморрой 256
Гигіеническіе препар. съ Эл.-Гом. лѣкарствами . 531
Гигіеническія указанія . 153
Гиперемія печени 366
Гипертрофія печени . . 367
„ сердца . . . 461
Глаза и ихъ болѣзни 189, 192
Глазная ванна 95
Глазныя примочки . . . 96
Гланды. См. Железы.
Глисты 199
Глотка 210
Глухота и тугость слуха 500
Гнойнопузырчатый лишай 265

Digitized by Google

стр.
Голень 341
Голова и ея болѣзни 202, 208
Головная боль 202
Головной мозгъ 205
Головокруженіе 208
Голодъ внезапный . . . 185
Голосовая щель 210
Голосъ и его измѣненія. 209
„ его потеря 210
Гонорея 469
Горбъ 374
Гортанная чахотка . . . 218
Гортанный сифилисъ . . 213
Гортань и ея болѣзни 209, 210
Горячка нервная 309
„ родильная . . . 413
Граафіевы пузырки . . . 381
Грануляціи матки 403
Гриппъ 219
Груди женскія и ихъ болѣзни 384, 408
Грудная водянка . 285, 288
„ жаба 462
„ клѣтка 284
Грудница 384
Грудобрюшная преграда. 285
Грусть 220
Грыжа 220
Губы половыя и ихъ болѣзни 383, 393
Губы ртовыя и ихъ бол. 450, 451

Д.

Давленіе во снѣ, Кошмаръ, см. Сонъ.
Дальнозоркость 196
Двигательные нервы глаза 333
Двоезрѣніе 197
Десны и ихъ болѣзни 245, 451
Дизентерія 282
Дикое мясо 221
Дисменоррея 411
Диспепсія 237
Дифтеритъ 215
Диффер. свойство всѣхъ крупин. въ различныхъ дозахъ 46, 53, 64, 67, 71, 74, 76, 79.
Діагностика . . . . 130—140
Діастола 454
Діафрагма 285
Діэта и нѣкотор. гигіеническія указанія 153
Дозы: внутреннія 80

стр.
Дозы: выборъ 146
дѣтскія 86
крѣпкій растворъ . 81
литровая доза . . . 150
массивныя 88
наружныя 88
1-го стакана 81
2-го стакана 82
3-го стакана и проч. 83
4-го стакана и проч. —
по климату. 150
соразмѣрныя . . 151
среднія 82
уменьшеніе . . 148, 151
усиленіе 81
Домъ-финъ 64
Дрожаніе 221, 359
Душевныя болѣзни, психопатія 221
Дѣвственная плева . . . 382
Дѣтскія болѣзни:
англійская 170
афты 450
бугорч. кишекъ и брыжжеечныхъ железъ 254, 230
глазъ воспаленіе см. Глаза.
глисты 199
головн. водянка . . 207
дифтеритъ 215
заушница 230
золотуха . . . 115, 242
корь 300
кровав. поносъ . . 282
крупъ 213
ложный крупъ . . . 215
лихорадка 296
молочница 450
накожныя: лишай 265, парша 266, сыпи 268, чесотка 266
оспа 303
падучая 513
параличъ 359
плѣшивость 270
пляска св. Витта . 369
поносъ 419
рахитизмъ 170
родимчикъ 512
свинка 230
скарлатина 301
холера 501
эклямпсія 512

Digitized by Google

стр.
Дыханіе 228
„ вонючее 229
Дыхательное горло . . . 286

Е.

Евстахіева труба 497

Ж.

Жаба 218
„ грудная 462
„ сифилитическая . . 476
Железы: болѣзни ихъ . . 229
брыжжеечныя . 230
грудныя 384
лимфатическія . 231
миндалевидныя . —
околоушныя . . 230
поджелудочная . 233
подчелюстная . 230
подъязычныя . . —
предстательная . 319, 376, 380
слюнныя 229
щитовидная . . 231
Желтая жидкость . 31, 100
Желтуха 363
„ катарральная . . 364
Желудокъ и его бол. 232, 234
Желудочный сокъ 232
Желчные камни 366
Желчныя колики . . . . —
Желчь 361
Женскія болѣзни 385
„ груди и ихъ бол. 384, 408
Жидкости Электр.-Гомеоп., ихъ свойства и кругъ дѣйствія . . . . . 97—105
„ внутр. употребленіе ихъ . . . . . 100—105
„ наружное употребл. ихъ . . . . . 105—111
Жилы боевыя 490
Жировая немочь 495
Жировая печень 365
Журналы Элек.-Гомеоп. XIV

З.

Загибы матки 402
Задержаніе мочи 326
Задній проходъ 252
Заиканіе 240
Законъ поляризаціи . . . 107
Занеза 240
Запой 353
Запоръ 240
Заразительныя болѣзни . 132
Заслонки сердца 454
Застой крови 242
Затвердѣніе печени . . . 366
Затылочный нервъ . . . 336
Заушница 230
Зеленая жидкость . . 31, 104
Зернистость вѣкъ, трахома 193
Зернистость печени . . . 364
Знаки и сокращенныя слова 34, 168, 169
Зобъ 231
Золотуха 115, 242
Зрительные нервы 333
Зрѣніе, ослабленіе его . 194
Зубы и ихъ болѣзни 244, 245
Зудъ. См. Болѣзни кожи 260
Зѣвъ 449

И.

Идіосинкразія 120
Идіотизмъ 227
Изжога 246
Измѣреніе тѣла 140
„ темп. тѣла . . 135
Изслѣдованіе зондомъ . . 139
„ микроск. . 140
„ пальцемъ . 139
„ разн. снар. —
„ химическое 140
Изъязвленіе матки . . 403
Икота 246
Импетиго 265
Инфлуенца 246
Ипохондрическое помѣшательство 225
Ипохондрія 247
Искривл. позв. столба . . 374
Искусственное дыханіе . 349
Испанскій воротникъ . . 470
Истерика 248
Истерическ. помѣшательство 225
Истечен. мужск. сѣмени . 380
Исхуданіе. См. Мышцы 330

Digitized by Google

стр.

К.

Камни мочевые 326
„ почечные 323
Канкроидъ. См. Ракъ.
Канчерозо и его одноименныя . . . . . 55—64
Капилляры 490
Карбункулъ 260
Кардіалгія 237
Каталепсія 250
Каталогъ болѣзней . . 167
Катарракта 195
Катарръ 250
Кашель 250
Кисты 352
„ матки 400
„ яичниковъ 406
Кисть руки 133
Кишечный каналъ, кишки и ихъ болѣзни . . 251, 252
Классификаціи болѣзней 130
Клистиры 151, 241
Клиторъ 383
Книги иностранныя по Электро-Гомеоп. . . . XIII
Кожа и ея болѣзни . 259, 260
Коклюшъ 271
Колики кишекъ 257
» подвздошныя . . 273
Колики—признакъ разн. болѣзней 273
Колотья, какъ признакъ разн. болѣзней . . . . —
Колѣно, воспаленіе . . . 344
» бѣлая опух. его 344
Компрессъ согрѣвающій. 93
Конвульсивный смѣхъ. . 273
Конвульсіи 494
Кондиломы 268
„ трипперныя . 470
Конечности 182, 341
Консервы—очки 197
Копростазъ, запоръ . . . 241
Копчикъ 316
Корчи сердца 464
Корь 300
Косоглазіе 196
Кости и ихъ болѣзни 273, 274
Костоѣда 275
» зубовъ . . . . . —
» носов. костей . —

стр.

Крапивная сыпь 305
Красная жидкость . . 99, 110
Краснуха. 306
Крестецъ 316
Кретинизмъ 227
Критическій возрастъ 410, 411
Кровавый поносъ 282
Кровеносная система . . 490
Кровеносные сосуды . . 490
Кровоизліяніе въ сѣтчат. оболочку 196
Кровотеченіе 284
„ изъ мочевого пузыря 327
Кровотеченіе изъ носа . 347
Кровохарканіе 292
Кровь и ея болѣзни . 27, 279
Круглый глистъ 200
Круглыя язвы желудка . 236
Кругъ дѣйств. жидк. 97—105
„ „ крупин. 36—80
Крупинки, ихъ употребл.:
внутрь въ растворѣ . . 80
„ „ сух. видѣ . . 86
наружное употребленіе 88
Крупъ 213
„ ложный 213
Куриная слѣпота 197

Л.

Лабиринт. слухов. вода . 497
Легкія и ихъ болѣзни 134, 284
Легочная гимнастика . . 295
Легочная чахотка . . . 287
Легочно-желудочн. нервы 333
Легочный сифилисъ . . . 479
Легочный тифъ 312
Ленточный глистъ . . . 200
Летаргія 296
Лимфа и ея болѣзни. 27, 112
Лимфатич. темперам. . . 123
„ тѣлосложеніе. 113
„ железы . 231, 491
„ сосуды. . . . 490
Линфатико 66, 67
Литература Эл.-Гомеоп. XIII
Литръ 150
Лихорадка 296
„ гастрическая 234
„ злокачеств. . 298
„ крапивная . 305
„ перемежающ. 297
„ сыпная . . . 299

Digitized by Google

стр.
Лицо и его болѣзни 313, 314
Личная боль . . . . . —
Личные нервы 333
Лишай и его разновидн. 265
Лобковая кость и ея болѣзни 316
Лобокъ 333
Ложечка (подлож. ямка) см. Желудокъ.
Ложный крупъ 213
Локтевой нервъ, перемѣщеніе его 183
Ломота въ пальц. ногъ . 316
Ломъ въ поясницѣ . . . —
„ „ разн. част. тѣла. —
Лордъ 64
Лунатизмъ. 316
Лѣкарства:
Вспомогательныя . . . 531
Выборъ ихъ. . . 142, 158
Главныя 36
Длит. дѣйств. ихъ . . . 147
Мгновенное дѣйст. ихъ 27, 98
Названіе ихъ . . . 26
Складъ (депо) . . . 517, 518
Случаи, когда они не дѣйствуютъ . . . 33, 147, 179
Спеціальныя . 68—80
Цѣна ихъ . . . 518, 531

М.

Мази, приготовл. ихъ . . 89, 91
Малокровіе 280
Малярія 297
Манія 224
Марина 45
Матка и ея болѣзни . 397
Маточный рукавъ 382
Маточные шарики 96
Маттеи, графъ Цезарь . 1
Межреберная невралгія 337
Меланхолія 223
Меноррагія 410
Метастазъ 423
Метроррагія 404
Мигрень 204, 338
Міазма 12
Міокардитъ 460
Млекотеченіе 408
Млечные сосуды. 491
Мнимая смерть 317
Мозговой тифъ 312
Мозгъ головной и его болѣзни . . . . . 205—208
Мозгъ спинной и его болѣзни 331, 371
Мозоли 268
Мокнущій лишай 265
Мокрота отхаркиваем. . . 317
Молоко женское 385
Молочница 450
Морская болѣзнь 317
Моча 319
„ задержаніе ея . . . 326
„ недержаніе ея . . . —
Мочевой пузырь . . 318, 320
Мочевые органы и ихъ болѣзни . . . . . 318—320
Мочеиспускат. каналъ . 318
Мочеточники 318
Мошонка 376
Мужское безсиліе 379
„ сѣмя 376
Мышечный ревматизмъ . 447
Мышцы и ихъ болѣзни . 330
„ глазныя 333
Мѣстныя болѣзни . . . 131
Мѣсячное очищеніе. См. Регулы.
Мягкая опухоль на ногѣ 345

Н.

Названія лѣкарствъ и общія о нихъ замѣчанія. 26
Надгортанникъ 210
Надкостная плева, ея воспаленіе 274
Наклоненія матки 402
Накожныя болѣзни . . . 260
Наросты 270, 331
Наружное употребленіе жидкостей 105
Наружн. употр. круп. . 88
Нарывы 261
Насморкъ 346
„ сифилитич. . . 476
Натужный поносъ . . . 282
Нёбо и его болѣзни. 450, 451
Невралгія 336
Неврастенія, невропатія. 338
Недержаніе мочи 326
Недостатокъ двустворч. заслонки сердца 454
Незалупа 470
Нервная астма. 172

Digitized by Google

стр.
Нервная боль желудка . 237
„ „ кишекъ. . 257
„ горячка. 309
„ система. 331
Нервныя болѣзни 336
Нервныя точки для прилож. электро-гомеопат. жидкостей 109
Нервы, болѣзни ихъ 331, 336, 338
„ головн. мозга 332, 333
„ верхнихъ конечностей 335
Нервы нижней конечности 335
Нервы спинного мозга . 334
Нервы туловищъ 334
Нижнія конечности и ихъ болѣзни 341, 342
Нимфоманія 404
Ноги 341, 342
Ногтоѣда 184
Нона (болѣзнь) 247
Носъ и болѣзни его полости 345, 346
Нѣмота 347

О.

Ожогъ 262
Обморокъ 348
Обмываніе 92, 151
Обоняніе, потеря его . . 347
Обонятельные нервы . . 332
Общій прогрессивн. параличъ 226
Общія разстройства . . . 131
Объект. призн. болѣзней 133
Объясненія сокращеній и знаковъ 34, 168, 169
Одышка 455
„ сифилитич. . . . 479
Ожирѣніе общее 495
„ сердца 464
Озноблениe. 263
Околосердечная сумка. . 453
Омертвѣніе костей . . . 276
„ мягк. тканей . 170
Онанизмъ. рукоблудіе . . 349
Онѣмѣніе 184, 351
Опред. болѣзн. вообще . 132
„ „ женск. . . 385
Опрятность 153
Опухоли 351
Опухоль бѣлая 352
„ матки 400
„ мягкая 385
„ раковая, см. Ракъ.
Опущеніе матки 402
Опьяненіе 353
Осадки въ мочѣ 319
Ослабленіе и упад. силъ 354
Ослабленіе 354
„ желудка . . . 237
„ зрѣнія 194
„ кишекъ 258
„ колѣнъ 354
„ памяти . . . . —
„ рукъ . . . . . —
„ слуха . . . . . —
„ тѣла . . . . . —
Оспа вѣтряная 307
Оспа натуральная . . . 303
Острицы 200
Острое воспаленіе легк. 289
Острый бредъ 227
Острыя болѣзни 132
Отводящіе нервы 333
Отвращ. реб. отъ груди 321
Отекъ 242, 352
Отзывы печати 14
Отмороженіе 262
Отравленія 355
Отрубевидн. лишай (питиріазъ) 265
Отрыжка. См. Болѣзни желудка.
Отхарк. мокротъ. 317
Охриплость 209
Очки-консервы 197
Ощупываніе тѣла 138

П.

Падучая болѣзнь 513
Пальпація тѣла 138
Пальцы ножные 342
„ ручные 183
Панкреатическій сокъ . . 233
Параличное дрожаніе конечностей 359
Параличъ . . . . 356—360
„ вѣкъ 192
„ дѣтскій 359
„ лицевой 356
„ моч. пузыр. 326, 358
„ общій прогрес. 226
„ языка 356

Digitized by Google

стр.
Параплегія 557
Парафимозъ 470
Парша 266
Паховая область . . . 220
Первый стаканъ (*доза*) . . . 81
Перелой 469
Перелойный ревматизмъ . 447
Переломы костей . . . 277
Перикардитъ 457
Періодическ. помѣшат. . 226
Перкуссія органовъ . . . 133
Перхоть см. Себоррея.
Петторале и его одноименныя . . . . . 75—77
Печень и ея болѣзни 361, 362
Питиріазъ, отруб. лишай 265
Питье 25, 153
Пища . . . . . —
Пищевая кашица . . . 233
Пищепроводъ и его болѣзни . . . . . 238—239
Пластыри, приготов. ихъ 95
Плевра, воспаленіе . . . 291
Плевритъ 291
Плесневица 450
Плечо 183
Площицы 380, 394
Плѣшивость 270
Пляска Св. Витта 369
Подагра 370
Подвздошная колика . . 371
Подложечная ямка . . . 180
Подошва ноги 341
Подраздѣленіе болѣзней . 132
Подреберная плева . . . 285
Подреберья, боль въ нихъ какъ признакъ болѣзни —
Подтеки подъ глазами . 196
Подъязычные нервы . . . 333
Позвоночный столбъ и его болѣзни . . . 371, 372
Полипы 347
» въ гортани . . . 213
» » кишкахъ . . 258
» » мочев. пузырѣ 325
» » носу 347
» » слух. проходѣ 499
» на лобк. кости . . 316
» » маткѣ 401
» » нёбѣ 451
Поллюціи ночныя 378
Полнокровіе 280
Половые органы женскіе и ихъ болѣзни 380, 393, 394
Половые органы мужскіе и ихъ болѣзни . . 376, 377
Полосканіе рта 92, 151
Полунеподвижн. локтя . 184
Помѣшательство . 224, 225
Поносъ 419
» кровавый 282
Пораженіе молніею . . 420
Порядокъ пріема лѣкарствъ . . . . . 83—85
Порѣзы. См. Кровотеч. и раны.
Постукиваніе органовъ 133
Потеря обонянія 347
Потливость 420
Потъ . . . . . —
Почесуха 264
Почечные камни 323
Почки и ихъ болѣзни 318, 320
Поясница, боль ея . . . 420
Приливы крови 421
Примочки 93, 151
Примѣры излѣченій приведены послѣ изложенія болѣзней.
Причины болѣзней . . . 25
Пріемы лѣкарствъ, ихъ порядокъ . . . . . 83—85
Пріемы крупин. въ растираніяхъ 87
Пріемы сух. крупинокъ . 86
Продолжит. лѣченія . . 146
Произношеніе затрудн. . 348
Проказа 269
Пролежни 262
Промежность 383
Прорѣзываніе зубовъ у дѣтей 245
Просообразная сыпь . . 306
Простуда 421
Психоневрозы 223
Психопатія 221
Псоріазъ 265
Пудра для присыпки . . 97
Пузыри гнойн. на кожѣ 264
Пузырная сыпь 264
Пузырьки . . . . . —
Пульверизаторъ 94
Пульверизація 94, 151
» влагалища 392
Пульсъ 136
Пупокъ 180, 220
Пятна на роговой оболочкѣ 196
Пятна на кожѣ 270

Digitized by Google

стр.
Пятнистая сыпь 306
Пьянство 353

Р.

Размягченіе костей . . . 276
» мозга 207
Разстройство желудка . . 237
Разъѣдающій лишай . . 266
Ракъ: 421
вѣкъ 442
губъ 439
гортани . . . 219, 439
грудной железы . . 439
желудка . . 236, 438
женск. грудей 384, 439
задняго прохода . . 255
кишекъ . . . 255, 439
матки 441
мочев. пузыря . 328, 439
мягкій (энцефал.) . 424
нар. женск. половыхъ органовъ . 394
носа 442
печени 367
почекъ 439
студенистый 424
твердый (Скирръ) —
черный . . . . . —
языка 422, 439
яичниковъ 407
Раны 443
Растиранія крупинокъ съ молочнымъ сахаромъ . 86
Расширеніе венъ 378
» сердца . . 461
Рахитизмъ 170
Рвота 444
Рвота каломъ 257
Реакція мочи 320
Ревматизмъ мышцъ . . 448
» перелойный 447
» сочлененій . 446
Регулы: 382, 409
болѣзненныя . . 411
недостаточныя . —
нормальныя . . 409
обильныя 410
отсутствіе ихъ . —
Ритмъ сердца 453
Родильная горячка . . . 413
Родимчикъ 512
Роды 411
Рожа 267

стр.
Ротъ и болѣзни его полости 449, 450
Руки 182
Рукоблюдіе, онанизмъ . 349
Рупія 266, см. еще Сифилисъ
Рѣсницы 191

С.

Сангвиническое тѣлосложеніе 116
Саркома 452
Сахарное мочеизнуреніе . 328
Свинка 230
Сведеніе руки вслѣдств. порѣза нерва 184
Свищи 501
Себоррея 270
Селезенка и ея болѣзни 362, 367
Сердечные тоны 455
Сердце 452
» его болѣз. . . . 455
Сердцебіеніе 457, 464
Сжатый палецъ 184
Сибирская язва 260
Симпатич. нервы 331, 332, 334
Симптомы 132
Синяки на тѣлѣ 467
Синяя немочь . . . . . —
Сиплость 209
Систола 454
Сифилисъ 467
Сифилисъ: вторичный . . 474
наслѣдствен. . 480
первичный . . 473
третичный . . 477
Скарлатина 301
Скирръ. См. Ракъ.
Складъ лѣкарствъ . . . 518
Скорбутъ 451
Скоротечная чахотка . . 287
Скоротечныя болѣзни . . 132
Скрофолозо и его одноим. . . . . 36—45
Слабость. См. Ослабленіе.
Слезная фистула 194
Слезотеченіе 197
Слезы 191
Слизистая оболочка . 282, 334
Слизь, отдѣляем. женск. пол. орг. въ норм. сост. 384
Слова сокращен. и знаки . . . . . 34, 168—169
Слоновая болѣзнь 268

Digitized by Google

стр.
Слуховая, лабиринтн. вода 497
Слуховые нервы . . . 333
Слухъ, притупленіе его . 499
Случаи, когда лѣкарства не дѣйствуютъ . . 33, 147, 179
Слѣпота внезапная . . . 154
см. Темная вода, Катаракта.
Слюна 229
Смертельный обморокъ. См. Мнимая смерть.
Смѣсь лѣкарствъ 83
Смѣшанное тѣлосложеніе 118
Смѣщеніе матки 402
Совѣты начин. примѣнять Электро-Гом. . . . 157
Совѣты черезъ корреспонденцію стр. 165 и См. также между примѣрами излѣч. нѣкотор. болѣзней.
Согрѣвающій компрессъ 93
Содроганія. См. Судороги.
Соединительн. оболочки глазъ воспаленіе . 193, 194
Сокращен. слова и знаки . . . . . 34, 168—169
Солитеръ. См. Глисты.
Солнечное сплетеніе . . 332
Солнечный ударъ 489
Соразмѣрность дозъ . . . 151
Сосудистая система и ея болѣзни 489, 490
Сочлененія 278, 493
Спазмы желудка 237
» матки 404
» пищепровода . . 239
» сердца 464
Сперматоррея 378
Спинной мозгъ 331
Списокъ лѣкарствъ . . 517
Спорадическія болѣзни . 132
Способъ изслѣд. болѣзней 133
Способъ употребленія лѣкарствъ . . 80, 97, 105—111
Способы опредѣленія женск. болѣзн. 385
Спринцованіе 92, 151
» влагалища · 389
Средній плечевой нервъ 335
Средняя доза 82
Ссадины 262
Стакана воды емкость . 81
Старческое слабоуміе . . 227
Стафилома 195
Стекловидная сыпь . . . 306
Стетоскопъ 134
Столбнякъ 493
Стопа 341
Стриктура 328
Строма 426
Субъект. призн. болѣзней 133
Судороги 494
Судорожн. дыхан., астма . 172
Судорожное сжатіе вѣкъ 192
Судорожное сжатіе челюстей 315
Сумасшествіе 225
Суппозиторіи, свѣчи . . . 96
Суставы 274, 493
Сухія круп., ихъ пріемы 86
Сухотка спинного мозга 374
Сущность Эл.-Гомеопатіи 11
Сыпи. См. Болѣзни кожи и Сифилисъ.
Сыпныя лихорадки . 263, 299
Сыпной тифъ 313
Сѣдалищнаго нерва невралгія 342
Сѣмя мужское 376
» » истеч. его 378, 379
Съуженіе кишекъ . . . 494
» мочеисп. кан. . 328
» полыхъ орган. 494

Т.

Тазобедренаго сустава воспаленіе 343
Тампонація влагалища . 391
Тампоны 94
Теплыя ванны 93
» » съ жидкост. 107
» » » круп. . . 92
Темная вода 195
Темперам.: желчный . . 125
лимфатич. . . 123
нервный . . . 127
сангвинич. . 124
смѣшанный . 129
теорія ихъ . 120
Температуры тѣла — измѣреніе 135
Термометрія 135
Течь изъ уха 499
Тикъ 314, 315
Тифозная лихорадка . . 307

Digitized by Google

стр.
Тифоидъ 308
Тифъ брюшной 312
» возвратный 313
» голодный . . . . . —
» легочный . . . . . —
» мозговой . . . . . —
» сыпной . . . . . —
Тоны сердца 134, 455
Тошнота 444
Трахома 193
Третій стаканъ (доза) . . . 88
Трипперъ 469
Трихинная болѣзнь . . . 495
Тройничные нервы . . . 333
Тучность 495
Тѣлосложеніе и его виды 111

У.

Угри 267
Ужаленіе змѣею 496
» насѣкомыми . —
Ударъ. См. Апоплексія 171
Удушье. См. Астма.
Укушеніе бѣшен. животными 496
Упадокъ силъ 354
Употребленіе лѣкарствъ . 80, 88, 97, 105, 111
Утомленіе головы 204
Утопленники 496
Ухо и ушн. болѣзни 497, 498
Ушибы. См. Боли и Застой крови.
Ущемленіе кишекъ . . . 253

Ф.

Фаллопіевы трубы . . . 381
Фебрифуго 1-е и 2-е . 68—72
Фиброиды 401
Фимозъ 470
Фистула въ задн. проходѣ 258
» зубная 246
Фистулы 501
Флюсъ 315
Фурункулъ 260

Х.

Характер. лѣкарствъ . 36, 97
Холера азіатская 501
» дѣтская 505
» молніеносная . . 504
Холера спорадическая . 504
» сухая 504
Холерина 505
Холерный тифоидъ . . . 504
Холодный нарывъ 261
Хроническія болѣзни . 132
Хроническое воспаленіе легкихъ 291
Худосочіе 131
Худощавость 511

Ц.

Цвѣтъ лица и его показанія 314
Циррозъ печени 364
Ціанозъ 467
Цынга 451
Цѣны лѣкарствамъ . . . 518

Ч.

Чахотка гортанная . . . 218
» легочная 287
» сифилитическая 479
Челюсти, судорожное ихъ сжатіе 315
Черепной мозгъ 332
Черепно-спинная нервная система 331
Чесотка 266
Четвертый стаканъ (доза) . 83
Чешуйчатый лишай, псоріазъ 265
Чистота 153
Чирей 260

Ш.

Шанкръ мягкій 472
» твердый . . 473, 488
Шарики маточные. 96
Шея кривая 511
Шумъ въ ушахъ 499

Щ.

Щитовидная железа, ея воспаленіе 231

Э.

Экзема 265
Эклямпсія 512

Digitized by Google

стр.
Эл.-Гом. жидкости . . 97—105
Эл.-Гом. жидк. употребленіе ихъ:
внутр. . . . 100—104
наружное . 105—111
Эпидемическія болѣзни . 132
Эндокардитъ 459
Энтералгія 257
Энцефалоидъ. См. Ракъ.
Эпидемія 132, 512
Эпилепсія 513
Эпилептическое помѣшательство 225
Эритема 263
Этіологія 25

Я.

стр.
Ядъ 355
Язва желудка 236
Язва кишекъ 255
Язва круглая 12-ти перстной кишки 236
» сибирская 260
Язвы разныя 269
Языкоглоточные нервы 333
Языкъ и его болѣзни . . 515
Язычекъ 449
Яйцепроводы 381
Яички и ихъ болѣзни 376, 378
Яичники и ихъ болѣзни 381, 405
Ячмень на глазу . . . 196

Вспомогательныя лѣкарства.

Аква перъ ла пелле (Acqua per la Pelle, см. стр. 316); флаконъ 1 р. 50 к.

Бужи съ Эл.-Гом. лѣкарствами (см. стр. 97); 20 штукъ въ коробкѣ 1 р.

Пудра Эл.-Гом. (см. стр. 97) для присыпки; коробка 50 к.

Суппозиторіи (свѣчи) съ Эл.-Гом. лѣкарствами (см. стр. 96); дюжина 1 р.

Шарики маточные съ Эл.-Гом. лѣкарствами (см. стр. 96); дюжина 1 р.

Гигіеническіе препараты для туалета,

приготовленные съ Электро-Гомеопатическими лѣкарствами.

Въ настоящее время когда для туалета употребляется множество разныхъ косметическихъ издѣлій, весьма важно имѣть такія, которыя удовлетворяютъ всѣмъ требованіямъ въ отношеніи гигіены, безвредности и хорошаго дѣйствія на кожу. Большинство препаратовъ для туалета, рекомендуемыхъ публикѣ какъ совершенно безвредные, на дѣлѣ содержатъ вещества, крайне вредныя для кожи и даже для здоровья.

Digitized by Google

Это обстоятельство побудило Лабораторію Центральной Гомеопатической Аптеки, при помощи электро-гомеопатическихъ спецификовъ, составить нижеслѣдующую серію гигіеническихъ издѣлій для туалета. Они отличаются своимъ прекраснымъ дѣйствіемъ на кожу, не содержатъ никакихъ вредныхъ примѣсей и не мѣшаютъ дѣйствію лѣкарствъ:

1) **Антисептикумъ** для дезинфекціи воздуха. Флак. 1 руб.

2) **Бальзамъ миндально-бензоевый**, для умыванія и для ваннъ. Флаконъ 1 р. 50 к.

3) **Зубное полосканіе**, для сохраненія зубовъ. Флак. 1 руб.

4) **Зубныя пастилки** со Скроф. и Канчер. для чистки зубовъ, весьма удобны, особенно въ дорогѣ. Коробка 30 к.

5) **Мыла на ланолинѣ—лучшія для кожи:**

а) *мыло зеленое* съ Канчерозо. Кусокъ 60 коп.

б) *мыло розовое* со Скрофолозо. Кусокъ 60 коп.

6) **Пудра бархатная**. Совершенно безвредная, отлично пристаетъ къ кожѣ, придастъ лицу бархатистость, нѣжность и свѣжесть. Коробка 50 к.

7) **Тоникумъ для рощенія волосъ**. Фл. 1 р. 25 к.

Всѣ эти препараты снабжены пломбой «Центральная Гомеопатическая Аптека» *и описаніемъ ихъ употребленія.*

Главный складъ этой книги (ц. 2 р., въ перепл. 2 р.50 к.) и лѣкарствъ находится въ С.-Петербургской Центральной Гомеопатической Аптекѣ, Гороховая, № 17, входъ съ Мойки.

Книга эта также продается въ лучшихъ Гомеопатическихъ Аптекахъ и книжныхъ магазинахъ Россіи.

Digitized by Google

Digitized by Google







Digitized by Google



На мѣстахъ, означенныхъ цифрами, находятся близко подъ кожей важные нервы или органы. Мѣста эти суть главныя нервныя точки для наружнаго примѣненія Электро-Гомеопатическихъ жидкостей (сравнить въ текстѣ стран. отъ 105 до 111).

1. Дуга надъ верхними бровями (надглазн. нервъ).
2. Дуга надъ нижнимъ краемъ глаза (подглазн. нервъ).
3. Переносица.
4. Локтевой сгибъ и лучевой нервъ (средне-плеч. нервъ).
5. Солнечное сплетеніе.
6. Подложечка или поджелудочная ямка.
7. Вѣнечное нервное сплетеніе желудка (симпат. нервъ).
8. Паховой сгибъ (берцов. нервъ).
9 Ямка подъ ушной раковиной (малый подъязычн. нервъ).
10. Три маленькихъ мышцы за ухомъ.
11. Затылокъ (затылочн. нервъ).
12 и 18. Область у 7-го шейн. позвонка (симпат. нервъ).
13. Большой подъязычный нервъ.
14. Сѣдалищный нервъ (бедреной).
15. Подошва, стопа.
16. Ср. № 9.
17. Ср. № 11.
18. Ср. № 12.
19. Дно (лѣвая часть) желудка.
20. Крестецъ и поясница (нервы, имѣющіе отношеніе къ половымъ органамъ).
21. Почки.
22. Промежность (между обоими проходами).
23. Лобъ.
24. Високъ.
25. Правое и лѣвое подвздошье.
26. Сердце.
27. Легкія.
28. Мочевой пузырь.
29. Яичники.
30. Пупокъ.

Если нужно подѣйствовать на весь организмъ и придать ему больше силы, тогда нужно соотвѣтственную Электро-Гомеопатическую жидкость приложить къ № 5, 6, 7, 11 и 12. Если нужно укрѣпить нервы пяти чувствъ человѣка—къ слѣдующимъ 7 пунктамъ: 1, 2, 3, 9, 11, 12 и 24.

Digitized by Google

Digitized by Google

С. В. Смирновъ.

ЭЛЕКТРО-ГОМЕОПАТІЯ

ГРАФА МАТТЕИ.

ДЕСЯТОЕ ИЗДАНІЕ.

Вновь пересмотрѣнное, исправленное и значительно дополненное по запискамъ, оставшимся послѣ смерти автора, и по лучшимъ иностраннымъ источникамъ.

ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ.

Съ подробнымъ алфавитнымъ указателемъ.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ АПТЕКА
Ворохская, 17.
прежде Ворохская, 15.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типо-Литографія К. Л. Пентковскаго, Большая Подъяческая 22.
1908.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

ЦѢНА 2 РУБ.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ АПТЕКА
Гороховая, 17,
прежде Гороховая, 15.
С-ПЕТЕРБУРГЪ.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

UNIVERSITY OF MICHIGAN
3 9015 06441 0940

Filmed by Preservation 1990

Digitized by Google

1837
ARTES VERITAS SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
E PLURIBUS UNUM
TUEBOR
SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM
CIRCUMSPICE

Digitized by Google

Digitized by Google

50

Digitized by Google

CÆSAR MATTEI

ELECTRO-HOMOEOPATHY

Digitized by Google



Digitized by Google

Digitized by Google



C. MATTEI

Digitized by Google

CÆSAR MATTEI

ELECTRO-HOMŒOPATHY

THE PRINCIPLES

17204

OF

NEW SCIENCE

DISCOVERED

BY COUNT CÆSAR MATTEI, OF BOLOGNA

SECOND ENGLISH EDITION
BY THE INVENTOR

BOLOGNA
PRINTING OFFICE MAREGGIANI

1880

Digitized by Google

Bologna (Italy) June 1880

The formalities required by Laws and international Treaties, regarding the rights of literary property, having been performed, every translation or abridgment of the work, if not authorised by the author, is forbidden: in consequence, it will be henceforward proceeded against the guilty both home and abroad.

COUNT CÆSAR MATTEI

Digitized by Google

NOTICE

Rec'd. T.C. 12-8-39. HRT.

The misunderstanding which existed between the Count Mattei and M.r Garnier, the editor of this book, having disappeared, since the visit of M.r Garnier to the Count at the *Rocchetta:* and M.r Garnier having agreed on his side, to the sentence of the *Tribunal de Commerce* of Nice, the present edition corrected and authenticated with the seal of the Count Mattei, is now on sale.

It contains the *List of Depositaries*, officially recognised by the Count Mattei, but as this list is subject to variations and amplifications, we advise our readers to refer themselves to the *Bulletin officiel de l' Electro-Homœopathie*, which is published in french at Bologna, under the high patronage and the supervision of the Count Mattei.

This Bulletin, bi-monthly, which will shortly be published in english, is intended to enlighten

Digitized by Google

the public in the unjustifiable acts of the contrefactors which, in England, falsify the medicine and publications of the Count in a shameless manner.

Thank to this publication, which was indispensable, these unworthy acts will become impossible in future, and the **New Science** will take, in England, the place and the importance which its undeniable value conquered for it in the world.

Besides, the Count Mattei is decided to pursue before the law, with the greatest rigour, all the contrefactors, and he has done all that is necessary to secure to his medicine and to his books the protection which the law and the international Treaties afford to industrial and litterary property.

He sues, actually to this effect, M.r Sauter of Geneva, the most shameless contrefactor of his medicines, and the solution of this process will certainly put a stop to the production in Switzerland of that large quantity of false medicine and false books, which are sent from there all over the world.

Digitized by Google

Commencing with the first of February (1880) Bologna will not recognise as authentic, any books on Electro-Homœopathy whether in Italian, French, German, Polish, Spanish, English or Dutch, which have not this following steel stamp.

DEPOSITS RECOGNISED AND AUTHORIZED

CENTRAL DEPOSIT OF THE REMEDIES MATTEI

AT BOLOGNA (Italy)

Via Mazzini 46, Mattei palace

Rome — Apothecary à la Scala — The Commendor J. Ph. Ghirelli — *Via dei Zingari N. 10.*

Naples — Guida Fr. — *Via Pignasecca N. 25.*

Turin — Graglia Widow. — *Via Barbaroux N. 3.*

Florence — Roda — *Via del Giglio N. 9.*

Padua — Doctor Cogo.

Digitized by Google

Geneva — John Delapraz, the Depositary and sole Representative for the whole Switzerland — *Rue de Théâtre 12.*

Warsaw — Mrs. de Byszewska, *Faubourg de Cracovie N. 7.* — The Military Hospital — Dr. Spirine — Frankiego *Apothecary.*

Cracow — Ladislaw Markiewicz.

Tiflis — Orlay de Karva.

Alfan *(Province of Longrono: Spain)* — Exc. D. Teodoro Ramirez Senator.

Obernai *(Alsatia)* - Joseph Kober — *Apothecary.*

Odessa — A. I. Pokorny - *Apothecary and Grocer* - Depositary for the New Russia — *Rue Catherine.*

Porretta — Miss J. Mistrali Baroness.

Delft *(Holland)* — Deposit under the patronage of Mrs. *Bichon van Usselmonde.*

East India — Muller.

London — *St. Mary's Cottage — St. Anna's Road — Stamford Hill* — Mr. C. Lecompte *General Depositary for England and English Colonies.*

Digitized by Google

Nice — Vigon — *Apothecary - General Deposit-*

ary for France, authorized by the Finance Minister to bring in the remedies of Count Mattei.

Chambery — At the Hospital.

Pau — Bassi — De Brauneker Baroness — Lefas *ex Sub-Prefect.*

Aranda del Duero. La Vid. *(Spain)* — R. P. Joaquin Garcia.

Japan *(Yokohama)* — The Count Barbolani.

Ratisbon — Consortium under the patronage of the Baroness d' Aufsess.

Moscow — Mrs. Catharine Guebaouer — *Rue des Gazettes* — Prince Chahofskoi 's house.

San Felix de Guixols *(Spain)* — Mr. Pedro Estrada.

Cairo — Mrs. Emily Morpurgo-Bey and Miss. J. Mistrali Baroness — General Deposit for Egypt.

Marseilles — Pougheol. — *Rue de la Darse 1.*

Digitized by Google

Digitized by Google

PRACTICE OF THE ELECTRO-HOMŒOPATHY

Count CÆSAR MATTEI has recognised to the persons whose names follow, the capacity of curing by means of the Electro-Homœopathy.

Bologna — Doctor Clement Conti.

Rome — Doctor H. Eld. — The Commendor J. Ph. Ghirelli — *Via dei Zingari 10.*

London — Prof. Leopold Edward Surville, *47 Jeffrey's Road.*

Nice — Doctor Schmeltz of the Faculties of Paris and Germany.

Naples — Fr. Guida.

Geneva — John Delapraz.

Porretta — Doctor R. Magnanelli.

Florence — Luce Roda.

Cairo — Mrs. Morpurgo — Bey.

Paris — Doctor Chapuzot.

Marseilles — Pougheol.

Varsaw — Mrs. De Byszewska — Doctor Spirine.

Chambery — The Abbé Chenal.

Digitized by Google

Buenos Ayres — Mary de Soler.

Verrières — Sophia Schmid.

Moscow — Doctor Socologorsky — *Boulevard Zoubovo — His own house.*

Turin — Mrs. Graglia Widow — *Via Barbaroux 3.*

Bodzechow *(Russian Poland)* — Vladimir de Crzanowki — *Physician.*

Saint Etienne — Vital Michaud — *Rue du Jeu de l'Arc 3.*

As the Deposits recognised receive the authentic remedies directly from Bologna in lump, they have the faculty to sell by retail in the measure and form which they think better, and they are enabled to mark the pipes and phials with their own names.

Digitized by Google

The variations and additions that take place continually in the table of Deposits recognised and authorized, are set down in the *Bulletin* of Electro-Homoeopathy, which is published in Bologna twice a month. To be a subscriber, send to the Director of the aforesaid *Bulletin* 25 franks - Via Del Cane N.° 9 - Bologna (Italy).

Count CÆSAR MATTEI

Digitized by Google

Digitized by Google

CAUTION

New methods have been brought into play by the League, which still hopes to arrest the progress of Electro-homœopathy. My works have been travestied; pretended new remedies, invented and perfected in Germany, are circulated, under the same names as mine, remedies to which I am a perfect stranger; the instructions are falsified; very low dilutions are vaunted, which I regard as useless and ineffective: the remedies are sold excessively dear, at the same time throwing the odium of this traffic on me; in short, supreme efforts are made to confuse the real remedies with the spurious, so as to destroy the confidence of honest people, in every possible way. This is why I deem it necessary to declare: 1st. That new measures have been adopted to guarantee, by means of a security, the authenticity of the remedies in the

Digitized by Google

depositories; 2ndly. I reject all books, pamphlets, publications of every sort, which do not follow the doctrine and practice, as laid down in my works and in the authorized editions and translations of the same; 3rd. The general dispensary at Bologna will, henceforth, send the remedies, either wholesale or retail, to any person ordering the same, at the prices further mentioned; 4th. With the exception of the authorized depositories, the remedies are strictly, cash, at Bologna, and are forwarded at the risk of the buyer; 5th. All orders should be addressed to Mr. Peter Mirandola, 46, Via Mazzini, Bologna. 6th. To my recognized agents, the remedies are delivered either wholesale or retail; to unknown or doubtful individuals they are only sold in tubes or bottles sealed and stamped at Bologna.

COUNT CAESAR MATTEI

Dalla Rocchetta, June 1880.

Digitized by Google

ELECTRO-HOMŒOPATHY

INTRODUCTION

GENERAL IDEA OF THE NEW SCIENCE, ITS IMPORTANCE, PROGRESS, STRUGGLES AND FUTURE OF THE NEW DISCOVERY

Trahitur autem sapientia de occultis.

JOB.

During twenty years I have worked to spread my discovery; I have reason to believe that at my death it will be known to the whole world.

I have the pleasure to acquaint all honest persons, interested in my existence, that my death, so often reported in many large cities, is not a fact.

Neither am I a myth, and those persons who lately asserted this at St-Petersburg forget that mythology and the telegraph are incompatible.

I am a *reality* although only an ordinary mortal belonging to this 19th century, the past seventy years.

Digitized by Google

My native place is Bologna; formerly I only quitted it to travel, I was there in the times of universal enthusiasm in 1847, I filled there several public offices, I have been occupied in state affairs, and have been honoured with a warrant of deputy in the Roman Parliament.

When I understood that I might be in the way of men of different political views, having myself only one faith and one word, and not having attached myself to any party, I resigned of my own accord a position of some importance and retired into private life.

From the obscurity of my retreat I followed political events, without forgetting the respect due to men, to the law, and above all to morality.

Up to this period I had never dreamt of practising medicine; this however was the mission reserved for the remaining years of my life. I have commenced late; nevertheless the result which I saw during twenty years justifies me in thinking that I have achieved a revolution in medicine. I bequeath to the world not a system of medicine, but the medicine which after twenty five centuries was yet to be sought for. For a long period I had well known the emptiness of all the systems which every century and nearly every school had engrafted on the old trunk of the decayed tree of medical science.

My native country has always produced illustrious men especially in the medical sciences.

Without being myself a doctor, I could easily understand that the medicine of the schools is powerless to cure the least malady although making a parade of a great deal of science. I was acquainted with the celebrities of the Faculty of Bologna, doctors before whom the world bows, and myself

Digitized by Google

also; for who does not appreciate these studies, this knowledge, and above all this tact which knows to grasp in an instant the pathological condition of an organ, and which sees the slightest alteration concealed in an intestine? I saw doctors tell the patient: You have a lesion at two thirds of the third lobe, not a line higher nor lower, — You have the lung attacked, the disease is under the tip of my finger, etc., etc.

These doctors were never deceived; after death the post-mortem examination showed the correctness of their statements. This was mathematical, but the patients died also mathematically.

The general opinion is, that it is the essential point of the practice of medicine to recognise exactly the disease; it is generally thought that the great number of patients who die under the hands of doctors, number that Stahal has estimated at seven in ten, have reason to complain only of ignorance or mistake. Here it was not a question of mistake, science was not in fault; in point of exactness, the diagnosis could not be more sure nor more precise; that which was wanting, that which did not preoccupy our doctors, was the cure; science having pronounced these *maladies incurable*, all was said.

Now I said to myself: what is the practice of medicine if it does not cure? I understand that there are complaints that one cannot conjure away; I understand that every disease, arrived at a certain stage, only finishes with the grave which awaits all mortals.

But so many patients, banished by science as incurables and sent to be cured beyond the grave, seemed to me too numerous; I even regretted so much knowledge, so much genius expended to obtain such a feeble result.

Digitized by Google

Now what are the diseases cured by medical science? In following closely the results of the practice I found only too exact the statement I had read in Broussais, namely, that: *The science of medicine is the art of soothing the sick with vain hopes;* I succeeded in convincing myself that the greatest physician could not even cure a chilblain; he could only anoint or cauterise the sore, but he did not destroy the germ of this disease which is in the blood, and is the same that, in a more advanced stage, gives rise to cancerous complaints.

The inability of the allopathic treatment, I like to repeat it, does not depend in general on want of knowledge; as far as concerns pathology, physiology, and anatomy, the human frame has been the subject of so many researches that there remains very little to examine; the dissecting knife and the microscope have allowed research to be pushed to the rudimentary cellule, I may say to the atomes of the cellule; by this powerful means of observation science is enabled to grasp the arrangements of the organs, their roles, their intimate functions, and to follow the phenomena of life to its last limit where commences the *quid divinum* of Hippocrates, the mystery of life.

But all this, proclaims the Professor Peter, whose beautiful maximes I like to recall, is not the practice of medicine. The doctor, says he, is not a simple practitioner. He ought also to be a man of science; but the science of the doctor is not simply chemistry, physics, and mecanics which are to him merely auxiliaries. The science of medicine is above chemistry and physics; it is the art of curing, I am going to put forth a paradoxe: *It is necessary that the doctor should not only think of seeing patients but that he should think of cur-*

ing them. — Scepticism in therapeutics is a misdeed, because the sceptical practitioner does not act when he ought, or acts at hazard and without conviction. — The practice of medicine cannot be but medical science; this is what is said, this is what is repeated without ceasing, but which has never been a fact. Because in the mind of creators of systems, especially those so much brought forward in our days, medicine still remains medico-chemistry, medico-physics, or medico-mechanics. — Actual therapeutics are confined to topical treatments, stopping short at the morbid symptoms which they keep off only by *palliatives* and being thus rendered powerless to prevent a relapse or a return of the disease — on the contrary, it is necessary to act on the organism in such a manner as to put it in a state to bring back, if possible, the affected parts to their normal condition. — This is why scepticism, I say, is a crime from the moment that it turns aside medicine from its aim, from its mission, which is, not to display a quantity of science, but to cure the greatest possible number of patients. — In the greater part of the treatises on medicine which come to us from Germany, there is a great luxury of anatomical and pathological details, but when you turn to the therapeutics, they are cut short and despatched in a few pages. Thus according to the celebrated professor of internal pathology, that which is calle d medicalscience is chemistry, physics, anatomy, in a word natural history, rather than medicine; the accessory hides the principal. This scientific cloak has only served, for the greater part of the time, to turn medicine from its real aim, that is to cure the sick, prevent the returns and relapses instead of stopping at local applications and palliatives.

Digitized by Google

Finally, science is given to us in the place of medicine.

Here are truths known to all the world, avowed by sincere practitioners, who nevertheless act as sceptics and believe their task finished when they have said: *Your complaint is there: such an organ is attacked at this point*, « These persons seem to forget that the patient requires a doctor to cure him; on the contrary they are paid to tell him: Science is not occupied in curing you, it has, in its infallibility, pronounced you incurable.

Twenty years ago these reflexions tormented my mind. Boerhaave said: « If one weighs attentively the good which a handful of true sons of Esculapius has procured for men, and the evil that the immense quantity of doctors, from the origin of the science even to this day, has caused to the human race, one will think without doubt, that it would have been more advantageous if there never had been any doctors in the world. »

Stahal would have wished « that a bold hand undertook to cleanse this stable of Augias: .... this science filled with errors, in which the language is as defective as the thought, wherein every thing is to re-cast, both the principles and the matter. » Modern authorities are neither less numerous nor less unanimous in deploring the state of medicine, in denouncing the anarchy and the confusion that prevails « Complete absence of scientific doctrines in medicine; absence of principles in the application of the art; empiricism everywhere: this is the state of medicine. » (Malgaigne).

After this, how does it happen that the Faculties of our old Europe still crown doctors? How does it happen that the legislation of the most civilized countries surrounds with guaranties a profession,

the chief masters of which would see it swept out of the world by a bold hand? For what reason these privileged bodies which have nothing less than the *right* to kill without responsability before the law, are they the first to tell you, that « each name of a class of remedies, each formula even is an error? » (Rostan); that « the practice of medicine is not in some respects that of a reasonable man? » that, « of all the sciences, materia medica is the one which best depicts the aberrations of the human mind? » Let us at least save these millions charged to the Budget of the state for professorships, laboratories, collections, etc., which have the name of medicine without the reality. For a long while reform was begged for, but here no reform could be made until the true medicine, capable of curing, the same as mentioned by the celebrated professor Peter, had been discovered. The erroneous system of Ptolemy would still prevail in astronomy if Copernicus and Kepler had not explained the movements of the stars by the true laws of nature: to depose *the medicine of palliatives* it is necessary to have found *the medicine which cures.* This Hahnemann had already understood.

I have read or heard that this illustrious physician abandoned the usual practice of medecine, leaving a large and lucrative connection, because he had no faith in his science, after that he consecrated his entire life to the research of means capable of curing, the complete absence of which had inspired him with disgust and aversion to allopathy.

Hahnemann divesting himself of the medical science drawn from schools followed experiments only; experiences alone made him discover « *the law of similars* which has given the name to his doctrine.

Digitized by Google

I did not ignore the attacks of the academies against the new doctine which relied, at least, upon the guide-principle, and was, after all, but the general expression of constant facts always identic. Nor was I stranger to the traditional custom of the academicians, always immobile, always looking back to the past, and, on another account, the objections that the academical science raises against homœopathy, seem to me vain and ridicule. And, at first, as to what regards the homœopathic principle, the allopaths, who vaccinate since two centuries, ordering the *ipecacuanha* against vomitings, which produce a second artificial irritation on the parts already exasperated by natural pain etc. etc. have not a sure ground, and fall into contradiction, when they pretend to reject the law of similitude. Would one have more right to rally the infinitesimal homœopathic doses, when they are matter of facts, and rigorous experiments have brought them about?

Besides this, in the first trial of inoculation, the learned doctors of Oxford found, that a minute pellicule of the postule introduced into the nostrils of the patient produced effects too dangerous.

Thus homœopathy would have been discovered and ought to have been already given out since two centuries, had the doctors followed the connexion of facts, and the habitude to argue as skilful people do; but they are too much accustomed to proceed without any direction, going about their sillogistic circle.

The question of doses is a question of *quantity, necessary and sufficient* to produce a definite effect, which experiment only can determine. The medical science officially acknowledged, maintains, that effective cares can be obtained only by massive doses. Then the medecine knows, or admits only the effects

of weight; knows nothing or holds for naught what concerns the molecular actions.

Physic and chemistry, everywere, point out this double kind of phenomena. It is known that the atomic forces come into play when matter is disengaged from its massive aggregations, in which this force exists in a latent state.

Could one, on the other hand, disavow the power of these almost infinitesimal doses, and the influence of the unponderable qualities on the living organism, when a miasm is seen, to develop the most dreadful maladies, to kill the population of a town, of a country? What is a miasm? Something of which enormous effects are seen, and the mass is so small, that no instruments or reactives are sensible enough to prove its presence.

The academical science admits the influence of unseizable crepuscules, and knows the trasmission of hereditary maladies, and of other facts which it is forced to ascribe to the indefinitely attenuated matter. Materialist as it is, it will not attribute the cause of maladies to the influence of spirits, which would beset the bodies. Science, therefore, is not coherent, in rejecting a *Priori*, real effects, very positive, for the sole reason, that they must be attributed to the minute doses of the homœopathic method.

This method, after all, seems to me more simple, surer and more rational that this chaos of complicated, arbitrary, and contradictory systems, among which Allopathy is floating since two thous and years.

Hahemann has the merit to have been the first who has tried to bring medecine to its own end, which is to establish by experience the relations either of quantity, or quality between the malady

Digitized by Google

and the remedy fit to cure it... *This* study has been almost forgotten since long, by *official* medecine, which, renouncing to cure, seems to be careful only to determine the diseases and make elaborate nosographies; such a science has never found the means to banish maladies, and has no hope to find it; by its scepticism it does not seek them after, and likes to state incurable the maladies, rather than to avow itself powerless and without any resources.

This fearful train of incurable evils did not appear to me reconcilable with the idea of a providential order here below, nor worthy of the infinite wisdom, which has created the tree of good at the side of the tree of evil, and which in a word, has placed everything in the world that is necessary to save it, let it be either morally or physically.

The brute after his instinct goes to browse on the herb that cures him; man has more than instinct; intelligence is the guide which should suffice to sustain his existence.

I thought then of the first physicians who only employed herbs. The medicine of Hippocrates which, after so much progress and so many discoveries, is justly regretted in our day, was almost ignorant of this confused mass of materials which compose our collections decorated with the name of pharmacopœia. It is from the vegetable that the nourishment comes to the animals, it is by the vegetable that the world of animated beings is united to the inorganic creation. It is there also, I said to myself, that God has placed medicine.

With such reflexions I gave myself up to the research of *something* which could cure; I thought to myself that this something, still unknown, is not far from us; these active and powerful principles,

Digitized by Google

proper for our cure, should be found prepared and ready made in the vegetable species.

I did not deceive myself. It soon happened to me to put my hands upon plants, the active principles of which, when extracted, produced cures. When I saw these effects repeated, always the same and never contradicted, I said there is the medicine. The patients on which I made my first trials belonged to the scrofulous type, that is to say alterations in the lymphatic system; this is why I called my first remedy by the word *antiscrofoloso.*

After that I carried my attention to the form and species of disease which this first remedy was fit to cure; soon the constancy of the effects and the habit of observation allowed me to insure the result in advance. I could no longer hesitate as the effects were certain in all varieties of scrofulous disease. These effects were wonderfully quick in the simple cases; the far advanced complaints diminished at first and then disappeared after a more or less long time of treatment, and the conquered diseases did not reappear.

Now what could be this plant? Could it be the universal panacea? In my inexperience, at first, I thought so. I was one moment on the point of admitting the theory of cancroides which during a time has been considered as the cause of all diseases.

Time and experience showed me that the antiscrofoloso did not always produce, nor in all cases, the same good effects; the patients of sanguine temperament, plethoric, suffering from palpitations, hemorrhage, sanguine congestions, etc., were not cured under the influence of *antiscrofoloso;* this made me think that the blood is affected by more than one principle and consequentely could not be cured by a single remedy.

Digitized by Google

But a second remedy which I, at first, thought to be also an antiscrofulous, gave me excellent results in all disorders of the blood properly so called, and in all disorders of the system of circulation. For example an ophthalmia incurable by the first antiscrofulous yielded easily to the remedy which I believed to be a second one; this also made a wonderful cure of varicose veins. I saw the blood vessels, when enfeebled and wasted, rapidly reconstituted by this second antiscrofulous, while the first produced no effect on them. I concluded from this that instead of being an antiscrofulous, my second remedy was an *antiangioitico*, and that if the first cured lymphatic diseases, the second removed all the alterations due to a viciation of the blood.

As I have been able to subdue thousands of lymphatic diseases of every possible form with the antiscrofulous: as I have cured an infinite multitude of disorders of the blood vessels with the antiangioitico: it became for me an axiom (an axiom founded on facts always identical and observed daily during many years) that the antiscrofulous is the *sure* remedy for the lymph, as the antiangioitico is the *sure* remedy for the blood, and that *the causes of all our maladies are reduecd to two only*.

But the human organization presents differences every where; the « *receptivity* » of individuals varies infinitely according to age, constitution, sex, habits and the influence of the surroundings. Hence the different forms and the complications of diseases, although all connected with the same two causes: alteration of the lymph and alteration of the blood.

Finally I have seen cases in which neither of the first two remedies effected a cure, whereas the employment of the two alternately carried off the victory. I conclude that the viciation of the lymph

Digitized by Google

brings on that of the blood and *vice versa*, and that there are mixed diseases requiring the simultaneous employment of the antiscrofoloso and the antiangioitico.

Henceforth I found myself in possession of fundamental facts; it was only necessary to extend researches in following the principle that every disease has its origin either in the viciation of the blood or of the lymph, or in a combination of the two. The same inspiration which leads one to discover the *antiscrofoloso* and the *antiangioitico* puts one upon the traces of other remedies to diseases already developed, provided, let it be understood, that they had not already destroyed the patient person, in which case it would no longer be a remedy that was required, but a miracle.

This is how the new materia medica has been formed, which I at first demonstrated by innumerable cures, and then announced to the whole world in pamphlets. Important publications have been put forth both in Italy and other countries, by physicians and honorable men won over to the new science, which possesses already a history, a bybliography in nearly all the European languages, a bibliography which I have completed as regards the number of the remedies and especially the different modes of their application, so that every man may be his own physician, by the Italian edition of *Elettromiopatia, scienza nuova, che cura il sangue e sana l' organismo. — Casale-Monferrato, Paolo Bertero, tipografo editore, 1878.*

To cure diseases hitherto regarded as incurable, this is indeed a revolution in medicine. The cures are thoroughly radical, as the complaints do not reappear. Under the influence of these specifics the organism is purified and visibly regenerated; in pro-

Digitized by Google

portion as the remedies penetrate, the general nutrition assumes a regular progress, the cachexie disappears, a fresh complexion is visible, the tissues acquire solidity and volume, and the wasted parts are themselves rebuilt up.

In the presence of such remarkable facts, constantly observed everywhere and under very various conditions, I think it is permitted to lay down the principles of the *new science*. But, note well, I have not discovered a new system of medicine, but the medicine itself. All the systems have taken a false course. Why? Because they have searched for remedies after an order of preconceived ideas, and to conform to a theory established beforehand, instead of commencing by experimenting on the materia medica and making the theory afterwards. This is what I have done and which I wish to be remarked.

When I saw a vegetable substance curing *herpes*, I said: here is an *antiherpetique;* when I saw the same remedy curing the *gout*, *caries*, *coxalgia*, *etc.*, I pronounced it *an antiscrofulous remedy*. When under its action, I have seen cured at the same time, and in the same patient, *herpes*, *gout*, and *diseased eye*, I said: *it is a remedy that acts on the mass of the blood*. When I have seen the piercing pains of cancer cease, the tumour itself lessen, become detached, and disappear; when I have seen with surprise the disorganized parts reorganized, I said: *these remedies act on the entire organization*. Finally when I have seen certain morbid affections disappear by simply touching them with certain liquids, and these liquids produce the effect of ordinary electricity, even the shock, perfectly astonished myself, I cried out: *this is electricity*.

I have seen all that I relate and have seen it

Digitized by Google

now during twenty years, and it is a sure fact that the diseases cured have never reappeared. These remedies, I said to myself, reach the evil in its very source and cure radically; IT IS THE END OF PALLIATIVES.

My discovery must not be placed side by side with the systems of medicine. If I lay down principles it is only to interpret facts; these nevertheless would equally exist, even if the interpretation is wrong; the remedies would lose nothing of their power, there would be nothing to change in the practice if it is found that I am deceived in my theory. The reader has already been able to grasp the theoretical principles of the *new science*, but I will resume them here.

1. The human organization is entirely composed of two elementary liquids, the *lymph and the blood.*

2. On the state of these two liquids health and disease depend.

2. Every disease originates in a change either of the blood or of the lymph or of both at the same time.

4. Diseases which have the same remedy have a common origin, that is to say, they originate in a viciation of the same principle, the lymph or the blood.

Hence it follows that all diseases curable by the antiscrofulous originate in a change in the lymph, as those which are subdued by the antiangioitico proceed from the alteration of the blood; finally maladies calling for the employment of these two remedies properly managed, prove both parts of the organization affected.

5. It follows again from all that has been said that the form or localization of the disease is not sufficient for the selection of the specific remedies,

Digitized by Google

it only serves to distinguish between lymphatic, angioitic, or mixed affections.

For example every skin disease can appear under a variety of different forms; yet the proper remedy would be found by ascertaining if the subject is lymphatic or sanguine.

Hence a diagnosis extremely easy; if the pulse, the carotid arteries, the heart and the other symptoms indicate no defective state of the circulation of the blood, it is the lymph which is the only cause of disease.

At the Hospital o St Theresa at Rome where, in two months, thousands of patient entered and were cured, I myself was able with some subordinate aid to make the diagnosis. Yet I was very seldom deceived, as men of every class can testify, beginning with ambassadors down to simple workmen.

There, in the presence of the public, were accomplished amongst others, instantaneous cures, almost miraculous, and of which a German Medical celebrity, Doctor Lutzé, published a memoir at Leipsic. And as the details which I have since published were then unknown, it was an astonishment, a stupefaction, an inexplicable mystery, yet it was the most simple thing in the world. It was a question of some herbs, of which some possessed the property of curing the lymph and others the blood, herbs which it had pleased God to put in my way when I was already advanced in years and had never made medicine my calling.

If now two remedies, two only, destroy the principles of disease, and if all diseases have only two origins, that is the lymph and the blood: which is the man, let him be ever so foolish, that cannot cure himself? Who cannot distinguish a skin disease

Digitized by Google

from an inordinate palpitation of the heart? Who will confound a varicose vein with tetter? Supposing one cannot distinguish that which every one can discern, and the wrong remedy is used, no inconvenience can result, save only that the cure contained in the true remedy is wanting. This will be a sufficient warning and one will be free to take the other specific. It cannot be too often repeated; all our diseases have their foundation in the lymph or the blood, in the white vessels or the red. All medicine is in this.

I say it is all in this, because no man in his senses would let a cancer develop itself, when he can so easily destroy the principle by curing the gland. No person would let himself be confined to bed by the gout, sciatica, or head ache, when with one of two remedies he can so easily eradicate the first symptoms.

Who would let himself be killed by cholera, when a few grains of antiscrofulous are sufficient to sweep out the germ as if by enchantment?

Principiis obsta, sero medicina paratur,
Quum mala per longas invaluere moras.

This all the world knows and understands. It is with such a simple theory and with such elementary remedies that every man can cure himself, and this medicine is certainly the medicine of the future.

I say that the principles so simple, which serve as the base of the new medicine, spring directly from experiment. The data of science come to their support; we shall see it.

Every one knows that in the human body there are two sets of vessels charged to carry and distribute to all parts of the organism the nutritive

Digitized by Google

fluids. The net-work of lymphatic vessels draws the whitish liquid called lymph towards the centre of circulation: in the red vessels, arteries and veins, circulate the blood properly so called and which can be considered as elaborated and oxydised lymph. The discovery of the white vessels followed shortly after that of the circulation of the blood demonstrated by Harvey at the commencement of the 17 th century (1628).

It is equally demonstrated that in a space of time varying according to individualities, all the integral parts of the tissues are more or less completely renewed. In fact the weight of a man after he has attained his complete developement, remains stationary and does not change until the age when the decline of life commences. Yet however the body absorbs, during this period, every day a certain quantity of food, which by the process of nutrition is assimilated and added to the whole of the organs. The invariability of the wheight shews clearly that a quantity of matter, exactly equal to the weight of the elements drawn from the food, goes out or is eliminated from the body: the ingested material replacing the eliminated in equal quantities.

The fluid elaborated from the food, taken up by the chyle vessels, drawn by the lymphatic ducts mixes with the red blood, falls into the heart: from thence forced into the lungs, it becomes itself by oxydation red blood.

This blood, so to say, origin, spreads itself throughout the organism, leaving everywhere new elements in its passage, whilst the excess of oxygen contained in the blood burns up the old and worn out particles and converts them into products of elimination. These products represented by water, carbonic acid, urea, etc., leave the frame by diffe-

Digitized by Google

rent issues, such as the skin, the respiratory organs, the kidneys etc.

Thus the human frame is incessantly renewed by this admirable process of successive decomposition and recomposition, at the expense of the elements of the blood; this is the first condition of our existence, of our life. In like manner, it is the relation either of quantity or quality existing between the materials exchanged which constitutes the actual state of the frame, that is to say, health or disease. In purely chemical substitutions it is only the relation of weights which is considered. In the progress of biological phenomena there prevails an equivalence of a higher order, little known as yet, but which may be called *organico-vital equivalence.*

The normal state of health is the result of a certain number of forces distributed through all the organs of the frame according to a given law. From the brain to the finger's toes all has a part to fill for the support of life; every where is work, and therefore consumption of force, or transformation of matter. This is why the same matter cannot suffice indefinitely to support life; matter which has been a certain time in the tissues, must be renewed; this matter has worked; work under whatsoever form it may be, is the result of its transformations; it is no longer capable of recommencing, and travels already in the cycle of super-oxydation which tends to bring it back to the inorganic world. It is the steam which is escaping from the cylinder after having raised the piston, and which is necessary to replace by an equal quantity drawn from the source in order to recommence and continue the same work.

The normal continuation of the vital work is perfect health, which is itself the result of the ba-

Digitized by Google

lance between the force wasted and the force renewed. Hence the elimination of exhausted matter represents the waste, whereas the assimilation of food is the restitution. Perfect health is thus found subordinate to the organico-vital equivalence of which we have spoken; that is to say, it is necessary that the atoms, which pass from the food by assimilation into the tissues, there deposit as much energy as the frame has lost in the work of elimination, by which living particles fall back into the inorganic world.

The state of perfect equilibrium in the organization, such as we have described, can only be purely ideal or could only have existed in man at the time of his creation. But it is necessary to remark that slight derangements in the accessory parts of a machine do not sensibly derange the whole movement. There are in our body the essential organs of life and there are those that may be called accessory; life is threatened when the first are deranged; it is only troubled and more or less painful when the second are attacked.

We have borrowed these details from modern science to render more easily understood that *life and health are in the blood and the lymph: that disease is in the alteration of the blood or the lymph, or of both together;* that there are only two general and primitive causes of disease, and therefore two general series of remedies, those which act on the lymph, which I call antiscrofulous, and those which purify the blood, which I name antiangioitic. By means of these remedies the constituant elements of all parts of the body are brought back to their normal condition; these elements by the work of their gradual substitution in all portions of the frame cause the expulsion of disease germs

Digitized by Google

wherever they may be found. Hence it results that in purifying the blood, the action extends through the entire frame, thus destroying complaints. Hence again the reconstruction of wasted and partially destroyed tissues is no longer an impossibility. We have done it. This is the theory that I induced from the experiments; these are the principles by which I endeavour to account for certain facts produced by the new remedies.

Scientific men may not only be contrary to my opinion, but may combat, reject and even ridicule my theoretical ideas, but they will be wrong in obstinately rejecting facts which remain incontestable. *(See appendix at the end of this work).*

After the preceeding declaration, every man is at liberty to take hold either of the differences or the points of contact between the new science and homœopathy, properly so called, as founded by the illustrious Hahnemann. The one and the other rest on the law of similars, and in this respect my discovery is but the continuation and the crowning point of the medical science constituted by Hahnemann. But with regard to the nature of the medicines, as well as the method of trying the power and mode of action on the organization, as well as to certain theoretical points of view, there are between the two doctrines differences of such importance that it is necessary to indicate them.

In the first place, Hahnemann stops at the morbid symptoms; he confines himself to combat the visible manifestations of the disease with his remedies, without tracing it back to its source, and which consequently sooner or later is bound to reappear. We are speaking here, let it be understood, of serious deseases which invade the fraem and threaten the source of life. By the homœo-

Digitized by Google

pathic method these diseases cannot be radically cured; in this respect the homœopathic remedies, although more appropriate and applied more rationally, do not essentially differ from those of the old school, in fact do not go beyond the rank of *palliatives*. What is wanting in the hahnemannian practice and which is its necessary completion, is exactly my discovery; *The power which increases the action of medicines so much as to restore to the frame its lost vitality, repair its waste and deliver it from the morbid causes which give rise to different diseases.* Add again to this the multitude of symptoms on which it is necessary to fix, according to the homœopathic system; the variability of these, according to the differences proper to each organization, creates uncertainty, renders the diagnosis difficult and the choice of the remedy embarrassing.

It is sufficient to open an homœopathic guide book to be convinced of this serious difficulty. At the side of each remedy are pathological tables mentioning a number of symptoms common to many of them: then it is necessary to distinguish and classify tbese symptoms in different orders and take into question their relative importance to grasp finally this or those which decide the choice. This is the cause that the practice of homœopathy is not so popular as is generally supposed.

All this is unnecessary for the application of the new materia medica; it is sufficient simply to decide between the lymphatic affections and the sanguine affections. It is rare that the subjects themselves do not show sufficient signs to distinguish one from the other. As for the remedies, the choice is generally easy. It is fixed so as not to be mistaken in all special diseases requiring special

remedies, such as febrifuges, expectorants, antisyphilitics etc. in general the choice is between the antiscrofulous and the antiangioitics.

Simplicity is in everything the mark of truth, for the new science its simplicity is also its stamp and its demonstration, because every man can test the truth and the reality of its effects. This is what causes me to say, that the science I establish makes a revolution, and that it is certainly the medicine of the future. Its effects are prompt, frequently instantaneous; a few globules of *antiscrofoloso* given dry on the tongue stop a fainting fit, or a threatening of apoplexie. I have seen spasms of the womb relieved with the first spoonful of the solution of *anticanceroso*, a suspended labour re-established; the state of intoxication disappears in a few minutes by giving the globules of *antiscrofoloso*, — I have seen thousands of times acute throbbing pains, tetanic convulsions disappear by touching with my liquids, which in certain cases have produced a shock similar to that caused by a Leyden Jar, or the action of an interrupted current.

It is from these phenomena, which seem to me remarkable, that I have given the name of ELECTRO HOMŒOPATHY to the medicine which Providence has made known to me. I wish to express by this word that these remedies, a class of *electroides*, conforming to the law of similars, possess a power and promptness which allows them to be compared to electricity. It is from these new phenomena and especially from the changes that follow in the organism to bring about a state of health, that I say that my discovery is come to complete that which was wanting in the materia medica of Hahnemann.

Digitized by Google

Again a few words about another sort of difference between homœopathy and electro-homœopathy. Hahnemann tried the effects of his remedies on the healthy man; afterwards, from these observations he founded what the homœopaths call the pathogenesis of a medicine; this made known the sphere of action on the invalid. This rather indirect process leads to objections. Is it well ascertained that the effects of an agent remain identical whether applied to the healthy subject or the invalid?

This is not evident for all the world. On the other hand the pathogenetic tables are composed of symptoms verified and observed in *many individuals*, for it will not be believed that this pathological train, which is found by the side of a remedy in an homœopathic manuel, was met with in a single individual, even if he should be a new Job. Can it not be believed that the same remedy absorbed by two different organisms will not always produce identical effects? This appears to be plainly induced from my experiments; after this it seems difficult to guide oneself in these symptomatological tables and, above all, to specify what effect a given remedy will produce in many cases.

I thought there was only one way to go straight to the knowledge of medicinal power; that is to try the remedies on the sick man and to note the class of diseases they are apt to cure. This way I have followed, a way free from every objection, from every difficulty; I CURE THE PATIENT; there is a fact that cannot be contested; there also is the entire value of my medicine which ought to remain in the world, in spite of scientific chicancy preeminently the positive medicine which does not require to be propped up by any theory, or which has for theory only the results of experiment under a general formula.

Digitized by Google

The homœopaths have tried to render account of the real effects produced by almost infinitesimal doses. Some have even thought that the medical processes of preparation could give power enough, and have called *dynamisation* the subdivision of remedies. I have said above what the actual state of my knowlegdes allows me to say on this point. The attenuation of masses, as I said, brings into play the muscular forces. It is an old saying: that *corpora non agunt nisi soluta.*

As for me, I am afraid of imaginary theories. I confine myself to evident facts stating that the general rule for my remedies is to place the doses in relation of the disease, viz: to diminish the doses in proportion to the gravity of the malady. What I have stated is drawn from the experience, and even the theoretical reason could not be given, it would be no less the general *canon* of Electro-homœopathy.

I cured by means of *one drop* of essence in a glass of water; I cured by an ordinary dose of a globule taken daily in a glass of water; and, indeed, I cured by a second dilution, and in rarer cases I descend to the third; on the other hand, I go up to the very strong doses. Here are the facts which I point out, saying, at the same time, that the dose should be in inverse ratio to the gravity of the disease: I add that it is necessary to know, if required, how to employ the whole scale of posology. I do not go so far as to say that I *dynamise* matter; I have not the power which belongs only to the Creator *qui effudit illam super omnia opera ejus,* as it is written in the Book of Wisdom.

Yet the facts exist, although the reason cannot be accounted for, and we cannot always discover it. Now we reflect that the cure is but the *result of*

Digitized by Google

organico-vital reactions caused by means of agents which we call remedies, and that reactions are so much the less as there remains less vitality in the centre of the organism, or the disease is grave. Thus it is why, in my opinion, it is necessary to lessen the quantity of the medicine in ratio to the intensity of the malady. To do otherwise it would be contradicting the general law of nature, namely that *the reaction is always EQUAL and opposed to the action.*

Great pain, large remedy, the vulgar will exclaim whithout doubt. But the large remedy, I say is not in the great mass of the medicine; and, as the meanest corpuscules and unseizable miasms cause desorders and the most grave maladies, even so minute quantities of a fit medicament suffice, by their repeated action, to destroy malady.

What is, in fact, the weight of the matter that the sting of an insect lays down in its empoisned prick, that causes a man to die? Well! do you think that it requires a more quantity of counterpoison to excite in the organism an equal reation, fit to cut and reduce to naught the morbific movement? How many facts happen about us unperceived which ought to instruct us, if we had the use of reflecting and arguing to conicive them.

But we are early accustomed to routine, that is to say, only to repeat what others have said; science is spread before the eyes of our intelligence ready made; even the very words that are necessary to repeat to be instructed and learned are placed on our lips. Frequently at the bottom of these theories which cost us so much study there is the emptiness of human ignorance adroitly masked by conventional phrases. It is only by this routine that prejudices are perpetuated. It is thus that it

Digitized by Google

is generally believed to be an absurd thing that medecine can exist outside of the Faculties, and that all are disposed to ridicule men who, outside of these learned bodies, announce to the world a discovery touching the sacred domain of the academy; and thus again supported by prejudices and ignorance the physicians have the right to kill us, and to forbid us to cure. This is how our society is constituted and the human race submits to it.

I had hardly discovered the new therapeutic agents and collected sufficient results to convince every one, that my discovery was a grand one, certainly the most useful that had been made to this day, I felt it my duty to make it known and spread it abroad for the good of all men. I was going to claim neither money nor honour; I simply obeyed the dictates of humanity; I did not pretend to be believed in words. I commenced by facts, I made numerous cures. What was the reception of the physicians? I am about to relate it.

During ten years I held at Bologna public meetings where I received the refuse of hospitals in a crowd, all these unhappy objects to whom science had said its last word. The incurables cured; it was the power of St-Anthony, said the vulgar. But the physicians, who had little faith in St-Anthony, came to assist at the consultations, took notes, one of them, Doctor C. kept a register with the names of the patients treated, all the details, and as far as the duration of the cure. After much pressure Doctor C. published a notice of the authentic cures. I began to believe that after this only electro-homœopathy would be practiced at Bologna. I was deceived: a demand was simply made to the Prefect to close my consulting rooms, and Bologna, the scientific town, continued to practice science and to allow the incurable to die very learnedly.

Digitized by Google

The miracles of St-Anthony, seen by the public in a celebrated city of one hundred thousand inhabitants, were noised abroad and spread throughout the whole Peninsula, for people came from all parts of Italy to my consultations; that which happened at Rome, where I was invited by that conscientious physician L. Pascucci, made known the marvels of electro-homœopathy to foreigners. At the hospital of Ste-Theresa at Rome I received in three months nearly 12,000 persons, from people of the highest rank, Italians and strangers, down to the lad of the streets; every one saw clearly the reality and power of the new therapeutic agents. It was enthusiasm, it was stupefaction; the rooms, the stair-cases, the court-yards swarmed with sick persons; it was necessary to place guards to keep order.

I only relate facts, and this a small part relative to the history of electro-homœopathy. The press and the correspondence of so many persons spread it everywhere; amongst others the celebrated doctor Lutze published at Leipsic the account of a cure which seemed miraculous to him: a blind man brought into the operating room went away reading a book!

A new phase in the history of electro-homœopathy was about to commence. A number of doctors asked for the remedies to try themselves. It is understood that I did not refuse them; I granted them a sufficient long time to enable these gentlemen to make all sorts of experiments. I was so certain of the effect, that I was not surprised when I heard of extraordinary cures, of which these good people took the trouble to inform me, and which some of them published accounts of, which they kindly adressed to me. My greatest astonishment

Digitized by Google

was when, all at once, the doctors were quiet and ceased to inquire for the remedies. But they required now more than the remedies; now what? the *Formula!*

Yes, the formula, they wished to cure by the formula. For an instant I thought that the doctors in question had taken in their heads to practice medicine after the fashion of the physicians of Morocco, who treat wounds by the virtue of a verse of the Koran, written on a piece of paper and carefully applied to the part. But I was deceived, and this was the false argument that I made; I thought: these physicians have tried the remedies and are convinced of their efficacy; but as doctors only search and ask to be successful in the treatment of disease (it is their mission, their oath), therefore they beg for these remedies which cure.

Finally, information from beyond the seas, from the old world and the new, especially from correspondents at Leipsic and New York, came to enlighten me. I saw a new light, a radious truth, a reality, a discovery more positive, more convincing and less open to discussion than electro-homœopathy. But, in short? It was very simple: a globule was sold for a dollar at New York, and a thaler at Leipsic; 800 francs was the price asked for one of my bottles of fluid. Then I understood the more logical and more scientific argument of these gentlemen; they said: we have cured cancer, gout, coxalgia, stone, etc., etc. with your remedies, which could, in our hands, be sold and produce three francs a globule; therefore give us the formula. For the want of it, we say nothing more; on the contrary we shall do all in our power to annihilate your discovery, and proclaim every where that it is mere quackery. The remedies without the formula are only good to cure

Digitized by Google

diseases; there is no worse disease than an empty pocket... Well, what shall we do, we, who have studied to live on illness, if this medicine of globules, of electric drops, should come to replace the official medicine, and the *materia medica* of our pharmacopœia?

These gentlemen had grasped all the importance of the medicine, of which they had proved the reality, and all that which would happen if it came to be spread abroad. They said: the new medicine is good; only it is necessary that it should not be sufficiently so, as to ruin the old; but, so that it should not cause a dangerous revolution, it must remain in the medical periphery and we ought to have the *formula*. The formulœ were demanded from all parts, for, wrote these physicians, *we are afraid of secret remedies*. I refrain from publishing a list of all these philanthrophists of different countries, whose correspondence I have preserved. At that time I answered to the most worthy by printed letters; a number of these will be found in my Italian edition: *Elettromiopatia del conte Cesare Mattei, Casale Monferrato. — Paolo Bertero, tipografo-editore, 1878.* — For the remainder see my little works: *Un poco di storia sui rimedi Mattei, Bologna, Istituto tipografico, 1874. Emancipazione dell' uomo dal medico pei rimedi Mattei, Bologna, 1875.*

To sum up: the medical question was to be transformed into a pecuniary one; these gentlemen understood it at once, but I, the author of the discovery never dreamt of it! There was in it, however, a *large and good business;* negociations, offers and projects were not wanting; it was necessary to decide.

Between a personal benefit and a benefit, which

I regard as sent from heaven for all men, I thought it better to give the medicine to the world than to increase my fortune. To insure this I have not given the formula to these philanthrophists, because, after all, they have discovered nothing, and, on the other hand, they did not appear to me disposed, after what I have heard from Leipsic and New-York, to render, pecuniarily popular this medicine, which has been discovered for the poor as well as the rich. I could see, confusedly, that, in the medical periphery, this medicine, instead of causing a revolution, and spoiling so many arts and professions, would be spoiled itself, and after having made some fortunes, would disappear from the world at the death of the inventor.

I have, therefore, kept the medecine which belongs to me, as I alone discovered it, at the price of my researches. Without calculating my expenses I reduced the tariff of Leipsic from a *thaler* to a *centime*, although leaving to the dispensaries a five fold profit on the medicines bought at Bologna. This is how I came to resolve the question under its double aspect, medical and economic.

But it is a *secret remedy*, cried the vexed philanthropists! Yes, I answer; it is a secret which I intend to guard in my own hands as long as I have not insured the benefit of it to men: as long as I have not found sure and faithful hands to preserve it for the world, and persons sufficiently human, not to convert it into a speculation, sufficiently honest to make an ordinary cure at the expense of a few centimes daily, as I have regulated it myself. I understand that it is not probable to be the medical periphery which will gather the medecine WHICH CURES: it does not wish for such remedies but only the formula.

Digitized by Google

The formula, during my life, I guard myself; after me do not fear the deluge! Everything is already arranged, everything insured so that this providential discovery be not lost, and that this revolution should be accomplished in the world.

Rejected by you, my medicine turned towards the people: « The people alone have the sentiment of the future and the intuition of truth. All the social creations of the past century proceed from them. It is by them that liberty has founded and created the happiness of a gigantic nation beyond the Atlantic Ocean ». (Mure). The people do not demand the formula, they are not afraid, they only wish to be cured; they say in their good sense, that health is the greatest treasure of the world. These people, there is a long time that they have been allowed to perish, although paying dearly the *recognized formula* of the official medicine, so that they cannot avoid trying my *secret remedies* which cost so little and yet CURE. But, you know, trial convinces even the physicians; here the results never fail, it is only necessary to say: Try it.

There are centuries that you make attempts without curing; the people commence to understand this, but they do not comprehend how men, certainly respectable by their knowledge and probity, as there are so many in the medical class, men who have devoted themselves incessantly to the study of medicine, who have sufficient self-denial to condemn themselves to tedious work in the pestiferous chambers of laboratories, to breath all their lives the surroundings of hospitals, and the miasma which exhales from the bed of the patient, running the risk of never having an hour's sleep free, and all this frequently for a recompense which is not ni proportion to the sacrifice; the people do not

Digitized by Google

understand that men, who do *all* this that I have described, are not yet able to cure many complaints, that the lower classes, the ignorant cure by means of *secret remedies.*

Here is the reason why the people do not inquire, like scientific men, about what you call my secret; it is because the people have been delivered by this secret from coxalgia, caries, cancer, staphyloma, elephantiasis, stone, gout, chronic bronchitis, and a thousand evils which you have never be able of relieving.

The people have seen this during ten years at Bologna, then at Rome, then every where, and continue to see it; they have also seen the physicians who assisted and who could see better; now the people are astonished that the doctors have not accepted this medicine with the *secret of curing;* the people have revolted against science, when they understood that science continued to amputate legs, which my remedies, tried in dispair, have cured, and to kill, with opium, the patients, declared incurable, who would have left my rooms thoroughly cured. The people will make the revolution, a revolution not requiring arms, which will shed no blood, which overturns nothing, not even the medicine of paliatives, because it will find itself overthrown by its want of power to withstand the medicine which CURES. At this hour the revolution has commenced; electro-homœopathy is in Italy, in Germany, in Russia, in England; it will pass the Caucasus and will penetrate into India and Japan.

The effects produced by it have left profound traces; adepts have everywhere been made. But those who have recognized the truth have not always had the good faith and the courage to proclaim it. I could quote here names become celebrated by

Digitized by Google

cures made with my remedies in Italy and in foreign countries: these are prodigies, but these workers of miracles take care to disguise my globules in every way and to employ them secretly for fear of compromising their prestige. These however are the jokers who ask for formulœ and fear the secret remedies of Bologna. Honest men have welcomed the truth, and openly rendered homage to it. Already, in 1869, the honest doctor L. Pascucci published at Rome an interesting account of electro-homœopathy to make known the wonders he had witnessed, an account which was soon translated into French, and several other languages. On his part Doctor C., put forth in 1867 a detailed notice of the favourable results of the great experiments made at the public meetings in my palace at Bologna. The celebrated physician, Acwort, in 1870, published some extraordinary cures, in the English press, among others that of his wife, who by means of a few grains of antiscrofoloso recovered the use of her right arm, which she had lost a year previous.

Not less astonishing cures were reported in the Italian, English and German press, and Doctor Zimpel published (Leipsic 1869) an important work on *the marvellous remedies of Count Mattei.* (German).

My first little book, *un poco di storia sui rimedi Mattei* (Bologna 1871) was at once translated into German by Girtler at Vienna.

L' emancipazione dell' uomo dal medico, which I published at Bologna in 1875 went through, as well as the preceeding work, several editions and translations into different languages. Two works of Doctor Regard of Geneva appeared in 1872 to 1873, the first entitled, « *Quelques mots sur les spécifiques du Comte Mattei* », the other: « *Guide*

Digitized by Google

pratique pour l' emploi des spécifiques du comte Mattei (Pfeffer et Puky, Geneva).

M. S. Bérard, pastor at Loriol (Drôme), from the indications which I supplied him, and aided by my treatises, has edited guidebooks which have been translated into nearly every European language; not long ago a journal having for title, *The electro-homœopathic Review* was founded at Geneva, for the diffusion, said the editors, of the new science, to announce especially the cures and the success of the new therapeutic agents (1).

It was to complete this bibliography and to publish, which was yet unknown, all the resources of the new medicine, that I published an Italian work, a long time demanded by persons who had not or who did not wish to have doctors to treat them. This book was translated into Russian

(1) Unfortunately the editors of the Review thought that they knew much more than their master the inventor, and although proclaiming the wonders of my discovery, they turned against me; I hardly dared to publish a book which was called for on all sides, seeing the insufficiency of the work « *Spécifiques électro-homœopathiques du comte Mattei*, by S. Bérard, pastor, a book which, up to this time, was almost the only guide, although insufficient in many respects for the use of the new medicine. Useless to say how great was my surprise when I saw this journal, whose programme had announced my name at the head of the contributors, which posed itself as the exclusive organ of the *new medical science*, to attack my book and refuse to insert my defence. Useless also to state that the behaviour of the Review did not seem to me such as to add authority to my work and to aid in the diffusion of light: so much the contrary, that I am obliged, to my great regret, to *disavow* these persons who, under the appearance of a propaganda, undermine my discovery, endeavour to slander my name in throwing on me the odium of a *certain commerce which surely was not done at Bologna*, and which I have had only too much trouble to thwart.

See: *Revue Electro-homœopathique de Genève.* N° 5 and 8, 1878, also a note placed at the end of this work.

Digitized by Google

at St-Petersburg two months after it appeared. Finally it is to throw a complete and universal light on the subject, that I am decided to put forth this new work, and which I think necessary to have compiled in the most wide spread language, for the book is addressed, as my medicines are, to the entire world.

All this movement is produced and progresses every day *in spite of the pretended secret;* this proves that it is not necessary to reveal it to the first physician that comes along. As has been seen, very honourable doctors have welcomed and illustrated the new science by their publications; I could quote many others, physicians, scientific and illustrious men of all countries, who have not rejected the remedies, the mystery of which I defer to a later period to divulge. These worthy people know that secrecy neither adds to nor detaches from the value of the remedies, which they take with more confidence than the *well known* drugs of ordinary medicine; they know well that I only guard the secret, for the present, to guarantee the purity of the remedies, to thrust aside sophistication and the cupidity of those who only see in the greatest inventions: money and profit; they understand also that, at the present moment, my medicine would have been done for, if I had given the formula to all those who demanded it.

Respectable persons, although admitting the necessity I am under, of guarding the secret for the present, have shown their apprehension for the remedies after my death. Those who know the perfidious struggle that I have sustained during twenty years, the persecutions, attempts even against my life, fear that crime or spite will finish by burying my discovery in my tomb.

Digitized by Google

I wish to assure them once more that this will never happen (1).

I should prefer that God, and especially men allow me to live all my days, but, whatever may happen, my remedies cannot be destroyed; every thing is foreseen, everything arranged, a long time since, so, that at my death, my discovery, which I regard as a benefit sent from heaven, remains to the world.

Why should one fear that I do not take sufficient precautions for it to survive me? I have laboured much to establish it, and I shall work more, during the days that remain to me, to insure MY LEGACY TO HUMANITY.

There are, also, worthy people who wish to see physicians at the head of electro-homœopathy. Physicians will always be welcome; I even say they will be the better comers; as medical science is not opposed to this practice, my remedies will be only better applied by men who are acquainted with the structure of the organs and the morbid lesions. It is not necessary that I repeat here that it was to physicians that I made the first appeal, to whom I offered and gave my remedies *gratis;* nor is it necessary that I again testify my respect for the true sons of Œsculapius. But the greater part do not want me; the greater part have rejected the new therapeutic agents, and I cannot convince these good doctors that these agents create no danger to their profession, if it is not to simplify their

(1) I repeat here what has been to often said and which ought to suffice to dissipate the *anxiety* of M. Bérard, or rather the *anxieties that M. Bérard seeks to cause.* The threats and the tyrannical monopoly of which he speaks seriously in n° 8 of his *Review* only regard him and the staff of the *Review.*

Digitized by Google

practice, and, what is more, to supply them with sure means to cure the greater part of the patients that, for the want of remedies, they are forced to let die. The greater number of physicians, even after having clearly seen it, said: No matter, they die legally! *(Un poco di storia sui rimedi Mattei pag. 15 Bologna 1874).* I answer that at present it is useless to wait to see the physicians come; but the time may come when they will be obliged to do so. After the history of twenty years I can say, that a spontaneous conversion, on their part, would be a greater miracle than the wonders of electro-homœopathy. I do not flatter myself to possess such powerful specifics. But this miracle will be the effect of the whole, the last result of electro-homœopathy. I have reason to think so, as it has already happened so many times. Against all changes, against all discoveries of new remedies, made outside the medical circle, doctors have always been seen to declare war.

Thus it was that learned medicine, for a long period, opposed the use of quinquina, brought from America by the profane, and this powerful febrifuge, known to the savages of Quito for centuries, would not have triumphed in the struggle against Mohy, Chifflet, Plemp, etc., if it had not worked a great miracle: the cure of the Countess of Chincon, the wife of the viceroy of Peru!

Thus it was again that physicians dreaded the inoculation for small-pox taught to Emmanuel Timoni, member of the faculty of Padua and Oxford, by an old woman of Thessaly; and it was by the miraculous effects, and the influence of Lady Montague who demonstrated them, that the medical College of London decided to make a trial, and then to adopt this prophylactic against a disease which ravaged Europe.

Digitized by Google

I am convinced that the same electro-homœopathy, which is not li an isolated means, frequently powe palliative of some diseases, but a cine, certain, radical, applying es plaints hitherto pronounced incura such is my conviction, based on th past, and on facts accomplished d twenty years; yet, after all, I thi reality, the truth of a discovery w its triumph. In the combat it is falls; it there purifies itself to shi after, and casts off, in the strug error, even as the sun frees itsel of the horizon, to lighten with a eyes even of those who fly from prejudices, opposition, controversi to stifle the discoveries which, since have come, in turns, to upset the edifice and to shake the secular Academies. The men who were the new truths, were branded; but Ga Fulton ridiculed, are trophies t day for their enemies, but which became titles of glory for their conquered Academy raises their rejected them! Electro-homœopath it only requires to be widely spr place to which it is called by it portance; it will bring about a in medicine. This reform may b fore being thoroughly accomplis fail: that which relieves so muc every one.

There are reforms which st of society, and there are those

the base to reach the summit. It is this ascending progress, which we have observed for a century, which grasps best the questions which concern it, which first came out of the middle ages, which stripped legislation of the rubbish of the past. The people are not the lowest of men; neither are a class of society; they are a society, the body and mind of the nation. When governments do not ncilude the people in questions which concern it the most, they march in a road, closed at the end.

It is thought that medical reform can only be the work of governments; this is a mistake, or, at least, we need, here, to distinguish.

Medical affairs are subject to special laws, amongst modern nations. It is the same as regards the practice of what is called: official medicine. Amongst the Greeks, the Romans and the Arabs, the physician did not hold his mission from the state; he did not go to be crowned with the academic laurel; the law accorded no diploma to authorize him; he put himself forward, simply, at his own risk and peril; he formed his connexion by his means and especially by his talents. In the first centuries of our era medicine was practised in this way, by the monks and ecclesiastics, up till nearly the 13th century, when the Popes interdicted the practice of medicine to the clergy. The physicians, in this period, were learned encyclopœdists, and filled one of the most remarkable parts in the governments of the epoch.

The Popes organised the *Faculties* amidst which shone Medicine. These were learned corporations which delivered diplomas and patents, after a course of study and public examinations, giving *faculty* to practice medicine.

The candidates took an oath, at their recep-

Digitized by Google

tion, on the works of Hippocrate
The *Faculties*, not only gave the po
but placed the licenciates under th
outside of the common laws; for the
were themselves indipendent, and
arms, their militia and their banner
as civilization, urged on by the p
of the people, made its way, these
legislation stripped of a quantity o
tended, without ceasing, to realize
of the *equality of all men before t*
by the people. Equality before the
openly, is not the *social level* of t
nor the monstruous dream of the
simple justice among men, proclaime
of Christ.

It will be thought that I go
conclusion: that the privileges a
which the law has continued to gra
and to the medical profession are rel
ages which ought to be abolished b
God forbid! nothing of this ougl
done; nothing of this is necessary
practice of medicine. Let the Facu
grant diplomas, and the Academie
concentrate all the means for the pr
science; science is truth; nothing
and stupidity can despise it: *Sapi
nam stulti despiciunt.* Could the
that they ought henceforth, to ab
no longer think to maintain the s
altar of Minerva, in order to carr
the torch of science in all the bra
knowledge? What would become
would forget, for a moment, the
which form its most glorious tit

Digitized by Google

which decree the rank that it occupies in the scale of civilization? And, in the number of the most elevated sciences, those which treat of life, the human organism and its functions, must well be included. I repeat, with the professor of internal pathology at the University of Paris: *it is necessary that the physician should be a scientific man;* it is not the scientific man who can deny the new truths that I proclaim.

Among the injuries that have been hurled against me, after the publication of my Italian book, is this: that I preach ignorance and obscurity, that I even pretend to demolish the colossal edifice, built up from Hippocrates to our own time! This is the very learned criticism that these *men of science* have launched against my work. These men attack me, in the name of science, and only find abuse to refute me with! they have not refuted me, for an insult is not an answer.

For the rest, I have sufficiently explained myself with these critics, with regard to what they call medical science, not to dwell on it any longer: see my italian pamphlet: *La scienza nuova del conte Cesare Mattei — E la scienza vecchia del dottore C...* at P. Bertero, Casale Monferrato, 1878.

What then is the reform of which you speak, will be asked now? What ought to be done so that your newly found medicine could be established? As regards the Faculties and the physicians, I answer: there is nothing to be done; respect them and leave them as they are.

But the law protects their position, gives them the right to regulate the practice of medicine, consequently to repel you, to interdict you and your remedies; this is nothing; I am about te explain it. The law, equal for every one, cannot maintain

Digitized by Google

privileges for any class or any profession. It would be necessary to go back some centuries, to find laws of this kind, to go into China to still find castes organized by the state. Thus, what you think in our countries privileges for the physicians, are, partly, guarantees for the people, for it is not the profession of doctor which the modern legislator places under the patronage of the law; it is the health of the people, the life of its subjects which is of supreme interest to every government. This, without deception, is the reason why our civilized governments decree for the medical profession and materials; this is just.

This is just as far as it regards official medicine; here the intervention of the state is necessary to regulate, either *the material, dangerous* in its nature, and the action, the guarantees of capacity, even the studies and the degree of knowledge of those who are called to use in their official profession.

Let, now, the first comer practice medicine with *therapeutic agents, containing life or death*, or rather death close to life; deliver these poisonous drugs to inexperienced hands. The earth, then, could still conceal the errors of these newly arrived doctors?

It is, I say, to ward off or diminish the accidents of this kind, that the law inspects the *materia medica*, and that there are commissions of hygiene to approve of medicines before delivering them to circulation. As to the profession, it is evident that the State has the right to impose regulations, programmes, courses on all those who come to claim, from it, a title assuring a social position. And, besides, medicine, such as our Faculties have made it, (as professor Peter has said very much to the

Digitized by Google

point) is science, chemistry, physics, physiology, etc., much more than it is medicine. Take away these sciences, there remains nothing which can be called official medicine. See, now, that in default of medicine, the accessory sciences must, of necessity, be preserved, such as are the organized Faculties, the laboratories, the courses, the diplomas, in short all the scaffolding of the official medicine.

To sum up, this medicine is, from its nature, and under all respects, subject to the law, and, not only would the public health be endangered, but the very existence of medicine itself, the day when the State should leave it entirely free.

Nothing of this, that we have remarked, applies to any medicine, which free from danger, requires no diploma, and can be practised, with the aid of elementary knowledge, by every man who has a slight habit of observation. Such a medicine is, by its nature, free in all States of the world, it is so by natural right, — the State cannot restrain it without violating personal liberty, the most sacred of all.

It is, now, understood what is the medical reform that I await, and which cannot fail to arrive. It is a very peaceful reform, as there is nothing to change, either in the official medicine or in the laws; the laws will continue to regulate dangerous drugs and large doses, but the *globules* which the doctors, by mockery, call innocent grains, afford no matter to the laws; my doctors, who do not incur the risk of killing, who do not go to demand diplomas, do not issue from a Faculty; for, if the physician could better show off the wonders of Electro-homœopthy, these wonders could take place, equally, without being a learned man. As long as I thought that all physicians only sought the means

Digitized by Google

of cure, I addressed myself to the
a long time to thoroughly experime
understood what the majority want
myself to the profane; I made a
people; I commenced by publishing
little work (*Un poco di storia sui*
to denounce the conduct and the ba
doctors, then I published another p
cipazione dell' uomo dal medico pei
then I furnished to persons, who c
services for the propaganda, mat
books; the books appeared and are
where, in many languages; person
practised medicine, treated themsel
others. Finally, when I saw that i
to place myself at the head of t
finished the work commenced by
published the guide book, in wh
all the resources that can be draw
homœopathy for the good of the p
greater part of the doctors, refuse
powerful means.

My discovery is now handed ov
it spreads and will be spread mor

One day, the people will say t
you are the deputies, the manda
to watch over our maladies and
laws recognize you as the public
— You do not cure us, you say t
die, if we are attacked by cance
gout, stone, cholera, etc., but w
diseases can be cured. Only, the
employ these excellent remedies,
secrets, discovered by a man who
of your medical science. You have a
doctors! but, we no longer want

Digitized by Google

in the name of the law, which protects the health of the people, that every doctor, who, being able to cure us, leaves us to die by palliatives, be responsible to society; for, on your part, leaving us to die, when we are curable, is a crime.

Behold the reform accomplished without noise, without action of any sort. When the people will have understood this, statesmen will see what is necessary to do to revise the legislation.

The partisans of Malthus may be alarmed « at a luxury of vitality, the exuberance of which would impede the march of their politics; but it is probable, that the most enlightened governments will be the principal to assure this powerful therapeutic means to their populations, and which will be at the same time, a source of revenue for the State treasury. Behold a lot of reveries! will cry the doctors. Yes, I dream, in my solitude, of things which do not enter into the minds of the physicians; from hence I measure the path, which, electro-homœopathy will make in a few years more, by the way that it has made, during the twenty years since it was hardly started. My correspondence, my registers allow me to state, that my discovery is called to regenerate the people, to save, to the budget of the State, the Province, the Commune, the milions now expended in the relief of public suffering, and to increase the receipt of the treasury by the *new duty* on medicines. I may be deceived, on this point, but I am too well acquainted with the grand reality of electro-homœopathy, and there are too many great personages, who know its reality and its capacity, not to be permitted to believe, that its ultimate destiny is placed in the hands of governments, to insure its preservation to the world. There I could deposit the formula

Digitized by Google

under the shield of public faith ar
who would have only too much in
tuate them and preserve them again

Until this day arrives, the gra
remain unknown and profoundly conc
be lost, the day it should fall int
those philantrophists, who covet it s
conceal their spite, when they cry
Beware of secret remedies!

I have, yet, a categorical wor
people: what do you mean by a s
According to common sense, it is a
effects of which are unknown, a
one is afraid to give to publicity,
of the doctors. This defined, you
remedies to which I have given eve
with which, I have supplied every
dies, which, for twenty years, I h
tors, chemists, scientific men and t
men in all the countries of the wo
again, of which the effects, the mo
the vegetable and non-poisonous nat
proved? — Should I not have dec
chemist can he not decompose and
mistry, which discovers a grain o
decomposed intestines of an exhu
mistry which detects the least ad
even a ten millionth part of a gr
does not escape its powerful me
could it not detect what there is i
in a kilogramme of my granules
one stroke, tear aside the mys
annihilate that, which many very
have called: *quackery*. Thus it i
reject me, in the name of science
contrary demonstrates that you h
ridiculous pretext and one unwort

Digitized by Google

What interests you is not *its nature* and effects; it is the material process. I understand that it suits you better. But, then, how many secrets are there not in your official medicine? Is it not from the class of doctors and pharmaciens that issue the great part of the secrets which encumber the fly-leaves of the press, the advertisement corners of all towns, the windows of all the pharmacies? Well, the inventors of all these remedies, certainly infallible to cure overloaded purses, have they placed their secret upon the label? What! here you are contented with a name and some details for use, and, especially, that wants no explanation: not to be deceived by the *numerous counterfeits*. Now why should I, who, according to you, have discovered nothing, and only play the part of a mountebank or clairvoyant, submit to you my process? So much noise for nothing, for an empty secret; this is a new contradiction on your part, or, better still, it is a new proof that this *nothing* is a great reality which preoccupies you, even to vexation. Without speaking of *patented specifics*, so much the fashion of our time, of which the invertors preserve the secret, there are manipulations, in existing preparations, which remain secret to the doctor. The doctor does not require to know the different processes that bark undergoes to furnish sulphate of Quinine; he ought to know that it is sulphate, and the effect it produces. This is all that he requires; this is also all that I state about my remedies. Everything else, I repeat, will remain concealed till the day, when myself, or some one after me, shall place it in security, in hands which command prisons, to prevent fraud and dishonest trade.

To many readers, mine is certainly a broken

Digitized by Google

language, but there are those who understand my English; those are they, who sigh after my secret; all those, who have taken so much trouble to extort it from me, even sending so many worthy fellows to the neigbourhood of my retreat, to *frighten me;* all those who, to better prove the efficacy of electro-homœopathy and the philanthropy of the Count, have demanded a thaler for a granule and 800 francs for a litre of electricity, whereas, elsewhere, doctors who were more modest, did not take more than 10 francs for an ounce of my fluids; as for the globules, they settled the affair in such a way as to increase the effect and, especially, the price.

All this was endurable, whilst it was a question of making known the remedies, and, above all, getting them appreciated, when there was no charge, as I sent them gratis; but now that *I sell them*, the thaler represents 1350 times the cost price at Bologna, and the competition of the inventor has thwarted the projects of the philanthropists throughout the world.

There only remained one attempt to this band. They said: since the Count guards his person and his formula in his castle, from which we cannot hope to draw them: since he does not, even, allow us to think a little of our purse and our future at the eve of a cataclysm which threatens our position, acquired at the price of study and effort, we will overthrow his grand project.

We must present ourselves as his propagandists; at first we will push the propaganda and gain money; then, either the monopoly will remain to us, or we will overturn the whole. Thus, we shall have done a good thing, in ridding the world of that which the *visionary* of the Rochetta called our end, *finis!* To make an end of him, we must

Digitized by Google

distribute good and bad remedies, especially the bad!

Here, adulteration is easy and, when it will be seen and heard that, for one successful case there are so many failures, and which, even, show some danger, the *sure effects* of electro-homœopathy will become *uncertain;* then some colics caused here and there will put all the world on its guard. Then, the miracles of Bologna and Rome will soon be a matter of legend or *mythology;* finally, the *curable* diseases will again become *incurable*, as it ought to be here below, where it would be difficult to know what to do with the numerous population which would accumulate in the old continent; it would happen as Malthus has stated. Finally, the inventor dead, the medicine destroyed, the world will say no more about it.

Behold again more hallucinations! will exclaim more than one of my readers. See, however, the history that will be written; the documents exist, which I hold, which cannot be easily destroyed, should I, even, be compelled to engrave them on flint.

For the present, I quit the history, as I have only one task, which is to insure the world a perfect knowledge of electro-homœopathy, and the purity of the remedies. Adulteration is impossible at Bologna; drawn from the source, it is not exacting too much. So, by very simple means, I think I have baffled even the last scheme, of all the most dreadful, viz. adulteration. Have I finished with intrigues? I do not know; but, if after all that I have done, the men, who preside over the destinies of the wold, or the societies, accustomed to regard human life as being at their mercy and human suffering as something to be speculated on, so as

Digitized by Google

to mache a living out of sickness and death: *if*, I say, men should find the means of destroying this benefit, which heaven has sent into the world: it would be the occasion to exclaim: *men were not worthy of it!*

I have faith that ruin will not come; the remedies that I have discovered will remain; the attacks and plots of the wicked cannot destroy the truth.

Electro-homœopathy is the truth of medicine. — The truth in medicine, after twenty five centuries of mistakes and errors, in *an event* — an event which contains the health of generations present and to come, an event which is the integral element of the grand discoveries of the century and of the new order of things, which these discoveries have produced on the face of the globe.

Digitized by Google

Digitized by Google

ELECTRO-HOMŒOPATHY

MEDICAL PART

Αυτοψια, ιστορια,
καί μεταβαβις του ομοιου
Τριπους της ιατρικης.

GLAUCIAS.

Observation made by one's self,
The notice of observations of others,
The induction drawn from similars,
Here is the tripod of medicine.

CHAPTER I

WHAT IS ELECTRO-HOMŒOPATHY?

1. Electro-homœopathy is homœopathy raised to the perfection of certain and radical medicine by the discovery of new therapeutic agents (which I call *electroides*), acting on the blood, and giving force to the organism to disengage itself from the morbid principles which change it.

Digitized by Google

This *materia medica* has been discovered, like homœopathy, of which it is the crowning point, by experiment; it rests entirely on experimental data; it is therefore true. Like the truth it is also simple.

2. Its effects are explained by principles equally simple.

The body of man is impregnated with certain impurities or principles which some call *herpetic*, others *scrofulous*, and which Hahnemann called *psoric*. These principles viciate the organization and predispose it to numerous diseases. But there exist, to expel them, remedies which I name *anti-scrofulous*.

This viciation frequently invades the white vessels, brings on serious changes of the lymph. But there are remedies which I name *anti-cancerous* (1).

At other times the viciation gains the sanguine system, produces alteration of the red vessels and diseases the arteries and veins. There exist remedies that I name anti-vascular, *anti-angioitic* (2).

With the help of these three kinds of remedies nearly all these maladies can be successfully treated, some other remedies are included in this materia:

The *Pectorals* which have an elective action on the bronchial tubes.

The *Febrifuges* which cure fevers and changes in the liver and spleen.

The *Vermifuges* which destroy intestinal worms, from the thread worm to the tape worm and tricocephalus.

(1) It will be seen hereafter that the sphere of action of each remedy extends far beyond that which its name litterally seems to indicate.

(2) From the Greek αγγειον *(angeion)* vessel.

Digitized by Google

The *Antivenereal* which cures sy
its forms, and perhaps prevents it.

Important remark. — In general
are only two primitive causes of disea
classes of remedies) namely: the vicia
blood and the viciation of the lymph.
to be remarked: 1st That the lymph a
are two joint agents in the functions o
ism; the viciation of one entrains, soo
that of the other; hence, the mixed dis
must be attacked by the two classes
alternately: 2nd The antiscrofulous exer
action on the lymphatic system as the a
act on the sanguine. Then it happens
the diseases are fixed and developed to
degree, the joint action is, or may be,
arrest the rapid progress of the complai

This is why I have been led to see
remedies such as the anticancerous, an
febrifuges, etc.

These remedies, for me, are thems
antiscrofulous or *antiangiotics*, *havin*
determined, *more immediate action eith*
lymph or the blood.

This results from experiment, for
scrofulous, for example, is also antivener
sufficient to attack syphilis as long as th
is only developed or arrived to a certain
much must be said of other specific reme
febrifuge combats especially fever; that i
it restores the normal circulation; but th
gioitics, acting on disturbances of the blo
bring back the sanguine tide to its regu
and thus prevent feverish symptoms, etc.

3. There are also liquids, which po

Digitized by Google

aid the internal treatment and, in many cases, are all that it is required. These fluids have an instantaneous action, similar to that exercised by eletricity on the living organism, even in some rare cases producing a shock. I have named them, more particularly, electric fluids or simply *electricities*.

All these remedies are comprised under the *law of similars*, in the sense that, given in large doses, they reveal the symptoms of the maladies of which, in proper doses, they eradicate even the cause. But experience does not authorize me to state that they produce morbid symptoms, in a healthy subject, who has no predisposition to or no germ of disease. In this, electro-homœopathy has not hitherto confirmed, in all its generality, the law of Hahnemann.

All these remedies are extracted from non-poisonous plants, as is proved by experiment and analysis.

In ordinary treatment, one globule, daily, is given to a man; this dose is sufficient to cure. But if a hundred, a thousand or a whole bottle of 10,000 granules, are given to a dog, no effect will be observed. A man, in like manner can take, vithout effect, a certain quantity of granules, providing that the remedy is not appropriate to the disease, which he has, and for which he takes another specific. In this last case, he will perceive unpleasant symptoms, but no danger.

4. It follows, from the preceeding, that, the greater the severity of the disease is, the smaller should be the dose. This is, moreover, a constant rule, drawn from experience. Thus, an intermittent fever is cured with a grain, in a glass of water, daily; a malignant fever requires the second or third dilution.

Digitized by Google

But, aside from the case of cer
diseases, the more dilute the reme
often it must be taken.

So, for the intermittent, it is fi
the glass of water, containing the gr
or ten times during the day; where
lignant, it will be proper to give t
the second or third dilution, for se
teaspoonful every five minutes, if it

It is, frequently, proper to give
dies to the patient; they must not
given at the same time, but alterna
one part of the day, one, the othe
day, the other. Tubercles of the lung
require the use of anti-cancerous an
there is a spitting of blood, a th
added, chosen from the anti-angioiti
the day ought, then, to be devoted t
remedies.

The rule, to select the remedies
teria, is as simple as the *materia* it
cause of the disease, whatever may
cause which, most often, must be sc
cerous, or angioitic; and, to this cau
proper specific.

Thus, for paralysis, the antiangi
employed, if it arises from a defect
tion; if it proceeds from the psora
principle, the antiscrofuloso is indicat

In like manner, for the electricit
ten the internal treatment, those m
which agree with the cause of the d
cause is in the circulation, apply t
antiangioitic: the red and the yellow
if the cause is scrofulous. We shall g
more detailed rules for the selection
ment of the remedies.

Digitized by Google

5th The homœopaths seek the remedy after the symptoms and form that the malady assumes, and say: for dropsy such a remedy; for convulsions, such another remedy. This is not the method of electro-homœopathy; for, the same forms of disease may arise from various causes. Thus, convulsions occasioned by worms could not be treated by a remedy which rectifies the circulation, and *vice versa*. Every dropsy could not be cured by one and the same remedy; that, which cures dropsy of the belly, would not be suitable to dropsy of the heart or of the ovaries. But, in each of these cases, the remedy must be used, which has an *elective* action on the viscera become the seat of the effusion.

The action which each remedy, applied to the exterior, exercises on the economy, is the same with a degree of difference, as the action of the same remedy, taken internally; a congestion of the liver, for example, will be more quickly subdued, if an external treatment is added to the internal, either by compresses or unctions of the same remedy, as given internally, and in doses which will be indicated in this work.

For the same reason, a diminished blood vessel or an anevrism, will be more promptly relieved, if compresses or unctions are applied to the affected part, during the internal treatment.

The grave scrofulous or syphilitic maladies, which do not yield to their special remedy, are treated vith the *anticancerous*.

When no effect is obtained from a remedy, or the effect is slow in showing itself, one of three things is certain; either that the diagnosis is erroneous and the remedy consequently badly selected, or the dose in wrong, or decomposition is so far advanced that it is humanly impossible to succeed.

Digitized by Google

The effect of the remedies cannot fail, on condition that they are properly given and according to the rules, which we indicate here and which we shall develop further on. With the help of this book, every one can, with a little reflection and observation, become his own physician and administer this *materia medica* with success.

Digitized by Google

CHAPTER II

NAMES OF THE ELECTRO-HOMŒOPATHIC REMEDIES

6. These remedies are now 29 in number; 24 for internal use, 5 for external. These last are called: electric fluids or simply *electroides*.

This number has varied, and may yet be increased, as all the remedies have not been discovered at the same time, and there are, at this moment, some undergoing experiment.

List of remedies

The internal remedies are:

Antiscrofoloso.	Antiscrofulous.	
Antiscrofoloso nuovo or 2°	»	new or 2d.
Antiscrofoloso doppio .	»	double.
Antiscrofoloso 5°.	»	5th.
Antiscrofoloso 6°.	»	6th.
Anticanceroso.	Anticancerous.	
Anticanceroso nuovo or 2°	»	new or 2d.
Anticanceroso doppio .	»	double.
Anticanceroso 4°.	»	4th.
Anticanceroso 5°.	»	5th.
Anticanceroso 6°.	»	6th.
Anticanceroso 10°. . . .	»	10th.

Digitized by Google

Antiangioitico . . . . . *Antiangioitic.*
Antiangioitico nuovo . . » new or 2d.
Antiangioitico 3o . . . . . » 3d.
Pettorale . . . . . Pectoral.
Pettorale 2o . . . . . Pectoral 2d.
Pettorale 3o . . . . . Pectoral 3d.
Pettorale 4o . . . . . Pectoral 4th.
Febrifugo . . . . . Febrifuge.
Febrifugo nuovo. . . . . » new or. 2d (1).
Vermifugo . . . . . Vermifuge.
Vermifugo nuovo . . . . . Vermifuge new.
Antivenereo. . . . . Antivenereal. . . . .

The external remedies or electricities are:

Red Electricity. . . . . Positive.
Yellow Electricity . . . . Negative.
White Electricity . . . . . In some way neutral, always beneficial.
Blue or angioitic Electricity.
Green Electricity . . . . . Negative.

Important Remarks

7. I. Among the internal remedies, there are three, namely: *antiscrofoloso*, *anticanceroso*, *an-*

(1) The new febrifuge or 2d, although included in the list of internal remedies, is only employed, ordinarily, in compresses or unctions over the hypochondres; given in the interior, at the second glass, it has subdued typhus and very serious cases of fever.

Digitized by Google

tiangioitico which fill the part of chief remedies; they are, especially, the main remedies, in the great majority of diseases, of which the source, as we have so often repeated, is scrofulous, cancerous, or angioitic (1).

Amongst the others, the homonymes are indicated, in peculiar cases, and some have an *elective* action, as will be seen (remark 2).

The *antivenereal* acts upon syphilis, in all its forms, and all its consequences.

The *febrifuges* are specifics against all sorts of fevers, all periodical maladies, and all affections of the liver and spleen.

The *pectorals* are adapted to affections of the respiratory system.

The *vermifuges* are employed against every species of intestinal worms.

II. *Elective action of certain remedies.*

Pectoral 1^{et} acts, in an elective manner, on the bronchial tubes, Pectoral 2nd on the cavities of the lungs, Pectoral 3rd on catarrh.

Anticanceroso 1st acts, in the same way, on spasms of the womb and difficult labours.

Anticanceroso nuovo, against dropsy.

Anticanceroso 4th against decay of the bones.

Antiscrofoloso 1st has an elective action on the stone, calculus and gravel.

Antiscrofoloso nuovo for non cancerous wounds.

Antiscrofoloso 5th in spinal affections.

(1) The antiscrofulous applies to viciation of the lymph; the anticancerous to these, when they are already far advanced ad serious, as in tubercles, cancer etc., the antiangioitic to disorders of the sanguine circulation.

Digitized by Google

III. It is always necessary to commence the treatment, by the first remedies, in their series; save to have recourse, afterwards, to their homonymes, when experience shall have shown that the first are not sufficient. After this, it is seen that, with the exception of some cases, every treatment ought to commence with one of the seven following remedies.

Antiscrofoloso, *Anticanceroso*, *Antiangioitico*, *Antivenereo*, *Febbrifugo*, *Vermifugo*, *Pettorale.*

It is understood that the remedy named and marked without number or adjective, is the first; so *antiscrofoloso* is the same as *antiscrofoloso* 1[et]; *antiangioitico* is identical with *antiangioitico* 1st. This remark applies, equally, to the nomenclature employed in the books and the labels, placed on the bottles containing the remedies.

IV. It must not be forgotten, that the mode of action of the remedies is the same externally as internally, and that, consequently, the cure is hastened by this joint means.

The remedies act rapidly, even instantaneously; this allows of trials being rapidly made, so as to determine the selection of the remedy.

But, it should be noted that, according to the different constitutions and the complication of diseases, *the sensible and clearly pronounced effects* may be, more or less, slow in showing themselves.

V. Finally the blood and the lymph, although circulating in two systems of vessels perfectly distinct, have their common origin in the laboratory of digestion, which furnishes incessantly the materials

Digitized by Google

constituting the pieces of the organization for the maintenance of life.

It results that the diseases of the lymph incroach upon the blood and *vice versa;* hence the necessity to have recourse to two or more alternated remedies to insure the cure.

External remedies, or electricities

8. I have, already, sufficently enplained the meaning attached to the words: *electric remedies, electricities.* Certain physicians, who practice science and not medicine, find, in these words, a sort of scientific profanation; for myself, who never make any question of names, I find sufficient analogy between my remedies and the mode of action of electricity on the organism. These worthy doctors know, without doubt, that the electric current has an instantaneous action; that the action of the positive pole, is not the same as the negative; that the voltaic wire applied on the extremity of a nerve, excites it directly through its whole length, and by reflection or derivation, the excitement extends throughout the whole of the organism. The doctors, who know all this, have invented words to designate the effects; they have said that the nervous system is found in an *electrotonic* state, which state the voltaic current has the power of modifying, so as to render it *catelectrotonic* or *anelectrotonic*, according to the pole that is considered. I, also, have sought for words to designate new phenomena, unknown before my time, mysterious even to myself, who discovered them. When I saw that my fluids acted with a rapidity comparable to that of electricity; when I saw them, in some cases, produce

Digitized by Google

the shock; when I' have remarked that, in touching the great sympathetic at the side of the 7th cervical vertebra, all the pneumo-gastric system was agitated; when I obtained the same effect by placing some granules of *antiscrofoloso* dry on the tongue; finally, when I observed that one of the liquids increased the tetanic contractions, whereas another removed them instantly; when I have seen all this that I describe, and more still, I said: this is *positive, negative* and *neutral electricity*, etc.

I abide, by these words, and I do not yet renounce the idea that there is something in it, which may be called *electroide* or simply *elecricity;* or, it may well be said, that, at the contact of these fluids with the surface of the organism, an electro-motive force, comparable to that which gives issue to the current in galvanic piles, developes itself. What now! have not living bodies their electric currents? And Galvani has he not proved animal electricity, which furnished to the celebrated Matteucci apparatus similar to ordinary electric piles? And, then, is electricity, at this day, so well known, that it must be believed that it is completely and entirely confined to cabinets and Leyden jars? Finally, let it be, that my *electricities* are found, really innate, in the plants from which they are extracted; let it be, that they are developed by the contact of the juice of these plants with the skin; I choose to call these extraordinary remedies, these very powerful principles: *vegetable electricities.*

9. Not wishing to tell all my secrets, obliged however, to state all that is necessary to distinguish the effects, and, above all, to avoid any mistake on the part of the practitioner, I had the electric liquids coloured *red, straw colour, green,*

Digitized by Google

blue, etc. I perceived that *this* expedient rather tended to commercial adulteration; I no longer colour them, but send them out all colourless, or nearly so, only marking on the labels: *red*, *yellow*, *green*, *blue*, and *white* electricity; names which I retain, equally, in the nomenclature of the new science.

10. The electricities are only applied, externally, in the manner which will be indicated hereafter; they are frequently all that is required, when the complaint is external, without any internal lesion or organic alteration. This is the case, with a number of pains; in these cases, it would be wrong to consider them as simple *palliatives*. In general, the electricities, properly used, give a powerful support to the treatment and cure, which, in the main, require internal remedies.

Digitized by Google

CHAPTER III

GENERAL INFORMATION ABOUT THE ELECTRO-HOMŒOPATHIC REMEDIES

11. All these remedies are extracted from non-poisonous plants, having electric properties, in the sense above declared.

They produce a gentle and instantaneous action, but generally, gradual, and of such a sort, that the sensible effects are only produced after some time; this period is, some minutes in acute affections, some days in dull chronic and slow moving maladies. In this, again, there is a resemblance between the remedy and the progress of the disease.

The instantaneous action of the remedies can be proved; let a few granules of *antiscrofoloso* be given, dry, to a person fainted away, threatened with paralysis, seized with sea-sickness, disentry, etc; the complaint will be seen to disappear instantly. It happened to me, to relieve from a state of intoxication, persons, who did not leave off drinking, merely by putting globules in their wine.

It has also happened to me to see persons to faint away, from contact with the red or yellow electricity; this happens to hysteric, convulsive and angioitic patients; this cannot always be foreseen. But 8 or 10 globules of antiscrofoloso dry have, always, instantly, arrested this effect.

It is the same, at the commencement of cholera, diphtheria, derangement of the stomach, indigestion, etc.

Digitized by Google

We have traced the differences and the points of contact between electro-homœopathy and homœopathy, properly so called. Hahnemann, the inventor of the law of similars, did not aim to combat the causes of diseases; he stopped short at the visible manifestations, and only destroyed the symptoms. Electro-homœopathy applies to the cause itself; it destroys, not only, the evil, but the germ of it also, in such a manner, that the cures, here, are real and radical; and, once relieved from his disease, man has no longer to fear either relapses, reflexions, transformations or morbid reappearances.

This superiority of electro-homœopathy depends on the active principle, contained in the medicine, a principle, in my opinion, electric, which, it pleased God to allow me to discover, producing a perfect cure. At Bologna and at Rome, there are persons, whose cure of maladies, pronounced incurable, now dates 10, 12 and 15 years; these persons have never ceased, since then, to enjoy perfect health.

Moreover, the purification of the blood, in most cases, is seen by the elimination of foreign and morbid principles, which are driven out of the frame, by abundant perspirations, by expectorations, by deposits in the urine, sometimes by the eruption of a series of boils or by diarrhœas presenting no alarming symptoms and causing no pain.

It is, especially, in the treatment of wounds, anevrisms, tumours, aches and pains, that it is well to have recourse to external remedies; bearing in mind, that under this form, although increasing the action of the internal medicine, they act as the palliatives of allopathy; therefore, it is necessary to increase the quantity, so as to augment the

Digitized by Google

effect; this is exactly the contrary to the internal remedies.

This is what I wish to make certain electro-homœopaths understand, who abide too closely to minute doses. Do not spare the globules when treatment calls for large doses: baths, unctions, compresses, to subdue an obstinate or rapidly increasing malady, are neither an *excessive extravagance* of medicines, nor a *new evolution in the application of remedies, requiring a consumption too costly for persons of small means*, as wrote the editor of the *Revue de Genève* at the publication of my new guide book; *Elettromiopatia, scienza nuova, etc. Casale Monferrato*, 1878. (See the *Revue Electro-homœopatique* da Genève 1878 n° 5, and the answer, which I addressed to the editors, dated 4th of Jnly 1878, an answer which I have had published, separately, by P Bertero, Casale Monferrato, and which these gentlemen refused to insert in the *Revue de Genève*).

Digitized by Google

CHAPTER IV

SPHERE OF ACTION OF THE REMEDIES IN GLOBULES

14. **Antiscrofolosi.** The antiscrofulous, especially the 1st and the 5th, are the most remarkable for their power and the extent of their action.

The antiscrofulous tend to annihilate the psoric, herpetic, or scrofulous principles, with which the frame, as has been stated, is more or less impregnated. The principles, naturally, never diminish, and, accumulating without cessation, finish by producing grave infirmities or premature old age. The action of the antiscrofulous, sufficiently prolonged, frees the systems from these. This is why these remedies cure ninety out of a hundred diseases; this is, moreover, the result of experience, whence it may be concluded that the greater number of complaints arise from scrofula, which is, in my opinion, hereditary lepra or syphilis.

It is, for the same reason, that the antiscrofulous prevent disease. The other remedies cut short the disease, at the onset, but they do not prevent it; at least, as far as I know, up to this time: whereas, the antiscrofulous, in purifying the psoric constitution, prevent the evil from happening.

The antiscrofulous are, therefore, the only remedies that can be taken, preventively, to ward off disease, to strengthen the health by good digestion and calm and restoring sleep, to fortify it against liability to chills, inflamations and a multitude of petty infirmities, which are often, the germ of more serious complaints.

Digitized by Google

Entire families, even populations, could protect themselves from many diseases and be regenerated by the daily use of the antiscrofulous, mixed with the food or the water at table. At London people have already begun to make sanity-bread by mixing 5 globules of antiscrofulous to each pound of meal.

Some years ago, a German prince engaged me to prepare a sanitary project or regulation to revivify the blood of his subjects, by means of electro-homœopathy. It was necessary to have an understanding with a medical celebrity, who, after having written to me respecting it, with much zeal and enthusiasm, finished by intrenching himself in a silence, from which, neither the prince nor the people, could make him issue.

15. **Anticancerosi.** These remedies display their specific action in all scrofulous complaints, arrived at the most serious stage, such as: scirrhus, tumours, etc. and which, for this reason, have shown themselves rebellious to the action of anti-scrofulous.

The cure of scirrhus and cancer is certain, as long as the essential organs of life have not been, too profoundly, attacked, or the prostration of strength, the invasion of disease and the rapidity of its progress, have not arrived to the point, where there is no longer time necessary for the remedy to purify the blood. This is what happens, especially, when the fever of absorption has set in. In these extreme cases, the certainty of cure is lost, but not the certainty of soothing, diminishing, relieving the pains and of retarding the hour of death. But it is said:

Principiis obsta, sero medicina paratur
Quum mala per longas invaluere moras.

Digitized by Google

Which is to say that the disease must be subdued at its commencement, and not to wait until the patient is dead or reduced to the impossiblity of being cured.

This is the contrary to what is generaly done; they wait until the disease is well defined, till the tumour is very large; then they cut it out or give opium to *prepare*, *not medicine*, but death. It is certainly this, with which Doctor Peter, professor of internal pathology at the University of Paris, reproaches physicians, exclaiming: *This is a crime!*

The first effect of the anticancerous is, frequently, the appearance of aggravating the disease; the reason is in the work itself of the remedy, which stirs up the depths of the frame, to expel the cancerous principles and, in some way, to separate the living particles from those which are already in a state of decomposed elements.

Sometimes, also, the good effect appears to be stationary, during the time necessary for the remedy to penetrate and saturate, so to say, the organism. But the point of saturation arrived at, the cure commences and progresses more and more rapidly. The treatment of these diseases may last months, sometimes years, more or less time according to the mischief to subdue. Particular difficulties may be presented, the disease remaining stationary; even partial relapses, but which must not discourage you; perseverance will end by prevailing, and will prevail as much as is humanly possible, because the remedies never deceive.

Once commenced, the cure of cancer must never be interrupted; it would be exposed to irreparable relapses. I say this from knowledge of the cause; let attention be paid to it.

The *anticancerous* which give the best result

Digitized by Google

in the treatment of cancer are: *anticanceroso 1*, *anticanceroso 4*, and *anticanceroso 5*.

16. **Antiangiotici.** — These remedies are the regulators and purifiers of blood; they act on the whole system of circulation, principally on the heart and its diseases.

From the reason that viciations of the blood bring corresponding viciations of the lymph and *vice versa*, it is frequently necessary, in practice, to alternate the antiangioitics with the antiscrofulous, or with the anticancerous, or with the specific remedies. Thus, when in certain changes in the sanguine system, such as varicose veins, hypertrophy of the heart, etc., congestion of the liver, is present at the same time, for which the febrifuges are specific, they must be alternated, either externally or internally, with the antiangioitics.

When the electricities otherwise indicated produce no effect, the existence of a serious change in the blood or circulation may be suspected.

In this case, compresses, unctions or baths of antiangioitics may be advantageously substituted for the electricities.

17. **Antivenereo.** — Is the specific for the cure of syphilis and all its results, even the most serious and the most remote.

It is employed, consequently, in the treatment of hereditary syphilis and the numerous maladies resulting from it. Many complaints, many scrofulous and cancerous affections have their secret source in a syphilitic heritage. In all these cases antiscrofoloso also acts as an antisyphilitic, but it will be advantageous to alternate the *antivenereo* with the antiscrofulous and the anticancerous.

Digitized by Google

Cures of syphilis, properly so called, which

do not yield to the antivenereo, should be treated by the anticancerous.

18. **Febbrifughi.** — The febrifuges are appropriate to intermittent, pernicious and inflammatory fevers, and, in general, to every sort of fever, even those simply symptomatic.

These remedies are much more certain (above all without danger) than sulphate of quinine and aconite.

Persons seized of typhoid fever, arrived at the gates of death, already given up as dead, have been brought back to life and cured by small doses of febrifuges, introduced into the mouth already locked, by means of a rag dipped in the remedy or with a teaspoon.

The febrifuges are also specifics against affections of intermittent type, neuralgia, pains, etc., and even against maladies of liver and spleen, with or without accompanying inflammation of the stomach; against congestions, indurations of the viscera, either ancient or recent.

Enormous and obstinate enlargements of the hepatic tissue I have seen banished by the febrifuges. Administered against the fever, at the beginning of an illness which is not determined, they are frequently able to arrest this, and when they cannot prevent, they certainly mitigate it.

Compresses or unctions prepared with the *febrifugo nuovo* and applied over the region of the spleen give excellent results in every class of infirmity, which ought to be sufficient to demonstrate the importance of this organ, to which the physiologists have not assigned a part. But there is more than one dark spot in classic medicine, on which light will be thrown by the effects of the new remedies. The classic divisions of diseases have no

Digitized by Google

longer a real value in many instances, as the effects of the *antiscrofulous*, point out, clearly, the common origin of many complaints apparently the most diverse.

19. **Vermifughi.** — The vermifuges are specifics against all the variety of parisitical disease: thread worms, stomach worms, tape worms, tricocephalus, etc., and all disorders caused by their presence in the intestines. Occasionally good results have been obtained from these remedies in cases of *lumbago* and even cancer.

20. **Pettorali.** — The pectorals, as their name imports, serve in diseases of the chest, the throat, the bronchial tubes and the respiratory organs generally. They are employed against cough, catarrh, inflammation of the lungs, pleurisy and pulmonary consumption.

We have already noted the elective action shown by the pectorals 1, 2, 3; (see chapter II, observation 11).

Digitized by Google

CHAPTER V

GENERAL OBSERVATIONS ON THE ELECTRIC LIQUIDS, THEIR MODE OF APPLICATION

21. These liquids are also extracted from non-poisonous plants, having powerful properties or principles which ressemble electric force. In a word, they are a class of *electroides*.

These liquids, unchangeable as all my remedies, are five in number, as we will recall, viz:

Red electricity	— having positive action.
Yellow —	— having negative action.
White —	— of which the action, in some way mixed or neutral, is always beneficial.
Blue or angioitic	— positive, but especially adapted to angioitic persons, who cannot support the red or the yellow.
Green —	— negative, especially adapted to cancerous sores.

The electricities are, generally, employed externally, sometimes in injections. The various species of electricities produce actions differing in nature, but all of equal power; a power, which is, more or less, felt by different temperaments and according to their degree of viciation.

Digitized by Google

This action is rapid, sometimes instantaneous; in rarer cases, it produces a shock, as electricity properly so called. In twenty years it has happened to me to see this singular phenomenon only 8 or 10 times, but it must also be noted that, generally, you have to do with persons who have not the habit of noticing it.

The most remarkable and most precious effect of the vegetable electricities is to sooth and, frequently, to completely take off the pain without disturbing the constitution.

22. Certain diseases, when they do not proceed from a too far advanced viciation of the lymph or the blood, are rapidly and frequently instantly cured by the application only of electricity. This is how I have cured partial tetanus by applying yellow electricity to the occiput; in the same way, by the electricities alone properly used, I have cured by hundreds, cases of amaurosis, chronic cephalalgia, rheumatism, sciatica, articular pains, and stammering from the birth in a person aged 45 years.

Science has recognized the reciprocal influence of the blood on the nerves, and the nerves on the blood. The cures by the electricities alone (which act on the nerves) demonstrate surely the influence of the nerves on the blood. The disappearance of certain nervous affections by single remedies which purify the blood, points out, on the other hand, the influence of the blood on the nerves.

I have not yet met with a single contradiction between the truths of the new art, and the truth, really such, recognized by science.

The vegetable electricities cannot alone cure constitutional maladies; for these, internal treatment is indispensable.

But even in these cases, these liquids, joined

Digitized by Google

to the internal treatment, are a powerful assistance to hasten the cure and to shorten the period of convalescence.

Health, as we have before said, is the result of a certain equilibrium between all the powers of the organism; there was some truth in the system of Brown (which has been so much abused) reducing all diseases to *sthenia* and *asthenia*. We are ill by excess, or default; health is the just medium. This is why I have found so much advantage in alternating the positive red Electricity with the negative yellow, especially in convalescence. The organic functions are thus powerfully excited in the infirm parts, by increasing at first the vital power, then withdrawing the excess of this power and bringing back the organism, in this way, to a state of equilibrium.

The suppression or at least the mitigation of pain is, already, an estimable benefit which the vegetable electricities bring to a multitude of diseases, particularly in the ulcerations of cancer, in sores and wounds of every description. If I had only found this mean of relieving suffering, should I not have had reason to thank God and to continue to proclaim it to the world?

It is particularly in the treatment of scrofulous maladies that the use of the electricities supports the action of the internal remedies and produces th ebest results.

23. **Mode of application of the electricities.** — The electricities are used either as *compresses*, by soaking a piece of linen in a few drops which are at once applied to the part indicated, or as a cupping glass by reversing the bottle holding the liquid and applying its mouth to the place where it is required to act.

Digitized by Google

The yellow electricity is only applied as cupping. The others, viz.

The Red, positive **The White**, positive **The Blue**, positive **The Green**, negative	Are employed either as compresses or as cupping.

Points of application. The points of application of the electricities are, generally, indicated by the seat of the pain or injury (contusions, wounds, sores, etc.)

In all cases, take care to touch the parts where the nerves are nearest to the skin or the pain; it is according to this rule that the plate, at the end of the volume, is drawn and which we suppose to be now before us all.

To act on the whole body, touch the occiput, the great sympathetic, along the spine each side where the nerves issue, and under the arch of the foot.

To act on the right side of the head, apply to the right temple, forehead, upper and under orbital, and root of the nose.

For the left side, choose the homologous points of this side.

For the tongue, the great and especially the small hypoglossids.

For the eyes, to the occiput, to the great sympathetic, to the sub and super orbital.

For the nose, to the root of the nose between the eyes, to the occiput, to the super and sub orbital.

For the ears, to the three little muscles behind the ear, but especially to the bottom of the ear. For this open the mouth and apply compresses of red or white electricity to the place

Digitized by Google

where the ear joins the jawbone. The positive electricities can, also, be used as gargles, but never the yellow or green.

For the arm, see the marks in the plate.

For the leg, see the plate, and also touch the sacred nerves, at the sides of the spine at the height of about 8 inches counting from the bottom, and under the arch of the foot.

To act on the bladder, the womb, etc. apply to the sacred nerves, the perineum, the pubis and the great sympathic nerve.

The seat of the pain generally indicates the point that ought to be touched, a little use will teach the rest.

The duration of the application: as cupping it varies from 3 to 30 seconds. The applications of 7, 10 and 15 seconds are usually the most efficacious; short and frequent act the best. The compresses are left untill dry, and renewed more or less often, according to the effect. The compress is prepared by moistening about a square inch of clean linen, but the dimensions and the quantity of liquid vary according to the extent of the sore or the surface of the application.

24. When it is question of a pain, commence always with the electricity; if the pain returns, join the internal treatment to the electric applications.

Usually, it is the red that is first applied; for most times, man is ill for the want of vitality, is *negative*. The red is alternated with the yellow to bring back the neutral state, health. These alternations are especially efficacious in convalescence.

When it regards a pain, always wait to see the effect of the red before going on to the yellow.

Digitized by Google

But to remove a humour, to act simply on the organism, the applications of the red and the yellow follow each other immediately.

When neither the red nor the yellow produce any effect, make compresses (specially for the head) with the white which always does good. If neither of these three act, there exists a viciation of the blood or the lymph, for, without this, one of the three would certainly have produced a result.

The blue electricity is reserved for the sanguine temperaments, which ought to be studied in advance, for sanguine temperaments, pure and invalid, may feel, from the use of the red and yellow, disturbances which, although only temporary, ought to be avoided. For these persons all the electricities are replaced by the angioitic electricity. The greatest utility of this is seen in wounds good compresses remove pain, stop the bleeding, and cicatrise *even the wounded arteries.* For the wounds very strong compresses of this electricity are necessary (1).

The *green electricity*, in compresses, is particularly suitable for calming the pain of ulcerated cancer; it is used pure, or mixed with water, according to the necessity and the effect. It is applicable to all sorts of wounds, especially for articular pains which, at the onset, it subdues in every case; it is necessary to regulate the quantity according to the constitution.

(1) In consequence of a wound in the brachial artery, which the doctor did not know how to dress, after 18 days of hœmorrhage the patient man was dying. Good compresses of blue electricity stopped the blood, and even cicatrised the artery; the man was saved. This is a fact which formerly would have appeared impossible.

Digitized by Google

CHAPTER VI

RESULTS OF EXPERIENCE

25. Prostration of strength is increased by the application of the yellow electricity; on the contrary, the red reestablishes the force, sometimes instantly, at the first touch. In a case of partial tetanus caused by a wound, the yellow electricity, applied to the occiput, the great sympathetic and injured part, immediately relaxed the tension of the nerves whereas the red had increased it.

It is on similar phenomena, constantly observed, that I base the denominations of *positive* and *negative* vegetable electricity.

In acute diseases, these electricities, properly managed, render the greatest service. Thus, in violent erysipelas of the face, applications of red electricity to the occiput, great sympathetic, forehead, and super and sub orbital nerves, aided by scrofoloso 1 internally, cause the pain, inflammation, fever and other symptoms to diseappear.

In the same manner, in stitch in the side, inflammation of the chest, pleurisy, electricity to the sympathetic and the solar plexus with scrofoloso 1 and pettorale 1, internally, overthrow the fever, oppression, pain and all the most serious symptoms.

In very acute sciatica, if electricity, applied to the sciatic and sacred nerves, does not succeed, employ unctions with the anticancerous 5 and antiangioitic 2 alternately.

Digitized by Google

In apoplexies, it is necessary to pay attention to the cause so as to select the fit electricity, because the electricities, which suit in nervous apoplexy, cannot be employed without danger in sanguine apoplexy.

The beneficial influence of the electricities, as an adjunct to the internal treatment, is seen in a sensible manner; for example, in erysipelas of the face, the eye can follow the decline of the swelling; in opthalmia, applications to the occiput, to the sympathetic, the root of the nose, the eyes, re-establish the flow of tears; the swelling and inflammation diminish. In wounds, also, the vegetable electricity promotes the flow of humours and the formation of pus.

Digitized by Google

CHAPTER VII

DOSES AND METHOD OF ADMINISTRATION OF THE REMEDIES IN GLOBULES

26. I am going to give here general indications as to the doses of the remedies: but absolute rules cannot be given, as constitutions vary infinitely; numerous exceptions may occur which must be left to individual observation.

The ordinary dose, for an internal remedy, is fixed at one globule of the first dilution, daily. The second dilution suits better in many cases, especially for women and all persons exceptionally sensitive.

In addition to the grain of the first dilutio, in certain cases, from 10 to 20 globules are given dry, either of the same or another remedy; in the last case alternating it with the remedy dissolved in water. I only give the third dilution in extremely violent cases, such as hysteria, epilepsy, typhus, etc.

Dilutions. The first dilution is obtained by dissolving a globule in a glass of drinking water; we also call it the first glass.

To make a second dilution, take a teaspoonful of the first, put it into second glass which is to be filled with pure water.

This is the second glass. The third is prepared inlike manner by taking a teaspoonful of the second glass.

The remedy is taken by teaspoonfuls in such a way as to finish the prescribed quantity in a day.

Digitized by Google

It must be remembered that the dose ought to be diminished in proportion to the gravity or violence of the disease, and that the more the dose is lessened, the more frequently the teaspoonfuls must be administered.

Thus the first dilution would be taken, for an intermittent fever, by exhausting the glass in 15 or 20 times: for typhus a teaspoonful of the second dilution would be given every 5 or 7 minutes.

27. **External use.** — The granules are used externally in different ways, namely, *baths*, *compresses, unctions and gargles.*

To medicate an ordinary bath (sweet water) dissolve a 100, 150, 200 granules in a glass, separately, then add this solution to the bath.

For *compresses* and *gargles*, dissolve 20 globules in an ordinasy glass of water.

For *unctions*, dissolve 5 granules in a little water; add a spoonful of oil or lard and mix intimately. Electricities are also used for baths and gargles. The proportion is 3 tablespoonfuls of electricity for the bath, and 8 to 10 drops for a gargle. The compresses should be renewed three times daily, or oftener according to the effect. We have no need to repeat that the external action of the granules is the same as the internal.

The doses should be increased in proportion as illness diminishes, from the reason that the remedy follows the law of similars, or let it be so, acts homœopathically.

But individual sagacity and habit must have the greatest part in regulating the larger or smaller dose required.

Here are rules drawn from experience which it will be useful to read carefully.

I. If the remedy is wrong, it has no effect; if,

Digitized by Google

on the contrary, it produces aggravation, the remedy is found, but the dose must be lessened until no aggravation is produced.

II. The effects of a remedy are not doubtful; *they are certain*, provided it be directed to a disease included within its sphere of action. Consequently, if after some spoonfuls nothing is observed, or if in spite of the diminution of the dose there is still aggravation, it may be concluded that the remedy is not specific for the malady.

III. The aggravation in such cases is temporary and not dangerous. The patient may feel it in different ways.

But, either by the diminution of the dose or the change of remedy, you can always succeed.

These are trials, inevitable preliminary experiments, which a little custom will render easy.

IV. The small doses do not decrease the action of a remedy: they only place it in proportion to the state of the patient.

To infants whilst sucking the remedy is administered to the nurse; for young children the second dilution is employed.

The necessity of taking the remedies in the low dilution and of frequently repeating the spoonfuls in grave affections, is explained by the fact that the remedies have an instantaneous action which terminates at once; therefore it must be the more frequently repeated to arrive at a satisfactory conclusion. Experience has shown that the surplus taken is so much lost for the curative effect.

V. The remedy is continued to be taken up to the time of a meal, and even during the repast; the example, before quoted, of a drunken man who going on drinking, after I had mixed the remedy with his wine, finished by becoming sober, demon-

Digitized by Google

strates that the remedies act likewise even when mixed with the food or drink.

VI. Menstruation is not a reason to discontinue the use of the remedies; on the contrary, it is the most favourable period, as they only act better at this time when the blood labours to expel morbid principles.

Only it is necessary to know that the antiangioitics, in ordinary dose, bring back suppressed menstruation, whereas, in small doses, they are specific against the opposite excess of too great an abundance of menstrual blood, and against general hœmorrhage.

VII. The only diet is a healthy and sufficient nourishment; in grave maladies powerful acids, such as vinegar and lemons, must be refrained from.

The remedies are never mixed: compresses and unctions of two different remedies ought to be made successively.

In the same way, when in complicated diseases several remedies are used, they must be given separately and successively, taking care to alternate them.

Seeing that the action of each spoonful of a remedy is of short duration, it is not strictly necessary to reserve an entire part of the day to each of these remedies that are alternated; they can be alternated by following up a spoonful of the first with one of the second, and then recommence by the first and continue with the second, and so on, at the prescribed intervals. The water of the compresses or bath, also for internal use, can be cold, tepid and more or less warm, according to one's taste. It can also be sweetened with sugar, etc.

Here are some rules by means of which, any

Digitized by Google

man, who knows how to make a diagnosis, that is to say, knows how to distinguish between a lymphatic subject and a sanguine, CAN SUITABLY ADMINISTER THESE REMEDIES.

VIII. A woman, having a cancer in the breast subject to hœmorrhages, saw them increased by having put two granules in her glass, instead of one. The accident disappeared as soon as she returned to the prescribed dose; but anxious to be cured, she again doubled the quantity; the hœmorrhage recommenced and again subsided under the influence of angioitico 2, and cancerous 1, in ordinary doses.

I have seen many similar cases which are very instructive.

For both slight and serious maladies, it is always prudent to commence by the second dilutions, so as to increase them after.

There are cases where feeble doses, the third, for example, are absolutely necessary; such are: organic diseases of the heart, epilepsy, hysteria and convulsive maladies in general.

In other cases, very large doses can be boldy used: 20 or 30 globules dry on the tongue, at the onset of cholera, generally arrest it: the same may be used in asphyxia and other affections.

Finally, there are persons whom it suits better to take eight or ten globules dry, one every hour, instead of the dilution. These are particular cases depending on differences of constitution and for which it is necessary to refer to individual observation. But, in serious maladies, it is of great importance to adhere to the prescribed doses.

Digitized by Google

CHAPTER VIII

DIAGNOSIS

After what we have so often stated in this book, we will not further insist upon the experimental principle which ought to guide the diagnosis and lead us to the selection of the specific remedy. The source of life is in the blood and the lymph; nine times out of ten, the seat of diseases, be the form what it may, is in the viciation of the lymph; once it is in the viciation of the blood, or a combined viciation, from the reciprocal effects of the two constituent elements of the organism.

As there are only these three causes of disease, there can only exist three classes of sick persons; for diagnosis, every thing is reduced to this, to know if the patient belongs to one of the three following classes:

1. Lymphatics, by far the most numerous;
2. Angioitics;
3. Combined, that belong to the two preceading classes by the junction of two viciations at the same time.

Practically, diagnosis is reduced to ascertain simply if the patient person is angioitic or not. If he is, the remedies are antiangioitics, no matter what may be the form of his disease.

The angioitic condition is easily recognized; it is particularly characterized by a florid complexion, tendancy to hœmorrhages, congestions, vertigo, palpitations, rapid pulsations in the carotids, hœmorroids, varicose veins, etc.

Digitized by Google

ıe patient has absolutely none of these
, he is *necessarily lymphatic.* The an-
ıs will be his remedy, whatever the di-
r be.

ly, by the side of some angioitic symptoms
ore, proper to the lymphatics, may be
such as tumours, enlarged glands, erup-
the skin, etc.; it is that the viciation of
co-exist with that of the lymph; it is a
malady. The remedies, therefore, are an-
ıs, and anticancerous combined with an-
s.

times one will hardly hesitate to choose
he antiscrofulous and the anticancerous.
e patient has *congestion* or *suppuration*
ands, scrofulous, gangrenous or cance-
nds, scirrhus, tumours, cancer etc., the
ifics are certainly in the series of anti-
: other remedies may aid or vary the
, but the anticancerous cannot be laid
suspended.

These are the rules that remain fixed for
y defined cases.

e are those which are not such; in the
he patient is lymphatic, or angioitic, the
ust be treated as combined.

now the constitution of a patient, it is
be acquainted with the previous state of
ı, the maladies which he may have had in
cy, in his youth, and the causes which
them. Also the health and diseases of the
nay furnish indications, for we all inherit
less of the constitution of our parents.

not difficult to distinguish between the
of the lungs and the disease of the liver;
afflictions, caused by syphilis, are not ea-

Digitized by Google

sily confounded with the disturbances occasioned by worms. For the rest, if these embarrassing cases may happen to us, it is the same for the physicians, and much more so, as, in their system, diagnosis requires so much skill that it is rare for two or three doctors to pronounce the same opinion in complicated cases, especially if they are consulted separately.

The very great advantage of electro-homœopathy is the power, when there is a doubt, to sustain for a period (which is very short) the treatment by some remedy which, although not the specific, may be the means of finding it; it will be the antiscrofulous 1 and 5 which may generally be tried in these cases.

Hesitation is more frequent in diseases of the liver and spleen and those caused by worms, particularly the tape worm, for nothing is more obscure than these maladies; physicians are deceived nearly as often as the vulgar. But the electro-homœopath can, at least, relieve himself from perplexity in these complaints, by administering the *vermifugo* internally and applying the *febbrifugo nuovo* in compresses to the hypochondria. The effects will soon shew the nature of the disease. The persistance of certain complaints is, sometimes, attached to an obscure hereditary syphilitic taint; when it may be doubtful, alternate *antivenereo* with the appropriate specific. It is a rule to follow, particularly in certain cancers, scirrhus, doubtful sores; never forgetting however that *anticanceroso* I is also specific against ancient syphilitic virus.

In this case one must be guided by the effects; if the remedies, although well selected and administered, are not successful, it is certain that it is the question of a *case properly incurable.* There are

Digitized by Google

such, and electro-homœopathy, although relieving them and extending the boundary of the possible, cannot perform the impossible. It works possible miracles by the cure of diseases, even the most cruel, pronounced incurable by allopathy; but on the condition that recourse be had to electro-homœopathic remedies before the entire mass of the blood is corrupted, or the essential organs of life seriously deranged. This is the boundary of electro-homœopathy and there also, I think, finishes the power of man.

30. Further on follows a catalogue of diseases which have been cured with my remedies, with the indication of all the modes of employing them in similar cases. This variety of means, which the *Revue électro-homœopathique* of Geneva, year 1878, n° 5, has condemned as being an *excessive extravagance of medicines*, demonstrates only one thing, namely, that the same complaint cannot always be cured by the same remedy; that which has been successful in one case, may be not so, in another, from the very simple reason, that constitutions differ, and the complications of disease are endless. No medication, let it be ever so detailed, can fix an absolute rule for every case; this would be a sort of universal remedy, which can never exist as long as there are organic irregularities in our race. The treatment of diseases would be very convenient and simple; all that I have written, here and elsewhere, would be almost useless, if the whole affair was reduced to searching, on a synoptical chart, the disease and its remedy side by side. No, it is not in this manner that I understand the affair; this is why I have placed, at the side of each disease, not one, but several means of subduing it. But, I have not said that all these means, and even those

Digitized by Google

which did not yet exist, had been employed in the treatment of patients whose cures are reported in the catalogue. It is astonishing that writers, who had deserved so well of Electro-homœopathy, who knew my discoveries by my treatises and my private correspondance, could be so much mistaken as to say in the *Revue*, that I gave the credit of the cures, obtained some years ago, to remedies which did not yet exist. The author of the criticism in n° 5 of the *Revue* had well reason to state that, *that which could cure, can still cure;* but to cure in all possible cases, it is necessary to be acquainted with all the means possible. And as I only preserve silence as regards the formula, I think it my duty to make the people acquainted with all my therapeutic resources, so that they may have the least possible need of doctors, either of the old or new school.

Digitized by Google

CHAPTER IX

EASY EXPERIMENTS FOR BEGINNERS

ımongst those who have seen Electro-ho-
at work, there are common ignorant
ıarned physicians, intelligent and unpre-
ersons belonging to all classes of society.
ignorant said; it is St Anthony!
physicians said; it is nothing!
persons of good faith said; it is very se-
s wonderful!
lerstand the doctors; I renounce their con-
ut the intelligent and unprejudiced men
all *seen;* the greater number have heard
ve read, or will read Electro-homœopathy;
need to behold and to behold it, it is
to make a trial.
, now, are experiments easy to perfom
re.
ght or ten granules of antiscrofulous, plac-
the mouth of a drunken man, render
, arrest a threatening of paralysis or a
t.
vo or three granules of the same remedy,
gue, restore an interrupted or difficult
give appetite, produce sleep, stop cramp
nach, calm the tooth ache, etc.
few spoonfuls of anticanceroso 1, second
arrest, most frequently in a moment,
the womb; and this same remedy, con-
iciently long, relieves a woman from all
ness felt before, during and after confi-

Digitized by Google

nement. The same, also, aids delivery in an interrupted labour.

4. Strong compresses of angioitic electricity remove the pain, stop the bleeding of a wound, close and cicatrise it, etc.

5. A few compresses of white electricity remove, instantly nevralgia of the head; a gargle is very often sufficient to carry off the tooth ache, although of long standing, etc.

6. A healment, continued a sufficient time with antiscrofoloso I, and applications of red electricity expel the *stone* in a sort of gruel, close ruptures, bring back the fresh colour and health in chlorotic subjects.

7. With febrifuge I, internally, and unctions over the hypochondria with the febbrifugo nuovo, one removes fevers and all diseases of the liver.

Here are little miracles which the beginners can perform to convince themselves and demonstrate electro-homœopathy; and to acquire, at the same time, confidence ad custom to manipulate the remedies, others can also be selected in the list of maladies which follows.

32. It is very generally thought that it is necessary to have confidence, *faith*, to feel the good effects of the remedies; the allopaths say that, in homœopathy, it is every thing. It is not of medicine that it is written: *Faith alone is sufficient.* Is it faith or confidence that cures the suckling in giving the medicine to the nurse only? What faith can a man have, dead drunk, a person fainted away, a madman, etc., whose revival to life, however, is not less certain, or prompt? There is no absurdity that has not been said by these men who have eyes and yet see not. Without doubt, confidence is necessary, not for the effect of the remedy, but to

Digitized by Google

follow out the prescriptions in a serious manner. Faith is especially necessary to beginners, not to add a few grains more in the glass, seeing how small they are; confidence is necessary to persevere the proper time, to avoid the temptation of making a quicker cure with strong doses. Confidence is only necessary at the commencement; after it has been *seen*, conviction and certitude are acquired.

It is now to recommend every person who begins, not to commence whith desperate or extremely difficult cases, which might well be amidst the number of those that are impossible. A check for a beginner, especially in difficult cases, certainly does not overthrow the remedies, but it may discourage the novice and expose him to the jests of those persons who find it always more convenient to ridicule than to conscientiously examine new truths It does not require a long time to acquire tact and custom, to render oneself acquainted with the remedies; then one can treat difficult cases with success. Facility and simplicity is not the least prize of this medicine, born and made for the people.

The catalogue of diseases which follows is made so that every man, if he wishes it, may become his own physician; *medicus esto tibi*, according to the proverb of the school I of Salerno.

Finally, to facilitate this to the people, we borrow, from that excellent little book: *The People's Physician*, by doctor Mure, a short popular instruction designed to make known the organs contained in the abdomen and the thorax, which will be useful for the practice of electro-homœopathy.

33. A person of a regular constitution, standing upright, placing the hands, naturally open, on the sides of the belly, the thumbs, directed backwards, towards the vertebral column, the other

Digitized by Google

fingers to the front and opened, the palm of the hands resting on the flanks, the internal edge (the lower in this position) resting on the bones of the hip, the index fingers touching the ribs; we have, in contact with the thumbs, the external edges and the upper extremities of the loins.

The stomach is between the two index fingers, the right index corresponds to the right lobe of the liver and the gall bladder, the left covers the spleen, and extends to the spot where the false ribs cover the left lobe of the liver.

Between the points of the two middle fingers is the transversal colon, that of the right covers the ascending colon, that of the left the descending colon. The little finger of the right hand rests on the cœcum, and the left on the iliac S of the colon. Between the ascending transversal and descending colon and the pubis, is the mass of the small bowels and their adjuncts.

Behind the pubis, is the bladder which is raised above it when full. Behind the bladder is the rectum and between these, in woman, is the uterus. In a woman, the ovaries are under the little fingers, but, during pregnancy, the enlargement of the womb changes all this. The same may be said of over fat persons, swollen or dropsical. This description is only exact for persons of an ordinary constitution.

The organs contained in the chest are more easy to recognize. On each side are the lungs, each enveloped in a serous membrane, called the pleura, like a sort of sack. Between these and a little to the left, is the heart, the point of which beats between the sixth and seventh rib.

Digitized by Google

Digitized by Google

CATALOGUE OF DISEASES

CURED BY ELECTRO-HOMŒOPATHY

with the indication
of all remedies suitable in similar cases

Preliminary and important observations

I. I have arranged the diseases in alphabetical order, to facilitate the search, without taking into account the fundamental principle of electro-homœopathy, that: *every disease is* lymphatic, angioitic or combined. At the side of each disease and its varieties, I have placed the treatment by one or more remedies and their modes of application.

II. It must once more be remembered that: *the remedy which has been successful in a case, may not infallibly cure in all possible cases.* Hence the necessity of indicating, not only one, but a series of medicines for each disease.

III. It is always understood that to practise electro-homœopathy it is necessary to become thoroughly versed in the preceeding principles and rules; afterwards, the catalogue may be consulted with advantage, and, in it, every one can discern the treatment suitable to each individual case.

IV. With the exception of particular cases, clearly defined, in which individual judgment may recommend some variations, the treatment should always be commenced with the first remedy indica-

Digitized by Google

ted in the catalogue. When experience (which may last some minutes or days) has proved that the first remedy is not sufficient, recourse must be had to following ones.

V. The diseases, here reported, have been cured by my remedies; but I report neither the number of cases, nor the different forms, nor the age, name, and rank of persons treated at Bologna, Rome, Rochetta and in foreign countries. All these details can be found in my pamphlet: *Un poco di storia sui rimedii Mattei.*

VI. For the method of preparing the dilutions, baths, compresses, unctions, gargles, either with the globules or with the vegetable electricities, refer to chapter V, for the electricities, and chapter VII for the globules. Finally, for sake of brevity, I adopt some abridged notations, simple and convenient, and with which the reader should render himself familiar.

Digitized by Google

Digitized by Google

ted in the catalogue. When experience (which may last some minutes or days) has proved that the first remedy is not sufficient, recourse must be had to following ones.

V. The diseases, here reported, have been cured by my remedies; but I report neither the number of cases, nor the different forms, nor the age, name, and rank of persons treated at Bologna, Rome, Rochetta and in foreign countries. All these details can be found in my pamphlet: *Un poco di storia sui rimedii Mattei.*

VI. For the method of preparing the dilutions, baths, compresses, unctions, gargles, either with the globules or with the vegetable electricities, refer to chapter V, for the electricities, and chapter VII for the globules. Finally, for sake of brevity, I adopt some abridged notations, simple and convenient, and with which the reader should render himself familiar.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

CATALOGUE

OF DISEASES CURED BY ELECTRO-HOMŒOPATHY

with the indication

of the remedies suitable for curing them

A

1. **Abcess.** — *Boils*, A collection of pus formed at the expense of the surrounding soft tissues. — Commences with a swelling.
   A^2 II. C. II. S. baths medicated with C^5. El. R. «—» El. Y. to the corresponding nerves.
   a. *In the breast:* see n° 1, and article *Breast.*
   b. *In the leg:* see n° 1, also El. R., El. Y. or El. W. alternated.
   c. *Syphilitic:* see n° 1, also Ven. d. f.
   d. *In the skull:* see n° 1, c., also El. R. «—» El. Y. to the occiput and sympathetic, unct. of C^5 to the part affected.
2. **Abdomen.** — *Affections of the belly.*
   a. *Ascites:* dropsy, effusion of the serous surface of the belly.
   SII. d. f. El. R. «—» El. Y. to the sympath. and occ. If from the blood viciation. $A.^2$ If originated from the liver: F. d. f. unct. of F^2 to the hypocond.

Digitized by Google

b. *Enteritis:* intestinal inflammation.

Sii. d. f. or Cii. Baths of C^5. El. R. «—» El. Y. to the symp; unct. of C^5 to the abdomen. Comp. El. W. to the abdomen. 20 gr. C^5.

c. *Mesenteritis:* inflammation and tubercules of the mesenteric glands.

C. d. f. Baths of C^5 El. W. to the symp. Comp. El. W. to the belly. 20 gr. of C^5; unct. of C^5 to the abdomen.

d. *Intestinal consumption.*

S. A. Baths of C^5; unct. of C^5 to the belly. El. W. to the symp.; compr. El. W. to the belly. 20 g. C^5; comp. C^5. Baths of S. — S^5 and A^2.

e. *Peritonitis:* Inflammation of the peritoneum or envelope of the bowels; it may be symptomatic or essential. Treatment as n° 2, d.

f. *Twisting of the bowels* (colic so called) see d.

g. *Morbid obesity:* see d; also El. R. «—» El. Y. to the occ., the symp. and the solar plexus; also baths of S., baths of A. unct. F^2 to the hypoc. unct. of C^5 to the hypoc. unct. of C^5 to the head.

h. *Enteralgia:* nervous colic.

Sii d. f. 20 g. of S. Baths of C^5. Baths of S. El. W. to the symp. unct. of C^5 to the symp.

i. *Ascites* proceeding from alterations in the mesenteric glands.

Cii d. f. El. W. to the symp., plex. sol., occ. 10 g. C^5, Baths of C^5 or S. or A^2. Unct. of C^5 to the parts more affected.

Digitized by Google

l. *Pancreatitis:* inflammation of the pancreas (gland of the abdomen).
SII, El. R. and El. Y. to the symp. Baths of C^5 or S. Unct. of C^5 to the part affected.

m. *False pregnancy:* CII, Baths of C^5 El. R. «—» El. Y. to the sacred nerves and to the symp. 10 g. C^5.

n. *Interrupted labour:* see m.

o. *Alterations of the womb* in general: pains, whites, difficult labours, falling down of, and every cause which deranges a woman in this respect is caused by teh viciation of the lymph. C. compr. or injections of C^5. El. R. «—» El. Y. to the sacred and crural nerves; baths of C^5 or even comp, of C. Baths of S or A^2.

p. *Amenorrhœa* caused by cold after confinement, see o.

3. **Acne.** — Isolated pustules, pointed, most frequently developed on the shoulders and breast bone, followed after disquamation by purplish spots, etc., two varieties are *acne rosacea* affecting the face, and *mentagra* the chin.
SII. AII. d. f. C, d. f. Baths of C^5, of S, of A^2, of S^5. Comp. of. C^5.

4. **Adenites.** — See *glands.*

5. **Alba dolens.** — See articles *blood*, *veins*, *phlebitis.*

6. **Albuminuria.** — See *urine.*

7. **Alopecia.** — Baldness, see *hair.*

8. **Amaurosis.** — See *eyes.*

9. **Amenorrhœa.** — See n° 2, o and article *menses.*

Digitized by Google

10. **Amygdaloid.** — Swelling of the amygdales, pimple hardness of these glands. (Tonsitar angina).

S. A. Gargles with these remedies (20 gr. every glass of water). Garg. of El. R. or El. W. or El. A. Baths of C^5. Compr. of C^5 externally.

Id. If cronic, the same treatment.

11. **Anasarca.** — See *Soft swellings.*
12. **Anœmia.** — Poverty of blood. A. S. baths of A^2, compr. A^2. unct. A^2. over the region of the heart. See *green sickness.*
13. **Aneurism.** — See *heart.*
14. **Angina.** — See *throat.*
15. **Angina pectoris.** — Neuralgia of the heart, characterized by sudden, acute and short pain, with anguish, feeble pulse, etc.

A. A^2. S. Some dry granules of S., compr. of A^2. slight applications over the heart with El. A. See *heart, neuralgia.*

16. **Angioitis.** — Inflammation of the sanguine *vascular* system (greek *angios*, vessel) with erysipelas, eruptions, etc. A. A^2II. C^5II. Baths of C^5. El. A. Baths of A^2.
17. **Antidotes.** — Against the use of a wrong remedy is the same remedy, at the 2nd or 3rd dilution. As a general rule, reduce it 1 or 2 degrees lower than that which caused the disturbance. Against excess of a remedy, lemonjuice or vinegar.
18. **Anthrax.** — See *Carbuncle, Boils.*
19. **Anus.** — See *rectum*, (bottom of).
20. **Aphonia.** — Loss of the voice, see *voice.*
21. **Appetite.** — Loss of. S. d. f. El. R. «—» El. Y. to the pit of the stomach. Baths of C^5.

Digitized by Google

22. **Apoplexy.** — Commences by: falling unconscious, face injected, laborious respiration. — At other times, the attack is preceeded by violent pains in the head, or paralysis, at once, strikes half the body.

S. A^2. C. Try, here, all the electricities to the occ., symp., plex. sol. to all the nerves of the legs and arms. Baths, unct. of C^5. Baths of A^2. Baths medicated with El. W.

When the attack is followed by paralysis, repeat the electric applications; persist with S. A. El. R. El. Y. or El. A. to the occ., symp., plex. sol. Baths, unct. of C^5. or better C. internally with Baths of S. and A^2.

23. **Aphtous.** — Ulceration of the mouth. Little whitish ulcerations on the membrane of the mouth or alimentary canal.

S. A^2. C^5. The same in gargles (20 gr. in a glass of water). Baths of C^5.

24. **Artrhitis.** — S. d. f. 20 gr. of S. Baths of C^5. comp. of A^2. over the heart. unct. of F^2. to the hypoc. comp. of C^5. to the hypoc. Baths of S.

25. **Arm.** — Atrophy of the arm with rheumatism. El. R. El. Y. to the occ. to the symp., plex. sol., bracheal nerves. Baths, unct. of C^5. or baths and unct. of S. or baths and unct. of. A^2. to the part. Comp. of. El. W.

a. *Paralysis* of arm as n° 25.
b. *Displacing nerve* of arm, see n° 25.
c. *Pains preventing* movement of arm, see n° 25, but generally El. R. is sufficient.

Digitized by Google

d. *Numbness* of arm, as n° 25, also A. internally.

e. *Inertia* of the hands and arms: see n° 25, frequently removed by El. R. alone.

f. *Semi-ancylosis* of the elbow and wrist: (see n° 25) also unct. of C^5, or S. or A^2, to the part affected.

26. **Articular** pains. — C. A^2. Baths of C^5. El. G. unct. over the region of the heart, of A^2, or of C^5. or unct. of F^2, to the hypoc. Verm. internally.

27. **Articulations.** — Rickets, richety children. S. C. A. d. f. Baths, unct of C^5. Baths of S. El. R. «—» El. Y. «—» El. A. to the symp., to plex. sol., to the occ.

28. **Ascarides.** — See *worms.*

29. **Ascitis.** — See *abdomen.*

30. **Asphyxia.** — S. d. f., or 20 gr. of S., or 20 gr. of A., all at once on the tongue, El. R. «—» El. Y. to the symp., plex. sol., occ. Baths of C^5. unct. of the same on the pit of the stomach, and over all the head.

Suffocation from drowning. S. d. f. El. R. «—» El. Y. to the occ. symp., to the temples, to the pit of the stomach. Baths of C^5. unct. of the same to the pit of the stomach; comp. *ibid* of C^5, 20 gr. of C^5. or 20 gr. of A^2.

31. **Asthma.** — Spasmodic uneasiness of the chest, with yawning, oppression, abundant urines etc.

S. d. f. A. d. f. If the origin is nervous, El. R. to the pit of the stomach, symp. and. plex. sol.; if it is vascular, El. A. to the same places.

Digitized by Google

Baths of C^5, unct. of C^5, to the symp. If the chest is attacked, P. alternated with the preceeding.

a. *Catarrhal asthma* as n° 31, in addition P^3II. d. f.

b. *Asthma* with *arterial hœmorrhage.* AII. A^2II. d. f. Baths of C^5, A^2, comp. A^2. over the heart.

c. *An asthma* of 2 years standing, removed by a single application of El. R. to the pit of the stomach.

d. *Nervous asthma*, of 10 years standing, cured by SII. d. f., and El. R.

e. *Catarrhal asthma* of many years, SII. d. f. P^3., Baths of C^5. unct. of A^2.

32. **Atrophy.** — General or partial of a limb. S. C^5, A^2. Baths of C^5, of S. of A^2. 10 g. of C^5., unct. of F^5., to the hypoc, El. R. «—» El. Y. «—» El. A. to the occ., symp., plex. sol. and nerves of the affected member. Baths of El. W. Unct. of C^5 to the hypoc. — The cures are numerous and very remarkable of cases of atrophy, some congenital, treated and cured in advanced life.

33. **Aversion** to milk. — (in infants, suckling.) Give the nurse S. For the infant unct. to the hypoc. of C^5.

B

34. **Beard** (loss of). — S. 20 gr. of C^5. unct. of same or of S. to parts, C. d. f. When of syphilitic origin, Ven. d. f. Baths of

Digitized by Google

C^5. unct. of the same. Baths of S., unct. of Ven.

35. **Belly.** — See *abdomen.*

36. **Bladder.** — *Gravel*, compare *Loins.* SII. A^2II. d. f. baths of C^5., unct. to the hypoc. of F^2. Baths of S., of A^2. compr. of El. W. to the pubis, perineum, sacred nerves. El. R. «—» El. Y. to the symp., occ., plex. sol., loins, sacred nerves, unct. of C^2, of S. of A^2. to the pubis.

a. *Cystitis*, inflammation, and other bladder diseases, (see n° 36).

b. *Paralysis* of bladder, (see n° 36) also injections of El. W.

c. *Wetting the bed.* Retention of urine, voiding drop by drop, (see b.)

d. *Catarrh* of bladder (see n° 36).

e. *Polypus* of bladder C. and C^5., and as in n° 36, and in same manner for other bladder affections.

Under the influence of our remedies the stone, if calcareus, is dissolved and voided as a gruel, ash coloured, after 20 or 30 days treatment. If the stone is of another nature it requires a longer period, but afterwards passes under the form a reddish gruel.

37. **Blennorrahgia.** — See *Womb.*

38. **Blennorrhœa.** — See *Urethra*, *Womb*, *Vaginatis.*

39. **Blindness.** — See *Eyes.*

40. **Blood.** — All diseases of the blood, properly called, are caused first by excess, or rather by an abnormal flow of blood towards one point of the economy, to the detriment of the others. Second, by

Digitized by Google

want or poverty of the blood. Congestion is the result in both cases, but it is *active*, or there is active hyperhœmia in the case of excess; it is *passive*, or there is passive hyperhœmia in the want either of the blood or circulation. In the first, there is congestion properly called (of the lungs, of the brain, etc.;) in the second case, an obstruction, sanguine *stagnation* (of the lungs, heart, liver, etc., varicose veins, anœemia, green sickness, etc.)

The maladies, arising from excess of blood, should be treated with small doses, second and third dilutions of angioitics and compresses over the heart, made with 2 granules to a spoonful of water of A or A^2. The diseases, arising from want of blood or slowness of circulation, ought to be treated with AII. or A^2II. and CII., which it is often necessary to alternate. These diseases are, essentially, the result of a viciation of the lymph; this is why the antiangioitics should be alternated with the anticancerous.

Special diseases proceeding, either from excess or want of blood, are indicated, with their treatment, in my catalogue, under their respective names.

41. **Boils and predisposition to abscesses.**

S. «—» A. El. R. «—» El. Y. to the occ., symp. unct. to the affected part of C^5. Baths of. S.

a. *On lower eyelids:* El. R. «—» El. Y. to the part affected, unct. C^5. or S. or A^2. Comp. of S. or A^2.

Digitized by Google

b. *On upper eyelids:* as above, also unct. or compr. of S^5.

42. **Bowels.** — Flatulence of, rumbling noise of: — (see *stomach*).

43. **Bowels** (diseases of). — Sii. d. f. Cii. d. f. C^5. d. f. unct. of C^5. to the abdomen. Baths, comp., unct. of C^5. of S. Pass lightly some drops of. El. W. with the hand over the abdomen. El. R. «—» El. Y. to the symp., occ., plex., sol., pit of the stomach.

a. Intestinal *consumption.* Cii. d. f. (see 43).

b. *Mesentiritis* (see a).

c. *Tubercles* of mesenteric gland (see a), also 20 gr. of C. or C^5. daily, alternating the dry granules with the diluted remedies.

d. *Polypus of the Bowels.* C. d. f. C^5. d. f. S. d. f. Baths of C^5., S., A^2., S^5.
El. R. «—» El. Y. to pit of the stomach, symp. and bottom of the spine. Unct. of C^5. or S. El. W. to affected parts.

e. *Strangulation* of the bowels. S. d. f. El. R. «—» El. Y. to the symp., plex. sol. Baths, unct., compr. of C^5. or S. Comp. El. W., 20 gr. of. C^2. and compr. of A^2. to the part.

f. *Weakness* of bowels. S. d. f. Baths of C^5. of S., of A^2. compr. of El. W. El. R. «—» El. Y. to the symp., plex. sol. and the sides of the spine. 28 gr. of C^5. or of S^5.

g. *Colic* of bowels (see f) and *Colics.* N. 70.

h. *Rumbling noise of bowels* (see f).

i. *Periodical inflammation of bowels:* F^2. d. f., 20 gr. of C^5. (see f).

Digitized by Google

44. **Bones, articulations.** — (See *Nodes*).
45. **Brain** (softening of). — See also *Rickets.* Unct. to the whole of the head of C^5. A^2. and S^5.
46. **Breast.** — Diseases of breast, mastite, congestion of breast. CII. C^2II. d. f. El. W. to plex. sol. and symp., baths of C^5. C. S^5. El. R. to plex. sol. and to symp.
    a. *Abscess* of breast, arrested by CII. «—» A^2II. d. f.
    b. *Craked nipple*, S. C^5. unct., compr., baths of C^5. S. S^5. Comp. El. W. or El. R. S^2. d. f. compr. of S^5. or C^5. Ven. d. f.
    c. *Inflammation of the nipple* (See above. b.)
    d. *Chapped nipples* (See b.), but first apply CII. d. f. compr. and unct. of same.
    e. *Loss of milk* caused by sudden anger. Cure of a woman aged 26 years. — In general give C^2. d. f. El. R. to the symp., plex. sol. C^5. d. f. Baths of C^5.
    f. *Secretion of milk at an anormal period.* Galactorrhœa. See *Milk, flow of.*
47. **Breath**, (fetidity of). — See *Mouth.*
48. **Bronchitis.** — See *Lungs.*
49. **Bubo.** — See *Syphilis.*
50. **Burns** and **Scalds.** — Grave, with sores, as n° 25, see also *wounds gangrenous.*
51. **Buzzing** in the ears. — See *Ears.*

C

52. **Calculus.** — See *Bladder, Loins.*
53. **Cancer** and *Scirrhus.* — This serious and hitherto incurable disease, is characterized: 1st. by the evolution of *cancerous*

Digitized by Google

tissue, in one or many parts of the economy; 2nd by the easy reproduction of affections which have been removed or destroyed; 3rd by the frequent development of a special class of cachexy. The *cancerous tissue* is a morbid product without analogy, organized, extending, by the disorganization and trasformation of the surrounding tissues, into its own substance, and ulcerating indefinitely. (Jousset). I have stated, during 20 years, *the radical cure of cancer:* the doctors, saving some honourable exceptions, continue to kill persons, affected with cancer, by opium.

There will be found, in my pamphlets, especially in: *Un poco di storia sui rimedi Mattei*, numerous proofs of the fact that I here assert; there will, also, be found curious anecdotes of doctors who hold on to opium and obstinately refuse to work miracles by the anti-cancerous of electro-homœopathy. Their conduct merits to be exposed to the public, who will end by judging the men, whose mission it is to cure.

Treatment. C. or C^4. or C^5. — A. or A^2; baths of C^5. compr. of C^5. unct. of C^5, to the part — Baths, unct., compr. of A^2. Baths of S. or S^5. — El. R. «—» El. Y. to the corresponding nerves.

When there is a wound: EL. G. or. EL. W. or unct. C^5., unct. of F^2. to the hypoc. also baths medicated by the white, green. red, or angioitic electricities.

a. *Cancer* of the stomach: as n° 53.

Digitized by Google

b. *Cancer* of the bowels: as n° 53.
c. » of the tongue: as n° 53; also, gargles of C., of A., of El. W. of C^5. of C^4, of S.
d. » of the eyelids: as n° 53., also comp. of El. W. and unct. of S.
e. » of the nose: as n° 53., also inhalations of C. of A, of El. W. or El. G. unct. of C^5, or of S., or of S^5, or A^2, to the exterior surface of the nose.
f. » of the breast: as n° 53.
g. » of the womb: as n° 53., also injections of C. of A^2. El. W. or El. G. and unct. of C^5. to the pubis and sacred nerves. El. R. and El. Y. to the sacred nerves. 20 gr. of C^5.
h. » of the anus: as n° 53.
i. » of the lips: as n° 53, generally it is detached and comes away, in a single piece, when the remedy has sufficiently penetrated.
l. » of the Pylorus; as n° 53. (1).

(1) Extract of the *Osservatore romano:*

« Onorevole sig. conte Mattei,

« Dopo le sofferenze tollerate per vari anni nello stomaco, e nei legamenti uterini, attenuate sempre coll' uso dei dolcificanti, nutritivi, tonici e bagni marini, nello scorcio del perduto anno, i professori riconobbero una durezza che non fece dubitare di uno scirro nel piloro.

« Tale era lo stato della mia consorte, allorchè nel passato Febbraro preceduto dalla fama delle cure da lei intraprese con eccellenti risultamenti, Ella trovavasi in Roma. Pregato da me si compiacque di visitare l' inferma, e di assicurarla che fra non molto usando dei rimedi che Ella avrebbe apprestato sarebbe tornata all' antica buona salute.

Digitized by Google

m. *Cancer* fungous tumour of the breast; treated as n° 53, g. A tumour of this class at the left of the breast, operated on, already several times, with very fetid suppuration, frequent hœmorrhage, shooting pains, etc. has been seen to come away in fragments.

n. » *ulcerated cancer of the Vulva:* treated as n° 53 g.

o. » fistulous ulcers of the anus: treated as n° 53 g.

Madame Albine Masotti, afflicted with cancer of the womb, was under treatment during 8 years, in three hospitals of Bologna, without result. I cured her in 14 months; no reappearance of disease 12 years after. She is still alive.

« Ciò si è verificato col cessare delle sofferenze nello stomaco e nell'utero; le funzioni digestive si fanno regolarmente, ed anche l'aspetto esteriore dimostra che tutto sia bene incamminato ad una perfetta guarigione.

« Se Ella con un disinteresse che non ha esempio non mi vietasse di misurare la mia riconoscenza col beneficio ricevuto, avrei saputo come manifestarle la mia gratitudine; ma giacchè ciò non mi è dato, aggradisca che colla presente possa esprimerle nel modo più ingenuo quanto colla mia consorte le debbo per l'opera, e pel felice effetto che ne è risultato: del che avremo eterna memoria.

« Riceva, onorevole sig. Conte, con questa testimonianza alla quale mi permetto di dare pubblicità, le attestazioni della mia distinta stima.

« *Roma*, 7 *Luglio 1869*.

« *Dev.mo obb.mo serv.*

« Giovanni Chiassi. »

Digitized by Google

Remarks. — The larger the wound, the greater the difficulty of cure; at too advanced a stage, it becomes frequently impossible and the remedies can only sooth it. But, on the other hand, why allow the disease to develop itself? I understand that the classic routine was obliged to allow its development and growth, in order to be able to amputate it: but it does nothing to ward off the evil during the time that it is yet curable.

54. **Cancer** or **chancre syphilitic.** — See *syphilis.*

55. **Caries of the bones.** — Follow the treatment n° 53.

At this moment, a *new remedy*, appearing to have a very special action on caries, is undergoing trial.

a. *Of the teeth* (decayed teeth), as n° 53., also gargles with the internal remedies there mentioned, and unct, of C^5 to the jaws.

b. *Of the bones of the nose*, as n° 53., also inhalations of C. and C^5. unct. of C^5. to the diseased part.

56. **Carbuncle.** — See *Antrax*, or *malignant pustules.* C. d. f. compr. of C. or C^5. or onct. Baths of C^5, or baths, unct. comp. of S. comp. A^2. El. R. and El. Y. to the corresponding nerves, S.

If not stopped, death will follow in the course of 24 hours.

57. **Catalepsy.** — El. R. to the occ. and symp. dissipates it in a few seconds; if it persists C. II. d. f. Baths, unct. of C^5. to occ. Baths of El. W.

Digitized by Google

58. **Cataract.** — See *eyes.*
59. **Catarrh.** — See *lungs.*
60. **Cauliflowers.** — See *Tumour*, the word condylomata.
61. **Cephalagy, meningitis.** — See *head, brain.*
62. **Change of life.** — S. II. d. f. see also *womb. menses.*
63. **Chill.** — Taking. cold, and its consequences. Arrest the fever by F. unct. of C^5. to the hypoc. comp. to the head of El. W. El. R. «—» El. Y. to the occ. and symp. S. II. d. f. 20 gr. of C^5 baths of C^5.
    a. *Stiff nek.* El. R. «—» El. Y. to the nerve, comp. El. W. unct. of S. of A^2. Comp. Baths, unct. of C^5. S.
64. **Chicken pox.** — See *fevers.*
65. **Chilblains.** — Can be generally dispersed with S. or 20 gr. of S. or unct. of C^5 Baths or comp. of C^5. Baths, comp., unct. of S. or comp. El. R. or El. W. unct. of F^2 to the hypoc.
66. **Chlorosis.** — See *anemia, green sickness.*
67. **Cholera.** — Preservative, in time of an epidemic: 20 gr. of S. during the day. At the onset, 20 gr. at once of S. dry, or S. d. f. El. R. El. Y. to the occ. and especially to pit of the stomach and the symp.

    If the disease is obstinate, baths of C^5. or A^2 or El. W.

    Consequences of cholera. S. d. f. El. R. «—» El. Y. to the occ., symp., plex, sol. Baths of C^5. A^2 of S. Comp. F^2 to the hypoc.
68. **Chorea.** See *St-Vitus's dance.*
69. **Colds in the head.** — S. d. f. unct. comp. of S. C^5 or baths of C^5.

Digitized by Google

The predisposition to take cold disappears with the prolonged use of antiscrofoloso.

For stopping in the nose, touch the base of the nose with El. R. — See also *Chills*.

70. **Colics.** — S. d. f. or 20 gr. of S. El. R. «—» El. Y. to pit of the stomach, to the symp. Baths of C^5 unct. of C^5 to pit of the stomach, C^5 or 10 gr. C^5 unct. and comp. of F^2 to the pit of the stomach.

71. **Coma.** — See *lethargy*.

72. **Commotion of the brain.** — See *head*.

73. **Condylomata.** — See *tumours*.

74. **Congestions of all kinds, either of glands or tissues**; C. II. d. f. Baths of C^5., or C^5. II. d. f. Baths of El. R., El. R. «—» El. Y. to the corresponding nerves. Baths of C.

Congestion of the liver or spleen, F. II. d. f. or 10 g. of the same. Unct. of F^2. or C^5. or F. to the hypoc. Baths of C^5. El. R. «—» El. Y. to plex. sol. symp., occ., hypoc. Baths of A^2.

75. **Congestion of blood vessels with constipation.** — See *Frost-bitten*, also unct. to the whole of the head and face with C^5 comp. Baths and unct. of A^2

76. **Contraction of the hand** from wounding the nerve. S. d. f. El. R. «—» El. Y. to the nerves of the hand. Bath, unct., compr., of C^5. Unct. or compr. of S. or El. W.

77. **Contraction** of the nerves of the whole body. They are won generally by El. R. to

Digitized by Google

the symp. occ., plex. sol. Baths of C^5. which may be alternated by baths of El. W.

78. **Convulsions.** — According to the case whether they proceed from worms, itch, or defective circulation, they are treated with: Verm. II. S. II. or C^5. II. A II. to be taken frequently.

a. *During summer*, as n° 78, also baths C^5.

b. *From fright*, S. II. El. R. to the symp.

c. *Convulsive movements.* Baths of C^5. S. II. El. R. «—» El. Y. Baths of El. W.

d. *Convulsions* and *germs* of insanity; treated as c.

e. *Convulsions* with itching of the nose. Verm. II. Baths of C^5. Unct. of F^2. to the hypoc. Baths of El. W.

f. *Convulsions* from alteration in the sympathetic nerve; from fright; treated as c. relieved by a single application of El. R.

g. *Nervous alterations* from the effects of carbonic acid gas. — As letter c.

h. *Convulsions* left by cholera, treated as c. also unct. of A^2. to the region of the heart. Unct. or compr. of F^2. to the hypoc. or baths of S.

i. *Convulsions* during the menses: A^2. III. and baths of C^5. or of A^2.

79. **Corns of the feet.** — S. C^5. Unct., or baths, or compr. of C^5. Unct. of S. compr. of El. R., or El. W.

80. **Coryza.** — Cold in the head; S. unct. of C^5. to the head, baths of the same, unct. of S. El. R. «—» El. Y. to the occ. symp. El. W. It has been cured with a few granules of S. or C^5.

Digitized by Google

81. **Coxalgia.** — See *Hips.*

82. **Cough.** — See *Lungs.*

83. **Cramp of the stomach.** — Often removed instantly by giving 10 gr. of S. dry, at once, in a single dose. El. R., El. Y, to the symp., plex. sol., occ.

a. *Menstrual cramp:* as 81, also El. A. A. II. compr. of A^2. to the painful part and over the heart.

b. *Of the legs:* cured by unct of C^5. or baths, compr. of C^5. S. C^3. comp. of El. W.

c. *Of the back of the head:* El. R. «—» El. Y. to the occ. or unct, of C^5. of S. of A^2. El. W.

d. *Of the hands* (writers cramp). Unct. of C^5. or of S., El. W. (see letter c).

e. *In the nerve of the heel:* El. R. removes this instantly, (see d.). In case of returns, baths of C^5.

84. **Croup.** — Cases have been cured, in a few minutes, by gargles of El. R. or El. W. «—» El. Y. to the occ., little hypoglosses. F. II. unct. of F^2. or C^5. to the hypoc. or baths or C^5. S. P. gargles of El. W.

85. **Crust of Milk.** — Give the nurse S, or 20 gr. of C^5. Unct. of C^5. to the affected part.

86. **Cystites.** — See *Bladder.*

87. **Cutaneous diseases.** — Eruptions on the skin of a thousand varieties. S. A. C^5. S^5. El. R. «—» El. Y. to the symp., occ., plex. sol. or baths, unct. and comp. of C^5. S. S^5. or A^2. Compr. or unct. either of C^5, or F^2. to the hypoc. But the most efficacious is generally the bath of C^5.

Digitized by Google

a. *Eruptions* which reappeared during 16 years cured by the means indicated.
b. The same for eruptions on the lower part of the abdomen.
c. Also, Impetigo on the face in a man 25 years of age.
d. *Herpes with severe angioitis;* as n° 87; but the antiangioitics and El. A. are preferable.
e. *Herpes furfuracea* on the head: as n° 87. persist with unct. of C^5. and of S.
f. *Squamous eruption* over the entire body; baths of C^5. of S. 20 gr. of C. or of C^5. (see n° 87).
g. *Exanthema* of the hands, as letter e.
h. *Eruptions* with thread worms: add to the treatment n° 87. a *vermifuge* at 1st dilution.

D

88. **Deafness** and difficulty of hearing.

If the cause is nervous: S. C^5. d. f. unct. to the entire ear of C^5., of S. El. R. in the ear. Baths of S^5. El. R. «—» El. Y. to the occ., symp., at the back and root of the ear by opening the mouth. Compr. of El. W. to all the nerves of the ear.

If the origin is congestive A. A^2. d. f. compr., unct. of A^2. to the ear. Baths of A^2. of C^5. of El. A. compr. of El. A. to the ear, unct. of A^2. to the heart.

a. **Deafness** of 30 years standing cured by El. R. alone.

Digitized by Google

b. *Ditto*, of 30 years cured with A. alone internally and externally.

c. *Ditto*, of 8 years with S. alone internally and externally.

d. *Ditto*, complete and chronic cured with C^5. internally and externally.

89. **Debility in general.** — S. Baths of C^5. El. R. «—» El. Y. to the symp., plex. sol., occ., and all the nerves of the face and body A. By these means have been treated: weakness of the hand, following a fracture; weakness of the arm, of the sight, of the brain, bowels, debility from prolonged lactation, etc.

This treatment should be followed, for all debility in general, saving possible variations in the application of the electricities to the affected nerves, variations which must be left to individual judgment.

90. **Delirium.** — See *fevers*.

91. **Delirium tremens** from drunkenness. — Same treatment as indicated for *debility* n° 89. But employ preferably the antiscrofulous.

92. **Derbyshire neck.** — See *glands*.

93. **Diabetes.** — Abundant secretion of sugary urine, accompanied with a peculiar cachexy, characterized by tendancy to formation of tubercles and to gangrene. S. C. A. Baths of C^5. or A^2. El. R. El. Y. or El. A. to symp., plex. sol., occ., and sides of the spine. Unct. of C^5. or F^2. to the hypoc. Bath of S., 20 gr. of S^5. See also *urine*.

94. **Diarrhœa, dyssentery.** — If there is no blood: S. or 20 gr. of S. Baths of S. El. R. «—» El. Y. to the symp., to pit

Digitized by Google

of the stomach, and plex. sol. Baths of C^5.

If there is blood: A. or 20 gr. of A, A^2. first dilution, or El. A. to the pit of the stomach. unct. of C^5. to the symp. or of F^2. to the hypoc. Baths, unct. of A^2. to the region of the heart, Baths of C^5.

95. **Digestion** difficult. — Dyspepsia. — S. or 20 gr. of S. or baths of C^5. El. R. to the pit of the stomach.

More numerous or more certain results cannot be found.

96. **Dysmenorrhœa.** — See *menses.*

97. **Dyspepsia.** — See *digestion.*

98. **Dysentery.** — See *diarrhœa.*

99. **Dysuria.** — See *urine, bladder.*

100. **Drowning.** Recovery from. — See *Asphyxia.*

101. **Dropsy.** — Attention must be paid to the cause, and the treatment modified accordingly.

Of the womb. C. III d. f. compr. of C^5.

Of the abdomen. F. III. d. f. compr. of F^2. to the hypoc. El. W. to plex. sol., sym. occ.

Of the heart. A^2. III. d. f. comp. of A^2. (2 granules) to the heart.

Baths of C^5. S^5. S. El. R. «—» El. Y. to plex. sol. symp.

a. *Dropsy in general,* n° 101. Persist strongly with the electricities to the occ. symp. plex. sol., unct. of F^2. to the hypoc. also of C^5. F. II. d. f. S. II. d. f. or C. II. d. f. or A^2. d. f.

Digitized by Google

E

102. **Ears** (Deseases of). — Ear-ache. — S. S^5. C. A^2. d. f. unct. comp. to the ears of C^5. S. A^2. Comp. of El. W. to the entire ear. El. R. El. Y. to the little muscles which are behind the ear and to the root of the ear, at its junction with the jaw, (by opening the mouth). Baths of C^5. S. A^2. El. W. in the ear.

a. *Otitis*, inflammation of the ear, as 102.

b. *Otorrhœa*, discharge from the ear, as 102.

c. *Otorrhœa*, with toothache, as n° 102.
And unct. comp. of C^5. to the painful point externally.

d. *Dysecia*, weakness of hearing, as n° 102.

e. *With congestion:* A. or A^2 d. f. Baths, unct., comp. of A^2. El. A. or El. W. to the entire ear.

f. *Noises or buzzing in the ear:* El. A. to the occ. symp., to the muscles behind the ear, to the root of the ear (in opening the mouth) a few drops of El. A. if there is congestion, or as n° 102, if not congested.

g. *Hemorrhage* from the ear, AII. or A^2 II. d. f. comp. of. A. or A^2. to the heart. El. A. to the occ., symp., and slight application over the heart. Comp., unct., baths of A^2. It has also been relieved by S. C. C^5., the last especially. Unct., comp. (to the heart) and baths of C^5.

h. *Inflammation* of the salivary glands under the ear (parotiditis) C.II. C^5. d. f. 20 gr.

Digitized by Google

of C^5. Unct., compr. of C^5, to the affected part, Baths, unct. of C^5. to the hypoc. El. W. in compr. El. R. «—» El. Y. around the swelling.

i. *Polypus in the auditory canal:* El. W. in the ear, with 20 gr. of C^5. Baths. unct. compr. of C^5. Injections in the ear of C^5. C. d. f. El. R. in the ear and applied to the three little muscles behind, or injections of S^5. or S. or A^2.

l. *Spasms in the ear:* El. R. or El. W. in compresses, (see n° 102).

m. *Otorrhœa* caused by suppression of milk: cured with S. and. compresses of the same.

103. **Ecchymosis of the Eyes.** — (Black Eye) A. A^2, compresses of C^5. El. A. to the occ., to super and sub orbital nerves; to symp. unct. of A^2. Baths or compresses of El. W.

104. **Ecthyma.** — Large roundish pustules. — (See *cutaneous diseases*).

105. **Eclamsis.** — Convulsions, trismus, shrink of the teeth. Sii. d. f. unct of S. to the jawbones. El. Y. to the occ: symp. to the masseter, to sub-orbit.

106. **Eczema.** — Hot, burning pustules. S. A. unct., baths, comp. C^5, or unct., baths, comp. of S^5. El. R. «—» El. Y. to the symp., occ., plex. sol. Baths of S. or unct. of C^5. to the hypoc., compr. of El. W.

107. **Elephantiasis.** — Disease of the lymphatic vessels, accompanied with swelling of the lower extremities, commencing at the groin, and extending progressively

Digitized by Google

until the leg, monstrously enlarged, effaces the jutting out of the foot.

C. S. A. A^2. C^5. Baths, unct., comp. of C^5. or S^5. or S. Compr. El. G. or of R. or Y. or of C., El. R. «—» El. Y. to the corresponding nerves, and to symp., occ., plex. sol., or baths unct., comp. of A^2. Unct. and comp. of F^2. to the hypoc.

A woman, aged 60 years, suffering from Elephantiasis of the left leg, was cured with these compresses only.

108. **Epilepsy.** — A nervous disease, manifesting itself by convulsive movements, and complete loss of sense and hearing.

It is not always easy to recognize the cause, therefore it is better to regard the probable causes, viz; *the circulation*, *worms* or *scrofula* and to treat it in consequence. A, or A^2. verm: S. or C, *the third dilulion*, *of which 10 teaspoonfuls will be given daily*. The fits are not announced, but symptoms of uneasiness and vertigo, sometimes precede them. After the fits, stupor.

109. **Epistaxis.** Bleeding from the nose, A. or A^2. d. f. generally arrest it. If the internal remedies do not suffice, employ inhalations of A. or A^2. or baths, or unct... comp. over the heart of this same remedy.

110. **Eruptions.** — See *Fevers*.

111. **Erysipelus.** — El. R. to the occ. at the onset., frequently averts an attak, SII or 5 g. of the same. S^5. comp. or baths of C^5.

Digitized by Google

a. If the complaint returns, persist with El. R. to the occ., to the sub orbital. When the face is attacked, to the super orbital, to the symp. comp. El. W. or El. R. «—» El. Y. to the face.

b. Phlegmonous erysipelus in right arm with vertigo. AII. A^2II. baths of C^5. or of A^2. comp. of El. W. or A.

c. Periodical erysipelus. F. «—» A., baths of C^5. unct. of F^2. to the hypoc. comp. of El. W. baths, unct., comp. of A^2.

d. Erysipelus with œdema in leg. see c., also unct. of A^2. baths of C^5. persist with these two last.

112. **Excoriations severe of the penis.** — Ven. compr. baths of C^5. or S. or baths, unct. comp. of S. comp. El. R. El. R. «—» El. Y. to sacred nerves.

113. **Excressences fleshy.** — Compare *Tumours* letter a. and *Syphilis*, if it is a question of syphilitic vegetation. Apart from these cases treat with S. C^5. compr. or unct. of C^5. or of S. or A^2. baths of S^5.

114. **Eyes. Sight.** — Affections of the sight.

a. *Weakness of the sight*, or ambliopia. This is frequently the beginning of amaurosis. El. R. to the occ., to sub and super orbitals with S. or A. d. f. 20 gr. of C^5. compr. to the entire head of El. W. unct., compr. to the head of C^5., baths of C^5. unct. of S. or A^3. to the sub and super orbitals. El. R. «—» El. Y. to occ., symp., sub and super orbitals, forehead, root of nose. Baths of A^2. S. or El. W.

b. *Opthalmia*, or disease of the eye. In opthal-

Digitized by Google

mia a powerful resource is found in electricities, applied to the occiput, to the sympathetic, the sub and super orbital nerves, the base of the nose, the forehead and temples. The remedies indicated at the commencement of the number apply to opthalmia whether *catarrhal granular, vascular, congestive, etc.*

For syphilitic opthalmia: Ven. II. d. f., baths, compr. and onct. with Ven. and other remedies as n° 114. The cures already effected of all classes of opthalmia are innumerable. Many were recently cured with *antiscrofoloso nuovo or 2.*

Instantaneous results are not rare here. In cases where the disease is obstinate it is necessary to attack it, in preference, with the anticancerous, among which C, C^4. C^5. succeed the best.

c. *Cataract.* — Formation of opaque membranes which cover the organ of sight. Remedies indicated above, and more, persist with baths of C^5. S. A^2. unction of the same to the whole head, and of F^2. or C^5. to the hypoc.

N. B. — When the cataract commences to fall off, which happens after 30 er 40 days of treatment, the eyes must be shaded from the light exactly the same as after the operation.

d. *Staphyloma*, vulgarly *Grapes* from the resemblance. — Transparent or opaque tumour formed either on the cornea, the sclerotic, or on the iris; it is a scrofulous product as well as cataract. Follow treatment indicated n° 114 at letter c., not

Digitized by Google

forgetting unct. of F^2. to the hypoc. During the night may be applied, advantageously, to the closed eye, compr. of S. or C^5. A^2. S^5. C. and A.

In a shorter or longer period, according to the humour to combat, the cornea is cleansed and recovers its transparency.

e. *Venereal staphyloma.* — Ven. compr. of Ven. on the closed eye. (See d).

f. *Specks in the cornea.* — (See d).

g. *Hemorrhage of the eyes.* AII. A^2II. d. f. unct. to the head of A^2. of C^5., baths of C^5. El. A. to occ., symp. and all the nerves of the head. Unct. of F^2. or C^5. to the hypoc.

h. *Strabismus, squinting.* — See n° 114, I once cured it by a single application of red electricity.

i. *Ecchymoses.* — (See this word).

j. *Small tumours at edge of eyelids.* — (See 114).

k. *Bleared eyes.* — See n° 114. and besides comp. on the closed eye with A. or A^2. and the white or angioitic electricities.

l. *Albinos:* Inability to support the light. Sometimes it is sufficient to once apply El. R. to occ., to symp., sub. and super orbital., forehead; also well to use El. R. «—» El. Y., to points aforesaid. Compr. to the head of El. W. or unct. of. C^5. S. or A^2. (See 114).

m. *Amaurosis*, dimness of vision: as l. Cures are known of cases arrived at almost total blindness.

n. *Indistinct vision:* cured by a single application of El. R.

Digitized by Google

o. *Shortness of sight:* and almost loss, (the patient not distinguishing objects) consequence of percussion, disease of 3 years standing: man aged 78 years cured by first application of El. R. to sub. and super orbitals.

p. *Eyes burnt by lunar caustic.*

Compr. of El. W., S. internally. Compr. of C^5. and other remedies above indicated.

Also cured by these means; eye displaced from its orbit by syphilis.

Eye displaced by an enormous staphyloma. Chronic ophtalmia of 27 years.

Cornea split. Retraction of the eye.

Sight troubled during 27 years.

Loss of sight during the night. Ophtalmia complicated with cataract. A complete cataract on the right eye, and one half formed on the left eye of same individual. Weakness of the eyes. Case of complete blindness, etc. There is enough to fill a book if all the cures were enumerated.

115. **Eyelids.** — Inflammation of: Sii. Cii. Aii. d. f. compresses of these remedies, of El. W. and El. R. «—» El. Y. to the occ., symp., sub and super orbitals, forehead and base of nose. Baths, unct., compr. of C.

a. *Paralysis of:* n° 115. Comp. of El. R. to the eyelids.

b. When there is severe inflammation, baths of C^5. S. and A. repeated.

c. *Spasms of, with vertigo:* A. ii.. A^2. ii. C^2. d. f. compr. of these remedies to super

Digitized by Google

orbital, El. W. to occ., symp. and sub orbitals.

F

116. **Face.** — Rheumatic pains of. El. R «—» El. Y. or compr. El. W.; unct., compr., or baths of C^5. unct. of S. or S^5. S. 20 gr. C^5. Aн. d. f.

a. *Congestive pains of* (caused by flow of blood to the head) A^2н. unct. to the entire head of C^5. or A^2. Compresses with A. or A^2. over the region of the heart (5 gr. every spoonful of water).

b. *Paralysis of:* — See *Paralysis.*

c. *Inflammatory tubercles* on the face. S. C^5. unct., compr. Baths of C^5. of S. Baths of S^5. El. R. «—» El. Y. to symp., plex. sol., occ., sub orbital; unct. C^5. to the hypoc.

d. *Lupus.* — First shows itself as livid, solitary and indolent tubercles followed by purulent ulcers, etc. It appears to attack the face in preference.

C. C^5. A^2. comp., baths of C^5. or S. comp. of El. W. El. R. «—» El. Y. to the symp., occ., sub and super orbital, to base of nose, temples and forehead. Unct. of C^5. or F^2. to the hypoc. but especially baths and compr. of C^5.

e. *Impetigo of the face:* chronic eruption of pustules, more or less close together, the summit of which soon suppurates forming large crusts, scattered or united; treatment as letter d.

Digitized by Google

f. *Acne of the nose:* as letter: e.

g. *Blemishes of the face:* (liver spot.) F. unct or compr. of F^2. or F. to the hypoc. or C^5. El. R. «—» El. Y. to the occ. and all the nerves of the face.

h. *Permanent erysipelus of the face*, cured: See d.

117. **Fainting Fits.** — Arrested with 10 gr. S. given all at once dry on the tongue.

118. **Falling sickness.** — See *epilepsy.*

119. **Favus.** — See *Scald head.*

120. **Feet,** — (Excessive perspiration of.) S. A. Baths of C^5. S. A^2. of El. W. unct. of F^2. to the hypoc. El. R. «—» El. Y. to the symp., plex. sol. occ., and nerves of the legs.

a. *Contusion of the foot* of 8 years standing cured by El. R. alone. See 120.

b. *Pain in the instep* caused by bone out of place. See 120.

c. *Swelling of foot:* S. A^2. d. f. El. W. baths of C^5. S. A^2. El. R. «—» El. Y. to the nerves of the foot, especially under the hollow of the foot.

121. **Fevers.** — All fevers are treated by F. internally and F^2. to the hypocondra in compresses on unctions.

The more violent the fever, the more the remedy should be diluted, and the more dilute, the more frequently it must be given, for instance, a teaspoonful every five minutes if possible.

Electricities may also be applied to the occiput, alternating the red with the yellow; the white may also be employed alone.

Digitized by Google

Sometimes, fever is only the result of defect in the circulation, or change in the blood. The angioitics, in restoring the blood to its normal condition, counteract fever; reciprocally the febrifuges, which are always beneficial in cases of fever from any cause, act in restoring the normal circulation.

a. *Typhoid fever*. F. III. d. f. unct. to the hypoc. of F. or C^5.

Nervous fever. F. II. d. f. alternate unct. to the hypoc. of F^2. C^5.

Mucous fever. F. II. d. f. alternate unct. to the hypoc. of F^2. C^5.

Bilious fever. F. II. d. f. alternate unct. to the hypoc. of F^2. C^5.

Catarrhal fever. F. d. f. alternate unct. of F^2. C^5. and P^3. II. El. R. to symp. plex. sol. and sides of the seventh vertebra.

Milk fever. PII. «—» CII. d. f.

b. *Intermittent fever*. F. 1st dilution.

Begin to take it, in 10 or 15 times, during the day, whilst the fever is not present and continue afterwards.

Pernicious fever: FII. d. f. unct. of F^2. to the hypoc. or, better still, of F.

Inflammatory fever in general: FII. d. f.

Feverish symptoms of short duration: F. unct. to the hypoc. of F. and C^5.

Scarlatina: F. «—» S. will facilitate the eruption; the same apply to all eruptive fevers, nettle-rash, measles, miliary fever, small pox, etc.

In some cases white electricity to

Digitized by Google

the occ. does good. Eruptions that have reentered are treated and cured by scrofoloso 1st dilution alone.

c. The consequences left by fevers, cachexy, debility, exhaustion, etc. are cured by S. d. f. unct. of F^2. to the hypoc. baths of C^5. El. R. «—» E. Y. to all the nerves. unct. of C^5. to the hypoc.

122. **Fistula.** — Originating in scrofula, treated with anti-scrofulous and anti-cancerous, comp. or baths of C^5. baths of S. A^2 El. R. «—» El. Y. to the corresponding nerves.

a. *Fistula sitting.* See 122. comp. of C^5.

b. *Fistula of the anus.* S. baths, comp., unct. of. C^5 comp. of El. W. of A^2.

c. *Fistula stercorous* of the right groin.
Of seven years standing cured as n° 122, but continually baths of C^5.

d. Cure also of 20 fistulas of the anus and scrotum in a man of 48 years. — S. C. C^5. Baths and unctions as indicated n° 122, and also c.

e. *Fistula of the gum,* C. «—» A^2. gargle of C^5. of C. of El. W. unct. of C^5. to the exterior of the jaw.

123. **Fluxion in the cheek.** — I. compr. unct. baths of C^5. El. R. «—» El. Y. to sub-orb., masetter, occ. El. W. to sub-orb. It ordinairily yields to some electric applications.

124. **Fluxion of the breast.** — See. *doins.*

125. **Fractures.** — Even complicated. S.II. compr., unct., baths of S. or C^5. or S^5. Compr. of El. A; El. R. «—» El. Y. to the corresponding nerves. El. W.

Digitized by Google

126. **Frost bites.** — Blue colour of the face caused by cold. A. A^2. El. A. to occ. symp. Baths unct, or comp. of A^2. to the face, or baths of C^5. and unct of F^2 to the hypoc. 20 gr. of C^5.

a. With perpetual chill: S. El. R. «—» El. Y. Baths of C^5. or S. unct of F^2. to the hypoc. Baths of El. W. or of S^5.

b. *Foot frozen and twisted*: treatment as preceeding.

c. Man, frozen by falling into a well and remaining there during the night, was cured by these means.

127. **Furoncles.** — See *Boils*.

G

128. **Galactorrhœa.** — See *Milk*.

129. **Ganglionitis.** — Inflammation of the lymphatic ganglions; little knots in the course of the nerves and lymphatic vessels, formed by the interlacing of ligaments united by the cellular tissue. Ch. C^5.II. 10 gr. of C. Baths, unct., comp. of C^5. El. R. «—» El. Y. to the corresponding nerves. Comp. of. El. W. or. S, or A^2.

130. **Gangrene** C.II d. f. C^5. or 20 gr. of C^5. Baths, unct., compr. of C^5. Baths of S. El. R. «—» El. Y. to corresponding nerves. Compr. of El. W. or El. G. unct. of S^5.

Numerous cases of gangrene have been cured by this treatment. Humid gangrene from gunshot wounds, gangrene of extremities caused by dropsy, gan-

Digitized by Google

grene of foot resulting from a wound and which it was decided to amputate; another case where the foot was already black; gangrene following an ancient amputation of the arm, etc.

131. **Gastralgia. Gastritis.** — See *stomach*, A.

132. **Generation** (organs of). — Spermatorrhœa. Sii. Cii. Aii. d. f. El. R. «—» El. Y. to the sacred nerves, to perineum, pubis, occ., symp.; baths, unct. (to sacrum, pubis, perineum) of C^5. S. unct. of A^2 to the above mentioned parts. Baths of El. W. 20 gr. of C^5.

133. **Glands.** — Adenitis or inflammation of the glands; also little fleshy tumours, hard, indolent, without alteration of the colour of the skin, developed on the course of the tendons. Tumours vulgarly called ganglions.

The remedies, indicated here, apply to adonitis, which is alteration of the glands properly so called, also to the tumours above mentioned.

C. S. C^5. and Aii alternated with remedies indicated n° 129. Baths, unct., compr. of C^5 or S. comp. El. W. El. R. «—» El. Y. to the corresponding nerves.

a. *Mesenteric glands* Cii d. f. see n° 133.

b. *Fatty congestion* of the whole glandular and vascular system (leprosy). Cii d. f. 20 gr. of C^5. A^2. «—» Cii d. f. See n.° 133.

c. *Tyroid gland.* (When on the throat). 133, also: El. R. «—» El. Y. to the base of the gland, comp. El. W. unct. of C^5 or of S.

Digitized by Google

d. *Parotid glands.* Inflammation of the sal vary glands under the ear. Cu d. comp. gargles of C^5. El. R. «—» El. Y to corresponding nerves, A.

e. Swollen *glands* of the neck, not suppura ting: see n° 133. Comp. El. A. El. W

134. **Gonorrhœa.** — See *Syphilis.*

135. **Gout, Arthritis.** — Acute: S. or S^2 or S^5 in 2nd dilution. A^2 u Baths, unct., comp of C^5 or S. S^5 unct of F^2 to the hypoc or C^5 comp. El. W. El. R. «—» El. Y to the occ., symp., plex. sol. to th painful nerves. But especially baths o C^5 or El. W. (two spoonfuls in the bath or else 20 gr. C. or C^5.

a. *Chronic* as n° 135, but given at the 1st di lution.

b. *Hand contracted by the gout.* as 135 treat ed especially by external means.

136. **Gravel.** — See *Bladder.*

137. **Green sickness** (Chlorosis anemia) espe cially shown by the lips, gums and ton gue, A. C. d. f. S. 20 gr. of C^5. gargle of El. W. Et. R. to the symp., occ. plex. sol. Baths of A^2, onct. of F^2 to the hypoc.

Other symptoms of chlorosis are head aches with palpitations of the heart, swelling of the legs, suppression or abnormal state of the menses, sadness, tears, anxiety, peevishness. A.u. C. C^5 d. f. com. or unct. to the heart of A^2. or baths of A^2. El. W. to occ., symp., plex. sol.

138. **Gums** (Disorders of the).

S. C. A^2. C^5 or 10 gr. of 5^5: gargles

Digitized by Google

with all these remedies or with El. R. El. W. or El. A.

H

139. **Hair** (Loss of). S. A. Baths of C^5 unct., comp. of C^5 to the head. baths, unct. compr. of S. El. R. «—» El. Y. to occ., symp., to little hypoglossids, to super orbital. and temples. Wash the head with El. W.

140. **Hœmorrhage** of all kinds. Arrested by the angioitics, alternated sometimes with SII. CII. d. f. El. A. or. W.

a. (Of the womb) AII or A^2 II d. f. comp. to the heart of A. or A^2. Baths, unct., comp. of A^2 Baths of C^5 unct. of F^2 to the hypoc.

141. **Head.** — The points selected to act on the whole of the head with the electricities, are: the occiput, little hypoglossids, temples, sub and super orbitals, forehead and base of the nose. Touch also the two sides of the seventh cervical vertebra.

a. *Cephalagia.* — *Headache.* — El. W. to occ., little hypogl. seventh cervical vertebra. Moisten lightly the head with El. W. Unct. to head and neck of C^5 S. A^2 El. R. to little hypogl. El. R. «—» El. Y. to the occ., temples, symp. El. R. or El. A. to the entire head.

b. If the headache is congestive: El. A. to the points above indicated; compr., unct. of A^2 to the head and neck; baths of A^2.

Digitized by Google

unct. F^2 to the hypoc. com
to the region of the heart.

c. If proceeding from derangement
tions of the womb: CII d. f.
C^5 to the head. Baths of C.
C^5. El. W. to the arch of th

d. *Congestive face-ache.* See b.

e. *Encephalitis,* S.II d. f. See a.

f. *Menengitis, acute Cephalo-mene*
flammation of the covering of
CII d. f. and see: e.

g. *Hydrocephalus* or *dropsy of t*
A^2.II d. f. If tubercles exist (
b. for the rest.
For infants suckling give th
A^2. d. f. to the infant the re
dicated letter b.

h. *Tubercles of the brain,* C.II
compr. of El. W. unct., compr
and baths of C^5 or S. compr.
C. El. R. «—» El. Y. to c
and all the nerves of the he
compr. to the hypoc. of C^5
compr. to the head of A^2.

i. *Softening of the brain.* See h.

j. *Commotion of the brain.* S. A.
see h.

k. *Headache* and other pains in the
curring periodically. F. d. f
hypoc. of F^2 and C^5. see also
I have already stated tha
brifuges are specific in ever
periodical disease.

l. *Ordinary headache* is removed by
tricities alone: El. R. «—»
occ., symp., compr. of El. W.

Digitized by Google

m. *Weariness*, fatigue of the head. See l.: S. internally and baths, unct., compr. of S. of C^5. baths of El. W. or El. R.

n. A cephalalgia declared incurable, accompanied with torpor, was removed by a single application of El. W. to the sub and super orbitals.

Another case of 8 month's standing, cured instantly. Pain caused by tubercles in the brain removed by El. R. alone.

Idem caused by excess of brain work.

o. *Hemicrania*, caused by congestion; baths, unct., compr. of A^2. El. A. to the corresponding nerves. Unct., comp., baths of C^5. AII. or A^2II, d. f. unct. to the heart of A^2 unct. or comp. of. F^2 to the hypoc.

p. *Effusion of the brain*, following on malignant fever.

S. Baths of S. C. internally, unct., compr. of S. C^5.; baths of C^5. comp. of El. W. El. R. «—» El. Y. to occ., symp.; comp. to the head of El. R. A. internally with comp. of El. A. to the head.

q. *Rheumatismal Cephalalgia of the left side.*

S. A. unct., comp. baths of C^5 unct. of S. A^2. comp. of El. W. El. R. «—» El. Y. to occ., symp.; unct. of S^5, comp. El. A.

r. *Shooting pains in the head*, El. W. (repeat the applications) and S. internally, unct of S. C. internally and comp. of same. Unct., comp., baths of C^5.

s. *Neuralgia of the head* proceeding from cold.

Digitized by Google

El. W. El. R. «—» El. Y. baths, u
to the head of C^5 unct. of S; A^2, ba
of S.

t. *Chronic pains of the head and stom*
El. R. «—» El. Y. to symp., pit of s
mach, plex, sol., occ. El. W. to sa
places, of S. internally with unct.
same to pit of stomach and forehe
Baths of C^5, unct. of same to pit
stomach and forehead, comp. of same

v. *Neuralgia of the head* with stitch in
side. S. d. f. El. W. to all the ner
of the head, or unct. of S. Baths
S. C^5. and A^2. El. R. «—» El. Y.
occ., symp., plex. sol., unct. of F^2 or
the hypoc.

142. **Heart.** — The study of diseases of the hea
involves an extended knowledge of p
thology. For me, the different shades
these maladies have very little utili
in the administration of the medicin
It is sufficient to know that the hea
is diseased, which can be recogniz
by the following symptoms: vertigo, pa
pitation, irregular pulsation of the hea
pain in the left side, shortness of breat
oppression, varicose veins, piles, swellin
of the lower extremities, etc. Treatmen
A_{II}. $A^2{}_{II}$. C_{II}. Baths of A^2. comp., un
of A^2. Baths of C^5. Comp. of S^5. or F
to the hypoc. — Compr. with granul
of A^2 or A to heart. Moisten the ha
with El. A. and pass it lightly over t
region of the heart.

If weight exists in the left side
bilious vomiting, add F_{II} alternately wi
the preceeding.

Digitized by Google

External treatment holds the first rank in heart diseases. Take care that the applications indicated are made on the point the most compromised, for example: the aorta and the carotid arteries. The treatment as described is *certain* in every class of disorder. In some cases 20 gr. of A. or A^2. produce a better effect. The greater part of pains proceeding from defective circulation yield to this treatment; these are those which resist the antiscrofulous and red, yellow and white electricities.

Spitting of blood, wounds with hemorrhage, etc., treated the same. (See also *wounds*).

143. **Hernia.** — Rupture; El. W., R. or A. to the rupture S. «—» A^2. Baths unct., compr. of C^5, or S. 20 gr. of C^5.

The compresses can be arranged round the circle of the rupture.

144. **Herpes.** — See *Cutaneous diseases.*

145. **Hip.** Accidental Coxalgia. S. and compr. of El. R. or W. to the hip, or 20 gr. of C^5. or baths, unct., compr. of S. or C^5. or S^5.

a. *Spontaneous Coxalgia;* See 149 also 10 gr. of C^4. 10 gr. of A^2. El. A.

146 **Hooping Cough.** — A.III. d. f. Baths of C^5. and unct. A^2. to the heart. El. A. to symp., plex. sol., or else the *Pettorali:* or again CIII. if there is superabundance of lymph. or C^5.III., or baths of El. W.

147. **Horaseness.** — P. d. f. C^5. d. f. S. d. f. gargles of El. R. or W. and with the

Digitized by Google

three first remedies. El. R. «—» El. Y
to occ., to great and small hypoglossid
Baths of C^5.

148. **Humours Cold.** — S. C. C^5. C^4. Baths
C^5. of S. of A^2. El. R. «—» El. Y. t
the symp., occ., plex. sol. El. W.

149. **Hydrocele.** — Tumour of the Testicle. S
C. C^5. C^4. Baths of $C.^5$ S. and A^2. Comp
of. C^5. El. R. «—» El. Y. to the symp
occ., plex. sol. El. W.

150. **Hydrocephalus.** — As 149. also unct.
C^5. to the whole head.

151. **Hypocondria.** — See *Insanity.*

152. **Hydropericardium.** — (Compare heart
CIII or A^2.III. d. f. Unct to the hea
of A. or A^2. with 2. gr. of remedy eac
spoonful of oil. Baths of C^5. unct. to th
hypoc. of. C^5. or F^2. El. A.

153. **Hydrophobia.** — *Canine Madness;* I hav
not quoted any cure, never having ha
any occasion to treat a case. But I thin
that this species of poisoning may b
subdued as well as others. I indicat
the remedies for those who may happe
to have to try them. S. El. R. «—» E
Y. to symp., occ., plex. sol. and pit
the stomach.

154. **Hysteria.** — C. II d. f. S.III d. f. or fo
angioitic patients A.II d. f. baths of C

I

155. **Impetigo.** — Chronic eruption of pustule
more or less separated, of which th
summit suppurates forming a roughish
yellowish crust scattered or united.

Digitized by Google

S.II. d. f. A. d. f. Baths, compr., unct. to the face of C^5. S. unct. of F^2. to the hypoc. 20 gr. C^5. El. R. «—» El.Y. to occ., symp. and all the nerves of the face.

156. **Impotence.** — General prostration. El. R. «—» El. Y. to pit of stomach, symp., occ. S. Baths (3 spoonfuls) of El. W. or R., or A. 20 gr. of. C^5. or 10 gr. of C^4.

157. **Indigestion.** — An interrupted digestion is restored by a few granules of S. dry on the tongue, if the symptoms are grave, here give as many as 20; if needed, afterwards the first dilution of scrofoloso in frequent doses. In serious cases, and especially to avoid the consequences, El. R. «—» El. Y. to pit of stomach, and plex. sol, or even baths of C^5. or S.

158. **Influenza**, at onset. treatment as in *throat.* Letters c. d.

159. **Insanity.** — Generally treated by S.II d. f. and baths of C^5.

Insanity not arising from any organic defect is *certainly* cured by the *scrofolosi* or (in women) by the *cancerosi*, and the *angioitici*, or the *vermifughi.*

In women the organs of reproduction, of which C. is the specific, exercise a great influence.

a. *Furious insanity* S.III d. f. A^2.III d. f. baths of C^5. El. W. to occ, and symp.

b. Same of 3 years standing, with accesses of fury, see a.

c. Same with loss of speech, see a. also: unct. of C^5. and comp. of El. W. to great and little hypoglossids.

Digitized by Google

d. Woman aged 29 years, cured by sm
(3rd dilution) of C. and El. R. «
Y. to occ., symp., and unct. (
back of neck.

e. Same after confinement. Cm d. f.
«—» El. Y to occ., symp. Batl
unct. of same to sacred nerves
cations of El. W. to same nerv

f. *Melancholy*: (Woman aged 24.) cure

g. *Melancholy:* (Woman aged 57.) S
El. R. «—» El. Y. to pit of s
occ. compr. of. C^5. or El. W.
of neck.

h. *Hypocondria.* Sn. d. f. and Fn d.
of F^2. to the hypoc. and bath
El. R. «—» El. Y. to plex. sol.
compr. of. El. W. to the hypoc.

i *Nymphomania:* Cm d. f. Baths of C
C^5. or El, W. to the sacred ne

l. *Paroxysms of fury:* (Man aged 3
Sn. Baths of C^5. El. W. to occ.

m. *Idiocy with deafness.* See i.

n. *Imbecility* (woman) C. Baths of C^5.
of El, W. to sacred nerves. El.
Y. to occ., symp., plex. sol. and
nerves of the head.

o. *Monomania:* see a; but for women
instead of S.

p. *General weakness* of mind and body
Numerous cures of insanity, hy
dria, monomania have been mad
ages and in both sexes. The cur
insane! This is really a discover
greatest importance.

160. **Insolation.** See *Sunstroke.*

161. **Itch.** — Sn. Cn, A^2 u. d. f. Baths o

Digitized by Google

S. El. R. «—» El. Y. to occ., symp., plex. sol. Unct. of F^2. or C^5 to the hypoc. Baths of El. W. or of A^2.

162. **Intermittence** (of pains and fevers).
Fii. d. f. unct. of F^2. or C^5. to the hypoc. El. R. «—» El. Y. to symp., occ., plex. sol. Baths of C^5 or S.

163. **Intoxication.** — 10 grains of S. at once dry on the tongue.
a. *Habitual intoxication* and consequences. S ii. d. f. S. A^2 ii. d. f. Compr. of F^2. to the hypoc. compr. A. to the heart. El. W. to symp. plex. sol. Baths, unct. (to the hypoc.) of C^5. El. R. «—» El. Y. to occ., symp. 20 gr. of C^5.

164. **Itching.** See *Itch.*

J

165. **Jaundice.** — Fii. d. f. unct. of F^2. to the hypoc. Baths of C^5. El. A. to symp., plex. sol. El. R. «—» El. Y. to occ., symp. El. W.

K

166. **King' s-evil.** — See *scrofula*, *humours cold.*

167. **Knee.** — White swelling of. — Internal treatment as n° 138. Externally: unct. baths, compr. of C^5., S. or S^5., but especially C. internally and externally. El. R. «—» El. Y. to the corresponding nerves; also El. W.
a. *If painful:* El. G. unct. compr. of C^5, of El. W. or El. A.

Digitized by Google

b. *Periodical Rheumatism* of: Fii. unct. F^2. to the hypoc. In general treat gout. See *Gout*.

L

168. **Laughing convulsive.** — El. R. «— El. Y. to the symp. occ. plex. sol. S d. f. Baths of. C^5.

169. **Legs.** — (Œdema, swelling of) Aii. d. A^2ii. d. f. Cii. d. f. Baths of C^5., bath unct., compr. of A^2. El. A. to occ symp. unct. of F^2. to hypoc.

a. *Varicose ulceration:* — See *ulcers*, al compr. of El. A.

b. *Varicose ulceration* complicated with scro fula, See *ulcers*. C, C^5., A, or A^2.

170. **Lepra.** — See *glands*.

Syphilitic ulcerations: Ven. d. f. ar compr. For other treatment refer *glands*.

Lepra complicated with epilepsy. Ci d. f. for other treatment. See *glands*.

171. **Lethargy.** — Employ the antiscrofulous antiangiotics, according to the case, ar application of an appropriate electricit to the back of the neck, eyes and sym

172. **Leucorrhea.** — See *Womb*, N. 2, lett. o

173. **Linghtening** (effects of.) 10 gr. of S. at on dry on the tongue. El. R. «—» El. Y to occ., plex. sol., temples, and all th nerves of the head. Compr. El. W. the head.

174. **Lips**, (hard swelling of.) C ii. d. f. compr. C. of El. W. Baths, unct., compr. C^5. 20 gr. of C^5.

Digitized by Google

175. **Liver and spleen.** — Two joint viscera.

Liver diseases may be recognized by the following symptoms: Yellow complexion, urine dense, yellow or reddish; alvine evacuations, greyish or clay colour.. Pain in right hypochondre; pain at the bottom of the stomach extending to the spine, and ascending to the right shoulder; heaviness of the right side, sometimes bilious vomiting, etc. Treatment F II. d. f. To the hypoc. employ unct. compr. of F^2. C^5. El. W. Baths of C^5. El. R. «—» El. Y. to symp., plex. sol., occ. If at same time there is affection of the heart, alternate A^2II. with F. and apply unct. to the heart with A^2. replace El. W. with El. A.

a. *Hepatitis:* Inflammation of the liver F. II. d. f. unct. of C^5. and F^2. to the hypoc. Compr. baths of C^5. also El. R. and Y. to plex. sol., symp., bottom of stomach. El. W. to part affected.

b. *Gastrohepatitis:* Inflammation of liver and stomach F II. d. f. S II d. f. unct. of F^2. to the hypoc, Baths, compr. of C^5 S. El. R. «—» El. Y. to pit of stomach, baths of El. W.

c. An affection of the liver, existing 14 years, was cured in ten days by unct. of F^2. to the hypoc.

d. *Congestion of liver* complicated with dropsy. F II. d. f. comp. of F. to the hypoc. baths of C^5 El. R. «—» El. Y. to plex. sol., symp. comp. of El. W. to the parts, and plex. sol.

e. *Tumour* of the liver: See d. also El. R. «—» El. Y. to liver and spleen.

Digitized by Google

176. **Lockjaw, or jawbone trismus.** — S. d. f. El. R. «—» El. Y. to the masseter, occ. symp. unct. of C^5., or S. compr. of El. W.

177. **Loins.** — Diseases of the loins.
S. C. C^5. A^2. Unct. compr. of C^5. S. unct. of A^2. to the parts. Baths of C^5. S. Baths or compr. of El. W. El. R. «—» El. Y. to loins and sacred nerves.

a. *Nephritis:* See this word, and also *Bladder*.

b. *Consumption* of the: A II. A^2 II. d. f. unct of A^2. to the loins. Baths. of C^5. unct. of S. or C^5. to loins. Baths, compr. of El. W. El. R. «—» El. Y. to the loins.

178. **Lumbago.** — Consequent on cold. S. d. f. Baths, unct., compr. of C^5. or S. compr. of El. W. or El. R. «—» El. Y. to symp., occ., and sides of the spine.

a. *Accompanied with fever:* F II. d. f. as 178.

b. *Caused by worms:* Ver d. f. also 178.

179. **Lungs.** — Nervous cough. S II. C^5 II. A^2 II. d. f.

a. *Tuberculous cough:* P II. P^2 II. C^5 II. S^2 II. d. f. Unct., compr., to the chest of C^5. of S. Baths of C^5. S. El. W. El. R. «—» El. Y. to occ., sym., plex. sol. Unct. of C^4. to the chest.

b. *Congestive cough*, with spitting of blood; as above, but alternate with A II. or A^2 II. the pectorals, and use compr. and unct. of A^2. to the chest and heart; baths of A^2.

c. *Simple or chronic cough* consequent on cold. P. P^2 II. C II. d. f. Gargles of El. W.

d. *Cough arising from worms.* Ver. II. Ver. ^{2} II. d. f. See c.

Digitized by Google

e. *Cough with hectic symptoms*, following on pneumonia and pleurisy, especially in scrofulous patients. C II. d. f. El. R. and El. Y. to symp. See c.

f. *Chronic congestion of the lungs* P. C^5. or P^2 II. d. f.

g. *Acute or Chronic Catarrh.* P II. P^2. A^2. d. f.

h. *Chronic Bronchitis with Asthma.* — P II. P^2 II. P^3 II. S II. S^5 II. d. f. Either employed singly or alternately.

i. *Hoarseness.* See h. Gargle of El. W. or R. or A.

N. B. — C. is specific for tubercles at the onset especially.

k. *Influenza:* sort of acute bronchitis; gargle of El. R. stops the malady instantly at its commencement; when the disease is declared See c. and add alternate gargles of El. R., W. and A.

l. *Dropsy of the chest*, with difficulty of breathing. S II. C II. P II. d. f. El. R. «—» El. Y. to the back of the neck; plex. sol., symp. A.

m. *Inflammation of the lungs.* See g. h.

n. *Pleurisy with fever.* F II. S II. P II. A II. d. f. El. W. to occ. plex. sol., symp. Unct. of C^5 to the chest; Baths of C^5.

o. *Pleurodinia* (pains or stitches in the side) disappear at the onset by El. R. to the part affected.

p. *Inflammation* of the lungs following on Measles. S II. d. f. generally sufficient, or else C II. d. f. or 20 gr. C^5.

q. *Phthisis*, with green expectoration, and inflammation of the lungs. P II. C II. C^5.

Digitized by Google

d. f. Unct. (to the chest) and bath
C^5. El. W. to occ., symp., plex. sol.
S. d. f.

r. *Tubercular Phthisis.* See q. also F II. d
Unct. of F^2. to the hypoc.

s. *Phthisis*, with complications of the lar
See q. also P^2 II. P^3 II. d. f.

t. *Œdema* (soft swelling) C II. d. f. 20 gr
C^5. C^2. II. d. f. Baths of C^5. and A^2.

u. *Chronic disorganization of the lung.*
C II. C^5. d. f.
Unct. of F^2. to the hypoc. F II. d
El. W. to plex. sol., symp., Unct. to
hypoc. of C^5.
The cures of phthisis obtained by me
of C. P. P^2. and baths of C^5. are in
merable.

180. **Luxation general.** — Follow the treatm
marked at n° 145.

181. **Lymph.** — It is known that the systen
circulation comprises: the arteries; wl
carry the blood from the heart, throu
out the whole body, the veins, wl
bring the blood from all parts of the b
to the heart, and the lymphatic vess
existing in every portion of frame,
ming numerous ganglions by their un
The lymphatics empty into the v
a liquid drawn from nearly all parts
the organism and named *lymph.* Ly
is clear, transparent, a little yellowisl
greenish, saline, and has a decided al
line reaction. Its composition cont
albumen, fibrine, fat, salts, all dissol
in water. It is remarkable that
quantity of fibrine goes on increasi

Digitized by Google

from the source of the lymphatic system to its discharge into the veins; it is in this respect that the blood may be considered a continuation of the lymph. It will, also, be understood that alterations of the lymph produce the same in the blood and *vice-versa*. Diseases of the lymph, by far the most numerous, demand especially the antiscrofulous and anticancerous.

Soft, flabby flesh, diaphanous skin and watery blood point out the lymphatic temperament.

M

182. **Marasmus** (Wasting away). — S. d. f. El. R. «—» El. Y. to occ. symp. plex. sol. unct. of C^5. to the whole of the head. El. W. to the head.

183. **Marasmus general.** — With ancylosis (enlargement of the joints). *See* 182. Also baths of C^5 S. or A^2.

184. **Masturbation.** — S. II. d. f. — Involuntary nocturnal emissions. 20 gr. of C^5. El. R. «—» El. Y. to occ. symp. plex. sol. comp. El. W. to occ. Baths of S^5.

185. **Measles.** — *See Fevers.*

186. **Melancholy.** — (Compare *Insanity*), S II. d. f. If proceeding from the womb. C II. d. f.

187. **Melœna.** — Vomiting of black blood, commonly called black Bile. Flow of dark coloured blood from the digestive organs, and voided either by the mouth or the anus. A II. or A^2 II. d. f. comp. to the

Digitized by Google

heart of A. El. A. to symp. plex. s
baths, unct. or compr. of A^2. Baths
C^5. El. R. «—» El. Y. to occ. to sid
of seventh vertebra (base of the neck) E
W. Compare *Vomiting*.

188. **Menses.** — Metrorrhagia, hæmorrhage of t
womb. A II. d. f. and compr. A. or A^2.
the heart. Baths of El. A. C. A^2. and com
to the heart of same. El. A. to the sacru
In some case, granules of angiotics d
give the best results.

a. *Amenorrhœa* (Suppression of the menses
See 188. In particular cases good effec
are obtained by S. «—» C. «—» A.

b. *Profuse menstruation. See 188*. It is to b
remembered, that: *angiotics in ordinar
doses bring back the menses, whereas
the second dilution, they moderate an
even arrest the flow.*

c. *Dysmenorrhœa*, abnormal and painful me
struation. S. «—» C. «—» A^2.

d. *Same* with swelling of the nose, *see 188*
Comp. unct of A^2. or C^5 to the nose. El. A
to the base of nose. Baths of C^5.

e. *Same* chronic, *see* c. El. A. to sacred nerve
Baths of A^2. unct. of A^2. to sacred nerve
and the heart.

f. *Sudden suppression of the menses* (cause
by cold water) with headache. Compr. E
W. to occ. symp. to super orbitals an
temples. S. C^5. Baths of C^5.

g. *Suppression with chlorosis. See 188.*

h. *Premature cessation. See 188.*

189. **Mercurial Salivation.** — With speci
apthes in the mouth. S. d. f. or C. d.
or C^5. d. f. or 20 gr. C^5 or baths of C

Digitized by Google

El. R. «—» El. Y. to occ. symp. hypoglosses sub orbitals.

190. **Mesenteric** disease. — *See Abdomen* letter c.

191. **Milk**, Flow of, when not suckled. (galactorrhœa.) C II. «—» A^2 II. d. f. baths of C^5. El. R. and El. Y. to occ., plex. sol. Baths of El. W. or of S. S^5 20 gr. C^5.

192. **Milk fever.** — Suppression of milk. C II. C^5 II. d. f. compr. to the breast of El. W. El. R. «—» El. Y. to symp., plex. sol., occ.

193. **Mouth.** — Stomach complaints; fetidity of the mouth. — Gargles of El. R. or El. W. or of S. — S. C. El. R. «—» El. Y. to pit of the stomach, and plex. sol. Baths, unct. of C^5. to the parts, or baths, unct. of S. or baths of A^2.

a. *Increase* of fetidity, during menstruation; as 193 also A^2. internally.

b. *Impossibility* of opening the mouth. El. R. to occ., symp. to the masseter muscles. Unct. and baths of C^5. or unct. of S. A. single application of electricity has often been sufficient.

N

194. **Nausea.** — Also of pregnancy. C. S. C^5. d. f. Baths of C^5. 10 gr. of C^4.

195. **Nephritis.** — Inflammation of the kidneys. S. A^2. d. f. Baths, unct. (to the loins) compr. of C^5. or S^5. or S. unct. of F^2. to the hypoc. or C^5. Baths of El. W. El. R. «—» El. Y. to occ., symp. and the length of the spine.

196. **Nerves.** — (Diseases of), as 195.

Digitized by Google

a. *Nervous agitation:* S II. or A II. d. f. light applications of El. W. to occ., symp., plex. sol. For angioitic patients, compr. to the heart of A^2. see also 197.

b. *Alteration of the nerves from abuse of quinine.* S. d. f. Baths of C^5 El. R. «—» El. Y. to symp., or baths of El. W.

197. **Nervous agitation.** — In general S III. d. f. Baths of C^5. El. W. to symp. Baths of S. Unct. C^5. to the whole of the head.

198. **Nervous contractions** of the whole body. Ordinarily removed by El. R. to symp., occ., plex. sol. Baths of C^5. which may be alternated with baths of El. W.

199. **Neuralgia.** — See also *Pains.*

a. *Accidental nervous pains;* cured instantly by comp. El. W. or applications of El. R. or Y. or, when the individual is angioitic, A.

If these means do not succeed, try compr., unct.; baths of C^5. S. or A^2. or S^5. S. d. f.

b. *Congestive neuralgia.* A. or A^2. d. f. comp., unct. baths of A^2. baths of El. A. of El. W.

c. *Syphilitic neuralgia.* Ven. II. d. f. Baths (100 globules) of Ven. Baths, unct., comp. of C^5. S. S^5. El. W. in compresses to painful parts. El. R. «—» El. Y. Unct. of F^2. or C^5. to the hypoc.

d. *General neuralgia.* See c. also baths, unct. compr. of A^2.

e. *Neuralgia of the head with rheumatism of the arm.* See c.

f. *Dental neuralgia.* See e. also gargles of S. A^2. C. and C^5. and S^5.

Digitized by Google

200. **Nocturnal Pollutions.** — S II. A^2. d. f. C^5. baths, unct. (to sacred nerves) of C^5. of S. El. W. to sacred nerves, pubis and perineum. El. R. El. Y. to occ., symp., plex. sol., and sacred nerves. Unct. of F^2. to the hypoc.

201. **Nodes.** — Bony tumours developed on the surface of a bone, generally consequent on syphilitic or scrofulous diseases accompanied by violent pains called *osteocops.* S. C. A. C^5. C^4. Unct., compr., baths of C^5. S. or S^5.

Compr. of Ven. 20 gr. of C^5. or S^5. or S. or $C.^4$

Compr. of El. W. or El. R.

a. *Syphilitic Nodes.* Ven. internally and in compresses. Treat as above N. 201.

b. *Periostitis;* scrofulous or not. See 201. Also unct. of S. or A^2.

c. *Spina Ventosa.* Dilatation of the tissues of the bones, as if they vere blown out. — Sharp and severe pains; treat with *cancerosi* and as 201.

d. *Treatment of ricketty children.* (knotted.) S. S^2. or *nuovo,* C. d. f. S^5. A^2. Baths, unct. compr. of C^5. or S. or S^5. Baths of A^2. or El. W. or El. A. El. R. «—» El. Y. to occ., symp., plex. sol. and all the nerves corresponding to the affected parts.

Baths of El. R. or El. G.

e. *Chronic Node* on the right leg; See d. persist in unct. of S. of A^2. Compr. El. G.

f. *Same* on the lower jaw, with fever. See e. Also F II. d. f.

Digitized by Google

g. *Same* with retraction of the jaw. See e., but especially use C. internally and in compresses.

h. *Spina Ventosa* in the foot with several lemon colour wounds. Amputation proposed; but the foot was cured in following treatment indicated letter e; persisting especially with C. and El. G. The decayed bone will be seen to come away in pieces.

i. *Softening of the bones.* (Rickets) See d. persist in baths of C^5. and El. G.

202. **Nose.** — Ozœna, S. d. f. C. d. f. A^2. d. f. C^5. d. f. Inhalation of these remedies, and unct. to the base of the nose of C^5. El. R. «—» El. Y. to the occ., symp., eyes and base of the nose. Baths of C^5. El. W. S. A^2. and S^5. The cure is certain.

a. *Suppuration* of the nose. See 202.

b. *Swelling* of the nose. See 202.

c. *Ulceration* of the nose. See 202, but C. C^5. A^2. are preferable.

d. *Polypus* of the nose. See c.

e. *Cancerous vegetation* at the base of the nose. See e. Compr. El. W. to base of nose.

f. *Epistaxis:* bleeding from the nose. A. or A^2. or C^5. d. f. Inhalation of the same medicines. El. A. to base of the nose, occ., symp., to forehead, or baths, unct., compr. of A^2. Compr. to the heart of A^2.

The doses, relatively too strong, increase the affection.

g. *Scrofulous Ozœna* from infancy; See 202. Also C^5. internally; inhalations, unctions externally.

Digitized by Google

h. *Dry Polypus* of the nose, with gangrene. See g.

203. **Nose** (Bleeding of). — See *Epistaxis.*

204. **Nymphomania.** — C II. d. very f. C^5. d. very f. or 20 gr. C^5. or C^4. Baths of C^5. Unct., compr. to pubis and sacred nerves of C^5. El. W. to symp., plex. sol., back of the neck and sacred nerves. Baths of S^5.

O

205. **Obesity.** — S. C. or C^4. or C^5. d. f. Baths, unct (to the pit of the stomach) of C^5. El. W. (to the same place) El. R. «—» El. Y. to occ. symp., plex. sol. Baths of S. A^2. unct. to the hypoc. of F^2. or C^5.

206. **Obesity morbid.** — (Unhealthy stoutness) S. or Ven. or A. or A^2. or 20 gr. of this last. Baths of C^5. or S. or A^2. El. R. «—» El. Y. to symp. occ. plex. sol. Baths of El. W.

P

207. **Palate** (polypus of). — C. d. f. Gargle of C. C^5. d. f. Gargle of C^5. of A^2, of El. W. C^4. and El. R. Baths of C^5.

208. **Paralysis** (commencement and threatening of). Averted by 10 or 12 granules of S. given dry on the tongue, or, else bathe the head with El. W. or El. R. «—» El. Y. to occ., symp., plex. sol. Unct., compr. to the head with C^5. or S.

a. *Menace of general Paralysis.* El. R. to symp.,

Digitized by Google

plex. sol. but especially to the pit of the stomach.

When there is congestion, A^2 II. A II. d. f. Compr. to the heart with these remedies and baths of A^2. El. A. to all the nerves of the head, especially to occ., symp., and temples. The means should be persevered in until the recovery of the patient. In case of doubt as to the cause, alternate the anti-angioitics with the anti-scrofulous, preferring those which produce favourable effects.

If the patient experiences some unpleasant effects from an erroneous remedy, a few globules of S., dry on the tongue, will promptly remove them. If unsuccessful, C. C^5. C^4. should be employed, but the first especially.

b. *Nervous paralysis without any symptoms of angioitics.*

S. C. C^5. A. S^5. Baths of the head of El. W. El. R. «—» El. Y. to occ. symp., plex. sol. and all the nerves of the head. Baths of El. W. or C^5. S. or A^2.

c. *Paralysis consequent on a sanguine apoplexy.* A. A^2 II. d. f. compr. to the heart of A or A^2. unct. or compr. to the hypoc. of C^5. or F^2. Baths of El. A. (2 or 3 tablespoonfuls) C. S. unct. to the entire head of A^2.

In some cases El. Y. to occ. has been successful.

d. *Nervous paralysis of the tongue*, S. d. f. gargle of S. El. W. and C^5. unct. comp. of C^5. to hypoglossids. El. R. «—» El. Y. to little hypogloss, occ., symp., baths of S. and C^5.

Digitized by Google

e. *Congestive paralysis of the tongue.* AII, A^2II, comp. to the heart of A. gargle with A, A^2. El. A. unct. of A^2. to hypoglos. baths of A^2.

f. *Paralysis of half the body.* S. A. unct. or comp. to the hypoc. of C^5. Baths of C^5, of S. and A^2. El. W. to the whole body, or El. A. passed lightly over the head. Comp. to the heart of A. 10 gr. of A^2. El. R. «—» El. Y. to symp., occ., plex. sol., super orbitals.

g. *Paralysis of one side of the face.* El. R. and El. Y. to occ., symp., forehead, sub orbitals, base of nose, and masseter muscle, compr. of El. W.

S. S^5. or C^5. internally, alternated with A., at same time, unct. to the part affected and the whole head of C^5., baths of C^5., S^5. If these remedies are resisted, use C. A^2.

h. *Paralysis of the eyelids.* S. A. unct. baths of. C^5. unct. of S. and A^2. El. W. or El. A. in compresses. El. R. «—» El. Y. to super and sub orbital, root of nose, symp. plex. sol.

i. *Paralysis of arm or leg.* See, f. unct. of C^5.

l. *Paralysis of the prostrate gland.* See f. Unct. to sacrum, perineum, pubis of C^5. S. El. R. or El. W. in compresses to the same parts.

m. *Paralysis of the bladder.* See l.

n. *General Hemiplegia* consequent on an apoplexy, with varicose veins and varicose ulcers, etc. A. A^2. Baths, unct. compr. of A^2. Baths of C^5., compr. of El. A. to all the nerves of the head, and along

Digitized by Google

the spine, unct. to the hypoc. of F^2. or C^5. Baths of C^5, El. W. and El. A.

o. *Paralysis of the left side.* See b., also unct. to the part of C^5., S., A^2.

p. *Paralysis of the genital organs.* S. A. unct. to the parts of C^5. S. $A.^2$ Baths of the same remedies. El. R. «—» El. Y. to sacred nerves, pubis and perineum. Baths of El. W. or El. A.

q. *Paralysis of the legs*, following small pox. See 208. Also unction, comp. of C^5. A^2. El. W. Baths of El. W.

209. **Pains** (Neuralgic) etc. — El. R. or El. Y. or El. R. «—» El. Y. S. A. C^5. Baths of C^5. and especially unct. of C^5. S. and A^2. to the part.

a. *Cephalalgia.* See 209 and comp. El. W. to super orbital.

b. *Pains* in the right side, onct. of F^2. to the hypoc. and F. d. f. comp. El. W.

c. *Pains* during the night. Ven. d. f., the rest as 209. Baths of S. C^5., A^2. S^5.

d. *Pains* in the left side. A_{III}. A^2. II. d. f. Baths of C^5. comp. of A^2 to the region of the heart. El. A. to symp.

e. *Pains* at about a third of the sacrum. Ven. II. d. f. comp. of Ven. or unct. of C^5. Baths of the same or of S. Baths of El. W. unct. of S.

f. *Pain* of the skull under the sagittal seam. C. II. d. f. compr., unct. of C^5. and. C. baths of C^5. or compr. of El. W.

g. *Pain* in the bone of the nose. Ven. II. d. f. Unct. of Ven. of C^5. or S. Compr. El. W. Generally, for these kinds of pains, C_{II}. d. f. or 10 gr. of C.

Digitized by Google

h. *Deep seated pains* in the bones, as if they were fractured. Sii. d. f. baths, unct., compr. of S. A^2. El. A. to occ., symp. and unct. of C^5. to the spot; or bath of C^5. Compr. El. W. El. R. «—» El. Y.

i. *Syphilitic pains* Ven. ii. d. f. El. G. the rest as above, h.

l. *Pain* in the knee, from white swelling, El. R. and El. Y. to corresponding nerves. Compr., unct., baths of C^5. El. W. or El. A. or C^5.

m. *Pain in the arm* from a fall, El. R. «—» El. Y. Compr., unct., baths of C^5. or S. with S. or A. internally. Comp., unct. (to the arm) and also bath of A^2.

n. *Neuralgic pain* of left temple, of 21 years standing, removed by compr. El. W.

o. *Shooting gouty pain* in thumb joint El. G. See m.

p. *Spasmodic and rheumatic pain* in foot, existing 10 years, cured in a man aged 23; The same, in the hand, of 18 years, standing, cured instantly in a man aged 47 years.

q. *Painful sensations* of the whole body. Baths of C^5. or 30 gran. of the same; baths of S. or A^2. Et. R. or El. Y. to all the nerves.

r. *Uncertain pains* removed in a man aged 39 years. El. R. to occ., symp., plex. sol. See q.

s. *Remains of articular pains:* Unct., baths of C^5. See q.

t. *Pain* in the shoulder, consequent on exertion. The shoulder was replaced by S. and El. R. »—» El. Y. also can be

Digitized by Google

employed baths, unct., compr. of or S. C^5. Compr. El. W. baths of A^2.

u. *Pains* left by ancient small-pox. El. R. «—» El. Y. or comp. El. R. or unct., baths of C^5. or see q. Ven. internally can also by tried.

v. *Pains* and helplessness of the arm; El. R. «—» El. Y. See u.

w. *Pain* in arm, consequence of fall, with affection of liver: as above v: cure finished by F. internally.

z. *Shooting pain* in the fold of the anus, with rheumatism. S. unct. (to the part) baths, compr. of C. or else, baths, unct., compr. of S. or baths of A^2. or S^5.

The pains, removed by the simple electricity, are innumerable; when one has, once, acquired the habit of using these liquids, it is, merely, a child's game to relieve pain. It is necessary not to forget that the electricities cannot cure without relapse, always, pains proceeding from a profound viciation, which claims jointly an internal treatment.

210. **Pemphigus.** — Eruption of bladders, preceeded by general uneasiness, (vesicular fever) F. II. d. f. unct. to the hypoc. of F^2. Baths, compr. of C^5. of S. and A^2. El. R. «—» El. Y. to plex. sol., symp., occ. Baths of El. W. Unct. to the hypoc. of C^5, SII. d. f. 20 gr. C^5.

211. **Peritonitis.** — CII. d. f. compr. C. baths, unct., compr. of C^5. unct. to the hypoc. of F^2. El. R. «—» El. Y. to symp., plex. sol. Compr. El. W. to abdomen. See *Abdomen*.

Digitized by Google

212. **Pericarditis.** — (Compare *Heart.*) CIII. or A^2 III. d. f. apply unct. to the heart of A, or A^2. with 2 gr. of remedy to spoonful of oil, Baths of C^5. unct. to the hypoc. of C^5. or F^2. El. A.

213. **Perspiration**, excessive, with headache. S. El. R. «—» El. Y. to occ., symp., plex. sol. Baths of El. W. of C^5. S. and A^2. unct. to the hypoc. F^2. 20 gr. of C^5. For suppressed perspiration, the same remedies.

214. **Perspiration**, excessive and fetid of the feet and arm pits. S. C. C^2. C^4. A^2. d. f. Baths of C^5 S. S^5. and El. W. or El. R. El. R. «—» El. W. to occ., symp. See also *Feet.*

215. **Pimples** on the face. — See *Face.*

216. **Piles** in general. — See *Hemorrhage.*
Alternate SII. with the angioitics.
a. *Bleeding piles:* as above.
b. *Painful piles*, with fissure of the anus. As above, and also baths, unct., compr. of C^5.

217. **Piss Warm.** See *Syphilis.*

218. **Plumpness** (Unsound). See *Obesity morbid.*

219. **Poisoning** and its consequences. — S. or 20 gr. of same. The *Scrofoloso* expels poison. El. R. «—» El. Y. to occ., symp., plex. sol. Baths of S. or A^2. or S^5.

220. **Polypi.** — See *Nose, Larynx, Womb, Bladder, Pubis.* Persist in C^5. internally, and unctions, inhalations, injections of the same externally.

221. **Pregnancy,** difficult or painful. — CII. or 10 gr. of C^5. relieve at once. El. W. to the sacred nerves.

Digitized by Google

222. **Prolapsus Ani.** S. C^5. El. R. «—» El. Y. to sacred nerves, perineum. Baths, and unct. of C^5. to the parts. Baths compr. of S. Injections or clysters of El. W. baths of A^2.

a. *Prolapsus Uteri;* as above, but replace S. by C. internally.

b. *Falling*: a man 60 years old, fell down from a fourth floor, almost dead, was cured by the above treatment (less the clysters). Also El. R. El. Y. to all the nerves, and hurted parts.

223. **Prolapsus Uteri.** — Falling of the womb. C. A^2. unct. C^5. to pubis, sacred nerves, injections of C^5. El. R. «—» El. Y. to sacred nerves, and pubis. Injections of El. W. Baths of S. or C^5.

224. **Prostration of strength.** — Sometimes a single application of El. R. to the pit of the stomach reestablishes the forces. If the prostration continues, apply electricity to all the nerves of the head, and sides of the spine.

In general S. or 20 gr. C^5. El. R. El. Y. to the above mentioned nerves comp. of El. W. or El. A.

225. **Proud flesh, Fungus hemat.** — Morbid development of the sanguine vessels. AII. A^2 II. C. alternated. compr., unct., baths of S^5. or baths, unct., compr. of C^5, Baths, unct., compr. of A^2. compr. of El. W. El. R. «—» El. Y. to the loins. Compr. El. A. or A^2. to the heart.

226. **Pruritus.** — Intolerable itching, with eruptions of little hard pimples, like millet grains.

Digitized by Google

S. A. Baths of C^5. S. A^2. El. R. «—» El. Y. to symp., occ., plex. sol.

Of the whole body: as above, and frequent baths of C^5.

227. **Pruritus universal itching, Pruritus of nurslings. —**

228. **Pustule Malignant.** — See *Carbuncle.*

229. **Pubis.** — See *Womb. Generation* (organs of). Eruption of polypi on pubis. See *Lepra.* Also Ven. C. d. f. or S. or 20 gr. C^5.

Q

230. **Quinsy.** — Ch. if the tonsils are not attacked, Sh. and gargles of C. or C^5. Compr., unct. of C^5. to the throat, or bath of C^5. El. R. «—» El. Y. to back of neck; unct. of S.

R

231. **Rage.** — See Hydrophobia. Not quoted any cure, having never had occasion to treat a case of rage. But I think that this kind of poisoning may be overcome as all the others. I shall give here the remedies for those who would have the occasion to make a trial. S. El. R. «—» El. Y. to the symp. to occ. plex. sol and to the pit of stomach.

232. **Rectum.** (Fall of) C. compr. of C. or S. Baths, compr. unct. of C^5. Baths of El. W. or R. El. R. «—» El. Y. to the symp., and to sacred nerves.

Digitized by Google

233. **Rectum** (loss of blood from). — In a particular case, a cure was made of this disease of 10 years standing, by S. d. f. and compr. to the hypoc of F^2. In general S. AII. A^2II. C. d. f. El. R. «—» El. Y. to pit of stomach, plex. sol. Baths of C^5. unct. to the hypoc. of C^5. baths of A^2.

234. **Rickets.** — Softening and deformation of the bones. C. S. A^2. or 20 gr. C^5. Baths, unct., compr. S. A^2. or C^5. Baths of El. W. El. R. El. A. Unct. to the hypoc. of F^2. El. R. El. Y. to all the nerves. Unct. to whole of the head of C^5. Baths El. G.

235. **Rigidity** of the muscles as n° 234.

236. **Rheumatism.** — Compare also *Pains.*

Rheumatism generally yields to the application of El. R. and El. Y. alternated. If it resists this means (by which it is always necessary to begin) or returns repeatedly, the following remedies must be given. S. unct., baths, comp. of S. or baths, compr., unct. of C^5. or baths of El. A. and of A^2.

a. *Chronic Rheumatism, with nephritis.* See *Nephritis* and 236, also add El. G.

b. *Articular rheumatism:* El. G. in compr. or as cupping. Baths of S. C^5. S^5. A^2, and as 236.

Good results have heen obtained by the other electricities and unct. of C^5. S. C^4. and F^2.

c. *Rheumatism of the arm*, very frequently relieved by El. R. to the nerves of the arm.

Digitized by Google

d. *Chronic rheumatism* with inflammation of the loins, cured by El. R. only, in general as 236.

e. *Rheumatism* which lasted 50 days and prevented any movement, was cured in one day by S.

Same in both hands cured by S. alone, internally and externally.

Same of 10 years standing, in one hand, with very violent paroxysms, cured by S. internally and externally.

Same but acute, confining the patient to his bed. S. alone internally and externally.

f. *Intercostal Rheumatism*, with suppression of the menses. Cured by A^2. alone, internally and externally.

g. Man aged 23 years, attacked by rheumatism in the knees and feet, carried on a man's back to my audience, went away cured by a simple application of El. R.

h. *Chronic Rheumatismal state* with acute crises by intervals. See 236.

To S., taken at first dilution, can also be added, according to the case A^2 II.

S

237. St. Vitus's Dance. — Chorea. S. II. d. f. C^5. d. f. El. R. «—» El. Y. to occ. symp., plex. sol. Unct. of A^2. to the heart. Baths of C^5. unct. to the whole head of C^5. baths of S. or S^5.

Digitized by Google

238. **Salivation**, and frequent need to expectorate. (Sialorrhœa) For children. Ver. II. d. f. unct. compr. of C^5. to the hypoc. For adults S. gargles of El. W.

The sialorrhœa (continual flow of saliva night and day) of authors can only be an affection symptomatic of hysteria, gout, hypochondria, etc.

In these cases the remedy must be directed to the main disease.

239. **Scald head.** — Different eruptions having their seat specially on the scalp; but which, also, appear on other parts of the body, having the form, sometimes, of an agglomeration of pustules, discharging a thick, offensive humour, sometimes furfuraceous scabs, or excavated or raised tubercles, etc.

C. C^4. C^5. S. S^2. S^5. d. f. or A. baths of C^5. of S. A^2. or S^5. Unct. of S^5. S. and C^5. to the affected parts. Compr. El. W. or El. A. or El. R. El. R. «—» El. Y. to occ. and symp. Compr. C^4. and S^2.

Scald re-entered: as to n° 239.

240. **Scarlatina.** — See *Fevers.*

241. **Sciatica.** — Applications of electricities, alone, are frequently sufficient. El. R. «—» El. Y. to the sacred nerves, to the two points where the nerve is nearest the skin. (See diagram, at end of the book). SII. d. f. CII. d. f. or unct., compr., baths of C^5. of S. S^5. or 20 gr. C^5. or compr. El. W.

These means are not, always, sufficient in the case of sanguine tempera-

Digitized by Google

ment. For such: El. A. Baths, unct., compr. A^2. unct. to the hypoc. either of C^5. or F^2. Baths of C^5. Compr. to the heart with granules of A. or A^2. Compr. El. W. unct. of S.

a. *Sciatica*, with biliary calculus, (which was the principal cause of the pain) treated and cured by Fu. d. f. unct. of F^2. to the hypoc. Unct. of C^5. to the hypoc. El. R. El. Y. to sciatic nerve, plex. sol., symp., loins; compr., to same parts, of El. W. baths of C^5. and S^5.

b. *Very painful Sciatica:* cured by S. internally and externally only.

c. *Contraction of the sciatic* nerve, cured by S. internally and externally, and compr. of. El. R. to the nerve.

d. *Chronic sciatica,* with sharp crises, preventing the patient walking, cured by preceeding treatment.

242. **Scirrhus.** — See *Cancer. Womb*, and *Stomach.*

243. **Scrofula.** — Constitutional disease, constituted by many affections, of which the principal characters are, the tendency to a chronic state, to ulceration, to suppuration, and a deposit of tuberculous matter, principally in the lymphatic ganglions, situated under the lower jaw, and along the neck, the groins, under the armpits, the poplitic hollow, etc.

General treatment. S. d. f. C. C^5. d. f. 20 gr. of. C^5 Baths of S. A^2. C^5. S^5. of El. W. El. R. or El. G. Application of electricity to symp., occ., plex. sol. Unct. or compr. to the hypoc. of F^2. or C^5.

Digitized by Google

Science *(Lebert, Traité pratique des maladies scrofuleuses et tuberculeuses, Paris, 1849)* recognises the scrofulous origin of the following diseases, which, in effect, yield all to the antiscrofulous or their congeners, the anticancerous, namely: the glands in general, affections and eruptions of the skin, such as superficial cutaneous affections, pimples, and tinea, *Lupus vorax* of the face and vulva, cold tumours, abscesses, ulcers, fistulas, the great portion of opthalmias, otorrhœa, many alterations of the cartilage and the bones, arthritis, contractions, ancylosis, periostitis, ostetis, necrosis, caries in general, tubercles of the lungs, the stomach, bowels, and genito-urinary organs. Science, also, recognises for the scrofula diagnosis the following symptoms, namely; cough, expectoration, hœmoptisis, pains in the chest, dysuria, fever accompanied by perspirations, laryngitis, tracheitis, pneumonia, pleurisy, pulmonary perforation, chronic gastritis, enteritis, peritonitis, meningitis, tubercular orchitis, affections of the menses, aphthae, etc.

All these maladies are cured by the antiscrofulous, supported, if necessary, by the anticancerous. But, as I judge, maladies, cured by the same remedy, have a common origin. Thus my results confirm that which science has declared.

But, there are a great number of diseases, not comprised in the preceeding list (here, it is sufficient to call to

Digitized by Google

mind that nine tenths of complaints call for the antiscrofulous; see Chapter IV, p. 70), which equally yield to the antiscrofulous. Hence, again, it results, in my opinion, that the frame of man is impregnated with scrofulous or psoric principles, which are the source of the greatest part of our infirmities.

For the treatment of scrofulous diseases, refer to each one, in the catalogue.

244. **Scrotum.** See *Testicles*, *Tumours*.

245. **Sea sickness.** — Granules of S. dry, each time that the malady commences. Su. d. f.

246. **Serpentine crusts.** — See *syphilis*.

247. **Skin.** — Ulcerations of the skin. C. S. A., d. f. comp. of these remedies, of El. W. or A. or El. R. or C^5. Baths of C^5. El. R. «—» El. Y. to occ. symp. plex. sol. Baths, unct. comp. of A^2. compr. to the hypoc. of F^2. The ulcerations, unless they are supported by some serious viciation, heal easily, even those of cancer, at the end of its cure.

a. *Impetigo, scaly herpes*, as 247, also comp. C. and sometimes V. alone.

b. *Intertrigo*, redness and irritation of the skin, as 247; persist with compr. of El. W. when it is caused by chafing of clothing or by the urine in infants.

c. *Tinea*, as 247. Unct. compr. of C^5. of S. of A^2. see also *Scald head*.

248. **Skin** (spots on) wine coloured. A. A^2. d. f. compr. unct. baths A^2. compr. and baths of El. A. unct. to the heart of A. Baths,

Google

Liver Spots on the skin. — FII. Unct. to the hypoc. of F^2. or C^5. or S. Baths of C^5. El. W. to the hypoc. Baths of El. R.

Copper coloured patches on skin. — See *Syphylis.*

Specks in the cornea. — See *Eyes.*

249. **Sleeplessness.** El. R. and El. Y. to symp. occ. plex. sol. and all the nerves of the head. S. d. f. 20 gr. of C^5. or unct. to the hypoc. of F^2. or C^5. Baths of C^5. or S. unct. to the head of S. Bathe the head lightly with El. W.

250. **Small Pox.** — See *Fevers.*

251. **Smell** (loss or perversion of the sense of). — El. R. «—» El. Y. to base of the nose: unct. comp. of C^5. S. A^2. to base of the nose. Baths of C^5. Inhalations of S. or S. d. f.

252. **Sobbing with flatulence.** — SII. d. f. C^5II. d. f. El. R. to symp. and bottom of the stomach. Little compresses of El. W. to the stomach. Sometimes removed by a simple touch of El. R. to the occiput.

253. **Somnambulism** in woman. CII. C^5II. d. f. Baths of C^5. unct. to the hypoc. of the same. El. W. to occ. or baths of the same. In man: S. S^5. and other remedies as above.

a. *Sudden starts, trembling,* etc. See 253.

254. **Spasms,** proceeding from worms, Ver. d. f. Ver. 2. d. f. S. d. f. Baths with El. W. or C^5. S. or A^2.

255. **Speech** (difficulty of). — Generally and im-

Digitized by Google

mediately restored by applications of El. R. «—» El. Y. to the hypoglossids and occ., symp. See 255 and *Stammering*.

256. **Speech** (loss of.) — S. d. f. C. d. f. A^2. d. f. C^5. d. f. C^4. d. f. Baths, unct., (to the whole head) of C^5. or S. El. W. to entire head. El. R. «—» El. Y. to occ., symp., plex. sol., hypogl. unct. to the hypoc. of F^2. and C^5.

257. **Spermatorrhœa.** — Compare *Urine, organs of generation.* Involontary loss of semen. SII. CII. d. f. Baths of C^5. S. El. W. El. R. «—» El. Y. to perineum and sacred nerves. Injections, in serious cases, of S. A. and C^5. unct. or compr. of F^2. to the hypoc.

258. **Spine.** — Myelitis. — Acute or chronic inflammation of the spinal marrow. SII. d. f. CII. d. f. C^2. A. d. f. But, specially, baths and unct. (to the vhole head) of C^5. or baths of A^2. or S., never the electricities before convalescence. At this time, apply comp. of El. W. the length of the spine. El. R. «—» El. Y. to occ., symp. temples, and sides of the seventh vertebra and the entire back bone.

a. *Displacement of vertebra;* see 258, but employ the electricities at the onset.

b. *Curvature of the spine;* see a.

c. *Humpback;* see a.

259. **Spinal marrow,** affections of. — C^2II. d. f. SII. d. f. A^2II. d. f. baths, unct., comp. of C^5. of S. S^5. unct. to the hypoc. of F^2. 20 gr. of C^5. or S^5. or C^4. or S^2. or *nuovo.* Baths of El. W. When the pain recommences, El. R. «—» El. Y.

Digitized by Google

to symp., plex. sol. unct. of C^5. to the hypoc.; see also 259.

260. **Spina ventosa.** — See *Nodes*, a.

261. **Spitting of blood.** — Hœmoptisis. A. A^2. C^5. Baths of C^5. unct. of F^2. to the hypoc. Baths, unct., comp. (to heart) of A^2. El. A. to symp. occ.; or C_{II}.

262. **Spleen.** — The affections of this organ produce the most strange phenomena.

a. *Splenitis*, inflammation of the spleen, F_{II}. d. f. comp. or unct. to the hypoc. of F^2. C^5. Baths of C^5. 10 gr. of $C.^5$

Baths of. El. W. El. R. «—» El. Y. to symp. plex. sol. unct. of S. A^2. to the hypoc. See *Liver*.

263. **Splenitis.** — See *Liver*.

264. **Sprains.** — S. d. f. or 20 gr. of S. $C.^5$ d. f. or 20 gr. of C^5. baths of C^5 S. A^2. or El. W. El. R. «—» El. Y. to all the nerves of the part; and to occ., symp., plex. sol. unct. of S. or S^5.

265. **Stammering, stuttering.** — Gargles with El. R. or El. W. S. El. R. and El. Y. to the little hypoglossids. Baths of C^5. Unct. of same to hypogl. Unct. also of A^2.

Congenital, as 265. Sometimes has been removed by a single application of electricity.

266. **Staphyloma.** — See *Eyes*.

267. **Stiff neck, crick in the neck.** — When with fever. F. and unct. to the hypoc. of F^2. or C^2. Without, or after fever has subsided, S. and unct. of S. to the part and A^2. El. W. in compr. Baths of C^5. unct. of S^5. El. R. to back of neck or El. R. «—» El. Y. to same part.

Digitized by Google

268. **Stings of Insects.** — C. d. f. compr. of C. of El. R. El. W. and El. A. unct., compr. of C^5. or S.

269. **Stomach.** — (Weakness of) El. R. «—» El. Y. to plex. sol., symp. S. d. f. S^5. d. f. or 20 gr. of this. El. W. to pit of stomach.

a. *Gastritis, Gastralgia.* El. R. «—» El. Y. to pit of stomach, unct. of F^2. or C^5. to hypoc. See also 269.

b. *Pyrosis.* Heartburn; S. A. compr., or baths of C^5. or C^5. d. f. El. R. «—» El. Y. to occ., symp. compr. of El. W or El. A.

c. *Indigestion* etc. S. or 20 gr. of S. or S^5. or unct. to the hypoc. of F^2. El. R. «—» El. Y. to symp., plex. sol. Baths of C^5. or El. W. for severe derangement of the stomach.

d. *Ulceration of stomach.* See *Cancer.* N. B. Ulcerations produce vomiting of pus and blood; scirrhus throws up a coffee coloured discharge.

e. *Nervous Gastritis.* FII. compr. to the hypoc. of F. or F^2. El. W. to symp., plex. sol. Baths of C^5. or A^2. unct. to hypoc. of C^5. or A^2.

f. *Convulsions of the bottom of the stomach.* See e. also SII. d. f. compr. or unct. to the hypoc. of F^2. or C^5. unct. of S. to the part.

g. *Dilatation of the stomach.* S. C^5. S^2. unct. to the hypoc. of F^2. or C^5. El. W. to symp., plex. sol. El. R. «—» El. Y. unct., compr. of C^5. to bottom of stomach (see diagram). Baths of C^5. or El. W.

Google

h. *Thumour at the upper* (cardiac) orifice of the stomach, CII. d. f. C^5II. d. f. El. R. «—» El. Y. to plex. sol. symp. compr. to same parts of El. W. or onct. or baths of C^5. Baths of S. or S^5. unct. to the hypoc. of F^2.

i. *Gastralgia*, accompanied with periodical vomiting, cramps (remains of ancient syphilis) F. Ven. unct. to the hypoc. of F^2. or C^5. El. A. Compr. to hypoc. of C^5. or El. R. «—» El. Y. to symp., plex. sol. or El. W. to aforesaid parts. Baths of C^5. S. and S^5.

l. *Gastralgia, after a meal, with violent pain.* See i, also unct. of C^5. to the painful part.

The cures of stomach complaints, of all descriptions, cannot be counted.

270. **Stomatitis.** — See *Mouth, Stomach.*

271. **Stone.** — See *Bladder.* S. has an elective action on stone.

272. **Strabismus, squinting.** — See *Eyes.*

273. **Strangury.** — See *Bladder, Urine.*

274. **Strictures**, in general, whatever they may be. — See *Loins*, using especially unct. and comp. of C^5. and A^2.

275. **Stupor**, produced by the abuse of quinine. El. R. «—» El. Y. to occ., symp., plex. sol. and the entire head. S. Baths of C^5. or S. or A^2. El. W.

276. **Stupidity.** — If proceeding from humours: S. d. f. El. R. «—» El. Y. to occ., symp., plex. sol., baths of El. W. of C^5. of S. unct. to the head of S. C^5. A^2.

If proceeding from disease of the liver: FII. d. f. unct. to the hypoc. of F^2. C^5.

Digitized by Google

The rest as above. If caused by a fall: insist on the baths above mentioned. When caused by fright: AII. A^2II. d. f. comp. unct. to whole of the head A^2. baths of the same or El. A.

There are cases of cure by some applications of E. R. to occ., symp., plex. sol.

277. **Suicide** (disposition to). — SII. d. f. baths of C^5. of El. W., El. R. «—» El. Y. to occ., symp., plex. sol. 20 gr. C^5. Baths of S.

278. **Sunstroke.** — El. R. «—» El. Y. occ., symp., super and sub orbit, forehead. Unct. (to the head), baths of C^5. compr. El. W.

Also, El. R. to back of neck. occ., symp., sides of the seventh vertebra, and all the nerves ot the head. Unct. or compr. to the head of C^5. S. d. f. 20 gr. of C^5. Baths of C^5. or S.

279. **Swelling of the face** (cold in the face). — S. Comp. unct. Beths of C^5. El. R. «—» El. Y. to sub. orbit. masseter, occ. El. W. to sub. orbit. Generally yelds to a few electric applications.

280. **Swelling soft.** — Without pain (anasarca), with weakness, thirst, diarrhœa, scantiness of urine.

Baths of A^2. S. d. f., and according to the case, F. d. f. or C. d. f. Baths of C^5. or A^2. El. R. «—» El. Y. to occ., symp. plex. sol., also baths of El. W.

Treat, in the same manner, a general swelling of the body.

Swelling of the hypochondres; FII. d. f. and unct. of F^2, and baths of C^5.

Digitized by Google

El. R. «—» El. Y. to symp., plex. sol., occ.; unct. to the hypoc. of C^5. comp. of El. W.

281. **Syncope.** — See *Fainting Fits.*

282. **Syphilis.** — Ven. internally and externally: C^5. C^4. A^2. Ver. S. d. f., repeated baths of C^5. are very efficacious, and of S. A^2. El. W. El. R. Ven. and S^5. comp. unct. of Ven. S^5. 20 gr. C^5. unct. to the hypoc. of $F.^2$ or C^5. El. R. «—» El. Y. to occ., symp., plex. sol. Injections and clysters, according to the case, of antivenereo.

The distinctions made between primary and secondary syphilis have for me no absolute value. Syphilis is only one; the degrees of gravity, the different forms that it affects, the complication of symptoms, etc., all depend upon the disposition of the organism which has absorbed the syphilitic virus. This is proved by the fact that one remedy is specific and chief in curing the alterations caused by syphilis. The other remedies, above indicated, act to support the antivenereo, a medicine which is fit to regenerate the human race. The cures, here, besides those reported by doctors Pascucci and Regard, are really innumerable.

The following syphilitic complaints can be attacked and radically destroyed by the medecines above indicated, namely:

The eruptions on the skin, nodes, (comp. of Ven.) gummy or old syphilis, weakness from venereal excess, bubo, falling off, wasting condylomata (syphilitic warts) deep wounds, inflammation of the inguinal glands, fetid ulcers.

Digitized by Google

Wounds with leathery edges, ulcers and ulcerations of the prepuce, hard ulcers with sharp edges, inflammation of the glands, pains in the bones, complicated inflammation of ganglion following on fatigue.

The chancre, hard or soft, blenorrhagia, primary syphilis, gonorrhea, warm piss drop discharges from the urethra or vagina, stricture of the urethra, blenorrhœa, chronic inflammation of the urethra or vagina, syphilitic crest, syphilitic orchitis, unequal adenitis, peeling of the epidermis, and daily fever, prepuce swollen, forced back with venereal warts on the glands, phagedenic chancres of the glands, the canal of the urethra raw, syphilitic abscesses of the skull, etc. It must be borne in mind, that the remedy is to be attenuated in proportion to the gravity of the disease, and also, that the anticancerous are necessary, in serious cases, to support the action of the antivenereal.

T

283. **Teeth.** — Affections of the teeth in general. S. C. A. Unct. of C^{5}. to the part affected by the pain. Gargles which may be alternated with the electricities red or or white, angiotic or red.

a. *Receding of the gums;* wash the mouth with water in which is dissolved some

Digitized by Google

C^5. or 20 gr. of C^5. Baths and unct of C^5. Baths and unct. (to the jaw) of S. El. W. or El. A. in the mouth A. S.

b. *Toothache.* El. R. to the external point of the pain; if, of no effect, El. Y. and unct. of C^5. Baths of C^5. S. Compr. El. W.

c. *Toothache, with swelling of the face,* see b.

d. *Difficult dentition:* to the nurse, S. or 10 gr. of A. Unct. of C^5. to the infant's jaws, El. R. «—» El. Y. to massiter.

e. *Dental fistula:* as 283; also wash the mouth with 50 gr. of C^5. dissolved in a glass of water. Unct. and compr. of F^2. to the hypoc.

f. *Toothache* caused by cold; El. R. «—» El. Y.; compr. of El. W.

Diseases of the teeth cured by these means are innumerable.

284. **Tenia.** — See *Worms.*

285. **Testicles.** — Simple inflammation of the Testicles. Baths, unct., compr. of C^5. CII. d. f. 10 gr. of. C^5. Baths, unct., compr. of S. Compr. of El. W. El. R. «—» El. Y. to the sacred nerves, pubis, perineum. AII. Unct., baths A^2.

Venereal orchitis. Ven II. Compr. of Ven. unct., compr., baths of C^5. of S. El. W. unct., of A^2. CII. d. f. Compr. of C.

286. **Tetanus**, complete or partial. — Compare Lockjaw. Partial tetanus has been relieved by El. Y. to the occiput only: complete, by the same applied to the occ., symp., plex. sol. and all the affected nerves.

Digitized by Google

287. **Throat.** — Laryngitis, inflammation of the larynx. SII. PII, C^2 II. alternated; gargles of El. W. C^5. S. Baths of C^5. S. $A.^2$ El. R. «—» El. Y. to occ., symp., unct. of. C^5. to the hypoglosses A^2II.

a. *Rheumatic laryngitis*, as 287, also compr. C^5. S^5. and El. A.

b. *Angina pectoris.* N. 287. Unct. to whole of the chest of C^5. gargle El. R.: same, with oppressed breathing. — See *angina pectoris;* also compr. of A. to the heart., to sides of seventh vertebra (at the base of the neck, at the level of the shoulders; see diagram) and pit of the stomach. El. A. in same manner.

c. *Simple sore throat.* FII. d. f. afterwards S. d. f. gargle El. R. and El. W.

d. *Diphtheria.* C. d. f. gargle of C. S. El. R. El. W. and El. A. The same treatment for the *granolous angina.*

e. *Affections of the windpipe;* as 287.

f. *Difficulty in swallowing;* as 287. El. R. «—» El. Y. to great hypoglossids.

g. *Cancerous Tansils;* as 287 frequent and abundant gargles.

h. *Clergyman' s sore Throat.* S. «—» AII. gargle of El. W. or R. El. R. «—» El. Y. to the hypoglos. See 287.

A weakened voice may be restored by El. R. to symp.

i. *Tumour of the pharynx;* see 287. Abundant gargles and unct. of C^5. to the throat.

288. **Throat-burn.** — *Pyrosis;* See *Throat, Stomach.*

289. **Tic painful.** Neuralgia, Faceache. — Unct. to part affected of C^5. S. A. or El. R.

Digitized by Google

«—» El. Y. compr. El. W. or El. A. or C. S. C^4. A. A^2. internally. Baths of C^5. S. and A^2.

290. **Tongue.** — (Cracks and inflammation of) Sii. C^5. S^5 ii. d. f. gargles of same remedies, or with El. W., or R. El. R. «—» El. Y. to the hypogl. occ., or else baths, unct. (to hypogl.) of C^5. and S. gargle of A^2.

291. **Tonsilitis.** — Swelling, redness, and hardness of the tonsils.

S. A. gargles with these remedies, (20 gr. to a glass of water.) Gargles of El. R. El. W. or El. A. Baths of C^5. comp. of C^5. to the external parts, *chronic*, the same treatment.

292. **Trismus.** — Tetanic stricture of the jawbones with cracking of the teeth. El. Y. to the occ. maseter symp. unct. of C^5. baths of C^5.

293. **Tumours.** — Insensibility is a cancerous characteristic; in this case treat as cancer.

a. *Fleshy, soft, moist, reddish vegetations*, warts, condylomata, wens, etc., employ S. C^5. A.

b. *Tumours of the breast, bones, knee;* see *Breast, bones, knee.*

c. *Hydrocele*, Tumour of the scrotum from serous accumulation. C. A. A^2. See *Cancer.*

d. *Varicocele*, tumour of the scrotum produced by dilation of the veins, A. A^2: unct. of A^2. unct., compr., baths of C^5, baths of A^2. compr. of A^2. El. A. S. internally with unct. of same.

e. *Tumour of the cornea*: Staphyloma. S. C^5.

Digitized by Google

A. unct. of C^5. compr., baths of the same, Baths of S., unct. compr. of S. over the closed eye. Unct. of A^2. El. W. to the closed eye. El. R. «—» El. Y. to occ., symp., super and sub. orbital. Unct. to the hypoc. of F^2. and C^5.

f. *Tubercular tumour of the belly:* C. Baths, compr., unct. to the belly of C^5. 20 gr. C^5. Baths of S. A^2. and S^5, compr. of El. W. to the belly, El. R. «—» El. Y. to symp., plex. sol. and loins.

g. *Internal fibrous tumour*, giving the appearance of advanced pregnancy, but with decided hectic symptoms. C. and unct. to the hypoc. of. F^2. The rest as f.

i *Cure of a scrofulous tumour of the thigh bone*, which was decayed in three parts, disease of nine years standing.

(Idem) Cure of a tumour accompanied by serious disorganization of the ankle of the foot, (consequent on fracture,) and which it was proposed to amputate.

U

294. **Ulcerations.** — See *cancer, scirrhus, skin.*

295. **Ulcers, phagedemic, veneral** or of syphilitic taint. See *Syphilis.*

a. *Scorbutic ulcers.* S. C. A^2. C^5. Gargles with all these remedies. Baths of C^5. S. A^2. S^5. Gargles of El. W. El. R. «—» El. Y. to symp., occ., plex., sol. gargle of El. R. or El. A.

b. *Varicose ulcers* . See *varicose veins.* Unct., compr. A^2. The same internally with

Digitized by Google

baths of A^2. Unct. to the hypoc of F^2 or C^5. Baths, unct. and compr. of C^5.

296. **Urethra.** — Congenital stricture. S. compr., unct. baths of S. baths unct., compr. to the urethra of C^5. S^5.

Compr. El. W. Injections of S. or C^5. El. R. «—» El. Y. to sacred nerves, pubis and perineum, Baths of El. W., or El. R.

Stricture of the urethra from external causes: as above. — Cure of a man aged 53 years, and another of 39 years, afflicted with congenital stricture of this class.

297. **Urine.** — See also *Bladder*.

a. *Albuminuria*, (urine charged with albumen, Bright's disease). C. C^5. S. S^5. d. f. Baths of C^5. S. A^2. S^5. El. W., or El. R. El. R. «—» El. Y. to occ., symp., sacred nerves, and along the spine.

b. *Dysuria;* difficulty in passing water. SII. A^2 II. d. f. 20 gr. C^5. and as above, a.

c. *Hæmaturia.* (bloody urine.) A^2II, AII. SII. d. f. compr. unct., (to sacred nerves) baths of A^2. compr. over the region ot the heart with. A. unct. to the hypoc. of F^2. Baths of El. A, or W. El. R. «—» El. Y. to occ., symp. plex. sol. and sacred nerves.

d. *Spermatorrhœa*, as a. and b., also see the word.

e. *Incontinence of urine;* see the word.

f. *Loss of urine.* S. d. f. El. R. to the sacred nerves. El. R. «—» El. Y. to same, or El. A. see b.

Digitized by Google

g. *Scalding urine.* See a. When there is, alternately, loss and difficulty of passing, follow the remedies indicated under letter a. The same for dysuria after the extraction of the fœtus.

298. **Urine.** *Incontinence of.* — S. 20 gr. of C^5. A^2. Baths of C^5. S. A^2. El. R. «—» El. Y. to sacred nerves, to symp. Compr. of C^5. to pubis also of S. A^2. El. W.

a. *The same* when produced by paralysis of the prostrate gland.

b. *In children.* Verm. El. W. to sacred nerves, to pubis. Compr. to pubis of A^2. El. R. «—» El. Y. sacred nerves.

c. *Paralysis of the bladder.* Also 298. also injections of El. W. or A. unct. of C^5. to pubis and perineum.

299. **Urine**, retention of. — See *Bladder.*

300. **Uterus.** — See *Womb.*

V

301. **Vaccination** maladies consequent on inoculation of the vaccine. — S. and the remedies 298 a.

302. **Vaginitis.** — Inflammation of the nervous surface of the vagina, acute or chronic, and all its varieties (erythemathous papular, vesicular or eczematous). C II. C^5 II. d. f. Baths of C^5. and compr. to pubis, perineum, and sacred nerves. Baths of S. and S^5.

303. **Varicose veins.** — Wounds, varicose ulcers, complicated with rheumatism, etc. treat by angioitics internally and ext. Add. also, baths and unct. C^5.

Digitized by Google

a. *Old, indurated varicose veins* of the knee, or abdomen, as above, also baths of C^5. A^2. unct. of C^5. The cure is certain.

304. **Varicocele.** — See *Tumours* and *Varicose veins.*

305. **Vegetations, fleshy.** — See *Tumours;* treated under all forms by anticancerous, and antiangioitics.

306. **Veins, affections of.** — Phlebitis, Phlegmasia, Alba dolens, etc. See *Blood.*

307. **Vertigo, from excess of blood.** — Employ the angioitics mentioned 297 letter d. Vertigo after miscarriage, C II. d. f. if proceeding from the spleen F II. d. f. Unct. or compr. to the hypoc. of F^2. C^5.

308. **Viper** (bite of). — I have not yet treated such a case, but I think that the antiscrofoloso expels the virus, from the reason of its action on other poisons.

309. **Voice** (loss of). — El. R. to occ., symp., plex. sol. especially to pit of stomach. Also El. A., or else El. R. «—» El. Y. to the hypogl. and pit of the stomach. Gargles of El. W. S. A^2. internally, baths of C^5. A^2. See also *Throat*, letter h.

310. **Vomiting.** — S II. d. f. 10 gr. S. The same remedies also apply to the vomiting of pregnancy.

a. *Hœmatemesis,* vomiting of blood, procceeding from the mucous membrane of the stomach, more or less dark-red in colour, A II. A^2 II. d. f. See also *Urine*, letter d. Hœmaturia.

b. *Hœmoptysis;* spitting of blood; a symptom, always connected with serious lesions of the chest, and frequently indicative of

Digitized by Google

tubercular diathesis. It requires antiangioitics, pectorals (if there is cough) and the medicines indicated, article *Lungs*.

c. *Melœna;* see the word. The cause, above all, must be studied, as it may be either a symptom of enterorrhage (exhalation of blood to the surface of the mucous membrane) or a specific disease, characterised by intense colics, paleness of the face, fainting, etc. The remedies must be selected conformably, employing small doses: See *Rectum*, loss of blood from.

d. *Continual vomiting* lasting 15 months, cured. In general, unct. to the hypoc. of F^2. El. R. to bottom of stomach S. II. d. f. 10 gr. S. Baths of C^5. S. compr. of El. W. to bottom of stomach El. R. «—» El. Y. to plex. sol., symp. and pit of stomach.

e. *Periodical vomiting*. F. II. d. f. unct. to the hypoc. of F^2. or C^5. See 310.

f. *Vomituration*. See stomach.

Cure of Vomiting in every form. Vomiting by the nose; daily, with diarrhœa, etc. In general, the remedies indicated above, and letter d.

W

311. **Warts.** — See *Tumours*.
312. **Weakness.** — See *Debility*.
313. **Wen.** — See *Glands*.
314. **Whitlow.** — At the onset, try the abortive treatment by compr. El. W. or El. R. or baths, unct., compr. of C^5. after the com-

Digitized by Google

mencement; if not arrested, treat with S II. C II. d. f. compr. of S. or sometimes A^2.

315. **Whites**, see *womb* and *abdomen*, letter o.

316. **Womb** (Pains in) generally cease with first spoonful of C. or C II. Baths of C^5. unct. comp. of same to the pubis. Baths of S. or A^2. El. R. «—» El. Y. to the sacred nerves and symp. compr. of El. W. to the sacred nerves S. II.

a. *Metritis (puerperal)* inflammation following after confinement. S. II. d. f. C. II. d. f. C^5 II. d. f. or 10 gr. C^5. Baths, unct., compr. to pubis of C^5. El. R. «—» El. Y. to sacred nerves, or baths of S^5. or A^2, El. W. to pubis and sacred nerves.

b. *Ovaritis.* Inflammation of the ovaries. See a, also, unct. of C^5. to the parts, and El. R. «—» El. Y. to symp., plex. sol. and sides of the spine.

If there is congestion SIII. d. f.

c. *Ovaries* and all their diseases, CII. d. f. and the electricities as b.

d. *Polypus of the womb* (compare cancer) CII. «—» A^2II. Baths. unct. (to pubis) compr. of C^5. or A^2. 20 gr. of C^5. El. R. «—» El. Y. to sacred nerves. Compr. to pubis of El. W. Injections of C. C^5. C^4. A^2. S^5. S^2. Baths of S., and in case of hœmorrhage, baths of A^2. compr. to heart of A.

e. *Falling of the Womb;* see d. also compr. of El. W.

f. *Spasms of the Womb;* see 316.

g. *Retraction of the ligaments of the Womb;* see d.

Digitized by Google

h. *Chronic congestion of the Womb;* see 316. and frequent injections as d.

i. *Granulations of the Womb;* see d.

l. *Nervous affections of the Womb.* See *Hysteria*, employ the 3rd dilution, d. f.

m. *Uterine melancholy;* see l.

n. *Uterine headaches;* see l. with light compr. of El. R. or W. to the super orbitals.

o. *Hœmorrhage of the Womb;* see *Menses.*

p. *Change of life;* see *Menses,* also Sii. d. f.

q. *Periodical colic of the Womb;* Fii. d. f.

r. *Disorders caused by painful labours;* see d.

u. *Convulsions of the Womb;* Ciii. d. f. the rest as letter d.

317. **Worms.** — Ascarides, (thread worms) lombricoides (stomach worms) tenia, tape worm, tricocephale, etc. employ the vermifuges at the 1st or 2nd dilution according to the case.

a. *Disorders caused by worms:* Diarrhœa, vomiting, convulsions, etc. The vermifuges, and unct. and compr. of F^2, C^5. to the hypoc.

b. *Tape worm.* Give, at first, a decoction of senna; the day after, commence by employing the vermifuges.

Sometimes, the expulsion of the worms shows them entire or in pieces, at others these are not visible, although the state of health proves the cure.

318. **Wounds.** (To arrest immediatly the bleeding of): compr. of El. A.

Afterwards, to complete the cure, S. C. A., compr. El. W. El. R. or El. A. Baths of C^5. compr. of the same or baths and unct. of S. Baths, unct. and compr. of A^2. unct. to the hypoc. of F^2.

Digitized by Google

319. **Wounds gangrenous.** C. A^2, compr. of these remedies, baths, unct., compr. of C^5, S. A^2. compr. El. W. El. G., El. A. Baths, unct., compr. of S. El. R. «—» El. Y. to corresponding nerves.

a. *Wounds resulting from burns.* — As 319. Also large compr. of A. A^2. C. C^5. C^4, and especially S.

S. and S^2. hasten the cicatrising. If there is pain, El. W. El. R. «—» El. Y. to corresponding nerves.

b. *Large burns on the hip and knee*: a patient given up after 6 months of useless treatment, cured by C. alone, given internally and externally.

c. *Wounds and swellings over the entire body.* (Cold humours) cured by Ch. d. f. and strong compr. of C.

d. *Enormous scrofulous wound*, cured by S. alone, internally and externally, and alternate compr. of El. W. El. A. El. R.

e. *Wound and swelling of the hand.* Cured by C. «—» S. internally and externally, and the electricities as d.

In conclusion, my aim, as I have already stated, was not to report, here, either the number or the details of the diseases cured by the new Therapeutic; I have only wished, in this catalogue (relying entirely on facts proved) to display its ressources, so that it may be easy, for every one, to employ it; again, it is to be remembered, that the catalogue is not an invariable formulary for all similar cases, it is, only a guide which should be consulted, after one is

Digitized by Google

thoroughly imbued with the principles and nature of Electro-homœopathy, such as I have shown them before.

I will finish by a general remark, namely, that in obstinate and rebellious maladies, an unexpected resource is frequently found in *anticanceroso* 5, unct. made, with this remedy, to the hypoc, or with *febrifugo nuovo, or 2*, as also with *vermifugo* given in the dose of 10 dry globules, on the tongue.

Digitized by Google

Digitized by Google

APPENDIX

The facts, proclaimed by the *new medicine*' are certainly so marvellous, that, unless they have been witnessed, they form a subject of hesitation for some, and of disdain for others. This mistrus is only too well understood, at a time, when mystification and jugglery seem to dominate the world; but disdainful refusal ought, no longer, to be permitted to educated persons, who see new facts announced, every day, which, in a former age, would have appeared impossibilities.

The extraordinary discoveries in physics, are no longer astonishing; however, *physicians* have qualified, with the name of *hallucination*, the cures wrought by electro-homœopathy (1). This would prove that medical science is very little advanced; some physicians do not, even, believe in the possibility of real discoveries in medicine.

When facts exist, the marvellous, which surrounds them, is not a reason of rejection; the only task of science is to endeavour to account for it.

(1) See the pamphlet: *La Scienza nuova del conte Cesare Mattei, e la Scienza vecchia del dottore C.; Casale-Monferrato. Paolo Bertero, 1878.*

Digitized by Google

ave introduced, here and there,
rations in this work; this is also
further details, which, in the
y, would have caused too much
general plan, which was, before
te the reality of the discovery,
ve and explain it scientifically.
the pretention to present a theory
thy, which, in reality, does not
ose, simply, a sketch which ap-
nnect known facts with the mar-
s have taken for clairvoyance.

draw from the exterior world
h serve to form their bodies, to
the whole of their organs, the
f which characterises life. Under
of food, must be comprehended
of contributing to the structure
nd thus, developing the pheno-
apted to the state of life.

s, once introduced into the diges-
lergo gradual transformations by
gastro-enteric fluids, until, after
refined part of the alimentary
the blood, whereas the inso-
ulates in the lower folds of the
ich finishes by getting rid of
of the economy.

t of the aliments, which is direct-
carries, with it, the principles
nstruction of tissues, principles
y its movement, is charged to
ts. But the fluid, drawn from
complete, and is not vivifying,
united to oxygen; this is why,
the course of the great circula-

Digitized by Google

tion, the nourishing fluid charges itself with the atmospheric element in the cells of the lungs. Thence the blood, combined with oxygen, *becomes the plasm of tissues, and the potential agent of phenomena which jointly, constitute the manifestation of the organic life of a being.*

The blood contains, so to say, all the life, in the same manner that the re-agents, placed in the cells of an electric battery, contain virtually the potential and all the effects of the electric current, which springs forth when the circuit is completed.

Thus, the nutrition, the growth, the play of the apparatus of life; then, the dissolution, the return of the elements to the inorganic world, result from the combined work of the air and the alimentary matter; this is why every living being depends upon the soil and the atmosphere. Then, it must be added, that all these changes of absorbed materials are accomplished by means of a gradual and increasing oxydation, of which, the formation of the blood is the mean term, that of the tissues, the highest term, after which the more advanced degrees of oxydation tend to decomposition, that is to say, to bring back organised matter to the exterior world, under inorganic forms.

To sum up, the aliments form blood by oxydation, the blood by oxydation produces the tissues, these, by super-oxydation give rise, by the increasing instability of molecular groups, to the products of elimination which abandon the organism, and again, return to inanimate nature. The work of transformation, which changes the aliment into blood, commences at the entry of the digestive apparatus, at the contact of the salivary secretion, is continued in the stomach and intestinal canal, under the combined influence of the bile, the

Digitized by Google

'o-enteric juices, etc.; so that the
ood through the digestive organs,
to the opposite orifice, has for
ution of the nutritive juice. The
s take it up, by capillary attrac-
osis, in proportion as it is pro-
to the thoracic canal, whence the
ation carries it on. Here oxygen
pursues the series of transfor-
he work of the stomach finishes,
f the lungs and heart, and life,
, is the work or continual labour
nental organs.
s physico-vital labour, it is neces-
first, the elements which the blood
ich are incessantly furnished by
gastro-enteric digestion. Blood is
', albumen, sugar, fat, and mi-
coming from the contact of the
ice and the intestinal secretions,
to fat; sacharine matters are only
es, and it is, under this form,
, place in nutrition. After this,
act may be considered as a solu-
atty bodies and mineral salts in

umen, by a first degree of oxyda-
fibrin of blood, the oxydation;
the tissues, the fibrin is depo-
ned into solid muscle. In fact
ced by introducing oxygen into
acted from the arteries; only
is amorphous, for form cannot
know, apart from the natural
sm.
ns sulphur and phosphorous; by

Digitized by Google

the partial combustion of the sulphur, the albumen is converted into *caseine*, the ulterior oxydation of which, through the course of the blood, gives rise to the formation of the sides of the sanguine vessels, to the connecting sub-cutaneous tissue, to the elastic ligaments, to the skin, and to the whole mass of matter distributed throughout the organism, which, on boiling, separates in the form of jelly. The skin, with its appartenancies, is only a species of crust of the oxydation of caseine, a crust which disappears and is renewed by the progress of successive oxydation.

As to the fatty bodies, it may be said that they assume a direct place in the formation of tissues, which, without these, would be wanting in supdleness and elasticity. The different movements, which take place in all parts of the animal machine, would, every where, produce disorder, suffering and constraint, if the friction of the hard portions was not removed by the interposition of the fatty and other similar bodies. Besides this, fat seems to be the principle which causes evolution: the white corpuscles of the blood, the first globules separated from the nutritive fluids which unite in clusters and granulations to form the utricular tissue, are composed of fat, enclosed in an excessively thin albuminous membrane.

Finally, the mineral elements of the blood rank in the organism, as the means of forming the frame of the solid parts and the canvass of tissues; this can be proved by the incineration of the portions of the body, properly managed. Thus the entire organism results from the materials contained in the blood, the true starting point of all the tissues. Nothing except the form, is contained in the tissues which did not pre-exist in the blood; in its

Digitized by Google

aws all its materials from the
e is nothing in the blood which
ɜ alimentary matters.
iples of the blood have not, all,
ɔn in the composition of the or-
ntrary, every tissue appears to
hich is adapted to it, and to re-
this species of selection which,
ɪs the curious phenomenon of assi-
ɪenon which has been explained,
by the known laws of physics.
ne fluid, starting from the centre
penetrates into the extremities
ɪ a speed which goes on decreas-
to the diameter of the vessels,
ɪt, more and more, seem to be
ɪt their extremeties, extremely
icated networks: the *capillary*
hese meshes, that the sanguine
d its current, reduced to its
:rested; the blood, then, passes
:nother by a real *transudation.*
ɪat the materials, carried along,
:e, deposited in the same man-
y, there takes place a sorting
ɪd fractional filtration; the nu-
ɪ step, divests itself of principles
hrough the pores of the tissue
udation takes place. To these
s of the system must now be
ɪction and affinity which inter-
, to arrest *similar* molecules,
to regulate the arrangements
the different tissues. The laws
ry where, the same; the aste-
ch turn from their course by

Digitized by Google

the vicinity of the earth and fall, by attraction, towards its surface, and the corpuscles of the blood, which, during its course, fall into the meshes of the surrounding tissues, obey the common law of attraction; and it is this law which explains the phenomenon, apparently so unlike, of the circulation of matter in space and in living atoms. But it will be remarked that the explanation, that I here give of *assimilation*, necessarily supposes an organic arrangement, or else a pre-established structural plan, without which, the organization of the elements, conveyed by the blood, cannot be understood. But there is the mistery of the creation, the point which escapes the known laws of matter; it is the principle called *Enormou* by Hippocrates, the *archea* of Van Helmont, the *plastic force* of Cudwort, the *anemisma* of Stahal, the *vital principle* of Barthez: the principle, which probably will escape all the physiologists of the world, and all researches of philosophy, as well as the power of the microscope. But it needs not be concluded from this, that: « this all powerful and inexplicable principle takes possession of the constituent parts of the body, destroys, in them, all tendancy to conform to the laws of pressure, shock, force of inertia, fermentation, and of putrefaction, etc. and submits them, only, to the laws of life, that is to say, maintains them in the state of sensibility and activity necessary to the preservation of the living being, in a dinamic almost spiritual state. » (Hahneman.) The vital principle cannot annihilate the properties and forces of matter; but this principle, being supposed present, and the structural plan being given, the arrangement of matter, in the organism, is a physico-chemical process which can be followed so far as to explain, by known laws, the organic transformation of matter.

Digitized by Google

hat the parts of the organism are
ed by means of oxydation and it
rocess, that the assimilated ele-
ed and, finally, ejected from the
at the same time, both the crea-
uctive agent of the tissues com-
m.

he formation of excremental or
tion which result from the pro-
oxygen upon the elements of the
te corpuscules, six hours after
the blood, are found changed to
lobules; later on, they assume
flesh; finally, at the end of
are eliminated from the tissue,
bustive products, become useless
nd incapable of sustaining its

acts of this muscular oxydation
ne appearance of creatine, crea-
sic, nitrogenous compounds very
oxygen. Their presence has even
the blood; by the process of
es pass into the state of uric
h represent the highest point of
scle or fibrous tissue. The blood
hese products in its passage
he urinary organs carry them
as fast as they are formed.

so, with which this work is ac-
ng time prevented the discovery
that these products of reduc-
normally in the blood and in
be said, in a general man-
of the organism, moistened by
at of the union of oxygen with

Digitized by Google

the hystological principles; union, of which the result is the formation of creatine, uric acid, and urea. They are not the only substances which represent the products of reduction, whose composition, it is understood, must vary, according to the nature of the tissue from which the elements fall again. Thus the albuminoid and colloid bodies, scattered throughout the organism, give rise, in their union with oxygen, to the formation of *leucine*, a body which, in fact, has been found in the salivary glands, in the pancreas, in the lungs, in the lymphatic glands, etc. either as a recrement, or as a recremento — excremental product.

The nitrogenous ternary bodies, composed of hydrogen, oxygen and carbon, such as sugar and fat, are also eliminated from the economy, by the labour of progressive oxydation, of which the last point is water and carbonic acid; whereas lactic acid, butiric acid, formic acid, oxalic acid, etc. represent the intermediate degrees of oxydation. These products are, also, found in the economy, and can, also, be produced in muscle, detached from the living body, by plunging it into oxygen; this, evidently, proves that their formation in the economy is entirely due to oxydation.

These new products leave the organism by different issues, namely: by the lungs, the loins, and the entire surface of the skin; a part of the water and carbonic acid exhales, in the gaseous state, from the lungs and from the skin, by perspiration; the rest escapes by the urinary organs. The function of the skin is, here, analogous to that of the lungs; only, the latter absorbs more than it rejects. The intestinal canal assists, also, in the elimination of the products of reduction, as these products are found, in the state of mucous, mixed with the insoluble residue of the aliments.

Digitized by Google

principles, contained in the orga-
have stated, form the framework
re also re-exchanged, transformed
r the most part, by the urinary
te of carbonates, sulphates, phos-
which are found abundantly in the
parts of the body, which fall into
hair, the nails, corns, etc., belong
products of slow and progres-
ich works, without ceasing, in
ganism and, by means of which,
etual exchange of matter between
d animated beings.
unning through its circle, goes
nical arrangements in the living
ts of which the characteristic is
nce of crystalline forms; it is,
l into different groups, during
f which the characteristic is a
ty of composition and the decided
stalline forms, proper to mineral

poken of the transformation of
averses the living organism; but
es, which govern the working
atus, result from these trans-
be seen.
well known in this day, of the
g forces in all the transforma-
atoms, which fall from the blood
ass of the tissues, change their
, but they cannot lose the living
heir first movement. But it is
, which, afterwards, appears
e: each atom of blood which is
he midst of the organism, a

Digitized by Google

quantity of vital energy, exactly equivalent to the lost motion, in the same manner es each atom of charcoal that burns, develops a determined quantity of heat, and each particle of zinc, which is dissolved in an electric plate, throws, into the conductor, an equivalent quantity of electricity. Thus, the living force, existing in the atoms, at the moment they leave the blood, is found converted into the proper force of the organs to which the atoms are to be united, and of which, consequently, the working is the organico-vital equivalent of the atomic properties and energies. Whatever may be the difference between the two phenomena, it is sufficient to know that one is the result of the other, to convince that an equivalence exists between them. But the working of the apparatus cannot take place without the action of the blood; then, the organico-vital phenomena, or else the working of each organ, represent the equivalent of living forces of the elements of blood, which is, for this reason, called the *vivifying element.*

Equivalence does not, in general, mean similitude; a weight, which falls, is far from being similar to heat; the solution of a metal, in a voltaic pile, is not similar to electricity; however, there is mathematical equivalence. In the same way, the transformation of the corpuscules of the blood have no resemblance with the vital phenomena which follow on. But, it is necessary that there should exist, also, a correlativeness of equivalence, as the organism cannot create or annihilate anything.

But the phenomena of which the whole, jointly, constitutes the organic function, have, necessarily, a resemblance between themselves; and this function is only the continuous reproduction of a fixed order of phenomena; life, itself, in its entirety, is only a

Digitized by Google

nomena, succeeding each other
The reproduction of similar
is the continuation of the other,
ıe re-exchange, on the other
ng of materials in the midst of
re produced, lead us, of course
re is a certain disposition, a
of these materials necessary to
In other terms, it is necessary
ich leave the organism, and
replace them, be *similar*, that
developing the same energies,
thing, of passing by the same
of being reduced to the same
and excretion. The functions
ty, constitute organic life, can-
eived.
on, which departs from the
organ, deranges life, and is
; its repetition and duration
isease is not a defect, except
does not affect matter which,
order of transformations it
less, preserve its properties
the physiological functions
ought into the organs, but by
ch differ, in their mode of
se place they take in the
f the bodies which we may
d *heterodynamic*, has, for
or transition, from the range
) life, to the range of pheno-
e.
ble of restoring its natural
ganism, is a *medicine*, and,
nalysis, a medicine is the

Digitized by Google

ponderable or imponderable matter, which, by its passage through the organs, re-establishes the natural functions when deranged, in whatsoever manner it may be. Then, in order that a matter may act thus, it is, above all, necessary that it reaches the points of the organism where the disorder has sprung forth; therefore *decided relations must exist between a therapeutic agent and the corruptive heteromorphous elements.*

The necessity of carrying the restorative principles to the very centre of the viciation or lesion is evident, as they must displace and expel those which have caused the mischief. On the other hand, known facts authorise me to state that a *certain similarity* is the condition necessary to enable two atoms to replace each other, and fill the same part in the living tissues. I know, in fact, that the different materials, carried by the blood, are drawn, each of them, to homologous parts; and the law, according to which these bodies are ranged and assimilated to one part more than another, depends, essentially, on the affinity and the atomic configuration, in respect to the texture of the network forming the organic woof irrigated and penetrated by the blood. In reality, it is the similarity and affinity which, in the process of nutrition, sort out the elements distributed in the blood. This is why, the salts of soda, potass, phosphorous, etc., which the aliments discharge into the blood, mixed together, are soon separated, the soda going to the plasma, the potass to the globules, the phosphorous combines with the fatty bodies, and afterward, with the nervous tissues. This is, then, a fact, a general law of the organism, that the different elements which traverse it, are separated from the liquid which carries them, directed towards and joined to

Digitized by Google

their homologous centres, there to replace their similars. This, then, is the relation which ought to exist between the morbid principles and the therapeutic agent, proper to overthrow them; this is, evidently, the reason of the *law of similars.*

Only, let the words be thouroughly understood, for it might be believed that a *similar remedy* could only add to the evil. Similarity is not *identity*, which is only a particular case of similarity. A similar, as regards our question, is matter capable of replacing, in the altered parts of the organism, the morbid principles found there, either in a latent state, or in one of morbid activity, and to form, by its substitution, new atomic groups of which it is possible, for the organism, to rid itself by its natural actions. I have seen that the organism renews and recasts its tissues, incessantly, by gradual transformation of the constituent elements; it is natural to believe that this work of renewal is deranged in the suffering or altered parts; the resistance to transformations, on which depends the organic vitality, is, necessarily, greater in the heteromorphous elements, as these elements, no longer, revolve in the orbit of life, and have not the same manners nor the same ways of dispersion.

This is why the restorative agent, although bringing similar elements of substitution, ought not to be indentical, as it would in the case only continue the same state of things. I now add that, after substitution, new atomic groups ought to be found, of which the organism can disengage itself, by means of its natural actions. Then, this is what ought to follow, as, on one hand, the labour, even of substitution, is the awakening of vital activity in the altered parts; on the other, the condition of a least fixity, of a least resistance to transfor-

Digitized by Google

mation, can always be realised, in the new combinations produced by the substitution of a similar. This is, no more, than a question of posology, and of attenuation of the matter, which is made to intervene in the place of the corruptive elements.

So, the similar medicine is placed between two classes of phenomena: disease and the normal state of the organism; the result of its intervention is, at first, to lessen, then gradually destroy and, finally, expel the evil.

I shall not stay to develop the consequences of the principles set forth, of which every one can seize the theoretical importance, to make himself acquainted with the truths and the practice proclaimed by the newly discovered medicine, and specially with the fundamental axiom that: LIFE IS IN THE BLOOD, DISEASE IN ITS VICIATIONS, AND MEDICINE IN SIMILARS.

Digitized by Google

Digitized by Google

ANSWER

Addressed by Count Mattei to the Editors of the Revue électro-homœopathique de Genève, *on the subject of the article:* Le nouveau livre de M.r le Comte, *contained in n.° 5, 1878. This communication, the editors refused to insert.*

Gentlemen,

You have announced my name, amongst the contributors to the *Revue;* I now make a beginning, in order to justify your advertisement, so that, I hope, you will find no difficulty in inserting, in your next number, these few remarks that I have the honour to make, to correct the errors into which you have fallen, in your article on **the new book of Count Mattei**, article which I first read in n° 5 of the *Revue.*

You express *regret that Count Mattei has, so evidently, availed himself of the work of M. Bérard. — a book which you know by his letters, that he made such a great affair of, hardly a year since — without once mentioning the author, etc.*

Gentlemen, I have not ceased to make a *grand affair* of this book, and, above all, for two reasons, namely:

Digitized by Google

M.r Bérard was one of the first
urage to launch the boat of electro-
the midst of the waves, raised by
Allopathy; you see, that I wish to
ice.

it would be contrary to all common
bsurdity, not to make much of that
to us, specially when it is a question
us, our own discoveries.

to know, Gentlemen, that all the
eas, the essential points, the prin-
o-homœopathy set forth in the book,
complained that I do not make much
belong to me, having been drawn,
own works, or various letters which
vailed upon me to write to him, and
mployed to give relief and consistence

evident, Gentlemen, that, without
ny writings, the book *Spécifiques*
opathiques of M.r Bérard would never
it may, also, be believed, that, without
ance, very few persons would have
existence of a corner of the world,
which has the honour of possessing
e name of Bérard. I wish to say, by
ithout me, Loriol and Bérard would
this day, strangers to electro-homœo-
y as you, Gentlemen, are probably
he world of the moon.

refore wrongfully, that you complain
copied *my writings*, of *having so*
l myself of my own; you are also
n you suppose that I wish to *annul*
formerly appreciated.

l you, however, that every body does

Digitized by Google

not make so much of the book of *Spécifiques* as I do; many persons, even at Geneva find it imperfect, much below what it ought to be, to serve as a guide in the treatment of diseases. Behold, on this subject, what has been written to me from many parts of Switzerland.

« After having administered, with little or no success, the two remedies alone indicated in the book of Bérard, we found ourselves at a loss, like a mouse with only one hole, not knowing what to do to pursue the cure, when the two remedies, alone indicated, had failed. »

This is very clear, Gentlemen; two remedies are not sufficient to practice Electro-homœopathy without a doctor; in this respect, the book of *Spécifiques* is not sufficient for the people, for persons who like to do it themselves.

If all the *new science* was reduced to two single trials, it could be said of us, as the celebrated physician Frappart exclaimed of Allopathy, « Medicine, poor science! Doctors, poor men of science! Patients, poor victims! »

I, therefore, occupied myself with these reclamations against the insufficient indications of remedies: I have displayed all the resources of my own discoveries and of my experiments (experiments already *made*, gentlemen, although you are pleased to call my work *the book of experiments to be carried-out*), I have developed numerous applications of the remedies discovered by me; finally, I had the boldness to write a book, in the midst of my occupations, of which you can hardly measure the extent, in the first place, to answer the reclamations which were made against the insufficiency of the book of *specifics*, and in the second place, I also avow, to recover my liberty, to publish my

Digitized by Google

writings where and when it may please me to do so; for M.r Bérard, you must know it, a long time, held me under the weight of his *veto*, not to reproduce his book of *spécifiques*, in Italy, which book after all, is at the bottom, nothing but an arrangement of my pamphlets and letters, as I have said.

You thought, gentlemen, to see, in my book, a *new evolution in the application of the remedies.* This is a blunder, if it is not an interested suggestion on your part. Here, there is no evolution, in the sense which you give to the word; it is only a display of curative means and of all the resources of electro-homœopathy, so as to get free men (with your leave) from the physician; for, my book is written so that every man may, if he wishes it, become his own doctor; *medicus esto tibi*, as had already said the celebrated school of Salerno, some centuries since. Thus, on one hand, to avoid the *evolutions*, I took care to maintain, in the first place, the two monotonous and *unvarying* remedies, indicated by M.r Bérard, yet fixing the doses better; and, on the other hand, I added that which is required by persons who do not whish to employ a doctor. I think that I had the right to do all this; for, without contesting your tendancy to establish a school of your own, which I shall abstain from wishing to *annul*, without waiting even *the decision of the future*, without making *other proofs* or *experiments*, the electro-homœopathy, gentlemen, it is I.

You may make experiments; all the world may do so; my book, which is, contrary to your opinion, the book of experiments already made, may be more and more enriched; I am, already, thinking of a new edition, as the first is nearly exhausted. It is, precisely, a result of my experiments, that

Digitized by Google

medicated baths, for instance, are extremely powerful in all or nearly all the cures. But it is necessary to employ *plenty of granules, plenty of liquids!* I understand that this may be the cause of some embarrassment to those who, at Geneva, take care to perfect the globules, which come from Bologna.

For, if it requires, for a bath, 100 imperfect globules of Bologna, which cost one franc, it requires to make a bath of equal strength, a pound of these globules, perfected at Geneva, which would cost 200 francs.

Two hundred francs for a bath? Gentlemen, I am of your opinion, that it is too much; all the world will understand that it is better, with equal effects, to only expend a franc on imperfect globules, than to spend 200 francs on the perfected or refined globules at Geneva.

This is, in my opinion, the inconvenience of the *large doses*, which have caused dismay at Geneva; thus, the author of the article in the *Review* does not, at all, disguise his war against *costly consumption*, and he really touches the bottom of the question when he declares, that he will hold rigorously to the *minimum doses*. It is that he is acquainted with them quite as much as the maker of these perfect globules.

Learn, gentlemen of the *Revue*, and all you, semi-philanthropists, and semi-egotists, that the straight path is always the best and the most convenient. The crooked ways, like the *improvements* of Geneva, like the *fire of the electricities*, calmed with cool water in England, will fail with the electricity sold in Germany, at 800 francs the bottle, with globules sold at a dollar each, in New-York; all this, I say, will fall into a *fiasco*.

What? You start a journal for the diffusion

Digitized by Google

of Electro-homœopathy of which you know all the aims, and from the fifth number, you make an attack, on whom? The inventor himself! You have the air to denounce him as a plagiary, as an evolutionary, an inconsistent innovator, throwing to the public a book destined, you say, to be the book of experiments to be tried!

Ah! gentlemen, my book is launched throughout the entire world, from Stockholm to Tunis, from Moscow to San Francisco. I shall prepare, shortly, a new edition, with your leave, without imposing on you the *veto* to do as much and better. I allow you to profit by the little I am worth, for I do not compete; I shed light, and at my own expense, in order to spread, over the world, the boon which has fallen from Heaven into my hands.

You are troubled with *large doses*, *with this luxury* (I copy your expressions so as to *disguise* nothing) *of remedies almost always excessive*, *requiring an employment so costly*, *that it will be impossible for persons of small means to procure the needful.*

Any one, not acquainted with your *good intentions*, would think, according to you, that I had introduced large doses, baths, unctions, etc., not to cure but to increase the consumption, or, in plain words, to make a *commercial speculation!* This is unworthy! This is disgusting! For 20 years, I have striven to prevent the speculation, which, many doctors of the ancient and specially of the *new school*, wish to make of my remedies. For 20 years, have I exerted myself to retain, in my own hands, my discovery, so that it should not fall into the hands of certain philantropists, who only regard medicine with an eye of covetousness; you know all this, gentleman of article n° 5, and you insinuate,

Digitized by Google

in your calm, oily style, full of compassion for *persons of small means*, that I denounce small doses, that I invent evolution, to render the cure inaccessible to the poor, and to increase the consumption of the remedies? You had an unlucky chance, blot it out. After that, you will do well to *start* your school apart, the school of *tried experiments;* you can there, display your talents, your medical inventions, and, specially, your lofty philanthropy; but, alas! after so much philanthropy, the people understand the word; useless to dream of again catching it there.

Your contributor.

C. MATTEI.

Dalla Rochetta, 4th July 1878.

Digitized by Google

Digitized by Google

SUPPLEMENTARY TABLE

to look for the maladies on the catalogue

A — Abdomen . . . . . *Pag.* 101
Accidity (See Stomach)
Affections - mental - (See Insanity)
» - nervous - of the womb . . 189
Agitation - nervous - 154
Alba dolens 103
Albinos 128
Albuminuria 103
Alterations - nervous - 118
» of the womb 103
Amaurosis 103
Ambliopia (See Weakness of the sigt)
Amenorrhoea 103-152
Amygdaloid 104
Angina 104-181
Anoemia 104
Appetite. 104
Ascitis 102-106

Digitized by Google

B — Back of the head (Cramps of the) . *Pag.* 119
Belly (See Abdomen)
» (Tubercular tumour of the). . . . 183
Blemishes of the face 131
Blood 108
Bowels 110
Bronchitis 111
Burns and Scalds 111
Buzzing in the ears 111

C — Caries of the bones of the nose 115
» of the teeth 115
Catarrh 116
Cephalalgia. 137-160
» - rheumatismal - 139
Change of life. 116-189
Children - treatment of ricketty - 155
Colds in the head 116
Colics 117
Colic - periodical - of the womb 189
Commotion of the brain 138
Congestion of the liver 147
» - chronic - of the lungs . . . 149
» - chronic - of the womb . . . 189
» - fatty - 135
Contraction of the hand 117
» of the nerve sciatic 169
Contusion of the foot 131

Digitized by Google

Consumption - intestinal - . . . . *Pag.* 102-110
» of the loins 148
Convulsions of the bottom of the stomach. 175
» of the womb. 189
Coryza 118
Cough - arising from worms - 148
» - congestive - 148
» - simple - 148
» - tuberculous - 148
» - with hectic symptoms - 149
Cramp - menstrual - 119
Curvature of the spine 173
Cyanosis (See Congelation)
Cystitis 108-119

D — Debility. 121
Disorders caused by worms. 189
Difficulty in swallowing . . . . . - . 181
Dilatation of the stomach 175
Diseases - cutaneous - 119
» of the blood 108
Disorganisation - chronic - of the lung. . 150
Displacement of the vertebra 173
Displacing nerve of the arm 105
Dropsy of the chest 149
Dysecia 123
Dysmenorrhoea 122
Dysuria. 122

Digitized by Google

E — Effusion of the brain . . . . . *Pag.* 139
Encephalitis 138
Enteralgia 102
Enteritis 102
Epilepsy. 125
Epistaxis 125
Exantema of the hands 120
Eyes - bleared - 128
» burnt by lunar caustic 129

F — Fevers 131
Fever - miliary - (See Fevers)
Fistula - dental - 180
» - sitting - 133
Frost bites 134

G — Gastralgia 176
Gastritis 175
Gastrohepatitis 147
Glands - swolen - of the neck. 136
Gonorrhoea (See Syphilis)
Granulations of the womb 189
Grapes (Staphyloma) 127
Gutta - serena - (See Amaurosis)

H — Headaches - uterine - 189
Headache (Cephalalgia) 137
Heel (Cramps in the nerves of the). . . 119

Digitized by Google

Hemicrania. . . . . *Pag.* 139
Hemorrhage of the eyes 128
» from the ear 123
» of the womb 152-189
Hepatitis 147
Herpes 120
Hiccugh (See Sobbing)
Hoarseness. 149
Hoematemesis. 186
Hoematuria 184
Hoemoptysis 186
Humpback. 173
Hydrocele 182
Hydrocephalus 138
Hydrophobia 142
Hypocondria 142-144

I — Idiocy 144
Imbecillity. 144
Impetigo 130-142
Impossibility of opening the mouth . . . 153
Inertia of the hands, and arms 106
Inflammation of Eyelids (Blepharitis) . . 129
» of the lungs 149
» of the nipple 111
» of the salivary glands under the ear 123
» - periodical - of the bowels . 110

Digitized by Google

Influenza . . . . . *Pag.* 149
Insanity 143
Intertrigo 171

J — Jaundice (Icterus) 145

L — Labour - interrupted - 103
Larynx (See Throat, Lungs)
Laryngitis - rheumatic - 181
Lethargy 146
Lichen (See Pruritus, Diseases cutaneous)
Lienteritis (See Bowels)
Liver 147
Loins 148
Lumbago (See also Loins) 148
Lupus of the face 130

M — Madness - canine - (See Hydrophobia)
Melancholy 144
Meloena 151-187
Menace of the Paralysis 157
Menaposis (See Change of life)
Menengitis 138
Menses 152
Mesenteritis 102
Metritis - puerperal - 188
Milk (Loss of the) 111
» (Secretion of the) 111

Digitized by Google

Misanthropy (See Insanity, Liver)
Miserere (Twisting of the bowels) . *Pag.* 102
Monomany (See Insanity)
Movements - convulsive - 118

N — Nephritis 148
Neuralgia of the head. 139
Neurosis (See Nerves)
Nerves 153
Nipples - chapped - 111
» - craked - 111
Nostalgia (See Insanity, Melancholy)
Notalgia (See Loins)
Numbness of arm 106
Nymphomania 144-157

O — Obesity - morbid - 102-157
Oedema 150
Ophtalmia 126
Orchitis (See Testicles) 180
Otitis. 123
Otorrhoea 123
Ovaries (their diseases) 188
Ovaritis 188
Ozoena - scrofulous - 156

P — Pain in the instep 131
Pains - accidental nervous - 154

Digitized by Google

Pains or stitches in the side (Pleurodinia) . . . . . *Pag.* 149
» - shooting - in the head 139
Pancreatitis 103
Paralysis of arm. 105
» of bladder 108
Paroxysms of fury 144
Periostitis 155
Peritonitis 102-162
Pharynx (Tumour of the) 181
Phlebitis (See Veins)
Phtisis - tubercular - 150
» with complications of the Larynx . 150
Piss - warm - 163
Pleurisy. 149
Polypus in the auditory canal 124
» » pubis 165
» of the bladder 108
» » bowels 110
» » nose 156
» » womb . . . . . , . 188
Poverty of blood (See Anoemia, Blood)
Pregnancy - false - 103
» difficult or painful 163
Prolapsus ani. 164
» uteri 164
Pruritus 164-165
Pyrosis 175

Digitized by Google

R — Rage . . . . . *Pag.* 165
Receding of the gums 179
Retraction of the ligaments of the womb . 188
Rheumatism of the knee 146

S — Salivation (Sialorrhoea) 168
Semi-Ancylosis 106
Sensation - painful - 161
Shortness of sight 129
Sickness - falling - (See Epilepsy)
Sobbing 172
Softening of the bones. 156
» » brain. 138
Spasms in the ear 124
» of the eyelid with vertigo . . . 129
» of the womb 188
Specks in the cornea 128
Spermatorrhoea 173-184
Spina ventosa 155
Splenitis. 174
Spots on skin and also on face 171
Squinting (Strabismus) . . . . . : 128
Stammering 174
Staphyloma. 127-174
Stiff neck (Torticolw) 116-174
Stomach. 175
Strabismus. 128
Strangulation of the bowels 110

Digitized by Google

Stranguria (Dysuria) . . . . . *Pag.* 184
Stricture of the urethra 184
Strictures in general 176
Stuttering 174
Soppression - sudden - of the menses . . 152
Suppuration of nose 156
Swelling of the foot 131
Syphilis . . . . . , 178

T — Tenia 180-189
Throat 181
Throat - clergyman' s sore - 181
Tubercules - inflammatory - on face . . . 130
» of mesenteric gland 110
» of brain. 138
Tumour at the upper cardiac 176
» - internal fibrous - 183
» of the belly 183
» of the cornea. 182
» of the liver 147
» - scrofulous - . . . . , . . . 183
» - small - at edge of eyelids . . 128
Twisting of the bowels (Miserere) . . . 102

U — Ulceration of the stomach 175
» - varicose - 146
Ulcers - varicose - 183
Urine - scalding - 185
» (Loss of) 184

Digitized by Google

V — Varicocele . . . . . *Pag.* 182
Vegetations - fleshy - 182-186
» - cancerous - 156
Veins (affections of) 186
Vision - indistinct 128
Voice (Weakness of the) 181
» (Loss of the) 186
Vomituration 187

W — Want of appetite (See Appetite)
Weakness general of mind and body . . 144
» of bowels 110
» of the sight (Ambliopia) . . . 126
Weariness 139
Wen - Derbyshire neck - (See Glands)
Wetting the bed. 108
Whites (See Womb and Abdomen)
Womb 188
Wounds resulting from burns 190

Digitized by Google

Digitized by Google

INDEX OF CONTENTS

Notice . . . . . *Pag.* v
Caution . . . . . » xv

INTRODUCTION

The inventor of electro-homœopathy affirms the reality of his existence . . . . » 1
Inability of the classic medicine . . . . » 3
Hahnemann and his discovery . . . . . » 7
First steps towards the discovery of the new remedies. . . . . » 10
Theoretical principles drawn from experience » 13
Data of physiological sciences in relation to the principles of the *new science* . . » 17
Electro-homœopathy compared with homœopathy. . . . . » 23
How the action of small doses can be accounted for: and of the necessity of attenuating the remedy according to the gravity of disease . . . . . » 25
First public trials of the electro-homœopathic remedies . . . . . » 27
Reception by the doctors and commerce of the remedies, recognised as marvellous » 28
The pretext of secrecy . . . . . » 31
Diffusion and progress of electro-homœopathy » 33

Digitized by Google

Medical reform which ought to result . . *Pag.* 36
The question of legal medicine . . . . » 42
The question of secrecy reduced to its real terms. . . . . » 47
Vain efforts to stop the progress of electro-homœopathy which is truth in medicine » 49

MEDICAL PART

CHAPTER I. — First notions of the *new science*. . . . . » 53
CHAPTER II. — Names and number of the electro-homœopathic remedies, of which the action is now known by experiment . . . . . » 60
Important remarks . . . . . » 61
Why these remedies are called *electro*. . . . . » 64
CHAPTER III. — General indications as to the Electro-homœopathic remedies » 67
Their radical action on the causes themselves of diseases . . . . » 68
CHAPTER IV. — Sphere of action of the remedies in globules . . . . . » 70
CHAPTER V. — General observations as to the electric liquids . . . . . » 76
Mode of application. Points of application. Length of application . . » 78
CHAPTER VI. — Results of experience . . » 82
CHAPTER VII. — Doses and method of administration of the remedies in globules . . . . . » 84
Dilutions. External use, baths, compresses, unctions, gargles . . . » 85
Rules drawn from experience . . . » 85

Digitized by Google

CHAPTER VIII. — Of Diagnosis. Principles and Rules for the selection of the appropriate remedy . . . . . *Pag.* 89
Necessity of having recourse to all the modes of treatment offered by the new therapeutic . . . . . » 92
CHAPTER IX. — Easy experiments to *demonstrate* the reality of the effects of the new remedies . . . . . » 94
Short popular anatomical lesson. . » 96
Preliminary remarks as to consulting the catalogue of diseases . . . » 99
Signs and abbreviations employed in the catalogue (see the table after page 100) . . . . . » 100
Catalogue of diseases, cured by electro-homœopathy with the indication of the remedies suitable for curing them . . . . . » 101
APPENDIX. — Sketch of a demonstration, after known facts, of the fundamental principle of electro-homœopathy and the *law of similars* . » 193
Defence of Count Mattei against the attacks of the *Revue Electro-homœopathique* of Geneva . . . » 209
Supplementary table to look for the maladies on the catalogue . . . » 217

Digitized by Google

Digitized by Google



1



tal.

l.

se.

ls.

nach.

c of ditto.

glossids.

les behind the ear

glossids.

e.

Foot.

gl.

(7.th vertebra.)

tomach.

es corresponding t

between the two orifices)

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Filmed by Preservation 1990

Digitized by Google

UNIVERSITY OF MICHIGAN
3 9015 06441 1096

Digitized by Google